COMM. INST. ENTOM
LIBRARY
No. 9382/2

EXD

SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

IMP. INST. ENT.
— LIBRARY —
17 DEC 1947
Ent. 156 A

MEMORANDA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

20

SUPPLEMENTUM

EDENDUM CURAVIT

ENZIO REUTER

HELSINGFORSIAE 1947

SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

MEMORANDA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

20

SUPPLEMENTUM

EDENDUM CURAVIT

ENZIO REUTER

HELSINGFORSIAE 1947

MEMORANDA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 20, SUPPL.

INDEX GENERALIS

MEMORANDORUM 1—20 (1927—1945)

SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA

ELABORAVIT

ENZIO REUTER

HELSINGFORSIAE 1947

HELSINGFORS 1947
GEDRUCKT BEI OY. TILGMANN AB.

QUAE HOC LIBRO CONTINENTUR.

	Pag.
Praefatio. — Vorrede	VII
Abbreviationes	XI
Index Auctorum chronologicus	1
Index auctorum alphabeticus	41
Index rerum. Varia	46
Anthropologia	46
Bibliotheca Societatis, Bibliographia	46
Biographia	46
Excursiones, Itinera	49
Historia	50
Hydrographia, Hydrologia	50
Oeconomia Societatis	50
Provinciae biogeographicae	50
Tutela naturae	50
Varia	50
Pars Botanica	53
Index systematicus	53
Algae	53
Bacteria	53
Fungi	53
Lichenes	53
Musci	54
Plantae vasculares	54
Index rerum	56
Agricultura, Horticultura	56
Biochemia	56
Biologia, Oecologia	56
Cecidia	58
Collectiones Societatis. (Flora)	58
Cytologia	58
Flora	58
Forestalia	59
Genetica	59
Limnologia, Hydrobiologia, Plancton	59
Monstrositates, Teratologia	59
Morphologia, Anatomia	60
Palaeontologia	60
Pathologia	60
Phaenologia	60
Phylogenia	60
Physiologia	60
Phytogeographia	61
Phytosociologia	62
Synonymia, Nomenclatura	63
Systema et Formae novae	63
Technica, Methodi	64
Topographia	64
Vegetatio	64
Verband fenno-baltischer Pflanzengeographen	64
Index specierum	64
Algae	64
Bacteria	83
Fungi	83
Lichenes	90
Musci (Bryophyta)	96
Pteridophyta	104
Phanerogamae (Anthophyta)	107
Pars Zoologica	171
Index systematicus	171
Protozoa	171
Coelenterata	171
Turbellaria	171
Nematodes	171
Nemertini	171
Polychaeta	171
Oligochaeta	171
Hirudinea	171
Tardigrada	171
Crustacea	171
Araneida	171
Acarina	171

Pag.

Myriopoda 171
Insecta 171
Thysanura 172
Orthoptera 172
Isoptera 172
Copeognatha 172
Thysanoptera 172
Mallophaga 172
Plecoptera 172
Odonata 172
Neuroptera 172
Trichoptera 172
Lepidoptera 172
Diptera 172
Aphaniptera 172
Coleoptera 172
Hymenoptera 172
Hemiptera 173
Mollusca 173
Bryozoa 173
Brachiopoda 173
Echinodermata 173
Vertebrata 173
Cyclostomata, Pisces 173
Amphibia 173
Reptilia 173
Aves 173
Mammalia 174
Index rerum 174
Animalia obnoxia 174
Biocoenose 174
Biologia, Oecologia 174
Cecidia 176
Collectiones Societatis. (Fauna) ... 176
Copiositas, Frequentia 176
Cytologia 176
Embryologia experimentalis 176
Fauna 177
Fauna hiemalis 177
Genetica 177
Hermaphroditismus, Gynandromorphismus 177
Hybridae 178
Importatio 178
Limnologia, Hydrobiologia, Plancton 178
Migratio 178
Monstrositates, Teratologia 178

Pag.

Morphologia, Anatomia, Histologia 178
Nidus 178
Palaeontologia 179
Parasitae 179
Pathologia 179
Phaenologia 179
Physiologia 179
Piscatoria, Piscicultura 179
Sexualitas 179
Signatio 179
Stadia juvenalia 179
Synonymia, Nomenclatura 179
Systema et Formae novae 179
Technica 180
Transportatio marina 180
Vagatio 180
Variationes coloris 180
Zoogeographia 181
Zoologia venatoria 181
Index specierum 182
Protozoa 182
Coelenterata 182
Turbellaria 182
Ratatoria 182
Gestrotricha 182
Nematodes 182
Nemertini 182
Polychaeta 182
Oligochaeta 182
Hirudinea 182
Tardigrada 182
Crustacea 183
Araneida 183
Pseudosorpionidae 183
Acarina 183
Myriopoda 185
Thysanura 185
Orthoptera 185
Dermaptera 185
Copeognatha 185
Thysanoptera 185
Mallophaga 185
Anoplura 186
Plecoptera 186
Odonata 186
Ephemeroidea 186
Neuroptera 186

	Pag.
Mecoptera	187
Trichoptera	187
Lepidoptera	187
Diptera	199
Aphaniptera	205
Strepsiptera	205
Coleoptera	205
Hymenoptera	217
Hemiptera	222

	Pag.
Mollusca	226
Bryozoa	227
Brachiopoda	227
Echinodermata	227
Cyclostomata, Pisces	227
Amphibia	228
Reptilia	229
Aves	229
Mammalia	236

PRAEFATIO. — VORREDE.

Im Jahre 1939 erschien unter dem Titel »Index generalis Actorum 1—60 (1875—1937) Societatis pro Fauna et Flora Fennica» ein von mir, auf Grund eines von dem Vorstand der Societas pro Fauna et Flora Fennica gegebenen Auftrages, ausgearbeitetes Sach- und Artenregister der genannten Schriftenserie (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 61, 431 S.).

Im Jahre 1944 wurde unter dem Titel »Index generalis serierum Notiser I—XIV (1848—1875) et Meddelanden 1—50 (1876—1925) Societatis pro Fauna et Flora Fennica» ein ähnliches Register über die von der nämlichen Gesellschaft publizierten Schriftenserien »Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica förhandlingar» und »Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica» herausgegeben (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 64, XV + 676 S.).

Am 10. Dez. 1942 erhielt ich, auch jetzt durch die Initiative des Vorsitzenden, Herrn Prof. ALVAR PALMGREN, von dem Vorstand der Societas pro Fauna et Flora Fennica den Auftrag, ein entsprechendes Register über die Schriftenserie »Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica» Vol. 1—20 zusammenzustellen. Dieses Register wird hier im Drucke vorgelegt.

Die frühere Serie »Meddelanden» wurde mit dem Heft 50 (1925) beendigt und durch die neue Serie »Memoranda» fortgesetzt. In dem jetzt vorliegenden Register ist das Material nach demselben Prinzip wie in den beiden früheren Registern angeordnet. Ich erlaube mir die dort für den Gebrauch des Registers in der Vorrede mitgeteilten Anweisungen in ihren Hauptzügen zu rekapitulieren.

Auch hier wird als erster Abschnitt ein chronologisches Inhaltsverzeichnis — Index Auctorum chronologicus (S. 1—40) — gegeben. In diesem gibt diejenige Ziffer, die unmittelbar nach dem Namen des betr. Verfassers folgt, die Nummernfolge des Aufsatzes bzw. der Notiz *dieses* Autors in der Schriftenserie an. (Beispiel: PALMGREN, ALVAR, 17. — Ajuga pyramidalis L. auf Åland.)

Falls (in den Verhandlungen der Gesellschaft) eine Mitteilung oder Notiz ohne Rubrik publiziert worden ist, wird hier eine solche neu gebildet und in eckige Klammern [] gestellt. (Beispiel: KROGERUS, ROLF, 1. — [Platanthera chlorantha Rchb., funnen i Ik]). Ist nur die *Rubrik* einer Mitteilung oder eines Vortrages erwähnt (ohne Text), so wird sie hier, nebst dem Namen des Verfassers, in runde Klammern () gesetzt. (Beispiel: (LINDBERG, HARALD, 1. — Forskningsresa i Tunisien.) — P. 5.).

In dem unmittelbar nach der chronologischen Inhaltsübersicht folgenden alphabetischen Verzeichnis der Autoren — Index alphabeticus (S. 41—45) — bezeichnet die erste Ziffer die oben genannte Nummernfolge der Mitteilungen des betr. Autors, die zweite, fett gedruckte Ziffer gibt die Nummer des Memoranda-Bandes, in dem die Mitteilung erschienen ist, und die dritte Ziffer die Seitenzahl

in dem betreffenden Band an. Auch hier sind, wie in den früherenRegistern, die verschiedenen Hinweise durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt. (Beispiel: ALFTHAN, K., **1**, **4**: 31; **2**, **5**: 79; **3**, **9**: 28.)

Nach diesem Autorenverzeichnis folgt ein allgemeines Sachregister (Index rerum. Varia, S. 46—51).

Das spezielle Sach- und Artenregister zerfällt auch hier in einen botanischen (Pars Botanica, S. 53—169) und einen zoologischen Teil (Pars Zoologica, S. 171—237).

In beiden wird zunächst eine systematische Übersicht — (Index systematicus, S. 53—55, 171—174) — derjenigen systematischen Hauptgruppen gegeben, auf welche sich die betr. Mitteilungen beziehen. Die für die hier aufgezählten Autoren angeführten Ziffern weisen auf den Index auctorum alphabeticus (S. 41—45) hin, wo unmittelbar nach der entsprechenden Ziffer eine Angabe über Band und Seitenzahl in der Memoranda-Serie folgt. Diese gleich nach den Autorennamen folgenden Ziffern entsprechen sowohl in dem Index systematicus als auch in dem Index rerum (S. 56—64, 174—181) der in dem chronologischen Inhaltsverzeichnis (S. 1—40) angeführten Nummernfolge der Mitteilungen des Verfassers in den Memoranda-Bänden.

Mit Rücksicht darauf, dass die meisten kürzeren Mitteilungen und Notizen floristischer oder faunistischer Art sind, werden — um Weitläufigkeiten zu vermeiden — in dem speziellen Sachregister (Index rerum) unter der Fachkategorie Flora bzw. Fauna nur die ausführlicheren Aufsätze und wichtigeren diesbezüglichen Mitteilungen aufgenommen. Hierbei werden, — wie in den Fachkategorien Phytogeographia, Phytosociologia, Vegetatio, Fauna und Zoogeographia — eingeklammert die biogeographischen Provinzen, auf welche sich die Mitteilungen beziehen, in abgekürzter Form angeführt (siehe Abbreviationes, S. XII). In dem allgemeinen Sachregister werden diese Provinzen hinsichtlich der Exkursionen (S. 49—50) ebenfalls angegeben. Wenn nur die *Rubrik* eines Vortrages erwähnt wird (ohne Text) und somit keine weitere Auskunft über den Inhalt des Vortrages gegeben wird, ist dies sowohl in den allgemeinen als auch in den speziellen Sachregistern (Index rerum) durch Hinzufügen eines Null-Zeichens (0) angedeutet.

In dem Artenregister — Index specierum (S. 64—169, 182—237) — sind Gattungen, Untergattungen, Arten, Unterarten, Varietäten und Formen, welche neu beschrieben werden, *kursiv*, solche, die als für die Flora bzw. Fauna Finnlands neu angemeldet werden, gesperrt gedruckt.

Wenn in einer Mitteilung nur der Gattungsname angeführt wird und die betreffende Gattung in dem biogeographischen Gebiete Finnlands bzw. in diesem Register nur durch eine einzige Art vertreten ist, so bezieht sich der Hinweis auf *diese* Art; andernfalls ist nach dem Gattungsnamen die Bezeichnung sp. (= species) hinzugefügt.

In den Arten-Registern bezeichnen die fett gedruckten Ziffern die Nummer des Memoranda-Bandes, die folgende oder folgenden Ziffern bezeichnen die Seite(n) des betreffenden Bandes; die verschiedenen Hinweise sind durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt. Falls in *demselben* Aufsatz eine Art oder Form wiederholt erwähnt ist, so werden in dem Register nur die erste und letzte Seite, durch drei Punkte (. . .) verbunden, angegeben. (Beispiel: Agrostis tenuis **1**: 17; **2**: 5 . . . 54; **6**: 26, 48; usw.). Wird eine Art nicht mit ihrem wissenschaftlichen (lateinischen) Namen, sondern anders (gewöhnlich in schwedischer oder finnischer Sprache) erwähnt, so wird der betreffende Hinweis in eckiger Klammer angeführt. (Beispiel:

Brassica rapa [**15**: 109].) Wird eine Art oder Form als nicht angetroffen bezeichnet oder beruht die Angabe hinsichtlich ihres vermeintlichen Vorkommens auf einem Irrtum, bzw. einer Fehlbestimmung oder Verwechselung, so wird der Hinweis eingeklammert. (Beispiel: Carex paludosa (**20**: 64)).

Bei der Ausarbeitung des Registers waren mir auch jetzt mehrere Fachgenossen mit Ratschlägen behilflich, und zwar unter den Botanikern die Herren Professoren A. PALMGREN, E. HÄYRÉN und HARALD LINDBERG sowie der Kustos des Botanischen Museums Dr. G. MARKLUND, unter den Zoologen der Kustos des Entomologischen Museums Dr. R. FREY, sowie die Amanuenses Dr. SVEN G. SEGERSTRÅLE, Mag.phil. W. HELLÉN und Mag.phil. A. F. NORDMAN, denen allen ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen möchte. Herrn Prof. Dr. HARALD LINDBERG bin ich ausserdem für seine wertvolle Mitwirkung bei dem Korrekturlesen zu Danke verpflichtet.

Über der Herstellung auch dieses Registers waltete ein Unstern. Als meine Wohnung am 6. Februar 1944 zum zweiten Mal durch einen Luftangriff zerstört wurde (vgl. die Vorrede, S. XII, in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 64), ging ein bedeutender Teil des Manuskriptes verloren und musste neu ausgearbeitet werden. Hierdurch wurde die Drucklegung des Registers wesentlich verzögert.

Helsingfors im März 1947.

ENZIO REUTER.

ABBREVIATIONES.

Ab. — Aberratio.
Acar. — Acarina.
Agric. — Agricultura.
Albin. — Albinos.
Alg. — Algae.
Amph. — Amphibia.
An. — Anatomia.
Anim. obnox. — Animalia obnoxia.
Aphan. — Aphaniptera.
Aran. — Araneida.
Bact. — Bacteria.
Bibl. — Bibliographia, Bibliotheca.
Biochem. — Biochemia.
Biocoen. — Biocoenose.
Biogr. — Biographia.
Biol. — Biologia.
Bor. — Borealis.
Bot. — Botanica.
Brach. — Brachiopoda.
Bryoz. — Bryozoa.
Cecid. — Cecidia.
Char. — Characeae.
Coel. — Coelenterata.
Col. — Coleoptera.
Collect. — Collectiones Societatis.
Cop. — Copiositas (Massenhaftes Auftreten).
Copeogn. — Copeognatha.
Crust. — Crustacea.
Cycl. — Cyclostomata.
Cyt. — Cytologia.
Derm. — Dermaptera.
Desmid. — Desmidiaceae.
Diat. — Diatomaceae.
Dipt. — Diptera.
Echin. — Echinodermata.
Embr. exp. — Embryologia experimentalis.
Ent. — Entomologia.
Esth. — Esthonia, Esthonica.
Exc. — Excursiones.
F. — Forma.
Faun. — Fauna.
Faun. hiem. — Fauna hiemalis (Winterfauna).
Faun. litor. — Fauna litoralis.
Fenn. — Fennia, Fennica.
Fig. — Figura.
Flor. — Flora.
Forest. — Forestalia.
Frequ. — Frequentia.
Genet. — Genetica.
Geogr. — Bio-, Phyto-, Zoogeographia.
Hem. — Hemiptera.
Herm. — Hermaphroditismus.
Hibern. — Hibernatio (Überwinterung).
Hirud. — Hirudinea.
Hist. — Historia.
Histol. — Histologia.
Hortic. — Horticultura.
Hybr. — Formae hybridae.
Hydrobiol. — Hydrobiologia.
Hydrogr. — Hydrographia.
Hydrol. — Hydrologia.
Hym. — Hymenoptera.
Imp. — Importatio.
Im. phot. — Imago photographica.
Ins. — Insecta.
Isopt. — Isoptera.
Itin. — Itonera.
Juv. — Juvenes, Stadia juvenalia.
Lapp. — Lapponia.
Lep. — Lepidoptera.
Lett. — Lettonia, Lettonica.
Lich. — Lichenes.
Limn. — Limnologia.
Lith. — Lithuania, Lithuanica.

Lus. — Lusus.
Mall. — Mallophaga.
Mamm. — Mammalia.
Mf. — Modificatio.
Migr. — Migratio.
Moll. — Mollusca.
Monstr. — Monstrositates.
Morph. — Morphologia.
Mp. — Mappa (Karte).
Mut. — Mutatio.
Myr. — Myriopoda.
Nemat. — Nematodes.
Nemert. — Nemertini.
Neur. — Neuroptera.
Nomencl. — Nomenclatura.
Odon. — Odonata.
Oecol. — Oecologia.
Oecon. Soc. — Oeconomia Societatis.
Oligoch. — Oligochaeta.
Orth. — Orthoptera.
Pal. — Palaeontologia.
Paras. — Parasitae.
Path. — Pathologia.
Phaen. — Phaenologia.
Phan. — Phanerogamae.
Phyl. — Phylogenia.
Physiol. — Physiologia.
Phytogeogr. — Phytogeographia.
Phytosoc. — Phytosociologia.
Pisc. — Pisces.
Piscat. — Piscatoria.
Piscic. — Piscicultura.
Planct. — Plancton.
Plant. — Plantae vasculares.
Plec. — Plecoptera.
Polych. — Polychaeta.
Prot. — Protozoa.
Pter. — Pteridophyta.
Rept. — Reptilia.
Sex. — Sexualitas.
Sign. — Signatio (Markierung, Beringung).
Synon. — Synonymia.
Syst. — Systema.
T. — Tabula (Tafel).
Tab. — Tabella.
Tard. — Tardigrada.
Techn. — Technica.
Terat. — Teratologia.
Terminol. — Terminologia.
Thys. — Thysanoptera.
Top. — Topographia.
Transp. mar. — Transportatio marina.
Trich. — Trichoptera.
Turb. — Turbellaria.
Tut. nat. — Tutela naturae (Naturschutz).
Vag. — Vagatio (Wanderung).
Var. color. — Variationes coloris (Farbenvarietäten).
Veget. — Vegetatio.
Vert. — Vertebrata.
Zoogeogr. — Zoogeographia.
Zool. — Zoologia.
Zool. ven. — Zoologia venatoria (Jagdzoologie).
Zygnemac. — Zygnemaceae.

Provinciae biogeographicae.

Ab — Regio aboensis.
Al — Alandia.
Ik — Isthmus karelicus.
Ka — Karelia australis.
Kb — Karelia borealis.
Kl — Karelia ladogensis.
Kr — Karelia rossica.
Ks — Kuusamo.
Le — Lapponia enontekiensis.
Li — Lapponia inarensis.
Lkem — Lapponia kemensis.
Lps — Lapponia petsamoënsis.
N — Nylandia.
Oa — Ostrobothnia australis.
Ob — Ostrobothnia borealis.
Ok — Ostrobothnia kajanensis.
Om — Ostrobothnia media.
Sa — Savonia australis.
Sb — Savonia borealis.
St — Satakunta.
Ta — Tavastia australis.
Tb — Tavastia borealis.

Index Auctorum.

A. Chronologicus.

Vol. 1 (1927).

(Lindberg, Harald, 1. — Forskningsresa i Tunisien.) — P. 5. — *Itin.*
Krogerus, Rolf, 1. — [Platanthera chlorantha Rchb., funnen i Ik.] — P. 5, 157. — *Plant.; flor.*
Munck, L., 1. — [Ett fynd av Acherontia atropos L.] — P. 6, 150. — *Lep.; faun.*
Kivirikko, K. E., 1. — [Mugil sp. löydetty Suomesta.] — P. 6, 149. — *Pisc.* (*Mugil capito*); *faun.*
Järvi, T. H., 1. — [Mugil sp.] — P. 6. — *Pisc.; faun.*
Warén, H., 1. — [Schoenus ferrugineus löytö.] — P. 6, 157. — *Plant.; flor.*
Pesola, V., 1. — [Schoenus ferrugineus.] — P. 6, 157. — *Plant.; flor.*
Hellén, W., 1. — [Menopon lutescens, ny för Finland.] — P. 6, 152. — *Mall.; faun.*
Forsius, Irmer, 1. — [Larven av Blasticotoma filiceti Klg.] — P. 6, 150. — *Hym.; faun.* (*larva*).
Krogerus, Rolf, 2. — Två för Finland nya skalbaggar från Ik. — P. 6, 149. — *Col.; faun.*
Luther, Alex., 1. — Über das Vorkommen der Bryozoe Victorella pavida S. Kent im Finnischen Meerbusen bei Tvärminne. — P. 7—9, 153. — *Bryoz,; faun., geogr.*
Brenner, Magnus, 1. — Pinus silvestris L. f. viminalis, teratologica. — P. 9—10, 153. — *Plant.; terat.*
—»— 2. — Tidig kottebildning hos granen [Picea excelsa (Lam.) Link.] — P. 10—11, 153. — *Plant.; oecol., path.*
Järvi, T. H., 2. — »Mäkäräpyry» (Simulium latipes Meig.) Ii- ja Oulujoella. — P. 11—12, 150, 151. — *Dipt.; cop.*
(Krogerus, Rolf, 3. — Insektlivet på Karelska näsets kustdyner.) — P. 12. — *Ins.* (*Dünenfauna*).
Forsius, Runar, 1. — Tvenne för Finlands fauna nya steklar. — P. 12, 149, 150. — *Hym.; faun., cecid.*
Hellén, W., 2. — Crabro kiesenwetteri Mor., ny för Nordeuropa. — P. 13, 149. — *Hym.; faun.*
Eklund, Ole, 1. — Botaniskt från Ab Korpo 1924. — P. 13—16, 153—154, 155, 156. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 2. — Baumförmige Hasel (Corylus avellana L.). — P. 16—20. — *Plant., musci, lich.; flor., oecol.*
—»— 3. — Über Rumex thyrsiflorus Fingerh. im ostfennoscandischen Florengebiet. — P. 20—29, 157. — *Plant.; flor., geogr.*
Krogerus, Rolf, 4. — Om några för Finlands fauna nya Bledius-former. — P. 29—30, 149. — *Col.; faun.*
Palmgren, Alvar, 1. — Juncus balticus Willd., neu für Nyland. — P. 30—33, 150. — *Plant.; flor., geogr.*
(Kivirikko, K. E., 2. — Thianschan-vuoriston eläimistö.) — P. 33. — *Itin.*
Lindberg, Harald, 2. — [Växter, vilkas fridlysning vore önskvärd.] — P. 33. — *Plant.; tut. nat.*
Forsius, R., 2. — [Sällsynta växter från Ik.] — P. 34, 155. — *Plant.; flor.*
Carpelan, Jarl, 1. — [Vaccinium vitis idaea f. leucocarpa från Petsamo.] — P. 34, 158. — *Plant.; flor.*
Hellén, W., 3. — Aploderus caesus Er., en för vårt faunaområde ny skalbagge. — P. 34, 149. — *Col.; faun.*

FORSIUS, RUNAR, 3. — Cecidologische Beiträge III. — P. 34—38, 149, 150, 151. — *Dipt., hym.; faun., cecid.*
FREY, R., 1. — För Finlands fauna nya Dolichopodider och Empidider. — P. 38—39; 150. — *Dipt.; faun.*
PALMGREN, ALVAR, 2. — Torilis Anthriscus (L.) Gmel. auf Åland. — P. 39—41, 158. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 3. — Epilobium rubescens Rydb. im Schärenarchipel von Åland gefunden. — P. 41—42, 156. — *Plant.; flor., geogr.*
(LINDBERG, HARALD, 3. — Överblick av vegetationen i Tunisien.) — P. 42. — *Veget.*
HINTIKKA, T. J., 1. — Perunasyövän turmelemia perunamukuloita. — P. 42—43, 158. — *Plant.* (*Solanum tuberosum*), *fungi* (*Synchytrium endobioticum*); *path.*
EKLUND, OLE, 4. — [Lepus europaeus, skjuten i Karuna.] — P. 43. — *Mamm.; faun.*
MONTELL, JUSTUS, 1. — Heleocharis triangularis Reinsch, en art, som bör närmare studeras. — P. 43—44, 154, 155. — *Plant.; syst., flor.*
CEDERCREUTZ, CARL, 1. — En för landet ny oscillatoriacé. — P. 44, 158. — *Alg.* (*Phormidium subuliforme*); *flor.*
—»— 2. — Några i januari 1925 blommande fanerogamer. — P. 44—45, 153. — *Plant.; phaen.*
PALMGREN, ALVAR, 4. — Carex brunnescens (Pers.) Poir., neu für Åland. — P. 45—47, 156. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 5. — Juncus balticus Willd. auf Åland. — P. 47—48, 156. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
—»— 6. — Suaeda maritima (L.) Dum. auf Åland. — P. 49—51, 157. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
—»— 7. — Salix repens *rosmarinifolia L., ein östlicher Einwanderer auf Åland. — P. 51—52, 157. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 8. — Geranium pratense L., neu für Åland. — P. 52—56, 156. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 9. — Thymus chamaedrys Fr., neu für Åland. — P. 56—58, 157. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 10. — Pyrola media Sw. auf Åland. — P. 58—61, 157. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
KUJALA, V., 1. — [Geranium pratense, mahdollisesti etelästä levinnyt Haminaan.] — P. 61. — *Plant.; geogr.*
PUOLANNE, M., 1. — [Rumex maritimus mahdollisena eteläisenä tulokkaana Helsingissä.] — P. 61. — *Plant.; geogr.*
KROGERUS, ROLF, 5. — [Cassida murraea, en baltisk invandrare i vårt land.] — P. 61, 149. — *Col.; geogr.*
FREY, R., 2. — [Platystoma seminationis, sannolikt invandrad från söder.] — P. 61, 151. — *Dipt.; geogr.*
JÄRVI, T. H., 3. — Nilakan ja Pielaveden muikkukannoista. — P. 62. — *Pisc.* (*Coregonus albula*); *oecol.*
LINDBERG, HARALD, 4. [Anmärkning om Heleocharis triangularis' berättigande som art.] — P. 62. — *Plant.; syst.*
MUNCK, L., 2. — [Mus rattus L. från Tavastehustrakten.] — P. 62. — *Mamm.; faun.*
LINDBERG, HÅKAN, 1. — Drei für Ostfennoskandien neue Käfer aus Enontekis-Lappland. — P. 62—63, 149. — *Col.; faun.*
—»— 2. — Zur Kenntnis der subalpinen und alpinen Hemipterenfauna von Enontekis-Lappland. — P. 63—68. — *Hem.; faun.*
HELLÉN, WOLTER, 4. — Bidrag till Finlands Mallophagfauna. — P. 68—70, 151—152. — *Mall., aves; faun., paras.*
FORSIUS, I., 2. — Tvenne nykomlingar för Finlands Eriophyidfauna. — P. 70—71, 153. — *Acar.; faun., cecid.*
PALMGREN, ALVAR, 11. — Potamogeton polygonifolius Pourr. in Finnland. — P. 71—75, 157. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 12. — Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. auf Åland. — P. 75—78, 156. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 13. — Neuer Fundort von Carex arenaria L. auf Åland. — P. 78—79, 156. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 14. — Neue Lokalitäten für Fritillaria Meleagris auf Åland. — P. 79—81, 156. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 15. — Polygonum Persicaria L., neu für Åland. — P. 82, 157. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 16. — Neue Lokalität für Lepidium campestre L. (R. Br.) auf Åland. — P. 82—83. — *Plant.; flor., geogr.*

Palmgren, Alvar, 17. — Ajuga pyramidalis L. auf Åland. — P. 84—86, 155. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 18. — Thymus Serpyllum L., ein ostbaltischer Einwanderer auf Åland. — P. 86—88, 157—158. — *Plant.; flor., geogr.*
(Korvenkontio, V., 1. — Piisamimyyrästä [Fiber zibethicus].) — P. 88. — *Mamm.; imp.*
Krogerus, Rolf, 6. — Anmärkningsvärda hemipterfynd på Karelska näsets kustdyner. — P. 88—89, 151. — *Hem.; faun.*
Buch, H. R. V., 1. — Cladopodiella statt Cladopus. — P. 89—90. — *Musci; syst.*
Hidén, Ilmari, 1. — Carex brunnescens × loliacea (C. Laestadii Holmb.) Suomessa. — P. 90—91, 154, 156. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 2. — Kolme mainittavaa saniaislöytöä Rovaniemeltä. — P. 91—93, 154, 155, 156. — *Plant.; flor.*
Puolanne, M., 2. — Kasvilöytöjä Helsingin alueelta. — P. 93—94, 155, 156, 158. — *Plant.; flor.*
(Lindberg, Harald, 5. — Tre veckor på Sicilien.) — P. 95. — *Itin.*
Levander, K. M., 1. — Komitea metsäriistakannan edyllytysten tutkimista varten. — P. 95. — *Zool. ven.*
Frey, Richard, 3. — [Tvenne för Finland nya stickmyggor.] — P. 95, 150. — *Dipt.; faun.*
Palmgren, Alvar, 19. — Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. (= Matricariae (Schranck) Spreng.) auf Åland. — P. 95—97. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 20. — Bemerkenswerte Lokalität für Lycopodium clavatum L. auf Åland. — P. 97—100, 156. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
—»— 21. — Ruppia spiralis (L.) Dum. auf Åland. — P. 100—102, 157. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 22. — Neue Lokalitäten für Aquilegia vulgaris L. auf Åland. — P. 102—105, 155. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 23. — Litorella uniflora (L.) Aschers., neu für Åland. — P. 105—106, 156. — *Plant.; flor., geogr.*
Holm, K., 1. — Picea excelsa Link. f. medioxima Nyl. l. viminalis Casp. — P. 107, 1 fig., 156. — *Plant.; flor.*
Forsius, I., 3. — Calidris alpina schinzii (Brehm) skjuten i Helsingfors skärgård. — P. 108—109, 148. — *Aves; faun., migr., syst.*
Schoultz, Åke von, 1. — Muscicapa p. parva Bechst. — P. 109—110, 148. — *Aves; faun., migr.*
Kotilainen, Mauno J., 1. — Cirriphyllum Vaucheri (Schimp.) Loesk. et Fleisch. Ruskealassa. — P. 110, 158. — *Musci; flor.*
Palmgren, Alvar, 24. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1924—13. 5. 1925. — P. 111—136. — *Hist., biogr.*
Idman, G. R., 1. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1924. — P. 136—138. — *Oecon. soc.*
Reuter, Enzio, 1. — Årsberättelse över bibliotekets tillväxt 1924—1925. — P. 139—140. — *Bibl.*
Välikangas, Ilmari, 1. — Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu toimivuonna 1924—1925. — P. 141—144. — *Collect., faun.*
Frey, Richard, 4. — Årsberättelse rörande de entomologiska samlingarna under verksamhetsåret 1924—1925. — P. 144—145. — *Collect. (ins.):*
Lindberg, Harald, 6. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1924—1925. — P. 145—147. — *Collect.; flor.*

Vol. 2 (1927).

(Kotilainen, Mauno J., 2. — Havainnoita tunturikasvien, lähinnä tunturisammalten ekologiasta.) P. 3. — *Musci; oecol.*
Lindberg, Harald, 7. — [Anthemis cotula, funnen i Hangö hamn sommaren 1925.] — P. 4, 115. — *Plant.; flor.*
Häyrén, Ernst, 1. — [Anteckningar angående kulturväxterna i Lappland, främst i Petsamo.] — P. 4. — *Plant.; hortic.*
Olsoni, B., 1. — Botaniska notiser från sommaren 1925. — P. 4, 115, 116. — *Plant.; flor.*
Forsius, Runar, 4. — Cecidologische Beiträge IV. — P. 4—8, 114. — *Dipt.; hym.; faun., cecid.*
Krogerus, Rolf, 7. — Tre för Finland nya skalbaggsformer. — P. 8, 113. — *Col.; faun.*
Schneider, Guido, 1. — Neue Fundorte für Protohydra leuckarti Greeff bei der zoologischen Station Tvärminne. — P. 8—10. — *Coel.; faun.*

LINDBERG, HÅKAN, 3. — Entomologiska notiser. — P. 10—12, 113, 114. — *Col., hem.; faun., oecol.*
FREY, R., 5. — Tre för landets fauna nya harkrankar. — P. 12, 114. — *Dipt.; faun.*
EKLUND, OLE, 5. — Versuche über das Keimungs- und Schwimmvermögen einiger Samen und Früchte in Ostseewasser. — P. 13—29. — *Plant.; physiol., oecol.*
(HÄYRÉN, ERNST, 2. — Växtvärlden, främst den marina algvegetationen i Petsamo.) — P. 30. — *Alg.*
PALMGREN, ALVAR, 25. — [Minnesord med anledning av att 80 år förflutit sedan J. A. Palméns födelse.] — P. 30. — *Hist.*
(PIPPING, MÄRTA, 1. — [Fiskarnas luktsinne och dess betydelse för uppsökandet av föda.].) — P. 30, 113. — *Pisc.; oecol.*
FORSIUS, I., 4. — Meddelanden om några sällsynta fåglar. — P. 30—34, 112. — *Aves; faun., migr.*
MONTELL, J., 2. — Butomus umbellatus L. funnen i Muonio. — P. 34, 115. — *Plant.; flor.*
HELLÉN, WOLTER' 5. — En för faunan ny bladlus, Pterochlorus roboris L. — P. 34—35, 114. — *Hem.; faun., oecol.*
(LEVANDER, K. M., 2. — Petsamon merenrantojen eläimistöstä.) — P. 35. — *Fauna litoralis.*
STENIUS, G., 1. — Platynychus cinereus Hrbst., ny för faunan. — P. 35, 113. — *Col.; faun.*
LINDBERG, HARALD, 8. — För landet nya eller sällsynta adventivväxter. — P. 35—36, 115, 116. — *Plant.; flor.*
NESSLING, E., 1. — Intressanta fynd av skalbaggar, varav två för landet nya arter. — P. 36—37, 113. — *Col.; faun.*
—»— 2. — En för landet ny microlepidopter. — P. 37, 113. — *Lep.; faun.*
FREY, R., 6. — Ytterligare tre för faunan nya tipulider (Limnophiliner). — P. 37—38, 114. — *Dipt.; faun.*
(LINKOLA, K., 1. — Seerumdiagnostiikka kasvisystematiikan palveluksessa.) — P. 38. — *Plant.; syst.*
(SCHULMAN, HJ., 1. — [Försök med en tam hare.].) — P. 38. — *Mamm.* (*Lepus timidus*); *oecol.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 3. — Ein beachtenswerter Moosfund, Fontinalis dichelymoides Lindb. mit Sporogonen. — P. 38—39, 116. — *Musci; flor.*
(MERIKALLIO, E., 1. — Äyrapäänjärven linnusto.) — P. 39. — *Aves.*
HORTLING, I., 1. — Olika geografiska raser av staren. — P. 39—40. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*); *syst.*
RENVALL, THORSTEN, 1. — [Färgförändringarna hos staren.] — P. 40. — *Aves* (*Sturnus vulgaris*).
MUNCK, L., 3. — Sträckande vildgäss invid Helsingfors. — P. 40. — *Aves* (*Anser*); *migr.*
PALMGREN, ALVAR, 26. — [Några växters uppträdande på Åland.] — P. 40. — *Plant.; flor.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 4. — Eräitä huomattavia kasvilöytöjä Tervolasta. — P. 40, 116. — *Plant.; flor.*
LINKOLA, K., 2. — Eräitä eteläisluontoisten kasvien löytöjä Pohjois-Suomesta. — P. 41—42, 115, 116. — *Plant.; flor.*
MONTELL, J., 3. — Tvenne oväntade växtfynd. — P. 42—43, 115, 116. — *Plant.; flor.*
(LINKOLA, K., 3. — [Pohjois-Suomen ja Lapin luonnonsuojelualueista.].) — P. 44. — *Tut. nat.*
KROGERUS, ROLF, 8. — [Revision av de inhemska Choleva-arterna.] — P. 44. — *Col.; faun.*
—»— 9. — [Anthicus axillaris Schmidt, ny för Finland.] — P. 44, 113. — *Col.; faun.*
FORSIUS, I., 5. — [Alcedo atthis ispida L. funnen i Helsingfors.] — P. 44, 112. — *Aves; faun.*
ODENWALL, E., 1. — [Subfossila hasselnötter, funna i Lappajärvi socken.] — P. 44, 115. — *Plant.* (*Corylus avellana*); *pal.*
KROGERUS, R., 10. — Parasitsteklar från Karelska näsets dynområden. — P. 44—48, 113, 114. — *Hym.; faun., oecol.*
OLSONI, B., 2. — Växtvärlden på Tytärsaari och Säyvi. — P. 48—56, 2 fig., 115. — *Plant.; flor., oecol., phytosoc.*
ODENWALL, E., 2. — Cottus gobio L. var. roseus n. var. — P. 56—57, 112. — *Pisc.; faun., syst.*
(FRIEDMANN, HERMANN, 1. — Über den Begriff der Morphologie.) — P. 58. — *Morph.*
LEVANDER, K. M., 3. — Förflugna härfåglar. — P. 58, 112. — *Aves* (*Upupa epops*); *faun.*
HELLÉN, W., 6. — [Ancylis upupana Tr., ny för Finlands fauna.] — P. 58, 113. — *Lep.; faun.*
FREY, R., 7. — [De inhemska arterna av flugfamiljen Piophilidae.].) — P. 58. — *Dipt.*

HÄYRÉN, E., 3. — [Parmelia acetabulum.] — P. 58, 116. — *Lich.; flor.*
ODENWALL, E., 3. — Fåglar vid Lappajärvi sjö (Om). — P. 58—59, 112. — *Aves; faun., migr.*
MUNCK, L., 4. — Några iakttagelser angående storleks-, vikts- och åldersförhållanden hos abborren. — P. 59—60, 112. — *Pisc. (Perca fluviatilis); oecol.*
GADOLIN, A. W., 1. — Några floristiska observationer från trakten kring Lemströms kanal på Åland (1925). — P. 61—64, 115, 116. — *Plant.; flor.*
PALMGREN, ALVAR, 27. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1925—13. 5. 1926. — P. 65—95. — *Hist., biogr.*
IDMAN, G. R., 2. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1925. — P. 95—100. — *Oecon. soc.*
REUTER, ENZIO, 2. — Årsberättelse över bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1925—1926. — P. 100—104. — *Bibl.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 2. — Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 1925—1926. — P. 104—108. — *Collect., faun.*
FREY, RICHARD, 8. — Årsberättelse rörande de entomologiska samlingarna under verksamhetsåret 1925—1926. — P. 108—110. — *Collect. (ins.).*
HÄYRÉN, ERNST, 4. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1925—1926. — P. 110—111. — *Collect., flor.*

Vol. 3 (1927).

(VALLE, K. J., 1. — Järvitutkimuksia Laatokan Karjalassa.) — P. 3. — *Hydrobiol.*
SUOMALAINEN, P., 1. — [Maallemme uusi perhonen, Calamia phragmitidis.] — P. 4, 132. — *Lep.; faun.*
STENIUS, G., 2. — [Förslag om fredning av Salix pyrolifolia.] — P. 4, 135. — *Plant.; flor., tut. nat.*
PALMGREN, PONTUS, 1. — Bon av Regulus cristatus och Aegithalus caudatus. — P. 4, 131. — *Aves; faun., nidus.*
VALLE, K. J., 2. — [Carex disticha Jääskestä.] — P. 4, 135. — *Plant.; flor.*
GADOLIN, A. W., 2. — Några sällsynta växtfynd. — P. 4, 135, 136. — *Plant.; flor.*
KROGERUS, ROLF, 11. — Piesma salsolae Beck., ny för Fennoskandia. — P. 4—5, 133. — *Hem.; faun.*
HELLÉN, W., 7. — Mallophager från Tetrao urogallus L. — P. 5—6, 133. — *Mall.; faun., paras.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 5. — Huomattavia kasvilöytöjä Pohjois-Suomesta. — P. 6—7. — *Plant., musci; flor.*
(MELIN, DOUGLAS, 1. — Natur och folk på Andernas ostsluttningar.) — P. 7. — *Itin.*
(HÄYRÉN, ERNST, 5. — Naturförhållandena på Fiskarhalvön.) — P. 7. — *Itin.*
LAGSTRÖM, HUGO, 1. — [Carex laevirostris × C. vesicaria från Björneborg.] — P. 7, 135. — *Plant.; flor.*
KROGERUS, R. och LEMBERG, B., 1. — Berättelse över en sommaren 1926 företagen resa till utöarna i Finska viken samt till Bottniska vikens kuster. — P. 7—13, 130. — *Exc.; plant.; flor., phytosoc., cecid.* (p. 9). — *Ins.; faun., geogr., biocoen.*
—»— 12. — Anoncodes rufiventris Scop., en direkt invandrare från Balticum. — P. 13—14, 131. — *Col.; faun., geogr.*
MONTELL, J., 4. — Sedum villosum L., ny för Finlands flora. — P. 14—15, 134, 135. — *Plant.; flor.*
ODENWALL, E., 4. — Asellus aquaticus L. v. abyssalis nov. var. — P. 16, 4 fig., 133—134. — *Crust.; syst., faun.*
—»— 5. — Vid Lappajärvi sjö i mellersta Österbotten år 1907 inplanterade och ännu fortlevande växter. — P. 16—17, 134—135. — *Plant.*
(LINDBERG, HARALD, 9. — Forskningsresa till Marocko.) — P. 17. — *Itin.*
—»— 10. — [Alnus incana f. laciniata från Iijoki.] — P. 17, 135. — *Plant.; flor.*
BERGER, ELNA, 1. — Ciconia ciconia iakttagen mellan Ekenäs och Lappvik. — P. 17—18, 131. — *Aves; faun.*
BÄCK, RAGNAR, 1. — En för landet ny myrform. — P. 18, 132. — *Hym.; faun.*
MIKKOLA, E., 1. — Rubus humulifolius in Jyväskylä gefunden. — P. 18—19, 134. — *Plant.; flor.*
(ELFVING, FREDR., 1. — Mimosans »nerver».) — P. 19. — *Plant.; physiol.*
SCHOULTZ, ÅKE VON, 2. — [Förslag om åtgärder för bevarandet av fågelvärlden i Äyräpäänjärvi.] — P. 19. — *Aves; tut. nat.*

KIERTONEN, A., 1. — Tunturipöllö ammuttu Suomenlinnan linnoitusalueella. — P. 19, 131. — *Aves (Nyctea scandiaca); faun.*
EKLUND, OLE, 6. — Ett fall av utrotning av paddor och grodor genom igelkottar. — P. 20, 131. — *Amph. (Bufo, Rana), mamm. (Erinaceus); oecol.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 3. — Huomioita siilistä sammakonsyöjänä. — P. 20—21, 131. — *Mamm. (Erinaceus), amph. (Rana, Bufo).*
(LINDBERG, HARALD, 11. — Vegetationen på Högatlas.) — P. 21. — *Veget.*
IDMAN, G. R., 3. — Förteckning över av undertecknad under en tidrymd av ca 25 år iakttagna kärlväxter i Teisko socken. — P. 21—31, 134. — *Plant.; flor.*
EKLUND, OLE, 7. — Wichtigere Pflanzenfunde aus Estland im Sommer 1926. — P. 32—37. — *Plant.; flor. esth.*
PALMGREN, PONTUS, 2. — Equisetum scirpoides C. Rich. på Åland. — P. 37, 135. — *Plant.; flor.*
OLSONI, B., 3. — Växtfynd i Ab Kimito-Hitis sommaren 1926. — P. 38—39, 135, 136. — *Plant.; flor.*
HIDÉN, ILMARI, 3. — Lisätietoja Rumex confertus'en esiintymisestä Suomessa. — P. 39—40, 135. — *Plant.; flor.*
NYSTRÖM, ERIC W., 1. — Larus minutus Pall. häckfågel i Nyland. — P. 40—43, 1 mp.; 130—131. — *Aves; oecol.*
(LEMBERG, BERTEL, 1. — Vegetationen på Finlands kustdyner.) — P. 43. — *Veget.*
(EKLUND, OLE, 8. — Natur och vegetation på Wormsö och Dagö.) — P. 43. — *Veget.*
PALMGREN, PONTUS, 3. — Parus cristatus' förekomst på Åland. — P. 44. — *Aves; faun., geogr.*
HORTLING, IVAR, 2. — Fynd av morkulla på Brändö. — P. 44. — *Aves (Scolopax rusticola); faun.*
(JOHANSEN, FRITZ, 1. — Faunan och floran kring Hudson Bay.) — P. 44. — *Itin.*
(FREY, RICHARD, 9. — Av plankton levande dipter-imagines.) — P. 44. — *Dipt.; oecol.*
BUCH, HANS, 2. — Ein für das Festland Finnlands und zwei für Finnland neue Lebermoose. — P. 44—45, 136. — *Musci; flor.*
EKLUND, OLE, 9. — Weitere Versuche über Keimung in Meerwasser. — P. 45—88, 7 fig. — *Plant.; physiol., oecol.*
PALMGREN, ALVAR, 28. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1926—13. 5. 1927. — P. 91—113. — *Hist., biogr.*
IDMAN, GUST. RUD., 4. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1926. — P. 115—118. — *Oecon. soc.*
REUTER, ENZIO, 3. — Årsberättelse över bibliotekets tillväxt 1926—1927. — P. 118—119. — *Bibl.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 4. — Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 1926—1927. — P. 119—124. — *Collect., faun.*
FREY, RICHARD, 10. — Årsredogörelse rörande de entomologiska samlingarna under verksamhetsåret 1926—1927. — P. 123—127. — *Collect. (ins.), faun.*
LINDBERG, HARALD, 12. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1926—1927. — P. 127—129. — *Collect.; flor.*

Vol. 4 (1928).

(PALMGREN, ALVAR, 29. — Tillfälligheten som biogeografisk faktor.) — P. 3. — *Geogr.*
(FORSIUS, RUNAR, 5. — De till Mutillidae, Tiphidae och Sapygidae hörande arternas utbredning i Finland.) — P. 3. — *Hym.; faun.*
PALMGREN, MAIDA, 1. — Fynd av Polygala comosa i Al Jomala. — P. 3. — *Plant.; flor.*
PALMGREN, ALVAR, 30. — Fynd av Asperula tinctoria på Äppelö i Al Hammarland. — P. 3. — *Plant.; flor.*
EKLUND, OLE, 10. — Myosotis baltica Sam. f. caespitosiflora (Ekl.) n. comb. — P. 4—5. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 11. — Vorläufige Mitteilung über die Kollektivart Sedum telephium L.p.p. (S. maximum Suter). — P. 5—7. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 12. — Allium schoenoprasum var. jurmoënse n. var. — P. 7—9, 1 fig. — *Plant.; syst., flor.*
—»— 13. — Epilobium adenocaulon Hausskn. für Karelia australis neu. — P. 10—11. — *Plant.; flor., oecol., syst.*
—»— 14. — Juncus ranarius Perr. & Song., für Finnland neu. — P. 11—14. — *Plant.; flor., syst.; phytosoc.*

EKLUND, OLE, 15. — Cuscuta halophyta Fr., neu für die Flora Finnlands. — P. 14—17. — *Plant.; flor., geogr., oecol., syst.*
—»— 16. — Potentilla Egedi Wormsk., ein arktisches Pseudorelikt aus Südwestfinnland. Nebst einigen systematisch-phytogeographischen Spekulationen. — P. 17—20. — *Plant.; flor., geogr., syst.*
—»— 17. — Viktigare växtfynd i Nagu sydskärgård (Ab) sommaren 1927. Mit deutschem Referate. — P. 20—22. — *Plant.; flor.*
—»— 18. — Anmärkningsvärdare växter från Ab Korpo sommaren 1927. Mit deutschem Referate. — P. 22—24. — *Plant.; flor., oecol.*
—»— 19. — Eupatorium cannabinum, für Regio aboënsis neu. — P. 24. — *Plant.; flor., oecol.*
MUNCK, L., 5. — Ny fyndort för Clitocybe gigantea. — P. 24—25. — *Fungi; flor.*
LINKOLA, KAARLO, 4. — Melica ciliata'n esiintymisestä Tenholassa. — P. 25—29. — Mit deutschem Referate. — *Plant., musci, lich.; flor., oecol., geogr., phytosoc.*
CARPELAN, JARL, 2. — Två abnormt färgade ripor i vinterdräkt. Mit deutschem Referate. — P. 29—30. — *Aves (Lagopus lagopus); path.*
HELLÉN, WOLTER, 8. — En för faunan ny psocid, Lepinotus formicarius Hag. — P. 31. — *Copeogn.; faun., oecol.*
AUTERINEN, ANTTI 1. — Kaksi faunallemme uutta makrolepidopteralajia. — P. 31. — *Lep.; faun.*
ALFTHAN, KNUT, 1. — Fynd av Galeobdolon luteum och Sorbus fennica. — P. 31. — — *Plant.; flor.*
LINDBERG, HARALD, 13. — [Galeobdolon luteum.] — P. 31. — *Plant.; flor.*
(LYNGE, BERNT, 1. — Naturförhållandena, speciellt växtvärlden, på Novaja-Semlja.) — P. 32. — *Itin.*
(KORVENKONTIO, V. A., 2. — Turkiseläinten kasvattamisesta Pohjois-Amerikassa. — P. 32.) — *Mamm.*
PALMGREN, ALVAR, 31. — Bromus Benekeni funnen på Åland. — P. 32. — *Plant.; flor.*
(FORSIUS, RUNAR, 6. — Redogörelse för en av O. W. Richards, Oxford, verkställd granskning av Psithyrus-exemplar från Finland.) — P. 32. — *Hym.; faun.*
KLINGSTEDT, HOLGER, 1. — Eine Beobachtung über die Beschaffenheit der Kernmembran. — P. 32—37, 2 fig. — *Trich.; cyt.*
HELLÉN, WOLTER, 9. — Verzeichnis der Trichogrammiden (Hym.) Finnlands. — P. 37—42, 2 fig. — *Hym.; faun., syst., oecol.*
FORSIUS, IRMER, 6. — Om skärsnäppans, Calidris m. maritima Brünn., höstflyttning. — P. 42—43. — *Aves; migr.*
—»— 7. — Var passera våra höstflyttare haven? Mit deutschem Referate. — P. 43—48. — *Aves; migr.*
HÄYRÉN, ERNST, 6. — Siphula ceratites från Petsamo. — P. 48—49. — *Lich.; flor., oecol.*
CEDERCREUTZ, CARL, 3. — Potentilla pulchella R. Br., ny för Fennoscandia. — P. 49—50, 1 fig. — *Plant.; flor.*
HÄYRÉN, ERNST, 7. — Saprolegnia asterophora De Bary. — P. 50. — *Fungi; flor.* — *Pisc. (Abramis brama); path.*
—»— 8. — Meeresalgen aus dem mittleren und östlichen Nyland. — P. 50—59. — *Alg.; flor., oecol.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 5. — Neuer Fundort für Eudesme virescens J. G. Ag. im Finnischen Meerbusen. — P. 59—60. — *Alg.; flor., oecol.*
OLSONI, B., 4. — Växtfynd i Ab Kimito-Hitis sommaren 1927. — P. 60—62. — *Plant.; flor.*
PALMGREN. PONTUS, 4. — Snatteranden (Anas strepera L.) på Åland. — P. 62. — *Aves; faun., geogr.*
LINDBERG, HARALD, 14. — Botaniska exkursioner i Spanien. — P. 63. — *Itin., plant.*
LEMBERG, BERTEL, 2. — Studier över sandsträndernas vegetation på kuststräckan Lappvik—Henriksberg. Mit deutschem Referate. — P. 63—85, 2 fig. — *Alg., lich., musci, plant.; flor., top., oecol., phytosoc.*
GADOLIN, A. W., 3. — Strödda bidrag till kännedomen om kärlväxtfloran i Jomala och Lemlands socknar på Åland (1927). — P. 85—90. — *Plant.; flor., oecol.*
—»— 4. — Några kompletterande uppgifter om lövängsvegetationen i Kyrkslätt och Esbo socknar. — P. 90—91. — *Plant.; flor.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 6. — Soiden kasvipeitteestä ja sen alustan laadusta. — P. 91—92. — *Plant.; oecol. (aciditas).*
EKLUND, OLE, 20. — Zur terminologischen Begriffsbildung der modernen Verbreitungsbiologie. — P. 92—98. — *Bot.; biol., geogr.*

Välikangas, Ilmari, 6. — Zwei neue Funde von Alcedo atthis ispida (L.) aus Finnland. — P. 98. — *Aves; faun., geogr.*

Lindberg, Harald, 15. — Fynd av Populus tremula f. villosa och Phragmites communis v. flavescens. — P. 98—99. — *Plant.; flor.*

Häyrén, Ernst, 9. — Den supralitorala havsstrandvegetationen i Petsamo och dess övergång i supramarin vegetation. — P. 99—100. — *Alg., lich., musci, plant.; oecol., phytosoc., veget.*

Lindberg, Håkan, 4. — Die Insektenfauna einiger Felsentümpel im Ladoga-See nebst Bemerkungen zur Verbreitungsgeschichte einiger Deronectes-Arten. — P. 101—108, 3 fig., 4 mp. — *Col., hem.; faun., geogr., oecol., biocoen.*

Hellén, Wolter, 10. — Beiträge zur Kenntnis der Wasserkäferfauna von Terijoki (Ik) und Umgebung. — P. 108—117. — *Col.; faun., oecol., biocoen.*

Krogerus, Rolf, 13. — Beobachtungen über Psammocharidae auf den Küstendünen Finnlands. — P. 117—122. — *Hym.; faun., oecol., geogr.*

Nordman, Adolf Fr., 1. — Hydrilla lepigone Möschl. in Finnland, ihre Biologie nebst einigen Bemerkungen über die geographische Verbreitung dieser Art in Eurasien und N-Amerika. With English Summary. — P. 122—152, 8 fig. — *Lep.; faun., oecol., biol., geogr., syst.*

Snellman, Johannes, 1. — Anser coerulescens (L.) [Anser hyperboreus Pallas] ny för faunan. — P. 152—153. — *Aves; faun.*

(Kupffer, K. R., 1. — Die pflanzengeographische Hingehörigkeit des Ostbaltischen Gebietes.) — P. 152. — *Phytogeogr.*

Klingstedt, Holger, 2. — Förslag till reform av den nuvarande provinsindelningen. — P. 153. — *Provinciae biogeographicae.*

(Carpelan, Jarl, 3. — Beitrag zur Kenntnis von dem Vorkommen und der Brutbiologie des nordischen Laubsängers im nördlichsten Finnland.) — P. 153. — *Aves (Phylloscopus borealis); biol.*

Klingstedt, Holger, 3. — Der Begriff der Art an dem Zeitkörper-Begriff erläutert. — — P. 153—170, 2 fig. — *Theoria; species.*

(Forsius, Runar, 7. — Finlands Psammocharider.) — P. 170. — *Hym.; faun.*

Poijärvi, L. Arvi P., 1. — Emästen tunkeutumisesta kasvisoluun. — P. 170—171. — *Plant.; physiol.*

Bärlund, Hugo, 1. — Permeabiliteettitutkimuksia Rhoeo discolorin epidermissoluilla. — P. 171—172. — *Plant.; physiol.*

Cedercreutz, Carl, 4. — Bidrag till Västra Nylands flora. — P. 172—176. — *Plant.; flor.*

Hellén, Wolter, 11. — Pentanota meuseli Bernh. från Finland (Col.). — P. 176—177. — *Col.; faun.*

Eklund, Ole, 21. — Om orsakerna till några halophyters frekvensmaxima i Skärgårdshavet. — P. 177. — *Plant.; geogr.*

Palmgren, Pontus, 5. — Coccothraustes coccothraustes sedd i H:fors. — P. 177. — *Aves; faun.*

Klingstedt, Holger, 4. — Heterogametic Females in two Species of Trichoptera. — P. 179—182, 9 fig. — *Trich.; cyt. (gametogenesis).*

Häyrén, Ernst, 10. — Grasbälle im Brackwasser bei Nystad, Regio aboënsis. — P. 182—184. — *Bot.; oecol.*

—»— 11. — Sidensvansen i Ekenästrakten hösten 1920. — P. 184—185. — *Aves (Ampelis garrulus); migr.*

—»— 12. — Algen aus der Gegend von Björneborg. — P. 185—192. — *Alg.; flor., oecol.*

Eklund, Ole, 22. — Notizen über die Flora des nördlichen und westlichen Dagö (Hiinmaa) in Estland. — P. 192—230, 2 fig. — *Plant.; flor. esth., geogr., syst.*

Palmgren, Alvar, 32. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1927—13. 5. 1928. — P. 231—276, 1 im. phot. — *Hist.; biogr.*

Idman, Gösta, 1. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1927. — P. 276—279. — *Oecon. soc.*

Reuter, Enzio, 4. — Årsberättelse över bibliotekets tillväxt 1927—1928. — P. 279—280. — *Bibl.*

Välikangas, Ilmari, 7. — Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 1927—1928. — P. 280—286. — *Collect., faun.*

Frey, Richard, 11. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1927—1928. — P. 286—289. — *Collect. (ins.), faun.*

LINDBERG, HARALD, 16. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1927—1928. — P. 289—291. — *Collect., flor.*

LINDBERG, HÅKAN, 5. — Sketch in Commemoration of Ernst Evald Bergroth. With Bibliography. 1 im. phot. — P. 292—317. — *Biogr., bibl.*

KLINGSTEDT, HOLGER et NORDMAN, ADOLF FR., 1. — Observanda för Sällskapets medlemmar rörande Memoranda-serien. — Huomioonotettavia näkökohtia Memoranda-sarjan suhteen. — P. 318—319, 320—321.

Vol. 5 (1929—1930).

(WILLER, A., 1. — Hydrographie und Biologie der Strandgewässer Ostpreussens. — P. 3.) — *Hydrogr., hydrobiol.*

HÄYRÉN, ERNST, 13. — Rön om Siphula ceratites i Petsamo. — P. 4—6, 1 fig. Mit deutschem Referate. — *Lich.; flor., oecol.*

EKLUND, OLE, 23. — On the resistibility of some seeds against seasalt. — P. 6—11. — *Plant.; physiol.*

—»— 24. — Die quantitative Diasporenproduktion einiger Angiospermen. — P. 11—28. — *Plant.; flor., biol.*

—»— 25. — Ergebnisse einer botanischen Reise in den Kirchspielen Houtskär und Iniö (Südwestfinnland) im Jahre 1928. — P. 28—64, 2 fig. — *Exc., plant.; flor., geogr., biol.* (p. 48), *syst.* (p. 61).

—»— 26. — Allium ursinum L., für Regio aboënsis neu. Nebst einigen verbreitungsbiologischen Betrachtungen. — P. 64—68. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

SEGERSTRÅLE, CURT, 1. — En Utricularia, som förtär fisklarver. Mit deutschem Referate. — P. 68—70. — *Plant., pisc.* (*Abramis brama*); *biol.*

KROGERUS, ROLF, 14. — Beobachtungen über Bledius- und Dyschirius-Arten auf Degersand (Al Eckerö). — P. 70—73. — *Col.; faun., geogr., oecol., biocoen.* — *Plant.; flor.*

HILDÉN, ILMARI, 1. — Ein Nestfund des Zwergfliegenfängers (Muscicapa p. parva Bechst.) in Finnland. — P. 73—75. — *Aves; faun., geogr., biol., nidus.*

PALMGREN, PONTUS, 6. — [Muscicapa p. parva i Suistamo.] — P. 75. — *Aves; faun.*

HELLÉN WOLTER. — Två för Finland nya microlepidoptera. — P. 76. — *Lep.; faun.*

VÄLIKANGAS, ILMARI, 8. — Uusia Cottus quadricornis L.-löytöjä sisävesistä. — P. 76. — *Pisc.; faun.*

LINDBERG, HARALD, 17. — Epilobium montanum × palustre, ny för Finlands flora. — P. 76. — *Plant.; flor.*

(POIJÄRVI, ARVI, 2. — Permeabiliteetti-tutkimusten tähänastisista vaiheista.) — P. 77. — *Plant.; physiol.*

LINDBERG, HARALD, 18. — [Eunotia Clevei som recent i Baikalsjön.] — P. 77. — *Alg.; flor.*

—»— 19. — Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. vid Bottniska viken, ny för Finlands flora. Mit deutschem Referate. — P. 77—78. — *Plant.; flor., geogr.*

BUCH, HANS, 3. — Några anmärkningsvärda fanerogam- och mossfynd. — P. 78—79. — *Plant., musci; flor., syst.*

ALFTHAN, KNUT, 2. — Fynd av Elodea canadensis och mörkt rödblommig Lychnis flos cuculi. — P. 79—80. — *Plant.; flor.*

HÄYRÉN, ERNST, 14. — [Elodea canadensis-fynd.] — P. 80. — *Plant.; flor.*

CAJANDER, AARNO, 1. — Gyrophora rugifera (Nyl.) Th. Fr., Suomelle uusi jäkälä. — P. 80. — *Lich.; flor.*

(ELFVING, FREDR., 2. — Drag ur de naturalhistoriska studiernas i Finland historia efter 1830. — P. 80.) — *Hist.*

ODENWALL, E., 6. — Tracheliastes fecundus n. sp. — Pag. 80—81, 1 fig. — *Crust.; syst., faun., paras. Pisc.* (*Abramis brama*).

KLINGSTEDT, HOLGER, 5. — Neuropterologisches aus Finnland 1. Die Gattung Sisyra mit besonderer Berücksichtigung von Sisyra jutlandica Esben-Petersen. — P. 81—88, 5 fig. — *Neur.; faun., geogr., syst.*

—»— 6. — Neuropterologisches aus Finnland 2. Helicoconis lutea Wallengren aus Lappland. — P. 88—91, 1 mp. — *Neur.; faun., geogr., syst.*

CLAYHILLS, THOMAS H., 1. — Zur Kenntnis der Temperaturabhängigkeit der jährlichen Abundanzkurven von Calymnia trapezina L. — P. 91—95, 1 fig., 4 diagr. — *Lep.; biol., oecol.*

(FEDERLEV, HARRY, 1. — Den allryska kongressen för ärftlighetsforskning i Leningrad i januari 1929.) — P. 95. — *Genet.*

KLINGSTEDT, HOLGER, 7. — [Provinsindelningen.] — P. 95. — *Provinciae biogeographicae.*
HELLÉN, W., 13. — För Finland nya eller sällsynta Coleoptera. — P. 95—97. — *Col.; faun.*
HÄYRÉN, ERNST, 15. — Ein für Finnland neuer Wasserpilz, Gonapodya polymorpha Thaxter. — P. 97. — *Fungi; flor.*
HIDÉN, ILMARI, 4. — Festuca gigantea (L.) Vill. in Finnland. — P. 97—103. — *Plant.; flor., geogr.*
KANERVA, NIILO, 1. — Kertomus ekoloogis-maantieteellisestä perhostutkimuksista Tvärminnen ulkosaaristossa. Mit deutschem Referate. — P. 103—105. — *Exc., lep.; geogr., oecol.*
KLINGSTEDT, HOLGER, 8. — Neuropterologisches aus Finnland 3. Boriomyia enontekiensis n. sp. aus Lappland. — P. 105—106, 1 fig. — *Neur.; syst., faun.*
(MOTYKA, J., 1. — Über die Vegetation Polens.) — P. 106. — *Veget.*
PUOLANNE, M., 3. — Intialainen kehrääjäperhonen (Saturnia atlas L.) kuoriutunut Suomessa. — P. 107. — *Lep.; biol.*
MEURMAN, OLAVI, 1. — Kromosoomien ketjuutumisesta. — P. 107. — *Plant.; cyt.*
LUTHER, ALEX., 2. — [Skydd av flyttande vildsvanar.] — P. 107—108. — *Aves (Cygnus musicus); migr.*
VALLE, K. J., 3. — Über Gammaracanthus loricatus v. lacustris (G. O. Sars) in einem südostfinnischen Kleinsee. — P. 108—109. — *Crust.; faun., geogr., oecol.*
HERPMAN, GEORG, 1. — Några ornitologiska anteckningar. — P. 110—111. — *Aves; faun.*
FREV, RICHARD, 12. — Några nykomlingar för Finlands empidid- och dolichopodidfauna Mit deutschem Referate. — P. 111—113. — *Dipt.; faun., geogr.*
HÄYRÉN, ERNST, 16. — Seeball aus Lärchennadeln aus dem Silzersee in der Schweiz. — P. 113. — *Plant. (Larix).*
ULVINEN, ARVI, 1. — Kasvilöytöjä Kymin läntisestä saaristosta (Ka) 1. Mit deutschem Referate. — P. 113—116. — *Plant.; flor., geogr.*
ODENWALL, E., 7. — On the Classification of the Various Forms of Coregoni s. str. of Northern Europe. — P. 116—125. — *Pisc.; syst.*
PALMGREN, PONTUS, 7. — Tvenne för faunan nya Lumbricidae. — P. 126. — *Oligoch. (Helodrilus constrictus, Lumbricus castaneus); faun.*
BRANDERS, KURT, 1. — Anteckningar om fågelfaunan i Pälkäne socken (Ta). Mit deutschem Referate. — P. 126—128. — *Aves; faun.*
(HÄYRÉN, ERNST, 17. — Om alluvialvegetationen vid Petsamonjoki.) — P. 128. — *Veget.*
PORSIUS, RUNAR, 8. — Cecidiologische Beiträge V. — P. 128—131. — *Dipt., hym., hem.; faun., cecid.*
HÄYRÉN, ERNST, 18. — Salices från Fiskarhalvön. — P. 132—134. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 19. — Zwei Notizen über das Meereis und die Algen. — P. 134—140, 2 fig. — *Alg.; flor., oecol., geogr., hibern., syst. Fungi; flor.*
—»— 20. — Tulpan med groddknopp. — P. 140. — *Plant. (Tulipa); biol.*
CEDERCREUTZ, CARL, 5. — Süsswasseralgen aus Petsamo. — P. 140—158, 1 mp. — *Alg.; flor.*
PALMGREN, ALVAR, 33. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1928—13. 5. 1929. — P. 159—197, 2 im. phot. — *Hist., biogr., bibl.*
IDMAN, GÖSTA, 2. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1928. — P. 197—200. — *Oecon. soc.*
REUTER, ENZIO, 5. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1928—1929. — P. 200—201. — *Bibl.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 9. — Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu v. 1928—1929. — P. 201—208. — *Collect., faun.*
FREV, R., 13. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1928—1929. — P. 208—211. — *Collect. (ins.), faun.*
LINDBERG, HARALD, 20. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1928—1929. — P. 211—213. — *Collect., flor.*

Vol. 6 (1929—1931).

(EKMAN, GUNNAR, 1. — Sammakon sydämen kehityksestä kokeitten valossa.) — P. 1. — *Amph. (Rana); embr. exp.*
CEDERCREUTZ, CARL, 6. — Potamogeton zosterifolius Schum., ny för Åland. — P. 1—3, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr.*
NORDBERG, SVEN, 1. — Ny fyndort på Åland för Allium ursinum L. — P. 3—4. — *Plant.; flor., oecol.*

PALMGREN, PONTUS, 8. — Fynd av blåkråka (Coracias garrulus L.). — P. 4. — *Aves; faun.*
EKLUND, OLE, 27. — [Coracias garrulus.] — P. 4. — *Aves; faun.*
HILDÉN, ILMARI, 2. — Eräs lisätieto pikkusiepon (Muscicapa p. parva Bechst.) esiintymisestä Tapanilassa. — P. 4. — *Aves; faun.*
BJÖRKSTÉN, JOHAN, 1. — Orientering i några biokemiska problem, samt ett bidrag till metodiken för undersökning av kvävehaltiga ämnens syntes hos högre växter. Mit deutschem Referate. — P. 4—6. — *Plant.; physiol., biochem.*
COLLANDER, RUNAR, 1. — [Cellsaftens sammansättning hos Chara ceratophylla Wallr.] — P. 6. — *Alg..; physiol.*
FREY, R., 14. — För faunan nya arter av nematocersläktet Tichocera Meig. — P. 6—7. — *Dipt.; faun.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 10. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1928. — P. 7—25. — *Aves; sign., migr.*
PETTERSSON, BROR, 1. — Ferns and Flowering Plants on Erratic Blocks with special Reference to their Modes of Dispersal. — P. 25—47. — *Plant.; flor., oecol.*
—»— 2. — Florula of Tree Stumps. — P. 47—54. — *Plant.; flor., oecol.*
SAXÉN, UNO, 1. — Muutamia Carex salina-hybriidejä. — P. 54. — *Plant.; flor., syst.*
PUOLANNE, M., 4. — Uusi itäinen Taraxacum balticum-löytö Porvoon saaristossa. — P. 55. — *Plant.; flor.*
LINDBERG, HÅKAN, 6. — Über die Art Deronectes griseostriatus De G. und ihre Verwandten. — P. 55—60, 1 fig., 1 mp. — *Col.; faun., geogr., oecol., syst.*
ROIVAINEN, HEIKKI, 1. — Tulimaan sademetsät. Mit deutschem Referate. — P. 61—67. — *Plant., musci., lich.; oecol.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 11. — Der Gartenschläfer, Eliomys quercinus (L.), auf der Insel Tytärsaari im Finnischen Meerbusen. — P. 68—79, 1 mp. — *Mamm.; faun., geogr., oecol.*
CEDERCREUTZ, CARL, 7. — Algvegetationen i träsken på Åland. — P. 79—80. — *Alg.; flor., oecol.*
(FEDERLEY, HARRY, 2. — Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.) — P. 80. — *Varia.*
FREY, R., 15. — En inventering av entomologiska museets samlingar. — P. 81—83. — *Ins., collect.*
HÄYRÉN, ERNST, 21. — Bericht über die Tagung der Pflanzengeographen in Dorpat (Tartu) vom 24.—27. August 1929. — P. 83—94. — *Phytogeogr., plant., musci, lich., exc.* p. 92—94).
KUPFFER, K. R., 2. — Über eine neue pflanzengeographische Untersuchungsmethode, angewandt auf die ostbaltische und südfinnländische Flora. — P. 83—85. — *Phytogeogr.*
LINKOLA, K., 5. — Über das Vorkommen von Samenkeimlingen in den natürlichen Pflanzenvereinen. — P. 86—87. — *Plant.; oecol.*
EKLUND, OLE, 28. — Wege und Ziele der Floristik im Schärenhofe Südwest-Finnlands. — P. 87. — *Plant.; oecol., geogr.*
(HÄYRÉN, ERNST, 22. — Bilder aus den an der Eismeerküste Finnlands vorgeschlagenen Naturschutzgebieten.) — P. 87. — *Tut. nat.*
STAMM., I., 1. — Schaffung einer pharmakogeographischen Arbeitsgemeinschaft. — P. 87—88. — *Pharmacogeographia.*
RÜHL, A., 1. — Pflanzengeographische Beobachtungen in den Wäldern des west-estländischen Festlandes. — P. 88. — *Plant.; flor. esth., geogr.*
THOMSON, P. W., 1. — Die Entwicklungsgeschichte der Vegetation Estlands. — P. 88—90. — *Veget., pal.*
SPOHR, EDM., 1. — Ueber die Eigenart der Vegetation im Embach-Tal. — P. 90—91. — *Plant.; veget.*
PALMGREN, ALVAR, 34. — Methode für pflanzengeographische und floristische Notationen. — P. 91. — *Phytogeogr.*
BRENNER, WIDAR, 1. — Massförekomst av Ophioglossum vulgatum L. i Kb Polvijärvi. — P. 94—95. — *Plant.; flor., oecol.*
MEURMAN, OLAVI, 2. — Chromosome Numbers in the Family Cornaceae. — P. 95—100, 6 fig. — *Plant.; cyt.*
KROGERUS, ROLF, 15. — Potamobius leptodactylus Eschz. tagen i Finland. — P. 100—101. — *Crust.; faun.*
LINDBERG, HARALD, 21. — Leonurus cardiaca-formernas utbredning i Finland. Mit deutschem Referate. — P. 101—103, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr.*

ENGLUND, BENGT, 1. — En ny hybrid, Carex distans L. × extensa Good , funnen på Gotland. Mit deutschem Referate. — P. 103—107, 4 fig. — *Plant.; flor. suecica, oecol., syst.*

EKLUND, OLE, 29. — Die pH-Werte einiger Pflanzen-Rhizosphären. — P. 107—112. — *Plant., musci; oecol.*

TERÄSVUORI, KAARLO, 1. — Maataloudellisista niittytutkimuksista. — P. 112—114. — *Plant.; oecol., veget.*

PAULSSON, G., 1. — [Utfodring av flyttande sjöfågel i Landskrona.] — P. 114. — *Aves; migr.*

MUNCK, L., 6. — [Volgasvamp.] — P. 114. — *Bact., fungi.*

BJÖRKSTÉN, JOHAN und HIMBERG, INTO, 1. — Können höhere Pflanzen Luftstickstoff direkt assimilieren? Versuche mit Triticum sativum. — P 114—121. — *Plant.; biochem., physiol.*

HÄYRÉN, ERNST, 23. — Über die Pilzvegetation eines Sticklings (Gasterosteus aculeatus). — P. 121—122. — *Fungi, bact.; oecol.* — *Pisc.; path.*

—»— 24. — Einige Flechtenfunde aus Estland. — P. 122—128. — *Lich.; flor. esth.*

KARLING, T. G., 1. — Bresslauilla relicta Reisinger (Turbellaria, Rhabdocoela) zum ersten Male in Finnland angetroffen. — P. 128—130, 2 fig. — *Turb.; faun., geogr., morph., oecol.*

CEDERCREUTZ, CARL, 8. — Spirogyra fluviatilis Hilse, neu für Finnland. — P. 131—132, 1 fig. — *Alg.; flor., syst., morph.*

LINKOLA, K., 6. — Beobachtungen über das Auftreten von Samenkeimlingen in der Felsenvegetation am Ladogasee. — P. 133—143. — *Plant.; flor., occol.*

ULVINEN, ARVI, 2. — Kasvilöytöjä Kouvolan seuduilta 1. Mit deutschem Referate. — P. 143—145. — *Plant.; flor.*

TANNER, V., 1. — Eine Assoziation von Viscaria alpina — Anthelia nivalis — Oligotrichum incurvum. — P. 145—148, 1 fig. — *Plant., musci, lich.; oecol., phytosoc.*

(KOTILAINEN, M. J., 7. — Vetyionikonsentratiosta hydrobiologisena tekijänä.) — P. 148. — *Hydrobiol.*

FORSIUS, RUNAR, 9. — Cecidiologische Beiträge VI. — P. 148—149. — *Dipt., hym.; faun., cecid.*

JÄRNEFELT, H., 1. — Phormidium mucicola Naumann et Huber aus Finnland. — P. 149—151, 3 fig. — *Alg.; flor., oecol.*

FREY, R., 16. — Förteckning över Finlands Scatopsider, på grundvalen av O. Dudas revision av vårt material. — P. 151—152. — *Dipt.; faun.*

JÄRNEFELT, H., 2. — En kort produktionsbiologisk orientering med avseende å sjöundersökningar och sjötyper. — P. 153—163. — *Limn.*

HELLÉN, W., 14. — Lathridius alternans Mannh., en för Finland ny skalbagge. — P. 163—164. — *Col.; faun.*

KORVENKONTIO, VALIO, 3. — Eine albinistische Bisamrotte. — P. 164—166, 1 fig. — *Mamm. (Fiber zibethicus); albin.*

BUCH, HANS, 4. — Über den Phototropismus der Panizeen. — P. 167—173, 6 fig. — *Plant.; physiol.*

HÄYRÉN, ERNST, 25. — Einige Algenfunde an den Meeresküsten Estlands. — P. 174—179. — *Alg.; flor. esth.*

—»— 26. — Gyrophora fuliginosa Havås aus Finnland. — P. 180. — *Lich.; flor., syst.*

EKLUND, OLE, 30. — Polygonatum multiflorum × officinale från Houtskär. — P. 180—181. — *Plant.; flor., syst.*

LINDBERG, HARALD, 22. — Några för Finland nya adventivväxter. — P. 181—187, 8 fig. — *Plant.; flor.*

PALMGREN, ALVAR, 35. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1929—13. 5. 1930. — P. 188—221, 2 im. phot. — *Hist.; biogr.*

IDMAN, GÖSTA, 3. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1929. — P. 221—223. — *Oecon. soc.*

REUTER, ENZIO, 6. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1929—1930. — P. 223—224. — *Bibl.*

VÄLIKANGAS, ILMARI, 12. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1929—1930. — P. 224—227. — *Collect., faun.*

FREY, RICHARD, 17. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1929—1930. — P. 227—230. — *Collect. (ins.), faun.*

LINDBERG, HARALD, 23. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1929—1930. — P. 230—232. — *Collect., flor.*

Vol. 7 (1931—1932).

(Jägerskiöld, L. A., 1. — Flyttfåglarnas vägar.) — P. 1. — *Aves; migr.*
Lindberg, Harald, 24. — Lamium album var. integrifolium Nolte funnen i Finland. Mit deutschem Referate. — P. 2. — *Plant.; flor., syst.*
Krogerus, Rolf, 16. — Om förekomsten av Potamobius leptodactylus i Muolaanjärvi. — P. 2—3. — *Crust.; faun., oecol.*
Saxén, Uno, 2. — Carex lasiocarpa × riparia, Suomelle uusi sarahybriidi. — P. 3. — *Plant.; flor.*
Ekman, Tor H. J., 1. — Större hackspett sönderhackar äpplen för att komma åt fröna. — P. 3—4. — *Aves (Dryobates major); biol.*
Lindberg, Harald, 25. — [Större hackspetten och ekorre angripande äppel.] — P. 4. — *Aves (Dryobates major), mamm. (Sciurus vulgaris); biol.*
Idman, G., 4. — [Större hackspetten förtärande äppel.] — P. 4. — *Aves (Dryobates major); biol.*
Ekman, Tor H. J., 2. — Stort flyttsträck av bergfink över Somero. — P. 4. — *Aves (Fringilla montifringilla); migr.*
Olsoni, B., 5. — [Massflyttning av bofink och bergfink]. — P. 4—5. — *Aves (Fringilla coelebs, F. montifringilla); migr.*
(Lynge, B., 2. — Gennem isen till Öst-Grönland.) — P. 5. — *Itin.*
Lindberg, Harald, 26. — Agaricus (Pholiota) aureus, en för landet ny hattsvamp. — P. 5. — *Fungi; flor.*
Hellén, Wolter, 15. — Två för Finland nya rovsteklar (Sphegidae). — P. 5—6. — *Hym.; faun.*
Välikangas, Ilmari u. Hytönen, Olavi, 1. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1927. — P. 6—26. — *Aves; sign., migr.*
Åberg, Gunnar, 1. — Commelina communis ny för Finland. — P. 26. — *Plant.; flor.*
(Häyrén, Ernst, 27. — Femte internationella limnologkongressen i Budapest.) — P. 27—28. — *Limn.*
Ekman, Anna Greta, 1. — [Demonstration av *Laminaria digitata.*] — P. 28. — *Alg.; morph.*
Olsoni, B., 6. — Nya växtfynd i Ab Dragsfjärd och Hitis. — P. 28—29. — *Plant.; flor., oecol.*
—»— 7. — Anteckningar om Ruppia- och Zannichellia-arternas förekomst i Ab Dragsfjärd och Hitis sommaren 1930. — P. 29—30. — *Plant.; flor., oecol.*
Eklund, Ole, 31. — [Ruppia och Zannichellia-arternas förekomst i Korpo-Houtskärsområdet.] — P. 30. — *Plant.; flor.*
Häyrén, Ernst, 28. — Ruppia- und Zannichellia-Formen in den Schären von Ekenäs. — P. 30—31. — *Plant.; flor., oecol.*
Eklund, Ole, 32. — Botaniska resor i Åbo skärgård sommaren 1930. — P. 31—36. — *Exc., plant.; flor.*
—»— 33. — Anmärkningsvärda växtfynd i östaländska skärgården. — P. 36—38. — *Exc., plant.; flor.*
—»— 34. — Alliaria officinalis Andrz. und Festuca polesica Zapal. für Regio aboënsis neu. — P. 38—41, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
—»— 35. — Crambe maritima L. im Nordbaltischen Gebiet. — P. 41—51, 2 fig., 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., biol., oecol.*
Tanner, T. R., 1. — Uusia Mallophaga-löytöjä. — P. 51—53. — *Mall., aves; faun., paras.*
(Salovaara, Hannes, 1. Ennakkotietoja oppikoulun uudistusta suunnittelevan koulukomitean suunnitelmista. — P. 53.) — *Paedagogia.*
Häyrén, Ernst, 29. — Bericht über die Tagung des Verbandes baltischer Pflanzengeographen in Helsingfors Anfang Juni 1930. — P. 53—92. — *Phytogeogr.*
Palmgren, Alvar, 36. — [Rede.] — P. 54—55.
Linkola, K., 7. — [Rede.] — P. 55—57.
(Cajander, A. K., 1. — Die Grenze zwischen Finnland und Russland in pflanzengeographischer Beziehung.) — P. 58. — *Phytogeogr.*
Malta, N., 1. — Die Verbreitung der Laubmoose im Ostbaltischen Gebiete. — P. 58—61. — *Musci; geogr.*
Linkola, K., 8. — Kurzer Bericht über das erste Geschäftsjahr (1929—30) des Verbandes. — P. 61—63. — *Hist.*
Lippmaa, Th., 1. — Pflanzensoziologische Betrachtungen. — P. 63—67. — *Phytosoc.*
(Spohr, Edm., 2. — Über ein phytophänologisches Arbeitsprogramm.) — P. 67. — *Plant.; phaen.*

(Ziegenspeck, H., 1. — Über die Kurische Nehrung und die Leba-Nehrung.) — P. 68. — *Phytogeogr.*

Linkola, K., 9. — Über die Hauptzüge der Vegetation und Flora in den Gegenden nördlich vom Ladogasee. — P. 68—84, 13 mp. — *Plant.; flor., veget., oecol.*

Kotilainen, M. J., 8. — Exkursion nach Ladoga-Karelien (Laatokan Karjala) 8.—14. Juni 1930. — P. 85—89. — *Exc., plant., musci; flor.*

—»— 9. — Über die Methoden der autökologischen Untersuchung der Felsenmoose. — P. 90—92. — *Musci; oecol.*

Railonsala, Artturi, 1. — Lappfjärdin pitäjän putkilokasvisto. — P. 92—119. — *Plant.; flor.*

Pettersson, Bror, 3. — Notes on the First Stages of Flora on Burnt Ground. — P. 119—139. — *Plant.; flor., biol., oecol.*

Hidén, Ilmari, 5. — Drei für die Flora Finnlands neue Adventivpflanzen. — P. 139—143. — *Plant.; flor.*

Gvelnik, V., 1. — Eine neue Peltigera-Art aus Kola-Lappland. — P. 143—145, 2 fig. — *Lich.; flor., syst.*

Lynge, B., 3. — Rhizocarpon nitidum Lynge n. sp. — P. 145—146, 1 fig. — *Lich.; flor., syst.*

Lindberg, Håkan, 7. — Die Küstenkäfer Finnlands (anlässlich Professor H. von Lengerkens Arbeit »Die Salzkäfer der Nord- und Ostsee usw.«). — P. 147—165, 14 mp. — *Col.; faun., geogr., oecol.*

Hellén, Wolter, 16. — Zur Kenntnis der Lepidopterenfauna von Lapponia Inarensis. — P. 166—172. — *Lep.; faun., geogr.*

Frey, Richard, 18. — Uppträdandet av den europeiska sträckgräshoppan (Pachytulus migratorius) i Finland sommaren 1930. — P. 172—174. — *Orth.; faun., vag.*

Häyrén, Ernst, 30. — Algenfunde an den Meeresufern von Brahestad. — P. 174—178. — *Alg.; flor.*

Palmgren, Alvar, 37. — Blechnum spicant (L.) Sm. i Finland. Mit deutschem Referate. — P. 178—193, 1 fig., 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., oecol., syst.*

Lindberg, Håkan, 8. — Die Hemipterenfauna Petsamos. — P. 193—235, 8 fig. — *Hem.; faun., geogr., oecol., biocoen.*

(Frey, Richard, 19. — Bilder från entomologiska studieresor i nordligaste Finland.) — P. 235. — *Itin.*

(Regel, C., 1. — Über die Vegetation Litauens.) — P. 235. — *Veget.*

Häyrén, Ernst, 31. — Ny fyndort för Ustilago grandis Fries. — P. 235. — *Fungi; flor.*

Dahl, A., 1. — Flyttfåglarnas ankomst till Uleåborg och andra vårtecken 1908—1928. — P. 236. — *Aves; migr., phaen. — Amph., hym., lep., plec.*

Cedercreutz, Carl, 9. — Süsswasseralgen aus Petsamo II. — P. 236—248, 17 fig. — *Alg.; flor., syst.*

Skottsberg, C., 1. — Juan Fernandez-öarnas växtsamhällen. — P. 248—254. — *Phytogeogr., phytosoc., veget.*

(Krogerus, Rolf, 17. — Sanddyndjurens ekologi.) — P. 254. — *Ins.; oecol.*

Ulvinen, Arvi, 3. — Kasvilöytöjä Kymin läntisestä saaristosta (Ka) 2. — P. 255—256. — *Plant.; flor.*

—»— 4. — Kasvilöytöjä Pyhtään saaristosta (N) 1. — P. 256—257. — *Plant.; flor.*

—»— 5. — Kasvilöytöjä Kouvolan seudulta 2. — P. 257—259. — *Plant.; flor.*

Linkola, K., 10. — Peltigera lepidophora (Nyl.) Vain. mit Apothecium gefunden. — P. 259—260. — *Lich.; morph.*

—»— 11. — Ramalina angustissima (Anzi) Vain. in Binnen-Finnland. — P. 261—267, 1 mp. — *Lich.; flor., geogr.*

Aario, Leo, 1. — Kasvistollisia tietoja Pohjois-Satakunnasta. — P. 267—276. — *Plant.; flor.*

Klingstedt, Holger, 9. — Neuropterologisches aus Finnland 4. Die Verbreitung der Arten der Gattung Boriomyia. — P. 276—280, 4 mp. — *Neur.; faun.*

Wallgren, Göran, 1. — Anteckningar om faunan i Snappertuna. — P. 281—284. — *Aves, mamm.; faun.*

Valle, K. J., 4. — Picus viridis L. in SE-Finnland gefunden. — P. 284—286, 2 fig. — *Aves; faun., syst.*

—»— 5. — Einige neue und seltene Schmetterlinge aus dem Petsamogebiete. —P. 286—289, 12 fig. — *Lep.; faun., syst.*

Palmgren, Alvar, 38. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1930—13. 5. 1931. — P. 290—312, 2 im. phot. — *Hist., biogr.*

IDMAN, GÖSTA, 5. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1930. — P. 312—315. — *Oecon. soc.*

REUTER, ENZIO, 7. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1930—1931. — P. 315—316. — *Bibl.*

VÄLIKANGAS, ILMARI, 13. — Kotimaisten yleisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 1930—1931. — P. 316—318. — *Collect., faun.*

FREY, RICHARD, 20. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1930—1931. — P. 318—319. — *Collect. (ins.).*

LINDBERG, HARALD, 27. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1930—1931. — P. 319—321. — *Collect., flor.*

Vol. 8. (1932—1933).

(KNOLL, FRITZ, 1. — Über die Bestäubung der Blüten durch Abendschwärmer.) — P. 1. — *Plant., lep.; biol.*

KLINGSTEDT, HOLGER, 10. — Sialis longidens n. sp. aus dem südlichen Zentral-Sibirien. — P. 1—3. — *Neur.; faun. sibirica, syst.*

—»— 11. — Neuropterologisches aus Finnland 5. Revision der Gattung Sialis nebst Beschreibung von zwei neuen Arten. — P. 3—14, 4 fig., 4 mp. — *Neur.; faun., syst.*

BUCH, HANS, 5. — Om vegetationen i NW-Spanien. — P. 14. — *Veget.*

WIKSTRÖM, D. A., 1. — Beobachtungen über die Ohrenqualle (Aurelia aurita L.) in den Schären SW-Finnlands. — P. 14—17. — *Coel.; biol.*

LINDBERG, HARALD, 28. — Ett antal tidigare inom landet ej observerade adventivväxter. — P. 17—19. — *Plant.; flor.*

BRENNER, WIDAR, 2. — Några anmärkningsvärdare växtfynd från den öståländska skärgården sommaren 1931. — P. 19—20. — *Plant.; flor.*

PALMGREN, ALVAR, 39. — Bidrag till kännedomen om Suaeda maritima's förekomst på Åland. — P. 20—22. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

—»— 40. — Tillägg till Dr. Brenners meddelande: Några anmärkningsvärdare växtfynd från den öståländska skärgården sommaren 1931. — P. 22—24. — *Plant.; flor.*

PALMGREN, MAIDA och ALVAR, 1. — Rubus arcticus L. på Åland. — P. 24—30. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

PALMGREN, ALVAR, 41. — Ny lokal för Carex aquatilis Wg. på Åland. — P. 30—31. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

EKLUND, OLE, 36. — Beiträge zur Bryologie Südwest-Finnlands. I. Das zentrale Schärenmeer mit besonderer Berücksichtigung des Kirchspieles Korpo. — P. 32—77. — *Musci; flor., oecol.*

OLSONI, BÖRJE, 8. — Anmärkningsvärda växter från Ab Kimito-Hitis sommaren 1931. — P. 77—78. — *Plant.; flor.*

—»— 9. — Formkretsen Valeriana officinalis i Ab Kimito-Hitis. — P. 78. — *Plant.; flor., oecol.*

—»— 10. — Silene rupestris L., skärgårdsväxt i sydvästra Finland. — P. 78—79, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

PETTERSSON, BROR, 4. — The Action of Extreme Temperatures on Species of Viola and Lamium. — P. 79—97. — *Plant.; biol., genet., mutatio* (p. 84), *physiol.*

KLINGSTEDT, HOLGER, 12. — Gentiana uliginosa Willd. funnen i Nyland. — P. 97. — *Plant.; flor.*

FÄRDIG, BERTIL, A., 1. — Linaria repens Mill. (striata DC.) × vulgaris Mill., ny för Finland. — P. 97—98. — *Plant.; flor.*

KARLING, TOR G., 2. — Phleum nodosum L. på Åland. — P. 98. — *Plant.; flor.*

—»— 3. — Fyndort för Stellaria crassifolia i Nyland. — P. 99. — *Plant.; flor.*

—»— 4. — Ny fyndort för Viola uliginosa i Nyland. — P. 99—100. — *Plant.; flor.*

(KOTILAINEN, MAUNO J., 10. — Fennoskandian atlanttiseen kasvistoelementtiin tutustumaan Bergenin saaristossa.) — P. 100. — *Phytogeogr.*

ELFVING, FREDR., 3. — [Hundraårsminnet av cellkärnans upptäckt.] — P. 100. — *Hist., cyt. (nucleus).*

VÄLIKANGAS, ILMARI u. HYTÖNEN, OLAVI, 2. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1930. — P. 100—136. — *Aves; sign., migr.*

PUOLANNE, M., 5. — Helsingin ja sen lähiseudun kasvisto. 1. Taraxacum-lajit. Mit deutschem Referate. — P. 136—181. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

RÄSÄNEN, VELI, 1. — Joitakin uusia jäkälälajeja ja toisintoja maallemme. Mit deutschem Referate. — P. 182—185. — *Lich.; flor., syst.*

Räsänen, Veli, 2. — Jäkäläsuku Usnea Hoffm. ja sen läheiset sukulaiset. Mit deutschem Referate. — P. 185—188. — *Lich.; flor., syst.*

Forsius, Runar, 10. — Stor dödlighet hos sjöfågel i Föglö skärgård våren och sommaren 1931. Mit deutschem Referate. — P. 188—189. — *Aves; path., biol.*

—»— 11. — Gör den åländska staren sommartid gruppexkursioner till Estland eller besöker den estniska staren sommartid Åland?. — P. 190—191. — *Aves (Sturnus vulgaris); biol.*

—»— 12. — Ornitologiska anteckningar från Al Föglö. — P. 191—193. — *Aves; faun.*

Krogerus, R., 18. — Gråhägern (Ardea cinerea) i Lojo sommaren 1931. — P. 193. — *Aves; faun.*

Hildén, Ilmari, 3. — Havaintoja siniärhen (Coracias g. garrulus L.) esiintymisestä Suomessa. — P. 193—194. — *Aves; faun.*

Karling, Tor G., 5. — Epilobium montanum × parviflorum, ny för Finlands flora. — P. 194. — *Plant.; flor.*

Färdig, Bertil A., 2. — Märkligare växtfynd från Ab Rimito 1929. — P. 194—195. — *Plant.; flor.*

—»— 3. — Märkligare växtfynd från Ab St. Marie Hirvensalo och Kakskerta 1930. — P. 195. — *Plant.; flor.*

(Frey, R., 21. — Från en studieresa till de Kanariska öarna.) — P. 196. — *Itin.*

Nybergh, Torsten, 1. — Ny lokal för Convolvulus sepium. — P. 196. — *Plant.; flor.*

—»— 2. — Ny lokal för Lemna gibba. — P. 196—197. — *Plant.; flor.*

—»— 3. — Växtfynd i norra Kyrkslätt. Mit deutschem Referate. — P. 197—198. — *Plant.; flor., morph., phyl.*

Lindqvist, E., 1. — Phragmitesfrön som föda för dvärgmusen? — P. 198. — *Mamm. (Mus minutus); biol.*

—»— 2. — Flädermus flygande i solsken. — P. 198—199. — *Mamm. (Vespertilio daubentonii); biol.*

Hiitonen (Hidén), Ilmari, 6. — [Vespertilio daubentonii lentelevä auringonpaisteessa.] — P. 199. — *Mamm.; biol.*

(Häyrén, Ernst, 32. — Den internationella botaniska exkursionen genom Rumänien senaste sommar.) — P. 199. — *Exc.*

Railonsala, Artturi, 2. — Niinimaan seudun putkilokasvisto. — P. 199—222. — *Plant.; flor.*

Linkola, K., 12. — Bericht über die Tagung des Verbandes fenno-baltischer Pflanzengeographen in Lettland Anfang Juni 1931. — P. 222—237. — *Phytogeogr.; plant., musci, lich., alg.; flor. lettonica.*

Kotilainen, M. J., 11. — Untersuchungen über die Braunmoore Finnlands. — P. 224—225. — *Musci; oecol.*

Cedercreutz, Carl, 10. — Die Einwanderung der Flora vom Ostbaltikum nach Nyland. — P. 225—226. — *Plant.; geogr.*

Thomson, P. W., 2. — Beitrag zur Stratigraphie der Moore und zur Waldgeschichte SW-Litauens. — P. 226—227. — *Plant.; pal.*

(Ziegenspeck, H., 2. — Versuche über den Schwefel- und Kohlenstoffkreislauf in den Ostmooren.) — P. 227. — *Varia.*

(Spohr, Edm., 3. — Studien über die Tiefenverbreitung von Sumpf- und Wasserpflanzen.) — P. 227. — *Plant.; oecol.*

Zāmelis, A., 1. — Bedeutung der Genetik in der Systematik und Geographie der Pflanzen. — P. 228. — *Plant.; genet., syst., geogr.*

Galenieks, P., 1. — Über Interglazialfunde in Lettland. — P. 228—229. — *Plant.; pal.*

Kotilainen, Mauno J., 12. — Einige Seltenheiten der Moosflora Fennoskandias. — P. 237—241. — *Musci, plant.; flor., geogr.*

(Kujala, V., 2. — Kanadan kasvillisuus. — P. 241.) — *Veget.*

Tanner, V., 2. — Fynd av kantareller i Petsamo. — P. 241. — *Fungi; flor.*

Cedercreutz, Carl, 11. — Die Characeen Finnlands. — P. 241—254. — *Alg.; flor., syst.*

Palmgren, Maida och Alvar, 2. — Myagrum perfoliatum L. funnen i Finland. — P. 254—256. — *Plant.; flor.*

(Hartmann, Max, 1. — Neueste Untersuchungen über das Sexualitätsproblem.) — P. 256. — *Sexualitas.*

(Järnefelt, H., 3. — Yleiskatsaus Petsamon limnologiaan.) — P. 256. — *Limn.*

Forsius, Runar, 13. — Cecidiologische Beiträge VII. — P. 256—258. — *Hym., dipt.; faun., cecid.*

KOPPERI, A. J., 1. — Über eine Lamblia-Art des Lemmings. — P. 258—259. — *Prot.; faun.* — *Mamm. (Lemmus lemmus).*

VALLE, K. J., 6. — Kasvitietoja Petsamosta. — P. 259—274. — *Plant.; flor.*

ÅBERG, GUNNAR, 2. — Förteckning över anmärkningsvärda växter från norra Nagu. — P. 274—282. — *Plant.; flor.*

BUCH, HANS, 6. — Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora Fenno-Scandias: I. Ein Versuch zur Aufteilung der Gattungen Lophozia Dum. und Sphenolobus Steph. — P. 282—297, 3 fig. — *Musci; syst.*

—»— 7. — Redogörelse för min botaniska forsknings- och studieresa till nordvästra Spanien och Frankrike 1930—31. — P. 298—302, 1 fig. — *Itin., Plant.; flor. iberica. Musci; flor. gallica.*

—»— 8. — Mitteilungen über die Flora und Vegetation Nordwestspaniens. I. Cistus hirsutus Lam. × salvifolius L. (C. obtusifolius Sweet) neu für Spanien. — P. 302—303. — *Plant.; flor. iberica.*

PETTERSSON, BROR, 5. — Beiträge zur Kenntnis der Taraxacum-Flora des südwestfinnländischen Schärenarchipels. — P. 303—316. — *Plant.; flor.*

CAJANDER, OLAVI, 1. — Lintufaunistisia tietoja Etelä-Hämeestä. — P. 317—318. — *Aves; faun.*

HIITONEN, ILMARI, 7. — Über die Kollektivart Valeriana officinalis L. in Finnland. — P. 318—320. — *Plant.; flor., syst.*

—»— 8. — Polygonatum multiflorum × officinale (P. mixtum Richt.) in Ka Räisälä gefunden. — P. 320—321. — *Plant.; flor.*

MALMSTRÖM, NICKEN, 1. — Valeriana salina Pleijel i Tvärminnetrakten. Mit deutschem Referate. — P. 321—325. — *Plant.; flor., oecol., morph.*

PALMGREN, ALVAR, 42. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1931—13. 5. 1932. — P. 326—367, 3 im. phot. — *Hist., biogr.*

IDMAN, GÖSTA, 6. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning år 1931. — P. 367—369. — *Oecon. soc.*

REUTER, ENZIO, 8. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1931—1932. — P. 370. — *Bibl.*

VÄLIKANGAS, ILMARI, 14. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1931—1932. — P. 371—372. — *Collect., faun.*

FREY, RICHARD, 22. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1931—1932. — P. 373. — *Collect. (ins.).*

LINDBERG, HARALD, 29. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1931—1932. — P. 373—375. — *Collect., flor.*

Vol. 9 (1933—1934).

(PORKKA, OSMO, 1. — Metsien hiilenravitsemuksesta. = P. 1.) — *Forest.; physiol.*

LINDBERG, HARALD, 30. — Gråpapper för pressning av växter. — P. 1. — *Plant.; techn.*

MARKLUND, GUNNAR, 1. — Über Potentilla argentea L. und P. impolita Wahlenb. — P. 2—13. — *Plant.; flor., geogr., oecol., syst., cyt.*

—»— 2. — Carex praecox Schreb. funnen i Terijoki. — P. 13. — *Plant.; flor.*

LUOTOLA, V. L., 1. — Botrychium-lajeja Saaristomeren N-osassa kesällä 1932. — P. 14—15. — *Plant.; flor., oecol.*

—»— 2. — Kasvilöytöjä Saaristomeren N-osasta ja Satakunnasta kesällä 1932. — P. 16—17. — *Plant.; flor., oecol.*

LUTHER, ALEX., 3. — Calymnia pyralina View., en för landet ny noctuid. — P. 17. — *Lep.; faun.*

HELLÉN, WOLTER, 17. — Anmärkningsvärda fynd av Hemiptera från utöarna i Finska viken. — P. 17—20. — *Hem.; faun., geogr.*

EKLUND, OLE, 37. — Bemerkenswerte Pflanzenfunde aus SW-Finnland 1932. — P. 20—23. — *Plant.; flor., geogr., oecol., syst.*

PETTERSSON, BROR, 6. — Några anmärkningsvärda växtfynd i Ladoga-Karelen. — P. 23—24. — *Plant.; flor., oecol.*

(FEDERLEY, HARRY, 3. — Eugenikerkongressen i New-York och genetikerkongressen i Ithaca.) — P. 25. — *Genet.*

HAMMERMANN, A., 1. — Untersuchung von Holzkohlen aus archäologischen Ausgrabungen. — P. 25—26. — *Plant.; pal.*

FORSIUS, RUNAR, 14. — Ny fyndort för Lepidium latifolium L. i Föglö yttre skärgård. — P. 26—28. — *Plant.; flor., geogr.*

Forsius, Runar, 15. — Egendomligt toppskott av tall. — P. 28. — *Plant. (Pinus silvestris); morph.*

Alfthan, Knut, 3. — Näktergal i Gammelstaden. — P. 28. — *Aves (Luscinia philomela); faun.*

Hellén, W., 18. — Aleurodes (Neomaskellia) vaccinii Künow in Finnland gefunden. — P. 28. — *Hem.; faun.*

Frey, Richard, 23. — Bidrag till kännedomen om Finlands harkrankar (Dipt.). — P. 29—31. — *Dipt.; faun.*

Renfors, Lauri, 1. — Ein Vertreter der Familie Spionidae (Annelida, Polychaeta) aus dem Finnischen Meerbusen. — P. 31—32, 1 fig. — *Polych. (Pygospio elegans); faun., morph.*

Välikangas, Ilmari u. Hytönen, Olavi, 3. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1931. — P. 33—67. — *Aves; sign., migr.*

(Meurman, Olavi, 3. — Kromosoomiluvun konstanssista.) — P. 67. — *Cyt.*

Gröndahl, O. A., 1. — Chaerophyllum aureum L. funnen i Lahtis. — P. 67—68. — *Plant.; flor.*

Malmström, Nicken, 2. — Om några fynd av sällsyntare buksvampar i Finland. — P. 68—69. — *Fungi; flor.*

—»— 3. — Senhöstens svampar i frost och blida. Mit deutschem Referate. — P. 69—91. — *Fungi; flor., oecol.*

Eklund, Olle, 38. — Neue Lokalitäten für Parmelia scortea Ach. (P. tiliacea Hoffm.) in Finnland. — P. 92. — *Lich.; flor., oecol.*

(Välikangas, Ilmari, 15. — Hollannin limnologikongressi.) — P. 92. — *Limn.*

Tanner, V., 3. — Bidrag till kännedomen om den subfossila marina molluskfaunan i Ishavsfinland. — P. 92—103. — *Bryoz., brach., echin., moll., crust.; pal.*

Lindberg, Håkan, 9. — Untersuchungen in N-Petsamo über die Käferfauna hochnordischer Biotopen. — P. 103—125, 1 mp. — *Col.; faun., oecol., syst., biocoen.*

(Segerstråle, Curt, 2. — Rön som fiskeribiolog i Chile.) — P. 126. — *Pisc.; biol.*

(Federley, Harry, 4. — [Minnestal över Correns.].) — P. 126. — *Biogr.*

(Collander, Runar, 2. — [Chara-cellernas permeabilitet.].) — P. 126. — *Alg.; physiol.*

Krohn, Väinö, 1. — Über das Vorkommen der viviparen Pflanzenformen im äusseren Schärengürtel Südwest-Kareliens. — P. 126—127. — *Plant.; flor., biol.*

Hellén, W., 19. — Fem för Finland nya skalbaggar från utöarna i Finska viken. — P. 127—128. — *Col.; faun.*

Frey, Richard, 24. — Förteckning över Finlands chloropider, bestämda av O. Duda. — P. 128—139. — *Dipt.; faun.*

Skuja, H., 1. — Die Batrachospermaceen und Lemaneaceen Finnlands. — P. 139—141. — *Alg.; flor.*

Cedercreutz, Carl, 12. — Spirogyra scrobiculata (Stockmayer) Czurda, ny för Finland. — P. 141. — *Alg.; flor.*

—»— 13. — Taraxacum decipiens Raunk., ny för Åland. — P. 141. — *Plant.; flor.*

Eklund, Olle, 39. — [Taraxacum decipiens i Ab.] — P. 142. — *Plant.; flor.*

Buch, Hans, 9. — Scapania Simmonsii Bryhn et Kaal., ein für das Festland Europas neues Lebermoos. — P. 142. — *Musci; flor., oecol.*

Preuss, Hans, 1. — Pflanzenfunde aus Nord-Finnland. — P. 142—143. — *Plant.; flor.*

Åberg, Gunnar, 3. — Crambe maritima L., ny fyndort i Ab Nagu. — P. 143—144. — *Plant.; flor., oecol.*

Kanerva, Niilo, 2. — [Crambe maritima.] — P. 144. — *Plant.; flor., oecol.*

Nordman, Adolf Fr., 2. — Über die verfrühte Ausbildung von imaginalem Pigment bei der Entwicklung dreier Larven von Polysphincta percontatoria Grav. v. gracilis Hlmgr. (Hym. Ichn.) — P. 144—156, 7 fig. — *Hym.; biol.*

Lindberg, Harald, 31. — Juncus Welwitschii Hochst. (J. Kochii F. Schultz), en misskänd västlig art. With an English Summary. — P. 156—160. — *Plant.; flor. britannica, geogr., oecol., syst.*

(—»— 32. — En botanisk forskningsfärd till de Brittiska öarna.) — P. 160. — *Itin.*

(Segerstråle, Curt, 3. — Förekomsten och fångsten av svärdfisk vid Chiles kust.) — P. 160. — *Pisc. (Xiphias).*

Hellén, W., 20. — Bledius erraticus Er. funnen i Petsamo (Col.). — P. 160. — *Col.; faun.*

Lindberg, Harald, 33. — [Bledius erraticus.] — P. 161. — *Col.; faun.*

Aulamo, Osmo I., 1. — Tietoja lastauspaikka- ja satunnaiskasvien esiintymisestä Riihimäellä. — P. 161—165. — *Plant.; flor., oecol.*

(KROHN, VÄINÖ, 2. — Königsbergin koulun kasviserologinen sukupuu.) — P. 165. — *Varia.*
LUTHER, ALEX., 4. — Über eine Coccolithinee aus dem Finnischen Meerbusen. — P. 165—171, 6 fig. — *Prot.; faun., morph.*
ROIVAINEN, H., 2. — Chillania pusilla Roiv., eine neue Art der Familie Cyperaceae. — P. 172. — *Plant.; syst., flor. chilensis.*
HÄYRÉN, ERNST, 33. — Einige Algenfunde aus dem Finnischen Meerbusen. — P. 172—173. — *Alg.; flor., oecol.*
BRANDER, G., 1. — Beiträge zur Kenntnis der Diatomeenflora Finnlands 1. Einige neue oder unvollständig beschriebene Diatomeen aus dem sog. Fredriksberger Moore unweit Helsingfors. — P. 173—176, 6 fig. — *Alg.; flor., syst., pal.*
ULVINEN, ARVI, 6. — Kasvilöytöjä Kymin läntisestä saaristosta (Ka) 3. — P. 176—177. — *Plant.; flor.*
—»— 7. — Kasvilöytöjä Kouvolan seudulta 3. — P. 177—178. — *Plant.; flor.*
LINKOLA, K., 13. — Ajuga genevensis L. und Campanula aparinoides Pursh als Anthropochoren in Finnland. — P. 178—182. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
ÅBERG, GUNNAR, 4. — Azotobacter chroococcum, funnen i Ab Nagu Käldö. — P. 182. — *Bact.; flor.*
—»— och HUSTICH, I., 1. — Rhytidiadelphus loreus (L.) från Ab Nagu Haverö Utterholm. — P. 182. — *Musci; flor., oecol.*
HELLÉN, W., 21. — Apion dispar Germ. funnen i Finland. — P. 183. — *Col.; faun.*
—»— 22. — Verzeichnis der Callimomiden (Hym. Chalc.) Finnlands nach Bestimmungen von E. Hoffmeyer. — P. 184—191. — *Hym.; faun., oecol., cecid.*
BACKLUND, HELGE O., 1. — Zur Nahrungsfrage der Mallophagen anlässlich einer eigentümlichen Lebensweise von Menopon biseriatum Piag. — P. 191—193. — *Mall.; biol.*
PALMGREN, ALVAR, 43. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1932—13. 5. 1933. — P. 194—229, 4 im. phot. — *Hist., biogr.*
IDMAN, GÖSTA, 7. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning år 1932. — P. 229—232. — *Oecon. soc.*
REUTER, ENZIO, 9. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1932—1933. — P. 232—233. — *Bibl.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 16. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1932—1933. — P. 233—235. — *Collect., faun.*
FREY, RICHARD, 24. — De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1932—1933. — P. 235—236. — *Collect. (ins.).*
LINDBERG, HARALD, 34. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1932—1933. — P. 236—238. — *Collect., flor.*

Vol. 10 (1933—1935).

(NYBERG, CARL, 1. — Bakteriofagerna och deras betydelse för vattnets självrening.) — P. 1. — *Varia.*
LINDBERG, HARALD. — [Potatisknölar angripna av potatiskräfta]. — P. 1. — *Plant.* (*Solanum tuberosum*); *path.* — *Fungi* (*Synchytrium endobioticum*); *flor.*
Hintikka, T. J., 2. — Tuomen (Prunus padus L.) tuulenpesästä. — P. 2, 1 fig. — *Plant., path.*
HIITONEN, ILMARI, 9. — [Tuulenpesä Prunus padus puun oksassa]. — P. 2. — *Plant.; path.*
KLINGSTEDT, HOLGER, 13. — Chromosomenstudien an Neuropteren 1. — Ein Fall von heteromorphen Chromosomenpaaren als Beispiel vom Mendeln der Chromosomen. P. 3—11, 6 fig. — *Neur.; cyt., biol., syst.*
LUTHER, ALEX., 5. — Über Funde von Potamopyrgus crystallinus Pfr. *carinatus J. T. Marsh an der Südküste Finnlands. — P. 11—13. — *Moll.; faun.*
FORSIUS, RUNAR, 16. — En ny fyndplats för Lemna gibba L. i Al Föglö. — P. 13—16. — *Plant.; flor., geogr.*
BÄCK, RAGNAR, 2. — Pilularia globulifera L., ny för Finlands flora. — P. 16—17. — *Plant.; flor.*
LEMBERG, BERTEL, 3. — Zwergwuchs bei Sandpflanzen. — P. 17—30, 1 fig. — *Plant.; morph., oecol.*
NYBERG, WOLMAR, 1. — Några i Borgå och dess omnejd funna, sällsyntare svamp-arter. — P. 20—23. — *Fungi; flor., syst.*
HÄYRÉN, ERNST, 34. — [Hydnotrya Tulasnei]. — P. 23. — *Fungi; flor.*
EKLUND, OLE und FORSIUS, RUNAR, 1. — Parmelia scortea Ach., eine ausgeprägte marine Vogelkuppenflechte in Finnland. — P. 23—31. — *Lich.; flor., geogr., oecol.*

Eklund, Ole. 40. — Viktigare växtfynd i SW-Finland 1933. — P. 31—35. — *Plant., musci; flor., oecol., syst.*
—»— 41. — Was ist eigentlich Viola »epipsila × palustris»? — P. 35—40. — *Plant.; flor., geogr., syst.*
Hiitonen, Ilmari, 10. — [Sorbus-muotoja]. — P. 42. — *Plant.; flor., syst.*
Eklund, Ole, 42. — Sorbus fennica (Kalm) Fr. × S. suecica (L.) Krook (S. fennosuecica Ekl. n. hybr.) — P. 41—42, 1 fig. — *Plant.; flor., geogr., syst.*
Backlund, Helge O., 2. — A Contribution to the knowledge of the Poultry-Lice in Finland. — P. 42—46. — *Aves (Gallus domesticus), mall., acar.; paras.*
Sonck, Carl-Eric, 1. — Herminium monorchis från Al Sund och Anthyllis vulneraria *affinis från Ab Raisio. — P. 46. — *Plant.; flor.*
Palmgren, Maida och Alvar, 3. — Potentilla norvegica L. ny för Åland. — P. 46—51. — *Plant.; flor., geogr.*
Palmgren, Alvar, 44. — Calamagrostis lanceolata Roth × C. neglecta (Ehrh.) ny för Åland. — P. 51—52. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 45. — Märklig Betula-form (forma Palméri Gunnarss.) på Åland. — P. 53—56, 1 fig. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 46. — Nya fyndorter för Torilis Anthriscus (L.) Gmel. på Åland. — P. 56—58. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
Åberg, Gunnar, 5. — [Fynd av Torilis anthriscus]. — P. 59. — *Plant.; flor.*
Olsoni, Börje, 11. — Cardamine impatiens L. für Finnland neu. — P. 59. — *Plant.; flor.*
Hiitonen, Ilmari, 11. — Über einige sog. intermediäre Arten und deren Ursprung. — P. 59—68. — *Plant.; flor., syst.*
(Kaudern, Walter, 1. — Djurgeografiska forskningar på Celebes.) — P. 69. — *Itin.*
Luther, Alex., 6. — Über die ersten in Finnland gefundenen Exemplare der Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis Milne-Edw.). — P. 69—73. — *Crust.; faun., geogr.*
Montell, J., 5. — Argynnis (Brenthis) improbula Bryk funnen i Finland. — P. 73—74. — *Lep.; faun., syst.*
Meurman, Olavi, 4. — Some Additional Remarks to the Question of Polyploid Acer platanoides Biotypes. — P. 74—76. — *Plant.; cyt.*
Hellén, W., 23. — Orchestes fagi L., en för Finland ny skalbagge. — P. 76. — *Col.; faun.*
Karling, Tor G., 6. — Ein Beitrag zur Kenntnis der Nemertinen des Finnischen Meerbusens. — P. 76—90, 24 fig. — *Nemert.; faun., morph., syst.*
Lindberg, Harald, 36. — Alnus glutinosa (L.) Gaertn. f. minutifolia n. f. — P. 91—92, 1 fig. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 37. — Valeriana officinalis L. f. integrifolia (Ledeb.). — P. 92—94. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 38. — Myosotis laxa Lehm. (M. baltica Samuelss.). — P. 94—96. — *Plant.; flor., syst.*
Åberg, Gunnar, 6. — Fynd av Hydrobia jenkinsi i Ab Nagu Storlandet Möviken. — P. 96. — *Moll.; faun.*
Hustich, I., 1. — Västra Lapplands nordligaste granlund med två för prov. Le nya växter. — P. 97—98. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 2. — Nordlig fyndort för huggorm (Pelias berus). — P. 98. — *Rept.; faun.*
(Heimbeck, B., 1. — Nord-Norges natur och Lofotenfisket.) — P. 98. — *Piscat.*
Puolanne, M., 6. — Maallemme uusi kasvi, Taraxacum Borgvalli, Helsingistä. — P. 99. — *Plant.; flor.*
Välikangas, Ilmari u. Hytönen, Olavi, 4. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1932. — P. 99—137. — *Aves; sign., migr.*
Eklund, Ole, 43. — Studien über die Gattung Taraxacum in Südwest-Finnland. — P. 137—201, 12 mp. — *Plant., musci; flor., geogr., biol., oecol., syst.* (p. 201).
Stenius, Gunnar, 3. — Två intressanta skalbaggsfynd. — P. 202. — *Col.; faun.*
Kotilainen, M. J., 13. — Maallemme uusi lehtisammal. — P. 202. — *Musci; flor.*
—»— 14. — Carex canescens × loliacea Kolin läheltä. — P. 202. — *Plant.; flor*
Lindberg, Håkan, 10. — Wasser- und Uferkäfer auf Rågöarna und bei Baltischport an der estländischen NW-Küste. — P. 202—212, 3 fig. — *Col.; faun. esth., oecol.*
Ahlqvist, Holger, 1. — Dipterenfunde auf Rågöarna und bei Baltischport (NW-Estland). — P. 212—215. — *Dipt.; faun. esth.*
—»— 2. — Notizen über die Vogelwelt auf Rågöarna an der estländischen NW-Küste. — P. 216—219. — *Aves; faun., esth.*
Pettersson, Bror, 7. — Taraxaca aus der Küstengegend NW-Estlands. — P. 219—222. *Plant.; flor. esth.*

Åberg, Gunnar, 7. — Floristische Beobachtungen bei Baltischport und auf den Inseln Rågöarna (Pakri saared) in NW-Estland, 4 fig. — P. 222—239. — *Plant., musci, lich., alg.; flor. esth.*

—»— 8. — Anmärkningsvärda växter från Ab Nagu. — P. 239—242. — *Plant.; flor.*

Karling, Tor G., 7. — Haplobranchus balticus n. sp., eine neue sedentäre Polychäte aus dem Finnischen Meerbusen. — P. 242—244, 1 fig. — *Polych.; faun., syst.*

Hustich, I., 3. — Några ord om en i vatten levande form av Caltha palustris L. — P. 245. — *Plant.; flor., morph.*

Lindberg, Harald, 32. — Juncus ranarius' Song. & Perr. förekomst inom det östfennoskandiska floraområdet. — P. 245—248, 1 fig., 2 mp. — *Plant.; flor., geogr., syst.*

Välikangas, Ilmari, 17. — Eine perückenartige Missbildung des Geweihes beim Rentier (Rangifer tarandus L.) — P. 248—255, 3 fig. — *Mamm.; path., histol.*

(Warén, Harry, 2. — Kasvien kalsiumtarpeesta). — P. 256. — *Plant.; varia.*

Grönblad, Rolf, 1. — A short report of the freshwater-algae recorded from the neighbourhood of the Zoological Station at Tvärminne, 5 fig. — P. 256—271. — *Alg.; flor., syst.*

Eklund, Ole, 44. — Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räs., eine seltene Kalkflechte aus SW-Finnland. — P. 271—272. — *Lich.; flor.*

—»— 45. — Eine pflanzengeographische Neueinteilung Südwest-Finnlands. — P. 272—288, 6 mp. — *Plant.; flor., geogr.*

Hävrén, Ernst, 35. — Två anmärkningsvärda fynd av alger. — P. 288—289. — *Alg.; flor.*

Cleve-Euler, Astrid, 1. — Subfossila diatomacéer från Åland. — P. 289—322, 2 fig. — *Alg.; flor., pal., syst.*

Klingstedt, Holger, 14. — Das mikroskopische Zeichnen mit Hilfe des Okularnetzes. — P. 322—326, 1 fig. — *Varia.*

—»— 15. — Neuropterologisches aus Finnland 6. Ergänzende Notizen über Boriomyia enontekiensis Klst. nebst Beschreibung des Weibchens dieser Art. — P. 326—328, 3 fig. — *Neur.; faun., syst.*

Rendahl, Hialmar, 1. — Om de kinesiska formerna av släktet Misgurnus. — P. 329. — *Pisc.; syst.*

(Hintikka, T. J., 3. — [Muistokirjoitus P. A. Karstenin 100-vuotispäivän johdosta].) — P. 329. — *Biogr.*

Rendahl, Hialmar, 2. — Ein paar neue Unterarten von Cobitis taenia. — P. 329—336, 6 fig. — *Pisc.; syst.*

Krogerus, Rolf, 19. — Leptidea brevipennis Muls. (Cerambycidae) införd till Finland. — P. 336. — *Col.; faun., imp.*

—»— 20. — Schlupfwespen von den Mooren SW-Finnlands. — P. 336—341. — *Hym.; faun.*

Hellén, W., 24. — För Finland nya staphylinider (Col.) — P. 341—342. — *Col.; faun.*

Pettersson, Bror, 8. — The Action of different Hydrogenion concentrations on the Germination of the Seeds of some native Plants (Preleminary Note). — P. 342—345, 5 fig. — *Plant.; physiol.*

Munck, L., 7. — »Murokas» (Coregonus lavaretus järvii Berg) från Sonkari sjö. — P. 354. — *Pisc.; faun.*

Järvi, T. H., 4. — [Coregonus lavaretus järvii]. — P. 354. — *Pisc.; synon.*

Nordberg, Sven, 2. — Aphanipterologisches aus Finnland 1. Verzeichnis der bisher in Finnland gefundenen Aphanipteren nebst Diagnosen über 8 für die Wissenschaft neue Arten. — P. 354—369, 15 fig. — *Aphan.; faun., paras., syst.* — *Aves, mamm.; paras.*

(Buch, Kurt, 1. — Betingelserna för havets produktion.) — P. 369. — *Hydrobiol.*

(Linkola, K., 14. — [Muutoksia eräitten viljelyskasvien levinneisyyssuhteissa maassamme].) — P. 369. — *Plant.; agric.*

Tanner, V., 4. — Förekomster av fjällväxter nere vid havsstranden vid Varangerfjorden. — P. 369—371. — *Plant.; flor., oecol.* — *Moll.; pal.*

Gunnarsson, J. G., 1. — Tillägg till »Monografi över Skandinaviens Betulae» 1. Några egendomliga huvudsakligen i Finland anträffade Betulaformer. — P. 371—377, 5 fig. — *Plant.; flor., syst.*

Färdig, Bertil A., 4. — Några anmärkningsvärda växter från Nyland Tusby Järvenpää 1938. — P. 377—378. — *Plant.; flor.*

Forsslund, Karl-Herman, 1. — Trichopteren aus dem nördlichen Finnland. — P. 378—381. — *Trich.; faun., syst.*

(Collander, Runar, 3. — Om växternas hormoner.) — P. 381. — *Plant.; physiol.*
Montell, Justus, 6. — Några för Finlands flora nya fjällväxter. — P. 381—382. — *Plant.; flor., syst.*
Buch, Hans, 10. — Archidium alternifolium (Dicks.) Schimp. an der Nordgrenze seines europäischen Verbreitungsgebietes. — P. 382—384. — *Musci; flor., geogr., oecol.*
Ekłund, Olle, 46. — Beiträge zur Bryologie Südwest-Finnlands 2. Wichtigere komplettierende Funde aus dem zentralen Schärenmeerbezirke. — P. 384—388. — *Musci; flor.*
Forsius, Runar, 17. — Stamfasciation av Alnus glutinosa. — P. 388. — *Plant.; terat.*
Karling, Tor G., 8. — Mitteilungen über Turbellarien aus dem Finnischen Meerbusen 1. Dalyellia nigrifrons n. sp. — P. 388—391, 3 fig. — *Turb.; faun., morph., syst.*
—»— 9. — Mitteilungen über Turbellarien aus dem Finnischen Meerbusen 2. Promesostoma cochlearis n. sp. — P. 391—395, 3 fig. — *Turb.; faun., morph., syst.*
Reichardt, Axel, 1. — Notiz über Plegaderus haraldi Jansson (Col. Hist.) — P. 395—398. — *Col.; faun., geogr., syst., synon.*
Palmgren, Alvar, 47. — Kompletterande fyndorter och synpunkter till Ålands flora 1. — P. 398—434. — *Plant.; flor., geogr., oecol., phytosoc.*
—»— 48. — [Hälsningstal till hedersordföranden]. — P. 434—435.
Elfving, Fredrik, 4. — [Hedersordförandens svarstal]. — P. 435—436.
Lindström, Axel, 1. — Rosa Lindbergiana n. sp. — P. 436—437. — *Plant.; flor., syst.*
Lindberg, Harald, 40. — Anvisningar för insamlandet av Rosa-former. — P. 437—438. — *Plant.; techn.*
Palmgren, Alvar, 49. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1933—13. 5. 1934. — P. 439—465, 2 im. phot. — *Hist., biogr.*
Idman, Gösta, 8. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning år 1933. — P. 465—467. — *Oecon. soc.*
Reuter, Enzio, 10. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1933—1934. — P. 468—469. — *Bibl.*
Välikangas, Ilmari, 18. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1933—1934. — P. 469—471. — *Collect., faun.*
Frey, Richard, 26. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1933—1934. — P. 471—472. — *Collect. (ins.).*
Lindberg, Harald, 41. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1933—1934. — P. 472—475. — *Collect., flor.*

Vol. 11 (1935—1936).

(Sauramo, Matti, 1. — Itämeren geologinen historia.) — P. 3. — *Geologia.*
Hellén, Wolter, 25. — Dyschirius angustatus Ahr. funnen i Finland. — P. 3—4. — *Col.; faun.*
Ekłund, Olle, 47. — Wichtigere Gefässpflanzenfunde aus SW-Finnland 1934. — P. 4—8. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 48. — Archidium alternifolium (Dicks.) Schimp. in Regio aboënsis gefunden. — P. 8. — *Musci.; flor., geogr., oecol.*
—»— 49. — Parmelia scortea fruchtend in Finnland gefunden. — P. 9—10. — *Lich.; flor., geogr., oecol., biol.*
Välikangas, Ilmari, 19. — Anodonta cygnea cellensis Schröter aus Antrea. — P. 10—14, 2 fig. — *Moll.; faun., syst.*
Forsius, Runar, 18. — Uppgifter om Diplopoda från Finland i utländsk litteratur. — P. 14. — *Myr.; faun.*
Lemberg, Bertel, 4. — Till kännedomen om utbredningen av Polygonum foliosum Lindb. fil. i Nyland. — P. 14—16. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
—»— 5. — Bidrag till kännedomen om hasselns utredning i Östra Nyland. — P. 16—19. *Plant.; flor., oecol.*
—»— 6. — Vegetationen inom klibbalsbestånden på de smärre holmarna i Stor-Pernå viken. — P. 19—28. — *Plant.; flor., geogr., oecol., phytosoc.*
—»— 7. — Vegetationens utveckling på näsartade tillandningar i Stor-Pernå viken. — P. 28—40. — *Plant.; flor., geogr., oecol., phytosoc.*
Markewitsch, A. P., 1. — Die Schmarotzerkrebse der Fische aus dem Kontschseegebiet (Karelien). — P. 40—47, 1 fig. — *Crust.; faun., paras., syst.* — *Pisc., paras.*
Häyrén, Ernst, 36. — Dryodon coralloides aus Ostrobothnia borealis. — P. 47—48. — *Fungi; flor.*

(Buch, Kurt, 2. — Om bio-geokemiska processer.) — P. 48. — *Bio-geochemia.*
(Lindberg, Harald, 42. — [Kaliforniska växter].) — P. 48. — *Plant.; flor. californica.*
(Klingstedt, Holger, 16. — [Kromosomernas byggnad i spottkörtlarna hos Drosophila melanogaster].) — P. 48. — *Dipt.; cyt.*
Södergård, Atle, 1. — Über das Vorkommen von Keimpflanzen bei Vaccinium vitis idaea, V. myrtillus und Linnaea borealis. — P. 48—51, 1 fig. — *Plant.; biol.*
Forsius, Runar, 19. — Botaniska anteckningar från Åland 1. — P. 51—58. — *Plant., lich.; flor.*
Välikangas, Ilmari, u. Hytönen, Olavi, 5. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1933. P. 58—96, 1 mp. — *Aves; sign., migr.*
Kairamo, A. Osw., 1. — Kaksi tuomessa kasvanutta tuulenpesää Hattulan Pekolasta. — P. 96—97. — *Plant. (Prunus padus); path.*
Malmio, Bruno, 1. — Uusia kasvilöytöjä Kuusamon alueelta. — P. 97. — *Plant.; flor.*
Eklund, Ole, 50. — Hyperium hirsutum L., eine in lebhafter Ausbreitung begriffene Art. — P. 97—114. — *Plant.; flor., geogr.*
Pettersson, Bror, 9. — Ett intressant lavfynd, Basidia alpina (Schaer.) Vain., i Kuusamo. — P. 114—115. — *Lich.; flor.*
(Streng, Osv., 1. — Verityyppien merkityksestä.) — P. 115. — *Varia.*
(Lindberg, Harald, 43. — [Karaktärerna hos holkar och frukter hos Finlands Taraxacum-arter].) — P. 115. — *Plant.; syst.*
Hiitonen, Ilmari, 12. — Einige für die Flora Finnlands neue Blütenpflanzen. — P. 115—121. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
Palmgren, Alvar, 50. — [Ruderatfloran]. — P. 121. — *Plant.; geogr.*
Sonck, Carl-Eric, 2. — Några anmärkningsvärda växtfynd inom Kuusamo-området och SW-Finland. — P. 121—122. — *Plant.; flor.*
Palmgren, Alvar, 51. — [Herminium monorchis]. — P. 122. — *Plant.; flor., geogr.*
Cedercreutz, Carl, 14. — Die Zygnemaceen Finnlands. — P. 122—132, 1 fig. — *Alg., flor., syst.*
Kotilainen, Mauno J., 15. — Anoectangium compactum Schwägr. Laatokan Karjalassa. — P. 133—135. — *Musci; flor., geogr.*
Kujala, Viljo, 3. — Bericht über die vierte Tagung des Verbandes fenno-baltischer Pflanzengeographen in Kaunas 12.—18. Juni 1933. — P. 135—154. — *Phytogeogr., plant.; flor., lithuanica.*
Lippmaa, Th., 2. — Die Einschichtassoziation und das sich auf dieser aufbauende System der Pflanzenassoziationen. — P. 136—138. — *Plant., musci, lich.; phytosoc.*
Malta, N., 2. — Die Florenelemente von Kurzeme (Kurland). — P. 139. — *Plant.; flor. curonica, geogr.*
Kupffer, K. R., 3. — Vorschläge zur pflanzengeographischen Kartierung des Ostbaltischen Gebietes. — P. 139—144. — *Phytogeogr.*
Kujala, V., 4. — Waldtypen in klimatisch abweichenden Gebieten. — P. 144—145. — *Plant., musci., lich.; forest., oecol.*
Spohr, Edm., 4. — Über die Blütenbiologie bei Stratiotes aloides. — P. 145. — *Plant.; biol.*
Volteris, E., 1. — [Die in Litauen gemachten paläobotanischen Funde]. — P. 145. — *Plant.; pal.*
Hustich, I., 4. — Botaniska notiser från västra Lappland. 1. Växtlokaler från skogsregionen. — P. 154—161. — *Plant.; flor.*
—»— 5. — Botaniska notiser från västra Lappland. 2. Floran kring en timmerkoja i Kittilä Lappmark. — P. 162—165. — *Plant.; flor., geogr.*
—»— 6. — Botaniska notiser från västra Lappland. 3. Några för alpina regionen på Pallas- och Ounastunturi nya kärlväxter. — P. 166—170. — *Plant.; flor.*
—»— 7. — En anteckning om fjällemmeln (Lemmus lemmus). — P. 170—174 — *Mamm.; biol.*
(Lindroth, Carl H., 1. — Islands insektfauna ur djurgeografisk synpunkt.) — P. 174. — *Ins.; geogr.*
Elfving, Fredr., 5. — Sextus Otto Lindberg. — P. 174. — *Biogr.*
Hintikka, T. J., 4. — Über die Natur des Hexenbesens an der Traubenkirsche (Prunus padus L.). — P. 174—188, 11 fig. — *Plant., path.*
(Frey, Richard, 27. — De kanariska öarnas dipterfauna och dess problem.) — P. 188. — *Dipt.; geogr.*
Palmgren, Pontus, 9. — Erolia minutilla (Vieillot) anträffad i Finland. — P. 188—189. *Aves.; faun.*

Söderström, Sigurd, 1. — Ett fynd av Bipalium kevense Moseley i ett växthus i Haga. — P. 189. — *Turb.; imp.*
(Järvi, T. H., 5. — Lohen kulkusuunnista Itämeressä.) — P. 190. — *Pisc.* (*Salmo*)*; migr.*
Palmgren, Pontus, 10. — [»Zoogeographica»]. — P. 190—191. — *Zoogeogr., bibl.*
—»— 11. — Phalacrocorax perspicillatus Pallas i Universitetets zoologiska museum. — P. 191. — *Aves.*
Cedercreutz, Carl, 15. — Chara tomentosa L. i sött vatten på Åland. — P. 191—192. — *Alg.; flor., oecol.*
Englund, Bengt, 2. — Oxel (Sorbus suecica Krok) växande i en ask (Fraxinus excelsior L.) på Gotland. Mit deutschem Referate. — P. 192—194, 1 fig. — *Plant.; biol.*
Buch, Hans, 11. — Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora Fenno-Skandias. II. Elf in den letzten Jahren für Finnland nachgewiesene Arten. — P. 195—197. — *Musci; flor.*
—»— 12. Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora Fenno-Skandias. III. Die Gattung Calypogeia Raddi. — P. 197—214, 3 fig. — *Musci; flor., syst.*
—»—13. — En ovanlig form av Tanacetum vulgare. — P. 214. — *Plant.; syst.*
(Ekman, Gunnar, 2. — Uusimpia kehitysmekaanisia saavutuksia.) — P. 214. — *Embr. exp.*
Hustich, I., 8. — [Naturskyddsfrågans nuvarande läge]. — P. 214—215. — *Tut. nat.*
Linkola, K., 15. — [Luonnonsuojelu]. — P. 215—216. — *Tut. nat.*
Wikström, D. A., 2. — Iakttagelser om öronmaneten (Aurelia aurita L.) i SW-Finlands skärgård. Mit deutschem Referate. — P. 216—226, 3 fig. — *Coel.; biol., oecol.*
Hellén, W., 26. — Platynus gracilipes Duft., en för Finland ny skalbagge. — P. 227. — *Col.; faun.*
Buch, Hans und Tuomikoski, Risto, 1. — Scapania sphaerifera spec. nova auctore Buch et Tuomikoski. — P. 227—229, 14. fig. — *Musci; flor., syst.*
Montell, Justus, 7. — Agropyrum caninum (L.) PB. × latiglume (Scribn. & Smith) Rydb., ny för Finlands flora. — P. 230. — *Plant.; flor.*
Luther, Hans, 1. — Carex Hartmani Aarno Cajander från Ab Lojo. — P. 230. — *Plant.; flor.*
Buch, Hans, och Hustich, I., 1. — En märklig fyndort för Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum. — P. 231—232. — *Musci; flor.*
Palmgren, Alvar, 52. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1934—13. 5. 1935. — P. 233—260, 2 im. phot. — *Hist., biogr.*
Idman, Gösta, 9. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning år 1934. — P. 260—263. — *Oecon. soc.*
Reuter, Enzio, 11. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1934—1935. — P. 263—264. — *Bibl.*
Välikangas, Ilmari, 20. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1934—1935. — P. 264—265. — *Collect., faun.*
Frey, Richard, 28. — De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1934—1935. — P. 266—267. — *Collect.* (*ins.*).
Lindberg, Harald, 44. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1934—1935. — P. 267—269. — *Collect., flor.*

Vol. 12 (1936—1937).

(Linkola, K., 16. — Niittykasvien nuoruusajan pituus ja vuosiluokkasuhteet.) — P. 3. *Plant.; biol.*
Fortelius, Olof, 1. — Fynd av Carex praecox i Ekenäs. — P. 3. — *Plant.; flor.*
Olsoni, Börje, 12. — Fynd av tångspigg (Spinachia vulgaris Flem.). — P. 4. — *Pisc., faun.*
Erichsen, C. F. E., 1. — Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Flechten Finnlands. — P. 4—11, 1 fig. — *Lich.; flor., syst.*
Eklund, Olle, 51. — Über einige Verpflanzungsversuche einheimischer Gewächse. — P. 11—24. — *Plant.; geogr., oecol.*
—»— 52. — Botaniskt från SW-Finland 1935. — P. 24—25. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 53. — Anthropochore Pflanzen als edaphische Indikatoren. — P. 25—31. — *Plant.; oecol., geogr.*
—»— 54. — Ergänzende Pflanzenfunde aus der Gegend von Baltischport (Paldiski) in Estland. — P. 31—36, 1 fig. — *Plant.; flor. esth.*
—»— 55. — Ein Artenverzeichnis von der Insel Odinsholm (Osmussaar) in NW-Estland. — P. 36—46. *Plant., musci; flor. esth.*
Palmgren, P., 12. — Dvärgsparven (Emberiza pusilla Pall.) häckande i Finland. — P. 46. — *Aves; faun., biol.*

CEDERCREUTZ, CARL, 16. — Algen aus Kuusamo. — P. 46—52. — *Alg.; flor.*
AHLNER, STEN, 1. — Einige Flechtenfunde aus Kuusamo (Nord-Finnland). — P. 52—56, 1 fig. — *Lich.; flor., biol.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 16. — Carex paniculata L. Suomesta. — P. 56—60, 2 fig. — *Plant.; flor., geogr.*
STORÅ, R., 1. — Calosoma denticollis och Orneodes hexadactyla, nya för Finland. — P. 60. — *Col., lep.; faun.*
(WAHL, W., 1. — Anrikningen av tunga metaller hos lägre organismer.) — P. 60. — *Varia.*
HIITONEN, ILMARI, 13. — Die arktischen Arenaria-Arten unseres naturwissenschaftlichen Gebietes. — P. 60—65, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr.*
SARVELA, JAAKKO, 1. — Kasvistollisia tietoja Ilmajoelta ja Kurikasta. — P. 65—74. — *Plant.; flor.*
VÄLIKANGAS, ILMARI, 21. — Tyto alba guttata ja Lagenorhynchus albirostris, Suomelle uusia selkärankaisia. — P. 75. — *Aves, mamm.; faun.*
MALMSTRÖM, NICKEN, 4. — Fynd av sällsynta svampar. — P. 74. — *Fungi; flor.*
(SVEDELIUS, NILS E., 1. — Lomentaria rosea, en könlös floridé. Ett bidrag till kännedomen om de olika utvecklingstyperna bland rödalgerna.) — P. 75. — *Alg.; physiol.*
(COLLANDER, RUNAR, 4. — Cellsaftens kemiska sammansättning hos characeerna.) — P. 75. — *Alg.; biochem., cyt.*
(PALMGREN, PONTUS, 13. — Dagrytmen hos fåglar å högre breddgrader under sommaren.) — P. 75. — *Aves; biol.*
(BUCH, HANS, 14. — Vegetationssuccessionen på strandbältet i Lovisavikens innersta del.) — P. 75. — *Plant.; veget.*
LINDBERG, HARALD, 45. — Tvenne för landet nya fanerogamer. — P. 75. — *Plant.; flor.*
VÄLIKANGAS, ILMARI u. HYTÖNEN, OLAVI, 6. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1934. — P. 106, 1 mp. — *Aves; sign., migr.*
(LIPPMAA, TH., 3. — Über die Vegetationskartierung Estlands.) — P. 107. — *Plant.; veget.*
LINDBERG, HARALD, 46. — Lactuca tatarica från Terijoki. — P. 107. — *Plant.; flor., syst.*
PALMGREN, ALVAR, 53. — [Carex Urbani Bcklr. = C. Oederi Retz. *oedocarpa Ands.] — P. 107. — *Plant.; syst.*
EKLUND, OLE, 56. — Einige botanische Beobachtungen in Nord-Estland im Sommer 1935. — P. 107—115. — *Plant.; flor. esth., oecol.*
(REGEL, C., 2. — Vegetation der Gebirge im östlichen Mediterrangebiet (Griechenland, Türkei.) — P. 115. — *Veget.*
LINDBERG, HARALD, 47. — Fynd av Alisma Wahlenbergii och Anemone trifolia. — P. 115. — *Plant.; flor.*
—»— 48. — Finlands adventiva Bromus-arter. — P. 115—120. — *Plant.; flor.*
HUSTICH, I., 9. — Elymus arenarius-lokalerna i det inre av Lappland. — P. 120—130, 2 fig. — *Plant.; flor., geogr.*
EKLUND, OLE, 57. — Bisamråtta i Korpo. — P. 130. — *Mamm. (Fiber zibethicus); faun.*
(KUJALA, V., 5. — Pohjois- ja Keskisuomen välinen kasvillisuusraja.) — P. 130. — *Phytogeogr.*
(PALMGREN, PONTUS, 14. — Betydelsen av spindlarnas sinneshår.) — P. 130. — *Aran.; physiol.*
NORDMAN, A., 3. — Rubus arcticus L. rikligt fruktificerande i Ab Pargas Lillmälö sommaren 1935. — P. 130—131. — *Plant.; flor., biol.*
AUER, A. V., 1. — Kasvistollisia havaintoja Pohjois-Suomesta. — P. 131—142. — *Plant.; flor.*
OLSONI, BÖRJE, 13. — Botaniskt från Ab Kimito-Hitis 1932—35. — P. 142—146. — *Plant.; flor.* — *Moll.; pal.* (p. 142, 146).
(THOMSON, P., 3. — Die Vegetationsentwicklung Estlands nach der Eiszeit.) — P. 146. — *Veget.*
LINKOLA, K., 17. — Luonnonsuojelualuekysymyksen käsittelyä hallituksessa ja eduskunnassa. — P. 146. — *Tut. nat.*
(LINDBERG, HARALD, 49. — Utbredningen av skalbaggsläktet Haliplus i Finland.) — P. 146. — *Col.; faun.*
MALMSTRÖM, NICKEN, 5. — Tvenne för landet nya Geaster-arter. — P. 146. — *Fungi; flor.*
BUCH, HANS, 15. — Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora Fenno-Skandias. IV—VI. — P. 148—149, 2 fig. — *Musci; flor., syst.*
HÄYRÉN, ERNST, 37. — Bericht über die Tagung des Verbandes fenno-baltischer Pflanzengeographen in Kuressaare (Arensburg) im Juni 1935. — P. 150—180, 6 fig. — *Phytogeogr., plant., musci, lich.; flor. esth.* (p. 167—180).

Lippmaa, Th., 4. — [Rede]. — P. 150—151. — *Phytosoc.*
Waris (Warén), H., 3. — Über die Kombinationskreise. — P. 152. — *Phytosoc.*
Regel, C., 3. — Über die Gliederung der Strandvegetation an den nordeuropäischen Küsten. — P. 152—154. — *Phytosoc., veget.*
(Hryniewiecki, B., 1. — Über einige wichtige Pflanzenareale in Polen und in angrenzenden Gebieten). — P. 154. — *Phytogeogr.*
Zāmelis, A., 2. — Studien über Monogenesis. — P. 154—158. — *Plant.; biol., genet.*
(Linkola, K., 18. — Die Dauer und Jahresklassenverhältnisse des Jugendstadiums bei einigen Wiesenstauden.) — P. 158—159. — *Plant.; biol.*
Eichwald, K., 1. — Über die Verbreitung und Reliktenfrage der Mamurabeere (Rubus arcticus L.) in Estland. — P. 159. — *Plant.; geogr.*
Kalela, Aarno, 2. — Über die Formen der Kollektivart Carex polygama Schkur im Fenno-Baltikum. — P. 159. — *Plant.; geogr., syst.*
(Hryniewiecki, B., 2. — Über den Naturschutz in Polen.) — P. 159. — *Tut. nat.*
Lippmaa, Th., 5. — Übersicht der im Sommer 1934 geleisteten Arbeit auf dem Gebiet der phytosoziologischen Kartierung Estlands. — P. 159—161. — *Phytosoc.*
Palmgren, Alvar, 54. — [Rede.] — P. 161—162.
Lippmaa, T., 6. — Über eine neue phytogeographische Einteilung Estlands. — P. 162—165, 1 mp. — *Phytogeogr.*
Thomson, Paul W., 4. — Zur Frage der arktisch-alpinen Relikte auf Saaremaa-Oesel. — P. 165—166. — *Phytogeogr.*
Hiitonen, Ilmari, 14. — Exkursionserinnerungen von der 5. Tagung der fennobaltischen Pflanzengeographen. — P. 168—173, 2 fig. — *Plant.; flor. esth., phytosoc.*
Häyrén, Ernst, 38. — Algenfunde 1935 von der Insel Ösel und von einigen Nachbarinseln. — P. 180—185. — *Alg.; flor. esth.*
—»— 39. — Strauch- und Blattflechten von der Insel Ösel und aus einigen Nachbargegenden. — P. 185—189. — *Lich.; flor. esth.*
—»— 40. — Moosfunde 1935 von der Insel Ösel und einigen Nachbarinseln. — P. 189—193. — *Musci; flor. esth.*
Klingstedt, Holger, 17. — On some tetraploid spermatocytes in Chrysochraon dispar (Orth.). — P. 194—209, 5 fig. — *Orth.; cyt.*
Palmgren, Alvar, 55. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1935—13. 5. 1936. — P.210—242, 5 im. phot. — *Hist., biogr.*
Idman, Gösta, 10. Societas' pro Fauna et Flora ekonomiska ställning år 1935. — P. 243—245. — *Oecon. soc.*
Reuter, Enzio, 12. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1935—1936. — P. 246. — *Bibl.*
Välikangas, I., 22. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1935—1936. — P. 247—249. — *Collect., faun.*
Frey, Richard, 29. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1935—1936. — P. 249—252. — *Collect. (ins.), faun.*
Lindberg, Harald, 50. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1935—1936. — P. 252—255. — *Collect., flor.*

Vol. 13 (1936—1938).

Linkola, K., 19. — Niittykasvien juuristosuhteista. — P. 3. — *Plant.; oecol., physiol.*
(Häyrén, Ernst, 41. — Växtassociationer i det förorenade vattnet i Helsingfors hamnområde.) — P. 4. — *Phytosoc.*
Lindberg, Harald, 51. — Lathyrus maritimus på Åland. — P. 4. — *Plant.; flor.*
Eklund, Ole, 58. — Potentilla procumbens Sibth., neu für die Flora Finnlands. — P. 4—6. — *Plant.; flor., geogr., oecol., syst., genet.*
—»— 59. — Floristiskt från SW-Finland 1936. — P. 6—9. — *Plant., musci; flor., geogr.*
Lemberg, Bertel, 8. — Märkligare växtfynd från östra Nyland. — P. 9—19, 1 fig. — *Plant., musci, lich.; flor., geogr., oecol., phytosoc.*
Olsoni, Börje, 14. — Botaniskt från Lavansaari, Seiskari och Penisaari. — P. 19—21. — *Plant.; flor.*
Ehnholm, G., 1. — Bidrag till kännedom om algfloran i Kvarken. — P. 21—25, 1 mp. — *Alg.; flor.* — *Coel.; faun.* (p. 24).
Sonck, C.-E., 3. — Utricularia-formerna i Pielisjärvi. — P. 26—30, 1 fig. — *Plant.; flor., syst.*

LINDBERG, HARALD, 52. — [Utricularia biseriata och dess systematiska ställning.] — P. 30. — *Plant.; syst.*

SONCK, C.-E., 4. — Asperula odorata på Koli, jämte några andra för Kb märkliga växtfynd. — P. 30—33. — *Plant.; flor.*

FAGERSTRÖM, LARS, 1. — Sötvattensalger från Ik Terijoki. — P. 33—48. — *Alg., plant.; flor.*

SEGERSTRÅLE, CURT, 4. — En kungsfiskare (Alcedo atthis ispida) sedd utanför Borgå. — P. 48. — *Aves; faun.*

(NYBERG, CARL, 2. — Hos bakterier förekommande variationer.) — P. 49. — *Bact.; varia.*

EKLUND, OLE, 60. — [Den termiska faktorns betydelse för skärgårdsväxternas utbredning.] — P. 49. — *Plant.; geogr.*

LINDBERG, HARALD, 53. — [Demonstration av bilder från Kuusamo.] — P. 49. — *Plant.; flor.*

—»— 54. — [Agropyrum violaceum-gruppens former i Finland.] — P. 49. — *Plant.; flor.*

NYBERG, WOLMAR, 2. — Några i Borgå och dess omnejd funna sällsyntare svamparter. — P. 49—51. — *Fungi; flor.*

HÄYRÉN, ERNST, 42. — [Lycoperdon pusillum och Clavaria fistulosa i Helsingfors.] — P. 52. — *Fungi; flor.*

(FEDERLEY, HARRY, 5. — Kromosomtalet och dess betydelse.) — P. 52. — *Cyt., genet.*

LUTHER, ALEX., 7. — Förekomsten av hydroidpolypen Craspedacusta sowerbii Lancaster (= Microhydra Potts) i Victoria regia-bassinen i botaniska trädgården i Helsingfors. — P. 52. — *Coel.; imp.*

HELLÉN, W., 27.— Priophorus foveivaginatus Mal. (Hym. Tenthr.) funnen i Finland. — P. 52. — *Hym.; faun., syst.*

VÄLIKANGAS, ILMARI u. HYTÖNEN, OLAVI, 7. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1935. — P. 53—87, 1 mp. — *Aves; sign., migr.*

FAGERSTRÖM, LARS, 2. — För vårt land nya adventivväxter från Ik Terijoki. — P. 87—89. — *Plant.; flor.*

RAILONSALA, ARTTURI, 3. — Lisätietoja Niinimaan seudun putkilokasvistosta. — P. 89—92. — *Plant.; flor.*

(STRENG, O., 2. — Verityypit ja antropologia.) — P. 92. — *Varia.*

KLINGSTEDT, HOLGER, 18. — [Inekvala bivalenter hos gräshoppor.] — P. 92. — *Orth.; cyt.*

KOTILAINEN, MAUNO J., 17. — [Kobresia caricina, Suomelle uusi sarakasvi.] — P. 92. — *Plant.; flor.*

LINDBERG, HÅKAN, 11. — Petrobius balticus Stach., en för Finland ny borstsvans (Thysanura). — P. 92—93, 1 fig. — *Thysanura; faun.*

HÄLLSTRÖM, EDVARD AF, 1. — Anmärkningsvärda bladmossor från provinsen Kuusamo. — P. 93—95. — *Musci; flor.*

ERKAMO, V., 1. — Alisma gramineum Gmelin für Finnland neu. — P. 95—97. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

—»— 2. — Havaintoja satunnaiskasvistosta eräillä rautatieasemillamme. — P. 98—101. — *Plant.; flor., geogr.*

(SEGERSTRÅLE, CURT, 5. — Undersökningar angående havsforellen.) — P. 101. — *Pisc. (Salmo); oecol.*

PALMGREN, PONTUS, 15. — [Massflyttning av fåglar, främst bofinkar, över Helsingfors den 15 april 1936.] — P. 101. — *Aves (Fringilla coelebs); migr.*

(LINDBERG, HÅKAN, 12. — Hos stritar förekommande parasiter.) — P. 101. — *Hem.; paras.*

(HUSTICH, I., 10. — [Vegetationen på fjällen i finska Lappmarkens västra delar.].) — P. 101. — *Veget.*

HÄYRÉN, ERNST, 43. — Mycenastrum corium Desv., ny för Finland. — P. 101. — *Fungi; flor.*

MALMIO, BR., 2. — Vicia pisiformis L. löydetty Suomesta. — P. 101—102. — *Plant.; flor.*

NILSSON, KAI, 1. — Fynd av Pisolithus arenarius Albert & Schwein från Finland. — P. 102. — *Fungi; flor.*

MALMSTRÖM, NICKEN, 6. — Beobachtungen über die Grosspilze des Hochwassergebietes von Tvärminneträsk und Sandträsk. — P. 103—109. — *Fungi; flor., oecol.*

(HIITONEN, I., 15. — Interseksualisuus eläinkunnassa.) — P. 109. — *Sexualitas.*

SONCK, C.-E., 5. — [Epilobium collinum f. albiflorum, Satureja vulgaris f. albiflora.] — P. 109. — *Plant.; flor.*

HINTIKKA, T. J., 5. — Suomessa tavatuista hedekatoisista omenapuista ja niiden partenokarpiasta. — P. 110—112. — *Plant. (Pyrus malus); path.*

Hintikka, T. J., 6. — Havaintoja mukuramännystä (Pinus silvestris L. l. gibberosa Kihlm.). — P. 112—116. — *Plant.; path.*
Schulze, P., Viets, K. und Willmann, C., 1. — Mitteilungen über F. D. Wasastjernas Monographia Acarorum. — P. 116—125. — *Acar.; syst., synon.*
Palmgren, Alvar, 56. — Carex jemtlandica, en ny Carex-art. — P. 126—128. — *Plant.; flor., syst.*
Sonck, C.-E., 6. — Några uppgifter om fyndet av Carex jemtlandica Palmgr. vid Nissinjärvi i Kuusamo. — P. 128—129. — *Plant.; flor.*
—»— 7. — Ett par märkligare växtfynd i Kuusamo-Salla. — P. 129—130. — *Plant.; flor.*
Grönblad, Rolf, 2. — Några observationer angående kopulationen hos Netrium digitus Itz. & Rothe. — P. 130—131. — *Alg.; flor., biol.*
Kalela, Olavi, 2. — Anodonta cygnea cellensis Schröter in der Gegend von Tampere gefunden. — P. 132—133. — *Moll.; faun.*
Palmgren, Alvar, 57. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1936—13. 5. 1937. — P. 134—160, 3 im. phot. — *Hist., biogr.*
Idman, Gösta, 11. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning år 1936. — P. 160—163. — *Oecon. soc.*
Reuter, Enzio, 13. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1936—1937. — P. 163—164. — *Bibl.*
Välikangas, Ilmari, 23. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu 1936—1937. — P. 164—166. — *Collect., faun.*
Frey, Richard, 30. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1936—1937. — P. 167—170. — *Collect. (ins.), faun.*
Lindberg, Harald, 55. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1936—1937. — P. 170—172. — *Collect., flor.*

Vol. 14 (1938—1939).

(Järvi, T. H., 6. — Itämeren lohikannan vaihteluista.) — P. 3. — *Pisc. (Salmo).*
Palmgren, Pontus, 16. — [Burfåglars dygnsrytmik under flyttningstiden.] — P. 3—4. — *Aves (Erithacus rubecula); biol., migr.*
Segerstråle, Curt, 6. — [Fiskvandringar vid södra Finlands kuster 1937.] — P. 4. — *Pisc.; faun.; vag.*
Hellén, W., 28. — En för Finlands fauna ny skalbagge, Corticaria eppelsheimi Reitt. — P. 4. — *Col.; faun.*
Segerstråle, Sven G., 1. — Ett fynd av sötvattenshirudinén Glossiphonia complanata (L.) i bräckt vatten. — P. 4—5. — *Hirud.; faun., oecol.*
Lemberg, Bertel, 9. — Tvenne växtfynd från östra Nyland. — P. 5—8. — *Plant.; flor., oecol., phytosoc.*
Zandt, Ferdinand, 1. — Beiträge zur Parasitenfauna und geographischen Verbreitung der Coregonen. — P. 8—11. — *Pisc. (Coregonus), crust.; faun. fenn., suec., americ., geogr., oecol., paras.*
Nyström, E. J., 1. — Die Norrlinsche Häufigkeitsskala in graphischer Darstellung. — P. 11—13. — *Varia.*
Pettersson, Bror, 10. — Arctostaphylos alpina, an arctic-alpine Plant found on an Islet in southern most Finland. — P. 13—16, 1 fig. — *Plant., musci, lich.; flor., geogr., oecol., phytosoc.*
Lindberg, Håkan, 13. — Långhorningen Trichoferus gayi Plav. utkrupen ur ett skrivbord. — P. 17. — *Col.; imp.*
(Elfving, Fredr., 6. — Drag ur Sällskapets äldre historia.) — P. 17. — *Hist.*
Kotilainen, Mauno J., 18. — [Tofieldia palustris.] — P. 17. — *Plant.; flor.*
Luther, Alex., 8. — Pseudachatina sp. importerad från Kamerun. — P. 18. — *Moll.; imp.*
Storå, Ragnar, 2. — Beobachtungen über Meerestriftinsekten in Tvärminne im Sommer 1936. — P. 18—25. — *Ins. (col., hem., lep., hym.); transp. mar., faun., geogr.*
Cedercreutz, Carl, 17. — Några ord om Bulbochaete-arterna i Finland. — P. 25—26. — *Alg.; flor., oecol.*
Backlund, Helge O., 3. — Eine Methode zur quantitativen Untersuchung der Mikrofauna in Moos, Förna, Trift und dergl., sowie einige vorläufige Ergebnisse dieser Methode. — P. 27—32. — *Prot., nemat., tard.; oecol., biocoen., techn. — Plant., musci, lich.; flor.*
(Krogerus, Rolf, 21. — Hangöuddområdets biogeografi och karaktär av en biogeografisk brännpunkt.) — P. 32. — *Geogr.*

(LINDBERG, HARALD, 56. — Studier vid Ryska Vetenskapsakademiens botaniska museum i Leningrad.) — P. 32. — *Varia.*

—»— 57. — [Draba hirta-gruppens arter i Finland.] — P. 32. — *Plant.; flor.*

SEGERSTRÅLE, SVEN G., 2. — En massförekomst av ilanddrivna insekter i Pellinge skärgård i augusti 1937. — P. 33—36. — *Ins. (lep., dipt., col., hym., hem.); transp. mar., faun., geogr.*

NORDMAN, ADOLF FR., 4. — Fynd av insekter, uppkastade på havsstränderna vid Tvärminne Zoologiska station i augusti 1937. — P. 36—37. — *Ins. (lep., col., hem.); transp. mar., faun.*

HUSTICH, I., 11. — Några anteckningar under en midvinterresa till Pallastunturi 1935. — P. 37—45. — *Meteorologia. — Plant.; flor.*

KLOCKARS, BERTEL och LUTHER, HANS, 1. — Floristiska iakttagelser i Li, Viibus-Maarestatunturiområdet. — P. 45—54, 1 mp. — *Plant.; flor., oecol.*

LUTHER, HANS, 2. — Algen aus dem westlichen Enare in Lappland. — P. 54—62, 1 fig. — *Alg., plant.* (p. 55); *flor.*

KROGERUS, HARRY, 1. — Lepidopterologiska iakttagelser inom Maaresta-Viibustunturi området i Lapponia inarensis. — P. 62—70, 1 mp. — *Lep.; faun., biol., oecol., biocoen. — Plant., lich.; flor.*

VÄLIKANGAS, ILMARI u. HYTÖNEN, OLAVI, 8. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1936. — P. 70—107, 1 mp. — *Aves; sign., migr.*

(PALMGREN, PONTUS, 17. — Nyare undersökningar rörande det naturliga urvalets inverkan.) — P. 107. — *Biol.*

KROGERUS, ROLF, 22. — Myggor som blodsugare på andra insekter. — P. 107. — *Ins., dipt.; faun., oecol., paras.*

CEDERCREUTZ, CARL, 18. — Anmärkningsvärda Characéfynd. — P. 108—110, 1 mp. — *Alg., plant.; flor.*

PALMGREN, ALVAR, 58. — [Carex jemtlandica.] — P. 110. — *Plant.; flor.*

SEGERSTRÅLE, CURT, 7. — Ett exemplar av faren, Abramis ballerus L., funnet i Ekenäs skärgård. — P. 110. — *Pisc.; faun., vag.*

AUER, A. V., 2. — Kasvistollisia havaintoja Pohjois-Suomesta II. — P. 110—123. — *Plant., musci.; flor., oecol.*

(JOHANSEN, H., 1. — Die Faunengeschichte Sibiriens.) — P. 123. — *Faun. sibirica.*

NORDBERG, SVEN, 3. — [Ålands däggdjursfauna.] — P. 123. — *Mamm.; faun., hist.*

HUSTICH, I., 12. — [Naturskyddsområden på statens mark.] — P. 123—124. — *Tut. nat.*

NORDMAN, ADOLF FR., 5. — Om förekomsten av gräshoppsarten Gomphocerus variegatus Fisch.-Waldh. i N-Finland. — P. 124—125. — *Orth.; faun., geogr. — Plant.; flor.*

HÄYRÉN, ERNST, 44. — Peziza (Plicaria) repanda Wahlenb. aus Satakunta, Finnland. — P. 125. — *Fungi; flor., oecol., syst.*

STERNBERG, ORRE, 1. — Ficus carica odlad som krukväxt i Finland. — P. 126. — *Hortic.*

(KOTILAINEN, MAUNO J., 19. — Magnesiumsilikaattisubstratista ja sen merkillisestä kasvilajistosta.) — P. 126. — *Plant.; oecol.*

HUSTICH, I., 13. — [Peridotitvegetation på Labrador.] — P. 126. — *Plant.; oecol.*

LINDBERG, HARALD, 58. — [Studier rörande kollektivarten Erigeron acris.] — P. 126—127. — *Plant.; flor., syst.*

BUCH, HANS, 16. — [Jungermania tristis.] — P. 127. — *Musci; flor.*

MONTELL, JUSTUS, 8. — Woodsia alpina (Bolt) Gray × ilvensis (L.) R. Br. funnen i Salla (Ks). — P. 127. — *Plant.; flor.*

LÖNNFORS, FRANS, 1. — Bidrag till kännedomen om Lampetra fluviatilis lektid i Kumo älv. — P. 127—128. — *Pisc.; faun., biol., hydrogr.*

HÄYRÉN, ERNST, 45. — Einige Algen aus dem Meere bei der Stadt Kemi, Ostrobothnia borealis. — P. 128—129. — *Alg.; flor.*

(KROGERUS, ROLF, 23. — Kalkhaltens inverkan på torvmarkernas djursamhällen.) — P. 129—130. — *Biocoen., oecol., geogr.*

LEHTONEN, LAURI ja PANKAKOSKI, ANTERO, 1. — Parmelia scortea Ach. Porkkalassa. — P. 130—131. — *Lich.; flor., oecol.*

HIITONEN, ILMARI, 16. — Zur Verbreitung der Gattung Elaphomyces in Finnland. — P. 131—134, 1 mp. — *Fungi; flor., geogr., oecol.*

KOTILAINEN, MAUNO J., 20. — Seligeria subimmersa Lindb. löydetty uudelleen Kuusamosta. — P. 135. — *Musci; flor.*

HINTIKKA, T. J., 7. — Omenien yhteenkasvaumia. — P. 135—136, 5 fig. — *Plant. (Pyrus malus); hortic., terat.*

Hintikka, T. J., 8. — Sektoriali Sävstaholm-omena. — P. 137—138, 1 fig. — *Plant. (Pyrus malus); hortic., mut.*
Palmgren, Alvar, 59. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1937—13. 5. 1938. — P. 139—160, 2 im. phot. — *Hist., biogr.*
Idman, Gösta, 12. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning år 1937. — P. 160—163. — *Oecon. soc.*
Reuter, Enzio, 14. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1937—1938. — P. 163—164. — *Bibl.*
Korvenkontio, V. A., 4. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1937—1938. — P. 165—166. — *Collect., faun.*
Frey, Richard, 31. — De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1937—1938. — P. 167—170. — *Collect. (ins.), faun.*
Lindberg, Harald, 59. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1937—1938. — P. 170—172. — *Collect., flor.*

Vol. 15 (1939—1940).

(Nyberg, Carl, 3. — Nyare rön ifråga om bakteriernas fortplantning.) — P. 1. — *Bact.; biol.*
Meurman, O., 5. — [Luonnonsuojelua.] — P. 2. — *Tut. nat.*
Buch, Hans, 17. — [Naturskydd.] — P. 2. — *Tut. nat.*
Palmgren, Alvar, 60. — [Melica uniflora anträffad på Åland.] — P. 2. — *Plant.; flor.*
—»— 61. — [Cryptogramme crispa (L.) R. Br.] — P. 2. — *Plant.; flor.*
Olofsson, Paul, 1. — Cryptogramme crispa återfunnen på Åland. — P. 2—4. — *Plant., musci, lich.; flor.*
Lindberg, Harald, 60. — Inplantering av vinbergssnäckan, Helix pomatia, i Lojo socken. — P. 4. — *Moll.; imp.*
Fagerström, Lars, 3. — Claytonia sibirica L. (Cl. alsinoides Sims.) funnen i Terijoki. — P. 4—5. — *Plant.; flor.*
—»— 4. — Galium saxatile i Terijoki. — P. 5—7. — *Plant., musci; flor., phytosoc.*
—»— 5. — Dentaria bulbifera L. i Terijoki. — P. 7—11, 1 mp. — *Plant.; flor., top.*
Lemberg, Bertel, 10. — En flytbladsform av Ranunculus sceleratus L. funnen i Pernå. — P. 11—13, 1 fig. — *Plant.; flor., oecol.*
—»— 11. — Rumex thyrsiflorus Fingerh. funnen i Pernå. — P. 13—15. — *Plant.; flor., geogr., top.*
Kuenen, D. J., 1. — Zur Kenntnis der stehenden Kleingewässer auf den Schäreninseln. — P. 16—22. — *Dipt., col., hem., moll.; faun., oecol.*
(Nordberg, Sven, 4. — Några drag ur den åländska däggdjursfaunans historia.) — P. 22. — *Mamm.; faun., hist.*
Segerstråle, Curt, 8. — [Salmo trutta L. i Sjundeå å.] — P. 23. — *Pisc.; faun.*
Häyrén, Ernst, 46. — [Cottus koshewnikowi Gratzianow anträffad i Könkämä älv (Le).] — P. 23. — *Pisc.; faun.*
Lindberg, Harald, 61. — [Ranunculus salsuginosus från Bastuskär nära Räfsö, St.] — P. 23. — *Plant.; flor.*
Fagerström, Lars, 6. — Cetraria nivalis (L.) Ach. funnen i Terijoki. — P. 23—25, 1 mp. — *Lich.; flor.*
—»— 7. — Fynd av Mnium Drummondii Bruch & Schimp. i Terijoki. — P. 26, 1 mp. — *Musci; flor.*
—»— 8. — Lamium galeobdolon (L.) Cr. i Finland. — P. 26—34, 1 mp. — *Plant., musci; flor., geogr., oecol., top.*
Luther, Hans, 3. — Über das Vorkommen von Utricularia neglecta Lehm. in Finnland. — P. 34—49, 2 fig., 2 mp. — *Plant.; flor., geogr., oecol., syst.*
(Buch, Kurt, 3. — De kvantitativa relationerna mellan kemiska och biologiska faktorer i havsvattnet.) — P. 49. — *Hydrol.*
(Halme, Erkki, 1. — Pohjanpitäjänlahden fosforitaloudesta ja planktontuotannosta.), — P. 49. — *Hydrol., planct.*
(Boström, K. J., 1. — Piirteitä Bosmina maritiman temporaalisesta esiintymisestä ja levinneisyydestä Itämerialueella.) — P. 50. — *Crust.; oecol.*
Segerstråle, Curt, 9. — [Coregonus lavaretus' och Anguilla vulgaris' vandringar vid våra kuster.] — P. 51. — *Pisc.; vag.*
Korvenkontio, V., 5. — [Kyselykaavakkeita sopulin esiintymisen johdosta.] — P. 51. — *Mamm. (Lemmus lemmus); vag.*

STENLID, N., 1. — Petasites spurius (Retz.) Rchb. funnen på Åland. — P. 51. — *Plant.; flor.*
NILSSON, KAI, 2. — Elymus arenarius f. ramosus Lüderwaldt i Finland. — P. 52. — *Plant.; terat.*
HIITONEN, ILMARI, 17. — [Secale cereale, Lolium multiflorum; haarovia tähkiä.] — P. 52. — *Plant.; terat.*
NORDMAN, ADOLF FR., 6. — Överflöd på lemlar och sorkar i trakten av Kilpisjärvi, Enontekiö, år 1938. — P. 52—55. — *Mamm. (Lemmus lemmus, Microtus agrestis, Evotomys rufocanus); faun., vag.*
HIITONEN, ILMARI, 18. — Eräitä leutojen syksyjen seurauksia Helsingin kasvillisuudessa (varsinkin ruderaattikasvillisuudessa). Mit deutschem Referate. — P. 56—66. — *Plant.; flor., oecol.*
(KEMNER, N. A., 1. — Studier över sociala insekter, särskilt termiter, på Java och Celebes.) — P. 66. — *Isopt.; oecol.*
KROGERUS, ROLF, 24. — [Tremex fuscicornis Fabr.] — P. 66—67. — *Hym.; faun., oecol., symbiosis.*
HINTIKKA, T. J., 9. — Zur Kenntnis einer Blütenanomalie bei Barbarea vulgaris R. Br. — P. 67—79, 9 fig. — *Plant.; terat.*
(PACKALÉN, K. THOROLF, 1. — Om filtrabelt virus och problemställningar inom virusforskningen.) — P. 79. — *Varia.*
(REGEL, C., 4. — [Halbinsel Athos.].) — P. 79. — *Varia.*
HUSTICH, I., 14. — Förslag berörande kartor, som skulle belysa den biologiska fältforskningens intensitet i olika delar av landet. — P. 79—81. — *Varia.*
MONTELL, JUSTUS, 9. — Luzula pallescens (Wg) Bess. × sudetica (Wlld.) DC. funnen i Kuusamo. — P. 81. — *Plant.; flor., syst.*
HIITONEN, ILMARI, 19. — Agropyrum junceum (L.) LB., neu für die Flora Finnlands. — P. 82—85, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr.*
MARKLUND, GUNNAR, 3. — Några anmärkningsvärda växtfynd. — P. 85—90. — *Plant.; flor., syst.*
(FREY, RICHARD, 32. — En naturvetenskaplig resa till Azorerna.) — P. 90. — *Itin.*
OLSONI, BÖRJE, 15. — Utricularia neglecta Lehm. i Hitis. — P. 91—92. — *Plant.; flor.*
— 16. — Botaniskt från Ab Kimito-Dragsfjärd-Hitis 1936—1938. — P. 92—94. — *Plant.; flor.*
FAGERSTRÖM, LARS, 9. — Ett bidrag till kännedomen om vegetation och flora i Terijoki socken på Karelska näset. — P. 94—140, 8 fig., 6 mp. — *Plant.; flor., top., agric., hortic.*
VÄLIKANGAS, ILMARI u. HYTÖNEN, OLAVI, 9. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1937. — P. 140—174, 1 mp. — *Aves; sign., migr.*
(KLINGSTEDT, F. W., 1. — Gränsproblem mellan biologi och kemi.) — P. 174. — *Biol.*
FEDERLEY, HARRY, 6. — [Spallanzanijubileet i Pavia.] — P. 175; vide etiam p. 237, 251. — *Varia.*
PALMGREN, ALVAR, 62. — [Carex viridula Michx.] — P. 175. — *Plant.; flor.*
LINDBERG, HARALD, 62. — [Carex imandrensis Kihlm. = C. limosa; C. limosa L. × C. rariflora (Wg.) Sm.] — P. 175—176. — *Plant.; flor., syst., synon.*
HÄYRÉN, ERNST, 47. — Massenvegetation von Oscillatoriaceen auf Holz in einem Gradierwerk. — P. 176. — *Alg.; flor. sibirica, oecol.*
CEDERCREUTZ, CARL, 19. — Einige neue und bemerkenswerte Zygnemaceen für Finnland. — P. 177—179, 3 fig. — *Alg.; flor., syst., synon., biol.*
SKEPPARNABB, LILLI, 1. — Förebilderna till Elias Tillandz' växtfigurer. — P. 179—185. — *Plant.; hist.*
HÄYRÉN, ERNST, 48. — Bericht über die Tagung der fenno-baltischen Pflanzengeographen in Finnland im Juni 1938. — P. 186—234, 13 fig. — *Phytogeogr., plant., musci, lich., alg.; flor.*
(LIPPMAA, TH., 7. — Areal und Altersbestimmung der Galeobdolon-Asperula-Asarum-Union.) — P. 189. — *Phytosoc.*
HÄYRÉN, ERNST, 49. — Die Schärenzonen in Südfinnland. — P. 189—197, 4 fig. — *Alg., lich., musci, plant.; flor. geogr., oecol., phytosoc.*
REGEL, CONSTANTIN, 5. — Über die Begrenzung von pflanzengeographischen Gebieten. — P. 197—200. — *Phytogeogr.*
SÖYRINKI, NIILO, 1. — Generative und vegetative Vermehrung in der alpinen Vegetation Petsamo-Lapplands. — P. 201—209. — *Plant.; biol., oecol., phytosoc.*
LINKOLA, K., 20. — Die Exkursion nach Ruotsinkylä und Tammisto. — P. 210. — *Exc.*

Bärlund, Ulla, 1. — Über die Einwanderung der Pflanzen nach einem Archipel von Kleininseln in den Schären Ålands. — P. 216—220, 2 fig. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
Kalela, Aarno, 3. — Der Exkursionstag in Turku. — P. 232—234. — *Plant.; flor.*
Buch, Hans, 18. — Några anmärkningsvärda Alchemilla-fynd. — P. 234—235. — *Plant.; flor.*
Palmgren, Alvar, 63. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1938—13. 5. 1939. — P. 236—264, 1 im. phot. — *Hist., biogr.*
Idman, Gösta, 13. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning år 1938. — P. 264—267. — *Oecon. soc.*
Reuter, Enzio, 15. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1938—1939. — P. 268. — *Bibl.*
Korvenkontio, V. A., 6. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu v. 1938—1939. — P. 269—270. — *Collect., faun.*
Frey, Richard, 33. — De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1938—1939. — P. 270—273. — *Collect. (ins.), faun.*
Lindberg, Harald, 63. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1938—1939. — P. 273—275. — *Collect., flor.*

Vol. 16 (1940).

(Söyrinki, Niilo, 2. — Piirteitä Bayerin alppikasvillisuudesta.) — P. 1. — *Flor. alpina.*
(Federley, Harry, 7. — Den 7:de internationella genetikerkongressen i Edinburgh.) — P. 1. — *Genet.*
Segerstråle, Curt, 10. — [Fynd av Clupea alosa finta Cuv. och Belone vulgaris.] — P. 1—2. — *Pisc.; faun.*
Järvi, T. H., 7. [Stamsillens förekomst vid våra kuster.] — P. 2. — *Pisc. (Clupea alosa finta); faun.*
Häyrén, Ernst, 50. — Tre fall av vegetationsfärgning sommaren 1939. — P. 2—3. — *Alg.; flor., oecol.*
Lemberg, Bertel, 12. — Viola Selkirkii Pursh. funnen i Nyland. — P. 3—8. — *Plant.; flor., geogr., phytosoc.*
Luther, Hans, 4. — Ny fyndort för Rubus arcticus L. på Åland. — P. 8—9. — *Plant.; flor.*
—»— 5. — Anteckningar om adventivfloran i Lappvik åren 1925—1939. — P. 9—15. — *Plant.; flor.*
Hustich, I., 15. — Växttopografi och växtsociologi. — P. 16—22. — *Phytosoc., top.*
—»— 16. — Några lemmelanteckningar 1938—1939. — P. 23—28. — *Mamm., aves; faun., oecol., vag.*
—»— 17. — Lemmelåren. En djurgeografisk skiss. — P. 28—44. — *Mamm. (Lemmus lemmus); faun., geogr., oecol., vag. — Plant.; oecol.*
Markkund, Gunnar, 4. — Einige Sippen der Ranunculus auricomus-Gruppe. — P. 45—54, 4 t. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 5. — Zwei neue Sippen der Potentilla argentea-Gruppe. — P. 54—57, 2 t. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 6. — Einige Beobachtungen über Potentilla Egedi Wormsk. — P. 57—59. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 7. — Die in Finnland vorkommenden Odontites-Sippen. — P. 59—63. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 8. — Plantago intermedia Gil. und P. major L. — P. 63—67. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 9.— Sonchus maritimus L. und S. arvensis L. — P. 67—72, 1 fig. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 10. — Über Atriplex praecox Hülph. — P. 72—74. — *Plant.; flor., oecol., syst.*
—»— 11. — Beobachtungen über Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup und E. nigrum L. s. str. — P. 74—77. — *Plant.; flor., oecol., syst.*
(Krogerus, Rolf, 25. — Ekologiska raser bland insekterna.) — P. 77. — *Ins.; oecol.*
Hintikka, T. J., 10. — [Kaksi koivun tautia.] — P. 77. — *Plant. (Betula); path.*
—»— 11. — Syreenin (Syringa vulgaris L.) lehtianomalioista ja niiden tulkinnoista. — P. 78—82. — *Plant.; terat.*
Fagerström, Lars, 10. — Juncus squarrosus L. funnen i Terijoki. — P. 82—85. — *Plant.; flor., oecol., syst.*
(Sauramo, Matti, 2. — Suomen metsien historiasta.) — P. 85. — *Varia.*
Segerstråle, Curt, 11. — [Coregonus lavaretus, Lota lota.] — P. 86. — *Pisc.; oecol.*
Hellén, Wolter, 29. — Chrysomela haemoptera L., en för Finland ny skalbagge. P. 87. — *Col.; faun.*

HUSTICH, I., 18. — Några växtgeografiska forskningsuppgifter i Lappland. — P. 87—99. — *Plant.; geogr.*

PALMGREN, ALVAR, 64. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1939—18. 5. 1940. — P. 101—146, 11 im. phot. — *Hist., biogr.*

STOCKMANN, STEN, 1. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1939. — P. 147—149. — *Oecon. soc.*

REUTER, ENZIO, 16. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1939—1940. — P. 149—150. — *Bibl.*

FREY, RICHARD, 34. — De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1939—1940. — P. 150—152. — *Collect. (ins.), faun.*

LINDBERG, HARALD, 64. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetså et 1939—1940. — P. 152—153. — *Collect., flor.*

Vol. 17 (1941—1942).

(LINDBERG, HÅKAN, 14. — Insektfaunan i hällkaren vid Finlands kuster.) — P. 1. — *Ins.; oecol.*

SEGERSTRÅLE, CURT, 12. — [Scomber scombus L. vid Finska vikens kust.] — P. 2. — *Pisc.; faun., vag.*

LUTHER, ALEX., 9. — Limax maximus L. (= L. cinereus Lister) från Helsingfors. — P. 2—3. — *Moll.; faun., imp., syst.*

LINDBERG, HÅKAN, 15. — Anteckningar om skalbaggs- och skinnbaggsarter på hedmarker på Hangö udd. — P. 3—6, 2 fig. — *Col., hem.; faun., oecol., biocoen.*

HÄYRÉN, ERNST, 51. — Floristiska iakttagelser i Uskela och Halikko, Regio aboënsis. — P. 6—12. — *Alg., fungi, lich., musci, plant.; flor.*

TUOMIKOSKI, RISTO, 1. — Muistiinpanoja Tuupovaaran pitäjän lehtisammalkasvistosta. — P. 12—21. — *Musci; flor., oecol.*

VIRTANEN, ARTTURI I., 1. — Aminohappojen ja valkuaisaineiden muodostamisesta kasveissa. — P. 21—22. — *Plant.; biochem.*

PETTERSSON, BROR, 11. — Mediterran flora inkommen till Drumsö. — P. 22. — *Plant.; imp.*

SUOMALAINEN, ESKO, 1. — Rana ridibunda Pall., tavattu Suomessa. — P. 23. — *Amph.; faun., oecol.*

AHLQVIST, HOLGER, 3. — Ett fynd av Rana ridibunda nära Borgå. — P. 23—24. — *Amph.; faun., oecol.*

MONTELL, JUSTUS, 10. — Carex holostoma Drej. funnen i Enontekis. — P. 24. — *Plant.; flor.*

—»— 11. — Draba dovrensis Fr. ny för Finlands flora. — P. 24—25. — *Plant.; flor., syst.*

HÄYRÉN, ERNST, 52. — Jasione montana i Lappvik i Tenala socken. — P. 25. — *Plant.; flor.*

—»— 53. — Växtfynd från Raumo. — P. 25—27. — *Alg., lich., musci, plant.; flor.*

—»— 54. — Om kryptogamvegetationen på batteribergen vid Helsingfors. — P. 27—32. — *Alg., lich., musci, plant.; flor., oecol., phytosoc.*

TUOMIKOSKI, RISTO, 2. — Muistiinpanoja Tuupovaaran pitäjän ja sen lähiseutujen putkilokasveista. — P. 32—43, 1 mp. — *Plant.; flor.*

LUTHER, HANS, 6. — Najas marina L. funnen i Jakobstads skärgård. — P. 43—50, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

FAGERSTRÖM, LARS, 11. — Cinna latifolia (Trev.) Griseb. i Pyttis skärgård. Ett bidrag till diskussionen om växternas invandring till Nyland. — P. 50—66, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*

—»— 12. — Några nya fynd av Epilobium adenocaulon Hausskn. och ssp. rubescens (Rydb.) Hiit. — P. 66—68. — *Plant.; flor., geogr.*

—»— 13. — Fynd av Thlaspi alpestre L. på Åland. — P. 68—70. — *Plant.; flor., geogr.*

—»— 14. — Roripa austriaca (Crantz.) Besser i Terijoki. — P. 70—72. — *Plant.; flor., syst.*

—»— 15. — Cetraria nivalis (L.) Ach. funnen på en ny lokal i Regio aboënsis. — P. 72—73. — *Lich., musci, plant.; flor.*

(HUSTICH, ILMARI, 19. — Periodicitet och växlingar i växt- och djurliv i Lappland betingade av klimatet.) — P. 73. — *Varia.*

(PLATONOFF, S., 1. — Insektlivet på älvstränder i södra Petsamo.) — P. 73. — *Ins.; oecol.*

MONTELL, JUSTUS, 12. — Hybriden Stellaria graminea L. × longifolia Mühl. funnen i Finland. — P. 74. — *Plant.; flor., syst.*

—»— 13. — Stellaria graminea L. var. ciliata n. var. — P. 74. — *Plant.; flor., syst.*

—»— 14. — Carex aquatilis Wg. v. stans Drej. × rigida Good., en ny hybrid. — P. 75. — *Plant.; flor., syst.*

HÄYRÉN, ERNST, 55. — Floristiska notiser från trakten av Torneå och Kemi. — P. 75—76. — *Plant.; flor.*
—»— 56. — Alger och vattenvegetation i Sibbo skärgård, Sydfinland. P. 76—79. — *Alg., plant.; flor.*
TUOMIKOSKI, RISTO, 3. — Kasvipeitteestä tilapäisellä vesijättömaalla. — P. 79—82. — *Plant.; oecol.*
EKLUND, OLE, 61. — Spår i SW-Finlands växtvärld av fimbulvintern 1940. — P. 82—86. — *Plant.; oecol.*
—»— 62. — Sind die Eiszeiten Folgeerscheinungen galaktischer Schatteneffekte? With english Summary. — P. 87—105, (144), 11 fig. — *Varia.*
CEDERCREUTZ, CARL, 20. — Beitrag zur Kenntnis der Felsenalgen in Finnland. — P. 105—121, 3 fig. — *Alg.; flor., oecol., phytosoc.*
FAGERSTRÖM, LARS, 16. — Anteckningar om floran och vegetationen i Terijoki socken. I. — P. 121—142, 4 fig. — *Alg., fungi, musci, plant.; flor., oecol.*
SEGERSTRÅLE, CURT, 13. — Lång vandring iakttagen hos insjögäddor. — P. 142—144. — *Pisc. (Esox lucius); sign., vag., oecol.*
(RANTANIEMI, P. A., 1. — Kasviston suhteista Kemijokisystemissä.) — P. 144. — *Veget.*
LINDBERG, HARALD, 65. — Exkursionei på Balkan. — P. 144. — *Itin.*
—»— 66. — Vicia cassubica från Ab, Tenala. — P. 145. — *Plant.; flor.*
SEGERSTRÅLE, SVEN G., 3. — Einige Amphipodenfunde aus dem baltischen Meeresgebiet Finnlands. — P. 145—149. — *Crust.; faun., oecol.*
FEDERLEY, HARRY, 8. — Ein kleiner Beitrag zur Frage vom Kampf um's Dasein. — P. 149—153. — *Lep. (Pygaera); oecool., biol.*
SEGERSTRÅLE, CURT, 14. — Huru länge bibehåller gäddmjölken sin befruktningsförmåga efter överföring i vatten? — P. 153—161. — *Pisc. (Esox lucius); oecol.*
SAXÉN, UNO, 3. — Eine neue Seggenhybride Carex rigida Good. × salina Wg. ssp. cuspidata v. borealis Almq. — P. 161—164. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 4. — Alisma lanceolatum With., für Finnland neu. — P. 164—166. — *Plant.; flor.*
KLINGSTEDT, HOLGER, 19. — Negative Heterochromacy in Orthopteran Chromosomes. — P. 166—175, 7 fig. — *Orth. (Mecostethus grossus); cyt.*
(PALMGREN, PONTUS, 18. — Lektor Päiviö Kuusistos biologiska studier över lövsångaren, Phylloscopus trochilus acredula (L.).) — P. 177. — *Aves; biol.*
MONTELL, JUSTUS, 15. — Carex rostrata Stokes × rotundata Wg., ny för Finlands flora. — P. 177. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 16. — Några anmärkningsvärda former av Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — P. 178. — *Plant.; flor., syst.*
SEGERSTRÅLE, SVEN G., 4. — Bläckfisken Ommatostraphes sagittatus anträffad i Petsamo. — P. 178—179. — *Moll.; faun.*
HÄYRÉN, ERNST, 57. — Notis om kryptogamvegetationens bältesbildning i Kerminnotko bäckdal, Lintukorpi naturskyddsreservat. — P. 180—182, 1 fig. — *Musci, plant.; flor., oecol.*
MALMSTRÖM, NICKEN, 7. — Amanita pantherina (DeC.) Fr. och Lentinus lepideus Fr. i rörlig dynsand. — P. 182—187, 2 fig. — *Fungi; flor., oecol., monstr.*
—»— 8. — Calvatia gigantea (Pers.) Th. Fr. j:r, jätteröksvampen funnen i Finland. — P. 187—189, 1 fig. — *Fungi; flor., syst., synon.*
—»— 9. — En för Finland ny Peziza, P. acetabulum L. — P. 189—191, 1 fig. — *Fungi; flor., syst.*
(JÄRVI, OSMO, 1. — Onko keksitty uusi soluorganelli-lipokondrit?) — P. 191. — *Cyt.*
(BACKMAN, A. L., 1. — Najas marina i Finland i postglacial tid.) — P. 191. — *Plant.; pal.*
PALMGREN, PONTUS, 19. — [Skrattmåsens fridlysning.] — P. 191. — *Aves (Larus ridibundus); lut. nat.*
SEGERSTRÅLE, CURT, 15. — [Eriocheir sinensis anträffad utanför Emsalö i Borgå skärgård.] — P. 191. — *Crust.; faun.*
—»— 16. — [Sphaerotilus natans som skadegörare på sikrom.] — P. 191—192. — *Bact., pisc. (Coregonus lavaretus); path.*
MONTELL, JUSTUS, 17. — Erigeron eriocephalus Fl. Dan. funnen i Finland. — P. 192. — *Plant.; flor.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 21. — Carex diandra × paniculata (= C. germanica Richter) ja Carex canescens × paniculata (= C. silesiaca Figert) Suomessa. — P. 193—195, 1 fig. — *Plant.; flor., syst.*
AUER, A. V., 3. — Putkilokasvihavaintoja Nauvosta. — P. 195—200. — *Plant.; flor.*

HUSTICH, I., 20. — Något om perioder och växlingar i Lapplands växt- och djurvärld under senaste årtionden. — P. 200—209, 5 diagr. — *Plant., mamm., aves; oecol., biol.*
—»— 21. — Fjällflorans snabba utveckling. Några synpunkter på ett ekologiskt-fysiologiskt problem. — P. 209—215, 8 fig. — *Plant.; oecol., physiol.*
—»— 22. — Några växtgeografiska anteckningar under en juliresa 1940 i Utsjoki, norra Lappland. — P. 215—226, 3 fig. — *Plant.; flor., geogr., oecol., phaen.*
—»— 23. — Några allmänna anteckningar under en aprilresa till Utsjoki 1941. — P. 226—232, 2 fig. — *Plant.; oecol. — Mamm., aves; faun.*
ENGLUND, BENGT, 3. — Ny fyndort för Ranunculus ophioglossifolius Vill. på Gotland jämte några synpunkter på artens förekomst därstädes. Mit deutschem Referate. — P. 232—239. — *Plant.; flor. suecica, geogr., oecol.*
VÄLIKANGAS, ILMARI u. SIIVONEN, LAURI, 1. — Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1938. — P. 239—275, 1 mp. — *Aves; sign., migr.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 22. — [Cerastium Regelii.] — P. 277. — *Plant.; flor.*
HINTIKKA, T. J., 12. — Petaloidi omenankukka. Mit deutschem Referate. — P. 277—279, 1 fig. — *Plant. (Pyrus malus); terat.*
—»— 13. — Ruskotäplistä Thuya occidentalis'en puussa. Mit deutschem Referate. — P. 279—283, 2 fig. — *Planth.; path.*
BUCH, HANS, 19. — Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora Fenno-Scandias. — VII—X. — P. 283—295, 6 fig. — *Musci; flor., syst.*
PALMGREN, ALVAR, 65. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 18. 5. 1940—13. 5. 1941. — P. 296—332, 1 im. phot. — *Hist., biogr.*
STOCKMANN, STEN, 2. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1940. — P. 332—335. — *Oecon. soc.*
REUTER, ENZIO, 17. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1940—1941. — P. 335. — *Bibl.*
KALELA, OLAVI, 3. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu vv. 1939—1940 ja 1940—1941. — P. 336—338. — *Collect., faun.*
FREY, RICHARD, 35. — De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1940—1941. — P. 338—342. — *Collect. (ins.), faun.*
LINDBERG, HARALD, 67. — De botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1940—1941. — P. 342—344. — *Collect., flor.*

Vol. 18 [1943].

(HULDÉN, EMIL, 1. — Studier över asken.) — P. 1. — *Plant. (Fraxinus excelsior).*
BUCH, HANS, 20. — [Scapania Degenii från Kon·] — P. 1. — *Musci; flor.*
EKLUND, OLE, 63. — Boletus satanas Lenz., für Finnland neu. — P. 2. — *Fungi; flor.*
—»— 64. — Zur Pilzflora des Schärenarchipels SW-Finnlands. — P. 2—21. — *Fungi; flor., oecol.*
LINDBERG, HÅKAN, 16. — Hemipterfynd i provinserna Oa och Om år 1940. — P. 21—24. — *Hem.; faun.*
(KLINGSTEDT, F. W., 2. — Virusämnena och virussjukdomarna.) — P. 24. — *Varia.*
EKLUND, OLE, 65. — [Svampfynd i SW-Finlands skärgård.] — P. 24. — *Fungi; flor.*
FREY, RICHARD, 35. — [För Finland nya hymenomyceter.] — P. 25. — *Fungi; flor.*
SEGERSTRÅLE, CURT, 17. — [Hermafroditisk Coregonus lavaretus.] — P. 25. — *Pisc.; herm.*
—»— 18. — [Gadus morrhua från Om.] — P. 25. — *Pisc.; faun.*
EKLUND, OLE, 66. — [Hermafroditisk strömming från Ab Korpo, Lövskär.] — P. 25. — *Pisc. (Clupea harengus v. membras); herm.*
—»— 67. — Geranium dissectum L., für Ab neu. — P. 25—26. — *Plant.; flor.*
CEDERCREUTZ, CARL, 21. — Anteckningar över i medlet av oktober 1941 på Åland blommande fanerogamer. — P. 26—28. — *Plant.; phaen.*
HÄYRÉN, ERNST, 58. — Kulturlavarna i Klemetskog, Tusby socken, Nyland. — P. 28—29. — *Lich.; flor., oecol.*
LINKOLA, K., 21. — Vihdin vuorijalavat. — P. 30—45, 1 fig. — *Plant., musci, lich.; flor., oecol.*
—»— 22. — Poa compressa leviämässä kulttuuriseuralaisena. — P. 45—56, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., oecol.*
LINDBERG, HARALD, 68. — Märkliga växt- och skalbaggsfynd belysande Finlands utvecklingshistoria. — P. (24), 56—61. — *Plant., col.; geogr.*
(KROGERUS, ROLF, 26. — Markreaktionen som ekologisk faktor för insekterna.) — P. 61. — *Ins.; oecol.*

PALMGREN, ALVAR, 66. — [Forskningar i Fjärrkarelen och på Kola halvön.] — P. 61. — *Exc.*
(BERGMAN, GÖRAN, 1. — [Åskfront och småfågelsträck.].) — P. 61. — *Aves; migr.*
(FREY, RICHARD, 37. — [Resa till Kola halvön.].) — P. 62. — *Itin.*
HÄYRÉN, ERNST, 59. — Zonationsförhållandena vid Skålbäck och vid Helsenbäck i Klemetskog, Tusby socken, Nyland. — P. 62—65. — *Alg., musci, plant.; flor., oecol., phytosoc.*
—»— 60. — Antropokorer och apofyter i Suurkylä på Hogland sommaren 1939. — P. 65—67. — *Plant.; flor., geogr.*
MALMSTRÖM, NICKEN, 10. — Boletus luridus Schaeff. från Åland. — P. 68—70. — *Fungi; flor., oecol., syst.*
—»— 11. — Boletus pulverulentus Opat. och B. castaneus Bull., nya för Finland. — P. 70—73. — *Fungi; flor., oecol., syst.*
—»— 12. — Fynd av Boletus cyanescens Bull. och Gyrodon lividus Sacc. ex Bull. — P. 73—77. — *Fungi; flor., synon., syst.*
—»— 13. — Agaricider, för landet nya o.a. från södra Finland. — P. 77—83. — *Fungi; flor.*
ENGLUND, BENGT, 4. — Om förekomsten av hybriden mellan Carex distans L. och C. extensa Good. Mit deutschem Referate. — P. 83—88, 1 fig. — *Plant.; flor. suecica, geogr., oecol.*
(PALMGREN, PONTUS, 20. — Några tillväxt- och formbildningsproblem.) — P. 88. — *Morph.*
(SUOMALAINEN, PAAVO, 2. — Uusia tutkimuksia kalojen hajuaistista.) — P. 89. — *Pisc.; physiol.*
HÄYRÉN, ERNST, 61. — Über das Zusammenballen der Schwärmer des zweiten Schwärmstadiums von Saprolegnia dioica. — P. 89—93, 2 fig. — *Fungi; biol.*
MONTELL, JUSTUS, 18. — Agropyron caninum (L.) P. B. × mutabile Drobov, ny för Finlands flora. — P. 93. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 19. — Intressanta Sparganiumfynd i Muonio, Lkem sommaren 1941. — P. 93—94. — *Plant.; flor.*
—»— 20. — Carex lasiocarpa Ehrh. × rotundata Wg. (C. enontekiensis mihi), en ny hybrid. — P. 94—95. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 21. — Agrostis borealis Hn × tenuis Sibth. (A. lapponica mihi) hybrida nova. — P. 95. — *Plant.; flor., syst.*
ERKAMO, V., 3. — Itämerenvihvilän (Juncus balticus Willd.) esiintymisestä Helsingissä. Mit deutschem Referate. — P. 96—98. — *Plant.; flor.*
—»—4. — Geranium bohemicum L. in Südostfinnland. — P. 98—101, 1 mp. — *Plant.; flor.*
—»— 5. — Alisma gramineum Gmel. ssp. Wahlenbergii Holmb. auf der Karelischen Landenge. — P. 102—104. — *Plant.; flor.*
FEDERLEY, HARRY, 9. — En semisteril population av en fjärilart. — P. 104. — *Lep. (Pygaera pigra); biol., cyt.*
HINTIKKA, T. J., 14. — [Kaksi kasvitieteellistä käsikirjoitusta.] — P. 104. — *Plant.; hist.*
—»— 15. — Muistiinpanokokoelma P. Kalmin kasvitieteellisistä luennoista 1753—1754. — P. 105—108. — *Plant.; hist.*
KLINGSTEDT, F. W., 3. — [Fluorescensmikroskopet.] — P. 108. — *Varia.*
HÄYRÉN, ERNST, 62. — [Demonstration: Pertusariaceae.].) — P. 108—109. — *Lich.*
KLINGSTEDT, HOLGER, 20. — [Negativ heterokromati hos kromosomerna av Mecostethus grossus.] — P. 109. — *Orth.; cyt.*
REUTER, ENZIO, 18. — Albinosform av Anas boschas. — P. 109. — *Aves; var. color.*
ERICHSEN, C. F. E., 2. — Mitteilungen über einige von Dr. E. Häyrén grösstenteils in Finnland gesammelte Flechten. — P. 109—111. — *Lich.; flor., syst.*
MONTELL, JUSTUS, 22. — Carex lapponica Lge och dess hybrider med C. brunnescens (Pers.) Poir. och C. canescens L. samt deras utbredning i Finland. — P. 112—113. — *Plant.; syst., flor.*
—»— 23. — Euphrasia borealis (Townsend) Wettst. funnen på Kolahalvön. — P. 113. — *Plant.; flor.*
KOTILAINEN, MAUNO J., 23. — Rikasta leväkasvillisuutta huhtikuussa. — P. 114, 1 fig. — *Alg.; oecol.*
HIITONEN, ILMARI, 20. — Pihlaja »epifyyttinä». — P. 114—115. — *Plant. (Sorbus aucuparia); oecol.*
FÄRDIG, BERTIL A., 5. — Botaniska anteckningar från Nyland: Kyrkslätt, Vitträskholmen. — P. 115—125, 1 mp. — *Plant.; flor., oecol., top.*
NORDMAN, ADOLF FR., 7. — Blaniulus guttatus Bosc., en för Finlands fauna ny myriopod.-art. — P. 126—127. — *Myr.; faun.*

NORDMAN, ADOLF, FR., 8. — Till kännedomen om fjärilfaunan i ett lundområde i det centrala Skärgårdshavet i SW-Finland (Föglö Bänö). — P. 127—184, 5 mp. — *Lep., (col., hym., hem., orth., odon., myr.); faun., oecol., geogr. cop., anim. obnox.*
PALMGREN, ALVAR, 67. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1941—13. 5. 1942. — P. 185—262, 8 im. phot. — *Hist., biogr.*
STOCKMANN, STEN, 3. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1941. — P. 262—264. — *Oecon. soc.*
REUTER, ENZIO, 19. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1941—1942. — P. 265. — *Bibl.*
FREY, RICHARD, 38. — De inhemska entomologiska samlingrnas tillväxt under verksamhetsåret 1941—1942. — P. 265—269. — *Collect. (ins.), faun.*
MARKLUND, GUNNAR, 12. — De inhemska botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1941—1942. — P. 269—271. — *Collect., flor.*

Vol. 19 (1944).

(CAJANDER, A. K., 2. — J. P. Norrlinin nuoruusvuodet.) — P. 1. — *Biogr.*
HUSTICH, I., 24. — [Växtgeografisk skildring av Kuuttilahtiområdet.] — P. 2. — *Plant.; flor., geogr.*
LEMBERG, BERTEL, 13. — Orchis incarnatus funnen i Östra Nyland. — P. 3—4. — *Plant.; flor.*
SEGERSTRÅLE, SVEN G., 5. — Yngel av näbbgäddan (Belone acus Risso) anträffat vid vår kust. — P. 4. — *Pisc.; faun., juv.*
—»— 6. — Ein Beitrag zur Kenntnis der östlichen Verbreitung der Miesmuschel (Mytilus edulis L.) an der Südküste Finnlands. — P. 5—7. — *Moll.; faun., geogr., oecol.*
(VARIS, H., 4. — Hiilihapon oton määrääminen luonnossa.) — P. 7. — *Plant.; physiol.*
MALMSTRÖM, NICKEN, 14. — [Tolv för landet nya i N: Tusby, Klemetskog funna hattsvampar.] — P. 7. — *Fungi; flor.*
FREY, RICHARD, 39. — [Kompletterande uppgifter om svampar.] — P. 8. — *Fungi; flor.*
—»— 40. — Tvenne vid lärkträdet bundna hattsvamparter. — P. 8—9. — *Fungi; flor., oecol., syst.*
—»— 41. — Några anteckningar om basidsvampfloran på Åland. — P. 9—16. — *Fungi; flor.*
NYBERG, W., 3. — Fynd av några mera sällsynta svamparter. — P. 16—18. — *Fungi; flor.*
HÄYRÉN, ERNST, 63. — [Rhizina inflata vid Ekenäs.] — P. 18. — *Fungi; flor.*
KROGERUS, ROLF, 27. — Potamogeton crispus L. funnen i Lojo sjö. — P. 18—20. — *Plant.; flor. — Ins.; faun., oecol.*
LINDBERG, HARALD, 69. — [Reliktförekomster i Lojo.] — P. 20. — *Plant.; flor., geogr.*
SEGERSTRÅLE, SVEN G., 7. — Weitere Beobachtungen über das Vorkommen der Amphipoden Leptocheirus pilosus Zaddach und Corophium lacustre Vanhöffen an der Südküste Finnlands. — P. 20—22. — *Crust.; faun.*
NORDMAN, ADOLF FR., 9. — Ett massuppträdande av fågelacariden Dermanyssus gallinae Redi, antastande människor i Helsingfors 1942. — P. 22—24. — *Acar.; cop., oecol.*
—»— 10. — En säregen form av ectoparasitism hos chalcididen Euplectrus bicolor Swederus 1795. — P. 24—25. — *Hym.; faun., oecol., paras.*
—»— 11. — Rovbaggarna Amara aulica Panz. och A. plebeja Gyll. som blombesökare. — P. 25—28. — *Col., dipt., thys.; oecol.*
FAGERSTRÖM, LARS, 17. — Nya fynd av Epilobium adenocaulon Hausskn. och E. rubescens Rydb. vid den sydfinska kusten. — P. 28—36. — *Plant.; flor., geogr., oecol., syst.*
—»— 18. — Floristiskt från Hangöområdet. — P. 36—42. — *Plant.; flor., geogr.*
(SEGERSTRÅLE, CURT, 19. — På strövtåg i fiskodlingens tecken.) — P. 42. — *Piscic.*
REUTER, ENZIO, 20. — [Tvenne sällsynta hattsvampar.] — P. 42. — *Fungi; flor.*
LINDBERG, HARALD, 70. — Myriophyllum spicatum från Jorois, Kotkatjärvi sjö. — P. 42. — *Plant.; flor.*
MARKLUND, GUNNAR, 13. — Hordeum violaceum och Potentilla supina v. cicutariifolia från Hangö. — P. 42. — *Plant.; flor.*
KARLING, TOR G., 10. — Några fynd av adventivväxter i Hangö hamn. — P. 42—43. — *Plant.; flor.*
EKLUND, OLE, 68. — Anmärkningsvärd Epilobium-lokal. — P. 43—44. — *Plant.; flor.*
AUER, A. V., 4. — Kasvistollisia havaintoja Pohjois-Suomesta. III. — P. 44—57. — *Plant.; flor.*
—»— 5. — Putkilokasvihavaintoja. — P. 57—77. — *Plant.; flor.*

(Palmgren, Pontus, 21. — Aktivitet och vila hos flyttfåglarna.) — P. 77. — *Aves; migr.*
Segerstråle, Curt, 20. — Biologiska notiser om några fiskarter. — P. 78—80. — *Pisc., cycl.; faun., oecol.*
Montell, Justus, 24. — Nya fynd av Carex macloviana D'Urv. — P. 80—81. — *Plant.; flor.*
—»— 25. — Några för floran nya växtformer från olika delar av landet. — P. 81—82. — *Plant.; flor., syst.*
Häyrén, Ernst, 64. — Några alger från Klemetskog, Tusby socken, Nyland. — P. 82—84. — *Alg.; flor.*
Cedercreutz, Carl, 22. — Einige für Finnland neue Süsswasseralgen. — P. 84—87, 1 fig. — *Alg.; flor.*
(Söyrinki, Niilo, 3. — Oulankajoen ja Pääjärven kasvillisuudesta.) — P. 87. — *Veget.*
Palmgren, Pontus, 22. — [Exkursioner i Fjärrkarelen 1943.] — P. 87. — *Exc.*
Granit, A. W., 1. — Zoologiska iakttagelser i Korpo södra skärgård. — P. 87—88. — *Pisc., crust.; faun.*
Cedercreutz, Carl, 23. — Hydrurus foetidus Kirchner i Finland. — P. 88—89. — *Alg.; flor.*
Palmgren, Alvar, 68. — Tvenne nya Carex-arter. — P. 89—90. — *Plant.; syst., flor.*
Herlin, Nils, 1. — Ruderaten von Ks, Salla im Sommer 1941. — P. 90—91. — *Plant.; flor.*
—»— 2. — Beitrag zur Kenntnis der Flora in der Provinz Karelia keretina in Ostkarelien. — P. 91—103, 1 mp. — *Plant.; flor.*
Erkamo, V., 6. — Lisätietoja Jyväskylän kasvistosta. Mit deutschem Referate. — P. 103—113. — *Plant.; flor.*
Montell, Justus, 26. — Euphrasia frigida Pugsl. var. vel f. purpurea nova forma. — P. 114—115. — *Plant.; syst., flor.*
—»— 27. — Euphrasia frigida Pugsl. var. palustris (E. Jörg.) Nordh. ny för Finlands flora. — P. 115. — *Plant.; flor.*
—»— 28. — Hybriden Calamagrostis lapponica (Wg.) Ha. × neglecta (Ehrh.) M. & Seh. funnen i Lapponia ponojensis. — P. 115—117. — *Plant.; syst., flor.*
Kotilainen, Mauno J., 24. — Fennoskandian kasvimaantieteellisestä kaakkoisrajasta ja postarkeisten kerrostumien kasvimaantieteellisestä merkityksestä Suomessa. — P. (113), 117—136, 6 fig., 1 mp. — *Plant.; flor., oecol., geogr.*
(Koehler, O., 1. — Vom Heimfinden der Tiere.) — P. 137. — *Biol.*
Malmström, Nicken, 15. — [Fynd av Gyromitra curtipes och Peziza fulgens.] — P. 137. — *Fungi; flor.*
Fagerström, Lars, 19. — Fyra för Öst-Karelen nya adventivväxter. — P. 137—143. — *Plant.; flor., geogr.*
Häyrén, Ernst, 65. — Floristiska iakttagelser i Tavastland. — P. 144—148. — *Plant.; flor.*
Olsoni, Börje, 17. — Växterna på de bombade tomterna i Borgå 1942. — P. 148—151. — *Plant.; flor., oecol.*
Kalela, Olavi, 4. — Suomen luonnonhistoriallisesta aluejaosta. — P. 151—165, 1 mp. — *Provinciae biogeographicae.*
Hustich, I., 25. — Skogsgränsproblemet. — P. (137), 165—180, 3 fig. — *Phytogeogr., forest.*
Kotilainen, Mauno J., 25. — Promemoria Fennoskandian kasvimaantieteellisestä kaakkoisrajasta ja samalla Aunuksen Karjalan (Kol) eteläräjasta Aunuksen kannaksella. — P. 180—192, 2 mp. — *Phytogeogr.*
Hustich, I. and Pettersson, Bror, 1. — Notes on Vascular Plants of the East Coast of Newfoundland-Labrador. I. Preliminary List of Plants. — P. 192—200. — *Plant.; flor. (Newfoundland-Labrador).*
Hiitonen, Ilmari, 21. — Poa glauca Vahl Kuhmoisissa (Ta). Mit deutschem Referate. — P. 200—206, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr.*
Nordman, Adolf Fr., 12. — En iakttagelse beträffande Tettigonia viridissima L. som skadedjur på havre. — P. 206—210. — *Orth.; faun., geogr., oecol., anim. obnox.*
Eklund, Ole, 69. — Weitere Beiträge zur Pilzflora des Schärenarchipels SW-Finnlands. — P. 212—216. — *Fungi; flor.*
Cedercreutz, Carl, 24. — Fresh-water Algae from Labrador. — P. 216—222, 1 fig. — *Alg.; flor. (Labrador).*
Palmgren, Alvar, 69. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1942—13. 5. 1943. — P. 223—295, 9 im. phot. — *Hist., biogr.*
Stockmann, Sten, 4. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1942. — P. 295—297. — *Oecon. soc.*

REUTER, ENZIO, 21. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1942—1943. — P. 298. — *Bibl.*
KALELA, OLAVI, 5. — Yliopiston Eläintieteellisen museon yleisten kotimaisten kokoelmien kasvu vv. 1941—1942 ja 1942—1943. — P. 299—300. — *Collect., faun.*
FREY, RICHARD, 42. — De entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1942—1943. — P. 300—304. — *Collect. (ins.), faun.*
MARKLUND, GUNNAR, 14. — De inhemska botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1942—1943. — P. 304—306. — *Collect., flor.*

Vol. 20 (1945).

(JÄRVI, T. H., 8. — Muikkukantojen tilannevaihtelut.) — P. 1. — *Pisc. (Coregonus); oecol.*
(SEGERSTRÅLE, CURT, 21. — [Fiskeribiologisk resa i norra Österbotten och västra Lappland.].) — P. 2. — *Pisc.; biol.*
PLATONOFF, STEPHAN, 2. — [Lacerta agilis L. från Aunusnäset.] — P. 2. — *Rept.; faun.*
SEGERSTRÅLE, CURT, 22. — [Fynd av storströmming, som levat av rov.] — P. 2. — *Pisc. (Clupea harengus); oecol.*
EKLUND, OLE, 70. — Neue Lokalität für Potentilla procumbens Sibth. — P. 2—4. — *Plant.; flor.*
—»— 71. — Potentilla erecta × procumbens, für Finnland neu. — P. 4. — *Plant.; flor.*
HÄYRÉN, ERNST, 66. — Spridda anteckningar om alger och vattenvegetation i Finland. — P. 4—10. — *Plant., alg.; flor., oecol.*
(SKOTTBERG, C., 2. — Min expedition till Hawaiöarna 1938.) — P. 10. — *Itin.*
(COLLANDER, RUNAR, 5. — Om användningen av radioaktiva indikatorer inom fysiologin.) — P. 10. — *Physiol.*
(HAARTMAN, LARS VON, 1. — [Svart och vita flugsnapparens (Muscicapa h. hypoleuca) orientering till boingången i en holk med flera öppningar.].) — P. 10. — *Aves; oecol.*
CEDERCREUTZ, CARL, 25. — Fenologiska anteckningar hösten 1943 på Åland. — P. 11—12. — *Plant., fungi; phaen.*
OLSONI, BÖRJE, 18. — Höstblomning i Borgå 1943. — P. 12. — *Plant.; phaen.*
—»— 19. — Anteckningar om grod- och kräldjuren i Borgå och Kimito-Hitis. — P. 12—13. — *Rept., amph.; oecol.*
MONTELL, JUSTUS, 29. — Calamagrostis epigejos (L.) Roth. × lanceolasta Roth. (C. Neumaniana Torges), ny för Finlands flora. — P. 13—16. — *Plant.; flor., syst.*
—»— 30. — Eriophorum medium Ands. (E. intercedens Lbg. fil. (f. candidum) Norm.) Blomgr. funnen i Finland. — P. 16. — *Plant.; flor.*
—»— 31. — Rhinanthus (Alectorolophus) minor (L.) Ehrh. var. lapponicus, nova var. — P. 16—17. — *Plant.; syst., flor.*
SPARRE, BENKT, 1. — Anteckningar om floran på halvön Arsenavalok i Fjärrkarelen. — P. 17—23, 1 mp. — *Plant.; flor.*
HUSTICH, I. and PETTERSSON, BROR, 2. — Notes on Vascular plants of the East Cost of Newfoundland-Labrador. II. — P. 24—46, 1 mp. — *Plant., musci, lich.; flor., geogr., oecol., phytosoc.*
HUSTICH, I., 26. — Pflanzengeographische Übersicht über das Kuujärvigebiet am mittleren Swir in Fern-Karelien. — P. 46—77, 3. fig. — *Plant., musci; flor., top., geogr., phytosoc., oecol., phaen.*
(TOIVONEN, SULO, 1. — Selkärankaissilmän linssin syntyongelma.) — P. 78. — *Vert.; embr.*
JÄRVI, T. H., 9. — [Anguilla vulgaris juv.] — P. 78. — *Pisc.; juv.*
—»— 10. — Der »vierhörnige» Seeskorpion (Cottus quadricornis relictus Lillj.) in finnischen Binnenseen. — P. 79—80. — *Pisc.; faun., geogr.*
HERLIN, NILS, 3. — Dianthus superbus L. auf der Karelischen Landenge gefunden. — P. 80. — *Plant.; flor.*
—»— 4. — Ein neuer Fundplatz für Alisma gramineum Gmel. ssp. Wahlenbergii Holmb. — P. 81—82. — *Plant.; flor.*
MONTELL, JUSTUS, 32. — Bidrag till kännedomen om adventiv- och ogräsfloran i Muonio socken, Lapponia kemensis. — P. 82—91. — *Plant.; flor.*
—»— 33. — Den sällsynta hybriden Calamagrostis epigejos (L.) Roth. × purpurea Trin. funnen i Finland. — P. 91—94. — *Plant., flor., syst.*
—»— 34. — Achillea millefolium L. var. lapponica, nova var. och f. Neumani, nova forma. — P. 94—95. — *Plant.; syst., flor.*
HUSTICH, I., 27. — Über die Nordgrenze des Ahorns (Acer platanoides L.) in Fern-Karelien. — P. 95—104, 1 mp. — *Plant.; flor., geogr., phaen.*

HUSTICH, I., 28. — Ergänzungen zur Flora des Gebietes Kuuttilahti am Swir (Fern-Karelien). — P. 104—107. — *Plant.; flor., phytosoc.*
FAGERSTRÖM, LARS, 20. — Växtgeografiska anteckningar från en färd i Fjärr-Karelen sensommaren 1942. — P. 107—142, 1 mp. — *Plant., musci; flor., top., geogr., phytosoc.*
—»— 21. — En förteckning över lavar, insamlade i Fjärr-Karelen sensommaren 1942. — P. 142—145. — *Lich.; flor.*
—»— 22. — Epilobium adenocaulon Hausskn. och E. rubescens Rydb. funna på nya lokaler vid den sydfinska kusten. — P. 145—147. — *Plant.; flor.*
HÄYRÉN, ERNST, 67. — Einige Algen im Meere bei der karelischen Landenge (Isthmus karelicus). — P. 147. — *Alg.; flor.*
—»— 68. — Alger från Tusby 1943. — P. 148. — *Alg.; flor.*
—»— 69. — Tvenne anteckningar om saprolegniaceer i Helsingforstrakten. — P. 148—149. — *Fungi; flor., oecol.*
(PALMGREN, PONTUS, 23. — Om lycosidernas fortplantningsbiologi. — P. 149.) — *Aran.; biol.*
HELLÉN, WOLTER, 30. — Berättelse över en till Öst-Karelen företagen entomologisk studieresa sommaren 1943. — P. 149—150. — *Exc. (Ent.).*
(JÄRVI, T. H., 11. — Suomessa esiintyvistä siikamuodoista.) — P. 150. — *Pisc. (Coregonus); faun.*
HERLIN, NILS, 5. — Algologische Studien im Meerbusen von Wiborg. — P. 151—153. — *Alg.; flor., oecol.*
NYBERG, WOLMAR, 4. — Bovistella Karsteni Nyberg n. sp. — P. 153—155. — *Fungi; syst., flor.*
FAGERSTRÖM, LARS, 23. — Ett bidrag till kännedomen om lavfloran i Terijoki socken på Karelska näset. — P. 155—170. — *Lich., plant.; flor., oecol.*
PALMGREN, ALVAR, 70. — Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1943—13. 5. 1944. — P. 173—244, 7 im. phot. — *Hist., biogr.*
STOCKMANN, STEN, 5. — Societas' pro Fauna et Flora Fennica ekonomiska ställning under år 1943. — P. 244—246. — *Oecon. soc.*
REUTER, ENZIO, 22. — Bibliotekets tillväxt under verksamhetsåret 1943—1944. — P. 247—248. — *Bibl.*
FREY, RICHARD, 43. — De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1943—1944. — P. 248—252. — *Collect. (ins.), faun.*
MARKLUND, GUNNAR, 15. — De inhemska botaniska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1943—1944. — P. 252—253. — *Collect., flor.*

B. Alphabeticus.

Aario, L., 1, **7** : 267.
Ahlner, S., 1, **12** : 52.
Ahlqvist, H., 1, **10** : 212; 2, **10** : 216; 3, **17** : 23.
Alfthan, K., 1, **4** : 31; 2, **5** : 79; 3, **9** : 28.
Auer, A. V., 1, **12** : 131; 2, **14** : 110; 3, **17** : 195; 4 : **19** : 44; 5, **19** : 57.
Aulamo, O., 1, **9** : 161.
Auterinen, A., 1, **4** : 31.
Backlund, H. O., 1, **9** : 191; 2, **10** : 42; 3, **14** : 27.
Backman, A. L., 1, **17** : 191.
Berger, Elna, 1, **3** : 17, 131.
Bergman, G., 1, **18** : 61.
Björkstén, J., 1, **6** : 4.
—»— & Himberg, I., 1, **6** : 114.
Boström, K. J., 1, **15** : 50.
Brander, G., 1, **9** : 173.
Branders, K., 1, **5** : 126.
Brenner, M., 1, **1** : 9, 153; 2, **1** : 10, 153.
Brenner, W., 1, **6** : 94; 2, **8** : 19.
Buch, H., 1, **1** : 89; 2, **3** : 44, 136; 3, **5** : 78; 4, **6** : 167; 5, **8** : 14; 6, **8** : 282; 7, **8** : 298; 8, **8**, 302; 9, **9** : 142; 10, **10** : 382; 11, **11** : 195; 12, **11** : 197; 13, **11** : 214; 14, **12** : 75; 15, **12** : 148; 16, **14** : 127; 17, **15** : 2; 18, **15** : 234; 19, **17** : 283; 20, **18** : 1.
—»— & Hustich, I., 1, **11** : 231.
—»— & Tuomikoski, R., 1, **11** : 227.
Buch, K., 1, **10** : 369; 2, **11** : 48; 3, **15** : 49.
Bäck, R., 1, **3** : 18, 132; 2, **10** : 16.
Bärlund, H., 1, **4** : 171.
Bärlund, Ulla, 1, **15** : 216.
Cajander, A., 1, **5** : 80. — Vide Kalela, A.
Cajander, A. K., 1, **7** : 58; 2, **19** : 1.
Cajander, O., 1, **8** : 317. — Vide Kalela, O.
Carpelan, J., 1, **1** : 34, 158; 2, **4** : 29; 3, **4** : 153.
Cedercreutz, C., 1, **1** : 44, 158; 2, **1** : 44, 153; 3, **4** : 49; 4, **4** : 172; 5, **5** : 140; 6, **6** : 1; 7, **6** : 79; 8, **6** : 131; 9, **7** : 236; 10, **8** : 225; 11, **8** : 241; 12, **9** : 141; 13, **9** : 141; 14, **11** : 122; 15, **11** : 191; 16, **12** : 46; 17, **14** : 25; 18, **14** : 108; 19, **15** : 177; 20, **17** : 105; 21, **18** : 26; 22, **19** : 84; 23, **19** : 88; 24, **19** : 216; 25, **20** : 11.
Clayhills, T. H., 1, **5** : 91.
Cleve-Euler, Astrid, 1, **10** : 289.
Collander, R., 1, **6** : 6; 2, **9** : 126; 3, **10** : 381; 4, **12** : 75; 5, **20** : 10.
Dahl, A., 1, **7** : 236.
Ehnholm, G., 1, **13** : 21.
Eichwald, K., 1, **12** : 159.
Eklund, O., 1, **1** : 13, 153, 155, 156; 2, **1** : 16; 3, **1** : 20, 157; 4, **1** : 43; 5, **2** : 13; 6, **3** : 20, 131; 7, **3** : 32; 8, **3** : 43; 9, **3** : 45; 10, **4** : 4; 11, **4** : 5; 12, **4** : 7; 13, **4** : 10; 14, **4** : 11; 15, **4** : 14; 16, **4** : 17; 17, **4** : 20; 18, **4** : 22; 19, **4** : 24; 20, **4** : 92; 21, **4** : 177; 22, **4** : 192; 23, **5** : 6; 24, **5** : 11; 25, **5** : 28; 26, **5** : 64; 27, **6** : 4; 28, **6** : 87; 29, **6** : 107; 30, **6** : 180; 31, **7** : 30; 32, **7** : 31; 33, **7** : 36; 34, **7** : 38; 35, **7** : 41; 36, **8** : 32; 37, **9** : 20; 38, **9** : 92; 39, **9** : 142; 40, **10** : 31; 41, **10** : 35; 42, **10** : 41; 43, **10** : 137; 44, **10** : 271; 45, **10** : 272; 46, **10** : 384; 47, **11** : 4; 48, **11** : 8; 49, **11** : 9; 50, **11** : 97; 51, **12** : 11; 52, **12** : 24; 53, **12** : 25; 54, **12** : 31; 55, **12** : 36; 56, **12** : 107; 57, **12** : 130; 58, **13** : 4; 59, **13** : 6; 60, **13** : 49; 61, **17** : 82; 62, **17** : 87; 63, **18** : 2; 64, **18** : 2; 65, **18** : 24; 66, **18** : 25; 67, **18** : 25; 68, **19** : 43; 69, **19** : 212; 70, **20** : 2; 71, **20** : 4.
—»— & Forsius, R., 1, **10** : 23.
Ekman, Anna-Greta, 1, **7** : 28.
Ekman, G., 1, **6** : 1; 2, **11** : 214.
Ekman, T. H. J., 1, **7** : 3; 2, **7** : 4.
Elfving, F., 1, **3** : 19; 2, **5** : 80; 3, **8** : 100; 4, **10** : 435; 5, **11** : 174; 6, **14** : 17; 7, **19** : 256, 293; **8** : **19** : 257, 294.
Englund, B., 1, **6** : 103; 2, **11** : 192; 3, **17** : 232; 4, **18** : 83.
Erichsen, C. F. E., 1, **12** : 4; 2, **18** : 109.
Erkamo, V., 1, **13** : 95; 2, **13** : 98; 3, **18** : 96; 4, **18** : 98; 5, **18** : 102; 6, **19** : 103.
Fagerström, L., 1, **13** : 33; 2, **13** : 87; 3, **15** : 4; 4, **15** : 5; 5, **15** : 7; 6, **15** : 23; 7, **15** : 26; 8, **15** : 26; 9, **15** : 94; 10, **16** : 82; 11, **17** : 50; 12, **17** : 66; 13, **17** : 68; 14, **17** : 70; 15, **17** : 72; 16, **17** : 121; 17, **19** : 28; 18, **19** : 36; 19, **19** : 137; 20, **20** : 107; 21, **20** : 142; 22, **20** : 145; 23, **20** : 155.

Federlev, H., 1, **5** : 95; 2, **6** : 80; 3, **9** : 25; 4, **9** : 126; 5, **13** : 52; 6, **15** : 175; 7, **16** : 1; 8, **17** : 149; 9, **18** : 104.

Forsius, I., 1, **1** : 6, 150; 2, **1** : 70, 153; 3, **1** : 108, 148; 4, **2** : 30, 112; 5, **2** : 44, 112; 6, **4** : 42; 7, **4** : 43.

Forsius, R., 1, **1** : 12, 149, 150; 2, **1** : 34, 155; 3, **1** : 34, 149, 150, 151; 4, **2** : 4, 114; 5, **4** : 3; 6, **4** : 32; 7, **4** : 170; 8, **5** : 128; 9, **6** : 148; 10, **8** : 188; 11, **8** : 190; 12, **8** : 191; 13, **8** : 256; 14, **9** : 26; 15, **9** : 28; 16, **10** : 13; 17, **10** : 388; 18, **11** : 14; 19, **11** : 51.

—»— Vide Eklund, O. & Forsius, R., 1.

Forsslund, K. H., 1, **10** : 378.

Fortelius, O., 1, **12** : 3.

Frey, R., 1, **1** : 38, 150; 2, **1** : 61, 151; 3, **1** : 95, 150; 4, **1** : 144; 5, **2** : 12, 114; 6, **2** : 37, 114; 7, **2** : 58; 8, **2** : 103; 9, **3** : 44; 10, **3** : 123; 11, **4** : 286; 12, **5** : 111, 13, **5** : 208; 14, **6** : 6; 15, **6** : 81; 16, **6** : 151; 17, **6** : 227; 18, **7** : 172; 19, **7** : 235; 20, **7** : 318; 21, **8** : 196; 22, **8** : 373; 23, **9** : 29; 24, **9** : 128; 25, **9** : 235; 26, **10** : 471; 27, **11** : 188; 28, **11** : 266; 29, **12** : 249; 30, **13** : 167; 31, **14** : 167; 32, **15** : 90; 33, **15** : 270; 34, **16** : 150; 35, **17** : 338; 36, **18** : 25; 37, **18** : 62; 38, **18** : 265; 39, **19** : 8; 40, **19** : 8; 41, **19** : 9; 42, **19** : 300; 43, **20** : 248.

Friedmann, H., 1, **2** : 58.

Färdig, B. A., 1, **8** : 97; 2, **8** : 194; 3, **8** : 195; 4, **10** : 377; 5, **18** : 115.

Gadolin, A. W., 1, **2** : 61, 115, 116; 2, **3** : 4, 135, 136; 3, **4** : 85; 4, **4** : 90.

Galenieks, P., 1, **8** : 228.

Granit, A. W., 1, **19** : 87.

Grönblad, R., 1, **10** : 256; 2, **13** : 130.

Gröndahl, O. A., 1, **9** : 67.

Gunnarsson, J. G., 1, **10** : 371.

Gyelnik, V., 1, **7** : 143.

Haartman, L. von, 1, **20** : 10.

Halme, E., 1, **15** : 49.

Hammermann, A., 1, **9** : 25.

Hartmann, M., 1, **8** : 256.

Heimbeck, B., 1, **10** : 98.

Hellén, W., 1, **1** : 6, 152; 2, **1** : 13, 149; 3, **1** : 34, 149; 4, **1** : 68, 151, 152; 5, **2** : 34, 114; 6, **2** : 58, 113; 7, **3** : 5, 133; 8, **4** : 31; 9, **4** : 37; 10, **4** : 108; 11, **4** : 176; 12, **5** : 76; 13, **5** : 95; 14, **6** : 14; 15, **7** : 5; 16, **7** : 166; 17, **9** : 17; 18, **9** : 28; 19, **9** : 127; 20, **9** : 160; 21, **9** : 183; 22, **9** : 184; 23, **10** : 76; 24, **10** : 341; 25, **11** : 3; 26, **11** : 227; 27, **13** : 52; 28, **14** : 4; 29, **16** : 87; 30, **20** : 149.

Herlin, N., 1, **19** : 90; 2, **19** : 91; 3, **20** : 80; 4, **20** : 81; 5, **20** : 151.

Herpman, G., 1, **5** : 110.

Hidén, I., 1, **1** : 90, 154, 156; 2, **1** : 91, 154, 155, 156; 3, **3** : 39, 135; 4, **5** : 97; 5, **7** : 139. — Vide Hiitonen, I.

Hiitonen (vide Hidén), I., 6, **8** : 199; 7, **8** : 318; 8, **8** : 320; 9, **10** : 2; 10, **10** : 42; 11, **10** : 59; 12, **11** : 115; 13, **12** : 60; 14, **12** : 168; 15, **13** : 109; 16, **14** : 131; 17, **15** : 52; 18, **15** : 56; 19, **15** : 82; 20, **18** : 114; 21, **19** : 200.

Hildén, I., 1, **5** : 73; 2, **6** : 4; 3, **8** : 193.

Himberg, I. — Vide Björkstén, J. & Himberg, I., 1.

Hintikka, T. J., 1, **1** : 42, 158; 2, **10** : 2; 3, **10** : 329; 4, **11** : 174; 5, **13** : 110; 6, **13** : 112; 7, **14** : 135; 8, **14** : 137; 9, **15** : 67; 10, **16** : 77; 11, **16** : 78; 12, **17** : 277; 13, **17** : 279; 14, **18** : 104; 15, **18** : 105.

Holm, K., 1, **1** : 107, 156.

Hortling, I., 1, **2** : 39; 2, **3** : 44.

Hryniewiecki, B., 1, **12** : 154; 2, **12** : 159.

Huldén, E., 1, **18** : 1.

Hustich, I., 1, **10** : 97; 2, **10** : 98; 3, **10** : 245; 4, **11** : 154; 5, **11** : 162; 6, **11** : 166; 7, **11** : 170; 8, **11** : 214; 9, **12** : 120; 10, **13** : 101; 11, **14** : 37; 12, **14** : 123; 13, **14** : 126; 14, **15** : 79; 15, **16** : 16; 16, **16** : 23; 17, **16** : 28; 18, **16** : 87; 19, **17** : 73; 20, **17** : 200; 21, **17** : 209; 22, **17** : 215; 23, **17** : 226; 24, **19** : 2; 25, **19** : 165; 26, **20** : 46; 27, **20** : 95; 28, **20** : 104.

—»— & Pettersson, B., 1, **19** : 192; 2, **20** : 24.

—»— Vide Buch, H. & Hustich, I., 1.

—»— Vide Åberg, G. & Hustich, I., 1.

Hytönen, O. — Vide Välikangas, I. & Hytönen, O., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Hällström, E. af, 1, **13** : 93.

Häyrén, E., 1, **2** : 4; 2, **2** : 30; 3, **2** : 58, 116; 4, **2** : 110; 5, **3** : 7; 6, **4** : 48; 7, **4** : 50; 8, **4** : 50; 9, **4** : 99; 10, **4** : 182; 11, **4** : 184; 12, **4** : 185; 13, **5** : 4; 14, **5** : 80; 15, **5** : 97; 16, **5** : 113; 17, **5** : 128; 18, **5** : 132; 19, **5** : 134; 20, **5** : 140; 21, **6** : 83; 22, **6** : 87; 23, **6** : 121; 24, **6** : 122; 25, **6** : 174; 26, **6** : 180; 27, **7** : 27; 28, **7** : 30; 29, **7** : 53; 30, **7** : 174; 31, **7** : 235; 32, **8** : 199; 33, **9** : 172; 34, **10** : 23; 35, **10** : 288; 36, **11** : 47; 37, **12** : 150; 38, **12** : 180; 39, **12** : 185; 40, **12** : 189; 41, **13** : 4; 42, **13** : 52; 43, **13** : 101; 44, **14** : 125; 45, **14** : 128; 46, **15** : 23; 47, **15** : 176; 48, **15** : 186; 49, **15** : 189; 50, **16** : 2; 51, **17** : 6; 52, **17** : 25; 53, **17** : 25; 54, **17** : 27; 55, **17** : 75; 56, **17** : 76; 57, **17** : 180; 58, **18** : 28; 59, **18** : 62; 60, **18** : 65; 61, **18** : 89; 62, **18** : 108; 63, **19** : 18; 64, **19** : 82; 65, **19** : 144; 66, **20** : 4; 67, **20** : 147; 68, **20** : 148; 69, **20** : 148.

Idman, G., 1, **4** : 276; 2, **5** : 197; 3, **6** : 221; 4, **7** : 4; 5, **7** : 312; 6, **8** : 367; 7, **9** : 229; 8, **10** : 465; 9, **11** : 260; 10, **12** : 243; 11, **13** : 160; 12, **14** : 160; 13, **15** : 264.

Idman, G. R., 1, **1** : 136; 2, **2** : 95; 3, **3** : 21, 134; 4, **3** : 115.

Johansen, F., 1, **3** : 44.

Johansen, H., 1, **14** : 123.

Jägerskiöld, L. A., 1, **7** : 1.

Järnefelt, H., 1, **6** : 149; 2, **6** : 153; 3, **8** : 256.

Järvi, O., 1, **17** : 191.

Järvi, T. H., 1, **1** : 6; 2, **1** : 11, 150, 151; 3, **1** : 62; 4, **10** : 354; 5, **11** : 190; 6, **14** : 3; 7, **16** : 2; 7, **20** : 1; 8, **20** : 78; 9, **20** : 79; 10, **20** : 150.

Kairamo, A. O., 1, **11** : 96.

Kalela (vide Cajander), A., 2, **12** : 159; 3, **15** : 232.

Kalela (vide Cajander), O., 2, **13** : 132; 3, **17** : 336; 4, **19** : 151; 5, **19** : 299.

Kanerva, N., 1, **5** : 103; 2, **9** : 144.

Karling, T. G., 1, **6** : 128; 2, **8** : 98; 3, **8** : 99; 4, **8** : 99; 5, **8** : 194; 6, **10** : 76; **7** : **10** : 242; 8, **10** : 388; 9, **10** : 391; 10, **19** : 42.

Kaudern, W., 1, **10** : 69.

Kemner, N. A., 1, **15** : 66.

Kiertonen, A., 1, **3** : 19, 131.

Kivirikko, K. E., 1, **1** : 6, 149; 2, **1** : 33.

Klingstedt, F. W., 1, **15** : 174; 2, **18** : 24; 3, **18** : 108.

Klingstedt, H., 1, **4** : 32; 2, **4** : 153; 3, **4** : 153; 4, **4** : 179; 5, **5** : 81; 6, **5** : 88; 7, **5** : 95; 8, **5** : 105; 9, **7** : 276; 10, **8** : 1; 11, **8** : 3; 12, **8** : 97; 13, **10** : 3; 14, **10** : 322; 15, **10** : 326; 16, **11** : 48; 17, **12** : 194; 18, **13** : 92; 19, **17** : 166; 20, **18** : 109.

—»— & Nordman, A. F., 1, **4** : 318, 320.

Klockars, B. & Luther, H., 1, **14** : 45.

Knoll, F., 1, **8** : 1.

Koehler, O., 1, **19** : 19.

Kopperi, A. J., 1, **8** : 258.

Korventio, V., 1, **1** : 88; 2, **4** : 32; 3, **6** : 164; 4, **14** : 165; 5, **15** : 51; 6, **15** : 269.

Kotilainen, M. J., 1, **1** : 110, 158; 2, **2** : 3; 3, **2** : 38, 116; 4, **2** : 40, 116; 5, **3** : 6; 6, **4** : 91; 7, **6** : 148; 8, **7** : 85; 9, **7** : 90; 10, **8** : 100; 11, **8** : 224; 12, **8** : 237; 13, **10** : 202; 14, **10** : 202; 15, **11** : 133; 16, **12** : 56; 17, **13** : 92; 18, **14** : 17; 19, **14** : 126; 20, **14** : 135; 21, **17** : 193; 22, **17** : 277; 23, **18** : 114; 24, **19** : 117; 25, **19** : 180.

Krogerus, H., 1, **14** : 62.

Krogerus, R., 1, **1** : 5, 157; 2, **1** : 6, 149; 3, **1** : 12; 4, **1** : 29, 149; 5, **1** : 61, 149; 6, **1** : 88, 151; 7, **2** : 8, 113; 8, **2** : 44; 9, **2** : 44, 113; 10, **2** : 44, 113, 114; 11, **3** : 4, 133; 12, **3** : 13, 131; 13, **4** : 117; 14, **5** : 70; 15, **6** : 100; 16, **7** : 2; 17, **7** : 254; 18, **8** : 193; 19, **10** : 336; 20, **10** : 336; 21, **14** : 32; 22, **14** : 107; 23, **14** : 129; 24, **15** : 66; 25, **16** : 77; 26, **18** : 61; 27, **19** : 18.

—»— & Lemberg, B., 1, **3** : 7, 130.

Krohn, V., 1, **9** : 126; 2, **9** : 165.

Kuenen, D. J., 1, **15** : 16.

Kujala, V., 1, **1** : 61; 2, **8** : 241; 3, **11** : 135; 4, **11** : 144; 5, **12** : 130.

Kupffer, K. R., 1, **4** : 152; 2, **6** : 83; 3, **11** : 139.

Lagström, H., 1, **3** : 7, 135.

Lehtonen, L. & Pankakoski, A., 1, **14** : 130.

Lemberg, B., 1, **3** : 43; 2, **4** : 63; 3, **10** : 17; 4, **11** : 14; 5, **11** : 16; 6, **11** : 19; 7, **11** : 28; 8, **13** : 9; 9, **14** : 5; 10, **15** : 11; 11, **15** : 13; 12, **16** : 3; 13, **19** : 3.

—»— Vide Krogerus, R. & Lemberg, B., 1.

Levander, K. M., 1, **1** : 95; 2, **2** : 35; 3, **2** : 58, 112.

Lindberg, Har., 1, **1** : 5; 2, **1** : 33; 3, **1** : 42; 4, **1** : 62; 5, **1** : 95; 6, **1** : 145; 7, **2** : 4, 115; 8, **2** : 35, 115, 116; 9, **3** : 17; 10, **3** : 17, 135; 11, **3** : 21; 12, **3** : 127; 13, **4** : 31; 14, **4** : 63; 15, **4** : 98; 16, **4** : 289; 17, **5** : 76; 18, **5** : 77; 19, **5** : 77; 20, **5** : 211; 21, **6** : 101; 22, **6** : 181; 23, **6** : 230; 24, **7** : 2; 25, **7** : 4; 26, **7** : 5; 27, **7** : 319; 28, **8** : 17; 29, **8** : 373; 30, **9** : 1; 31, **9** : 156; 32, **9** : 160; 33, **9** : 161; 34, **9** : 236; 35, **10** : 1; 36, **10** : 91; 37, **10** : 92; 38, **10** : 94; 39, **10** : 245; 40, **10** : 437; 41, **10** : 472; 42, **11** : 48; 43, **11** : 115; 44, **11** : 267; 45, **12** : 75; 46, **12** : 107; 47, **12** : 115; 48, **12** : 115; 49, **12** : 146; 50, **12** : 252; 51, **13** : 4; 52, **13** : 30; 53, **13** : 49; 54, **13** : 49; 55, **13** : 170; 56, **14** : 32; 57, **14** : 32; 58, **14** : 126; 59, **14** : 170; 60, **15** : 4; 61, **15** : 23; 62, **15** : 175; 63, **15** : 273; 64, **16** : 152; 65, **17** : 144; 66, **17** : 145; 67, **17** : 342; 68, **18** : 56; 69, **19** : 20; 70, **19** : 42.

Lindberg, Håk., 1, **1** : 62, 149; 2, **1** : 63; 3, **2** : 10, 113, 114; 4, **4** : 101; 5, **4** : 292; 6, **6** : 55; 7, **7** : 147; 8, **7** : 193; 9, **9** : 103; 10, **10** : 202; 11, **13** : 92; 12, **13** : 101; 13, **14** : 17; 14, **17** : 1; 15, **17** : 3; 16, **18** : 21.

Lindqvist, E., 1, **8** : 198; 2, **8** : 198.

Lindroth, C. H., 1, **11** : 174.

Lindström, A., 1, **10** : 436.

Linkola, K., 1, **2** : 38; 2, **2** : 41, 115, 116; 3, **2** : 44; 4, **4** : 25; 5, **6** : 86; 6, **6** : 133; 7, **7** : 55; 8, **7** : 61; 9, **7** : 68; 10, **7** : 259; 11, **7** : 261; 12, **8** : 222; 13, **9** : 178; 14, **10** : 369; 15, **11** : 215; 16, **12** : 3; 17,

12 : 146; 18, **12** : 158; 19, **13** : 3; 20, **15** : 210; 21, **18** : 30; 22, **18** : 45.
Lippmaa, T., 1, **7** : 63; 2, **11** : 136; 3, **12** : 107; 4, **12** : 150; 5, **12** : 159; 6, **12** : 162; 7, **15** : 189.
Luotola, V. L., 1, **9** : 14; 2, **9** : 16.
Luther, A., 1, **1** : 7, 153; 2, **5** : 107; 3, **9** : 17; 4, **9** : 165; 5, **10** : 11; 6, **10**:: 69; 7, **13** : 52; 8, **14** : 18; 9, **17** : 2.
Luther, H., 1, **11** : 230; 2, **14** : 54; 3, **15** : 34; 4, **16** : 8; 5, **16** : 9; 6, **17** : 43.
—»— Vide Klockars, B. & Luther, H., 1.
Lynge, B., 1, **4** : 32; 2, **7** : 5; 3, **7** : 145.
Lönnfors, F., 1, **14** : 127.
Malmio, B., 1, **11** : 97; 2, **13** : 101.
Malmström, N., 1, **8** : 321; 2, **9** : 68; 3, **9** : 69; 4, **12** : 74; 5, **12** : 146; 6, **13** : 103; 7, **17** : 182; 8, **17** : 187; 9, **17** : 189; 10, **18** : 68; 11, **18** : 70; 12, **18** : 73; 13, **18** : 77; 14, **19** : 7; 15, **19** : 137.
Malta, N., 1, **7** : 58; 2, **11** : 139.
Markewitsch, A. P., 1, **11** : 40.
Markl.und, G., 1, **9** : 2; 2, **9** : 13; 3, **15** : 85; 4, **16** : 45; 5, **16** : 54; 6, **16** : 57; 7, **16** : 59; 8, **16** : 63; 9, **16** : 67; 10, **16** : 72; 11, **16** : 74; 12, **18** : 269; 13, **19** : 42; 14, **19** : 304; 15, **20** : 252.
Melin, D., 1, **3** : 7.
Merikallio, E., 1, **2** : 39.
Meurman, O., 1, **5** : 107; 2, **6** : 95; 3, **9** : 67; 4, **10** : 74; 5, **15** : 2.
Mikkola, E., 1, **3** : 18, 134.
Montell, J., 1, **1** : 43, 154, 155; 2, **2** : 34, 115; 3, **2** : 42, 115, 116; 4, **3** : 14, 134, 135; 5, **10** : 73; 6, **10** : 381; 7, **11** : 230; 8, **14** : 127; 9, **15** : 81; 10, **17** : 24; 11, **17** : 24; 12, **17** : 74; 13, **17** : 74; 14, **17** : 75; 15, **17** : 177; 16, **17** : 178; 17, **17** : 192; 18, **18** : 93; 19, **18** : 93; 20, **18** : 94; 21, **18** : 95; 22, **18** : 112; 23, **18** : 113; 24, **19** : 80; 25, **19** : 81; 26, **19** : 114; 27, **19** : 115; 28, **19** : 115; 29, **20** : 13; 30, **20** : 16; 31, **20** : 16; 32, **20** : 82; 33, **20** : 91; 34, **20** : 94.
Motyka, J., 1, **5** : 106.
Munck, L., 1, **1** : 6, 150; 2, **1** : 62; 3, **2** : 40; 4, **2** : 59, 112; 5, **4** : 24; 6, **6** : 114; 7, **10** : 354.
Nessling, E., 1, **2** : 36, 113; 2, **2** : 37, 113.
Nilsson, K., 1, **13** : 102; 2, **15** : 52.
Nordberg, S., 1, **6** : 3; 2, **10** : 354; 3, **14** : 123; 4, **15** : 22.
Nordman, A. F., 1, **4** : 122; 2, **9** : 144; 3, **12** : 130; 4, **14** : 36; 5, **14** : 124; 6, **15** : 52; 7, **18** : 126; 8, **18** : 127; 9, **19** : 22; 10, **19** : 24; 11, **19** : 25; 12, **19** : 206.
—»— Vide Klingstedt, H. & Nordman, A. F., 1.
Nyberg, C., 1, **10** : 1; 2, **13** : 49; 3, **15** : 1.
Nyberg, W., 1, **10** : 20; 2, **13** : 49; 3, **19** : 16; 4, **20** : 153.
Nyberg, T., 1, **8** : 196; 2, **8** : 196; 3, **8** : 197.
Nyström, E. J., 1, **14** : 11.
Nyström, E. W., 1, **3** : 40, 130.
Odenwall, E., 1, **2** : 44, 115; 2, **2** : 56, 112; 3, **2** : 58, 112; 4, **3** : 16, 133; 5, **3** : 16, 134; 6, **5** : 80; 7, **5** : 116.
Olofsson, P., 1, **15** : 2.
Olsoni, B., 1, **2** : 4, 115, 116; 2, **2** : 48, 115; 3, **3** : 38, 135, 136; 4, **4** : 60; 5, **7** : 4; 6, **7** : 28; 7, **7** : 29; 8, **8** : 77; 9, **8** : 78; 10, **8** : 78; 11, **10** : 59; 12, **12** : 4; 13, **12** : 142; 14, **13** : 19; 15, **15** : 91; 16, **15** : 92; 17, **19** : 148; 18, **20** : 12; 19, **20** : 12.
Packalén, K. T., 1, **15** : 79.
Palmgren, A., 1, **1** : 30, 150; 2, **1** : 39, 158; 3, **1** : 41, 156; 4, **1** : 45, 156; 5, **1** : 47, 156; 6, **1** : 49, 157; 7, **1** : 51, 157; 8, **1** : 52, 156; 9, **1** : 56, 157; 10, **1** : 58, 137; 11, **1** : 71, 157; 12, **1** : 75, 156; 13, **1** : 78, 156; 14, **1** : 79, 156; 15, **1** : 82, 157; 16, **1** : 82; 17, **1** : 84, 155; 18, **1** : 86, 157, 158; 19, **1** : 95; 20, **1** : 97, 156; 21, **1** : 100, 157; 22, **1** : 102, 155; 23, **1** : 105, 156; 24, **1** : 111; 25, **2** : 30; 26, **2** : 40; 27, **2** : 65; 28, **3** : 91; 29, **4** : 3; 30, **4** : 3; 31, **4** : 32; 32, **4** : 231; 33, **5** : 159; 34, **6** : 91; 35, **6** : 188; 36, **7** : 54; 37, **7** : 178; 38, **7** : 290; 39, **8** : 20; 40, **8** : 22; 41, **8** : 30; 42, **8** : 326; 43, **9** : 194; 44, **10** : 51; 45, **10** : 53; 46, **10** : 56; 47, **10** : 398; 48, **10** : 434; 49, **10** : 439; 50, **11** : 121, 51, **11** : 122; 52, **11** : 233; 53, **12** : 107; 54, **12** : 161, 55, **12** : 210; 56, **13** : 126; 57, **13** : 134; 58, **14** : 110; 59, **14** : 139; 60, **15** : 2; 61, **15** : 2; 62, **15** : 175; 63, **15** : 236; 64, **16** : 101; 65, **17** : 296; 66, **18** : 61; 67, **18** : 185; 68, **19** : 89; 69, **19** : 223; 70, **20** : 173.
Palmgren, Maida, 1, **4** : 3.
—»— & A., 1, **8** : 24; 2, **8** : 254; 3, **10** : 46.
Palmgren, P., 1, **3** : 4, 131; 2, **3** : 37, 135; 3, **3** : 44; 4, **4** : 62; 5, **4** : 177; 6, **5** : 75; 7, **5** : 126; 8, **6** : 4; 9, **11** : 188; 10, **11** : 190; 11, **11** : 191; 12, **12** : 46; 13, **12** : 75; 14, **12** : 130; 15, **13** : 101; 16, **14** : 3; 17, **14** : 107; 18, **17** :177; 19, **17** : 191; 20, **18** : 88; 21, **19** : 77; 22, **19** : 87; 23, **20** : 149.
Pankakoski, A. — Vide Lehtonen, L. & Pankakoski, A., 1.
Paulsson, G., 1, **6** : 114.
Pesola, V., 1, **1** : 6, 157.
Pettersson, B., 1, **6** : 25; 2, **6** : 47; 3, **7** : 119; 4, **8** : 79; 5, **8** : 303; 6, **9** : 23; 7, **10** : 219; 8, **10** : 342; 9, **11** : 114; 10, **14** : 13; 11, **17**:: 22.
—»— Vide Hustich, I. & Pettersson, B., 1, 2.
Pipping, Märta, 1, **2** : 30, 113.

Platonoff, S., 1, **17** : 73; 2, **20** : 2.
Poijärvi, L. A. P., 1, **4** : 170; 2, **5** : 77.
Porkka, O., 1, **9** : 1.
Preuss, H., 1, **9** : 142.
Puolanne, M., 1, **1** : 61; 2, **1** : 93, 155, 156, 158; 3, **5** : 107; 4, **6** : 55; 5, **8** : 136; 6, **10** : 99.
Railonsala, A., 1, **7** : 92; 2, **8** : 199; 3, **13** : 89.
Rantaniemi, P. A., 1, **17** : 144.
Regel, C., 1, **7** : 235; 2, **12** : 115; 3, **12** : 152; 4, **15** : 79; 5, **15** : 197.
Reichardt, A., 1, **10** : 395.
Rendahl, H., 1, **10** : 329; 2, **10** : 329.
Renfors, L., 1, **9** : 31.
Renvall, T., 1, **2** : 40.
Reuter, E., 1, **1** : 139; 2, **2** : 100; 3, **3** : 118; 4, **4** : 279; 5, **5** : 200; 6, **6** : 223; 7, **7** : 315; 8, **8** : 370; 9, **9** : 232; 10, **10** : 468; 11, **11** : 263; 12, **12** : 246; 13, **13** : 163; 14, **14** : 163; 15, **15** : 268; 16, **16** : 149; 17, **17** : 335; 18, **18** : 109; 19, **18** : 265; 20, **19** : 42; 21, **19** : 298; 22, **20** : 247.
Roivainen, H., 1, **6** : 61; 2, **9** : 172.
Rühl, A., 1, **6** : 88.
Räsänen, V., 1, **8** : 182; 2, **8** : 185.
Salovaara, H., 1, **7** : 53.
Sarvela, J., 1, **12** : 65.
Sauramo, M., 1, **11** : 3; 2, **16** : 85.
Saxén, U., 1, **6** : 54; 2, **7** : 3; 3, **17** : 161; 4, **17** : 164.
Schneider, G., 1, **2** : 8.
Schoultz, Å. von, 1, **1** : 109, 148; 2, **3** : 19.
Schulman, Hj., 1, **2** : 38.
Schulze, P., Viets, K. & Willmann, C., 1, **13** : 116.
Segerstråle, C., 1, **5** : 68; 2, **9** : 126; 3, **9** : 160; 4, **13** : 48; 5, **13** : 101; 6, **14** : 4; 7, **14** : 110; 8, **15** : 23; 9, **15** : 51; 10, **16** : 1; 11, **16** : 86; 12, **17** : 2; 13, **17** : 142; 14, **17** : 153; 15, **17** : 191; 16, **17** : 191; 17, **18** : 25; 18, **18** : 25; 19, **19** : 42; 20, **19** : 78; 21, **20** : 2; 22, **20** : 2.
Segerstråle, S. G., 1, **14** : 4; 2, **14** : 33; 3, **17** : 145; 4, **17** : 178; 5, **19** : 4; 6, **19** : 5; 7, **19** : 20.
Siivonen, L. — Vide Välikangas, I. & Siivonen, L., 1.
Skepparnabb, Lilli, 1, **15** : 179.
Skottsberg, C., 1, **7** : 248; 2, **20** : 10.
Skuja, H., 1, **9** : 139.
Snellman, J., 1, **4** : 152.
Sonck, C.-E., 1, **10** : 46; 2, **11** : 121; 3, **13** : 26; 4, **13** : 30; 5, **13** : 109; 6, **13** : 128; 7, **13** : 129.
Sparre, B., 1, **20** : 17.
Spohr, E., 1, **6** : 90; 2, **7** : 67; 3, **8** : 227; 4, **11** : 145.
Stamm, I., 1, **6** : 87.
Stenius, G., 1, **2** : 35, 113; 2, **3** : 4, 135; 3, **10** : 202.
Sternberg, O., 1, **14** : 126.
Stenlid, N., 1, **15** : 51.
Stockmann, S., 1, **16** : 147; 2, **17** : 332; 3, **18** : 262; 4, **19** : 295; 5, **20** : 244.
Storå, R., 1, **12** : 60; 2, **14** : 18.
Streng, O., 1, **11** : 115; 2, **13** : 92.
Suomalainen, E., 1, **17** : 23.
Suomalainen, P., 1, **3** : 4, 132; 2, **18** : 89.
Svedelius, N. E., 1, **12** : 75.
Södergård, A., 1, **11** : 48.
Söderström, S., 1, **11** : 189.
Söyrinki, N., 1, **15** : 201; 2, **16** : 1; 3, **19** : 87.
Tanner, T. R., 1, **7** : 51.
Tanner, V., 1, **6** : 145; 2, **8** : 241; 3, **9** : 92; 4, **10** : 369.
Teräsvuori, K., 1, **6** : 112.
Thomson, P. W., 1, **6** : 88; 2, **8** : 226; 3, **12** : 146; 4, **12** : 165.
Toivonen, S., 1, **20** : 78.
Tuomikoski, R., 1, **17** : 12; 2, **17** : 32; 3, **17** : 79.
—»— Vide Buch, H. & Tuomikoski, R., 1.
Ulvinen, A., 1, **5** : 113; 2, **6** : 143; 3, **7** : 255; 4, **7** : 256; 5, **7** : 257; 6, **9** : 176; 7, **9** : 177.
Valle, K. J., 1, **3** : 3; 2, **3** : 4, 135; 3, **5** : 108; 4, **7** : 284; 5, **7** : 286; 6, **8** : 259.
Viets, K. — Vide Schulze, P., Viets, K. & Willmann, C., 1.
Virtanen, A. I., 1, **17** : 21.
Volteris, E., 1, **11** : 145.
Välikangas, I., 1, **1** : 141; 2, **2** : 104; 3, **3** : 20, 131; 4, **3** : 119; 5, **4** : 59; 6, **4** : 98; 7, **4** : 280; 8, **5** : 76; 9, **5** : 201; 10, **6** : 7; 11, **6** : 68; 12, **6** : 224; 13, **7** : 316; 14, **8** : 371; 15, **9** : 92; 16, **9** : 233; 17, **10** : 248; 18, **10** : 469; 19, **11** : 10; 20, **11** : 264; 21, **12** : 75; 22, **12** : 247; 23, **13** : 164.
—»— & Hytönen, O., 1, **7** : 6; 2, **8** : 100; 3, **9** : 33; 4, **10** : 99; 5, **11** : 58; 6, **12** : 75; 7, **13** : 53; 8, **14** : 70; 9, **15** : 140.
—»— & Siivonen, L., 1, **17** : 239.
Wahl, W., 1, **12** : 60.
Wallgren, G., 1, **7** : 281.
Warén, H., 1, **1** : 6, 157; 2, **10** : 256. — Vide Waris, H.
Waris (vide (Warén), H., 3, **12** : 152; 4, **19** : 7.
Wikström, D. A., 1, **8** : 14; 2, **11** : 216.
Willer, A., 1, **5** : 3.
Willmann, C. — Vide Schulze, P., Viets, K. & Willmann, C., 1.
Zāmelis, A., 1, **8** : 228; 2, **12** : 154.
Zandt, F., 1, **14** : 8.
Ziegenspeck, H., 1, **7** : 68; 2, **8** : 227.
Åberg, G., 1, **7** : 26; 2, **8** : 274; 3, **9** : 143; 4, **9** : 182; 5, **10** : 59; 6, **10** : 96; 7, **10** : 222; 8, **10** : 239.
—»— & Hustich, I., 1, **9** : 182.

Index rerum. Varia.

ANTHROPOLOGIA.

Streng, O., (1), (2).

BIBLIOTHECA SOCIETATIS, BIBLIOGRAPHIA.

Lindberg, Håk., 5 (E. E. Bergroth).
Palmgren, A., 33 (E. Vainio, p. 162, 181).
Reuter, E., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22.

BIOGRAPHIA.

Ahnger, C. (im. phot.). — **19** : 244—245, 281—282 (Hellén in Palmgren, 69).
Alfthan, K. (im. phot.). — **18** : 205—206, 246—247 (Frey in Palmgren, 68).
Allorge, P. — **20**: 192—193, 228—230 (H. Buch in Palmgren, 70).
Andersin, J. E. — **10** : 445, 458 (Palmgren, 49).
Andersson, C. F. G. — **5** : 169, 188 (Palmgren, 33).
Arnell, H. W. — **9**: 201—202, 219—220 (Elfving in Palmgren, 43).
Aro, J. E. — **4** : 245, 267—268 (G. Ekman in Palmgren, 32).
Arvonen, Maria (Maja) Katharina (im. phot.). — **19** : 249—250, 286—287 (Har. Lindberg in Palmgren, 69).
Aurivillius, P. O. C. — **5** : 169—170, 188—189 (Frey in Palmgren, 33).
Bergroth, E. E. (im. phot.). — **2** : 73—74, 88 (Frey in Palmgren, 27) **4** : 292—317 (Håk. Lindberg, 5).
Birger, S. — **8** : 332—333, 353—354 (Har. Lindberg in Palmgren, 42).
Björkenheim, C. G. — **3** : 98, 107 (Palmgren, 28).
Björkstén, M. — **16** : 107, 130—131 (Palmgren, 66).
Bonsdorff, A. von. — **4** : 248, 270—271 (Palmgren, 32).
Bonsdorff, Hj. von. — **2** : 72, 87 (R. Forsius in Palmgren, 27).
Borg, V. — **19** : 233, 271 (Palmgren, 69).
Borge, O. — **14** : 144, 155 (Palmgren, 59).
Brander, G. O. E. — **16** : 119—121, 142—144 (Thord Brenner in Palmgren, 66).
Brander, O. E. G. (im. phot.). — **14** : 146—147, 157—158 (Har. Lindberg in Palmgren, 59).
Brander, V. — **10**: 445, 458 (Palmgren, 49).
Brenner, M. M. W. (im. phot.). — **6** : 195—199, 212—216 (Elfving in Palmgren, 35).
Brenner, M. W. (im. phot.). — **8** : 333—336, 359—357 (Collander in Palmgren, 42).
Brockmann-Jerosch, H. — **15** : 245, 259 (Palmgren, 65).
Brotherus, V. F. (im. phot.). — **5** : 173—178, 192—197 (Palmgren, 33).
Buddén, E. J. — **8** : 337, 357—358 (Levander in Palmgren, 42).
Böök, A. T. (im. phot.). — **20** : 193—195, 230—232 (R. Kalliola in Palmgren, 70).
Cajander, A. K. (im. phot.). — **19** : 237—244, 274—281 (Kujala in Palmgren, 69).
Cajander, E. — **5** : 172—173 (Linkola in Palmgren, 33).
Chodat, R. — **11** : 240, 254 (Palmgren, 52).
Christ, H. — **10** : 445—447, 459—460 (E. Rübel in Palmgren, 49).
Collin, O. — **1** : 116—117, 132—133 (Levander in Palmgren, 24).
Correns, C. — **9** : 126 (Federley, 4).
Dahlstedt, G. A. H. (im. phot.). — **11** : 240—242, 254—256 (Har. Lindberg in Palmgren, 52).
de la Chapelle, A. H. — **9** : 206, 223—224 (Federley in Palmgren, 43).
Drude, K. G. O. — **9** : 200—201, 218—219 (Palmgren, 43).
Ekman, G. (im. phot.). — **14**: 147—149, 158—160 (Järvi in Palmgren, 59).
Ekström, J. E. — **2** : 72—73, 87 (J. E. Rosberg in Palmgren, 27).
Elfving, F. E. W. (im. phot.). — **19** : 252—258, 289—295 (Palmgren, 67).
Elfving, Thyra (nat. Ingman). — **15**: 246—247, 261 (Vivi Lindberg in Palmgren, 65).
Elo, J. E. (im. phot.). — **18** : 200—201, 239—240 (Collander in Palmgren, 68).

ENGLER, A. — **7** : 298, 309 (Palmgren, 38).
ERIKSON, E. R. T. — **6** : 194—195, 211—212 (Har. Lindberg in Palmgren, 35).
ERIKSSON, C. T. (im. phot.). — **19** : 250—252, 288 (A. Luther in Palmgren, 69).
ESBEN-PETERSEN, P. — **18** : 196, 235 (R. Krogerus in Palmgren, 68).
ESKELIN, KAROLINA SIDONIA. — **13** : 143—144, 157 (Palmgren, 57).
FABRITIUS, B. H. H. — **9** : 201, 218 (Palmgren, 43).
FAGERLUND, L. W. — **16** : 110, 133 (Elfving in Palmgren, 66).
FAZER, K. O. — **9** : 205—206, 222—223 (Levander in Palmgren, 43).
FIEANDT, E. (im. phot.). — **12** : 220—222, 236—239 (L. M. P. Poijärvi in Palmgren, 55).
FLODERUS, B. G. O. — **18** : 217, 256 (Palmgren, 68).
FONTELL, C. W. (im. phot.). — **13** : 141—143, 154—156 (A. Luther in Palmgren, 57).
FORSIUS, I. (im. phot.). — **7** : 297—298, 308—309 (Hellén in Palmgren, 38).
FORSIUS, R. (im. phot.). — **12** : 223—226, 239—242 (Frey in Palmgren, 55).
GENETZ, A. T. B. — **9** : 204—205, 222 (Järvi in Palmgren, 43).
GRANIT, J. O. (im. phot.). — **16** : 115—116, 138—139 (H. Krogerus in Palmgren, 66).
GROTENFELT, N. H. A. (im. phot.). — **16** : 118, 141—142 (G. Bergman in Palmgren, 66).
GRÖNDAHL, O. A. — **10** : 449, 462—463 (Har. Lindberg in Palmgren, 49).
GRÖNROOS, HJ. — **6** : 194, 211 (A. Luther in Palmgren, 35).
GRÖNVALL, F. — **13** : 140—141, 154 (Levander in Palmgren, 57).
HAGLUND, P. — **6** : 193, 209—210 (Tor Ekman in Palmgren, 35).
HAMMARSTRÖM, R. E. — **4** : 244—245, 267 (Palmgren, 32).
HANSEN-OSTENFELD, C. E. — **7** : 298—299, 309—310 (Har. Lindberg in Palmgren, 38).
HERMONEN, EEVA. — **15** : 247, 261—262 (A. Luther in Palmgren, 65).
HILDÉN, K. A. I. — **5** : 171, 190—191 (Palmgren, 33).
HJELT, A. H. — **2** : 75—76, 90—91 (Palmgren, 27).
HJELT, HEDVIG VILHELMINA (nat. FORSBLOM) (im. phot.). — **5** : 170—171, 189—190 (Elfving in Palmgren, 33).
HOLMBERG, O. R. — **7** : 299, 310 (Har. Lindberg in Palmgren, 38).
HOLMBOE, J. (im. phot.). — **20** : 203—207, 240—244 (Palmgren, 70).
HORVATH, G. — **14** : 145, 156 (Håk. Lindberg in Palmgren, 59).
HÄLLSTRÖM, J. A. AF. — **2** : 72, 86—87 (Palmgren, 27).
HÄLLSTRÖM-MOLTESEN, EVA ELISABET. — **10** : 242, 256 (Vivi Lindberg in Palmgren, 52).
IDMAN, G. R. (im. phot.). — **4** : 248—250, 271—273 (Palmgren, 32).
ILVESSALO, L. — **4** : 242, 264 (Palmgren, 32).
JANTUNEN, P. — **6** : 193—194, 210—211 (Välikangas in Palmgren, 35).
JOHANSSON, K. — **5** : 169, 188 (Palmgren, 33).
JOHNSSON, J. V. (im. phot.). — **12** : 217—219, 233—235 (Linkola in Palmgren, 55).
JUSLIN, A. W. — **2** : 72, 87 (Palmgren, 27).
KAIRAMO (KIHLMAN), A. O. (im. phot.). — **15** : 247—250, 262—264 (Kujala in Palmgren, 65).
KAJAVA, Y. H. — **5** : 173, 192 (A. Luther in Palmgren, 33).
KANERVA, N. R. (im. phot.). — **19** : 246—248, 283—285 (Hiitonen in Palmgren, 69).
KARSTEN, P. A. — **10** : 329 (Hintikka, 3).
KARVONEN, J. J. — **19** : 234, 271 (Palmgren, 69).
KRÖGER, A. V. — **16** : 107, 130 (Palmgren, 66).
KUPFFER, K. R. — **12** : 215—216, 231—232 (Palmgren, 55).
KUUSISTO, A. P. (im. phot.). — **16** : 122—123, 145—146 (I. Paasio in Palmgren, 66).
LAGUS, E. — **14** : 146, 156—157 (Håk. Lindberg in Palmgren, 59).
LAITINEN, T. — **18** : 195, 234 (Palmgren, 68).

Lakari, O. J. — **18** : 204, 243 (A. K. Cajander in Palmgren, 68).
Landtman, G. — **17** : 304, 325 (Palmgren, 67).
Laurén, W. E. C. (im. phot.). — **9** : 206—208, 224—225 (Har. Lindberg in Palmgren, 43).
Laurin, Å. (im. phot.). — **16** : 107—109, 131—132 (Magnus Hagelstam in Palmgren, 66; Palmgren, 66).
Levander, K. M. (im. phot.). — **20** : 186—191, 223—228 (Häyrén in Palmgren, 70).
Lindberg, K. E. — **16** : 106, 129 (Palmgren, 66).
Lindberg, S. O. — (**11** : 174) (Elfving, 5).
Lindfors, A. M. (im. phot.). — **13** : 144—145, 157—158 (G. Idman in Palmgren, 57).
Lindholm, W. A. — **12** : 216—217, 232—233 (A. Luther in Palmgren, 55).
Lindman, C. A. M. — **5** : 169, 188 (Palmgren, 33).
Linkola, K. (im. phot.). — **18** : 206—210, 245—248 (Kujala in Palmgren, 68; Palmgren, 68).
Lippmaa, T. (im. phot.). — **19** : 235—237, 272—274 (Kotilainen in Palmgren, 69).
Liro (Lindroth), J. I. (im. phot.). — **20** : 198—202, 235—239 (Roivainen in Palmgren, 70 .
Listo, J. (im. phot.). — **12** : 219—220, 235—236 (Nordman in Palmgren, 55).
Lynge, B. (im. phot.). — **18** : 210—217, 249—256 (Palmgren, 68; Johannes Lid, Häyrén in Palmgren, 68).
Lönnberg, E. — **19** : 234—235, 271—272 (A. Luther in Palmgren, 69).
Lönnbohm, O. A. F. — **4** : 243—244, 266—267 (Linkola in Palmgren, 32).
Malme, G. O. (im. phot.). — **13** : 146—147, 159—160 (Har. Lindberg in Palmgren, 57).
Maristo, L. V. (im. phot.). — **18** : 196—198, 235—237 (A. Kalela in Palmgren, 68).
Mikkola, E. — **16** : 116—118, 139—141 (Sauramo in Palmgren, 66).
Munck, L. (im. phot.). — **18** : 205, 244 (Palmgren, 68).
Munsterhjelm, G. R. (im. phot.). — **5** : 172, 191—192 (Palmgren, 33).
Myrberg, K. V. — **1** : 117, 133—134 (Palmgren, 24).
Nessling, E. A. J. — **18** : 199—200, 238—239 (Montell in Palmgren, 68).
Nordenskiöld, N. E. (im. phot.). — **9** : 209—211, 227—229 (Federley in Palmgren, 43).
Nordqvist, O. F. — **2** : 74—75, 89 (Levander in Palmgren, 27).
Norrlin, J. P. — (**19** : 1) (A. K. Cajander, 2).
Nupnau, B. (im. phot.). — **18** : 198—199, 237—238 (G. Bergman in Palmgren, 68).
Nyberg, C. (im. phot.). — **20** : 202—203, 239—240 (Backman in Palmgren, 70).
Nybergh, T. W. (im. phot.). — **8** : 342—346, 362—367 (Marklund in Palmgren, 42; Palmgren, 42).
Olander, A. I. — **13** : 145—146, 158—159 (Järvi in Palmgren, 57).
Paasio, F. P. I. (im. phot.). — **17** : 305—308, 325—328 (Söyrinki in Palmgren, 67).
Pekkarinen, J. (im. phot.). — **9** : 202—204, 220—222 (Linkola in Palmgren, 43).
Pfaler, K. E. L. von. — **7** : 295, 306 (Palmgren, 38).
Pohle, R. — **3** : 98—99, 110 (Palmgren, 28).
Porkka, O. H. (im. phot.). — **16** : 112—114, 135—137 (Collander in Palmgren, 66).
Pousar, C. V. — **10** : 447, 460—461 (Levander in Palmgren, 49).
Pulkkinen, A. A. (im. phot.). — **9** : 208—209, 225—227 (G. Ekman in Palmgren, 43).
Puolanne, M. E. (im. phot.). — **18** : 201—204, 240—243 (Hiitonen in Palmgren, 68; Palmgren, 68).
Rainio, A. J. P. (im. phot.). — **20** : 195—197, 232—234 (Hiitonen in Palmgren, 70).
Ramsay, W. — **4** : 241, 264 (Palmgren, 32).
Renvall, A. — **2** : 75, 90 (Palmgren, 27).
Renvall, G. G. — **2** : 75, 90 (Palmgren, 27).
Renvall, K. T. G. — **4** : 242—243, 265—266 (K. Hildén in Palmgren, 32).
Rosberg, J. E. — **8** : 341, 361—362 (K. Hildén in Palmgren, 42).
Rosqvist, Alma Josefina (Ina). — **19** : 246, 283 (E. Qvarnström in Palmgren, 69).

Rothström, G. I. — **1** : 117, 133 (Palmgren, 24).
Rudolph, K. — **13** : 140, 153 (Palmgren, 57).
Sahlgren, A. T. — **7** : 295, 306 (Palmgren, 38).
Salmenlinna, S. S. (im. phot.). — **16** : 109—110, 132—133 (Linkola in Palmgren, 66).
Salovaara, H. A. (im. phot.). — **11** : 243—245, 257—258 (G. Ekman in Palmgren, 52).
Samuelsson, G. — **20** : 185, 222 (Palmgren, 70).
Sars, G. O. — **3** : 99—100, 110—111 (Palmgren, 28).
Schröter, C. — **15** : 245—246, 260—261 Häyrén in Palmgren, 65).
Schulman, O. K. Hj. (im phot.). — **10** : 450—452, 463—465 (A. Luther in Palmgren, 48).
Schulman, T. V. E. (im. phot.). — **7** : 296—297, 307—308 (Cedercreutz in Palmgren, 38).
Sievers, K. R. — **8** : 338—339, 358—359 (Elfving in Palmgren, 42).
Sjöström, T. W. (im. phot.). — **20** : 197—198, 234—235 (V. Auer in Palmgren, 70).
Sorsakoski (Lindblad), O. E. (im. phot.). — **12** : 222—223, 239 (A. Luther in Palmgren, 55).
Spoerhann, H. — **18** : 195—196, 235 (Palmgren, 68).
Spoof, A. R. — **7** : 295—296, 307 (Reuter in Palmgren, 38).
Stenberg, K. H. — **4** : 245—246, 268—269 (A. Luther in Palmgren, 32).
Stolpe, T. — **19** : 233, 271 (Palmgren, 69).
Sucksdorff, J. — **13** : 140, 153 (Palmgren, 57).
Sundell, A. F. — **1** : 117, 133 (Palmgren, 24).
Sundman, N. — **2** : 71, 86 (Palmgren, 27).
Sundström, K. E. — **1** : 118—119, 134—135 (A. Luther in Palmgren, 24).
Suomalainen, E. W. (im. phot.). — **8** : 339—341, 359—361 (G. Ekman in Palmgren, 42).
Söderman, A. H. (im. phot.). — **10** : 448—449, 461—462 (Hellén in Palmgren, 49).
Tanner, T. R. (im. phot.). — **16** : 121—122, 144—145 (E. J. Valovirta in Palmgren, 66).
Tertti (Hertz, Sydänheimo), M. — **16**: 114, 137—138 (E. Laitakari in Palmgren, 66).
Vainio, E. A. (im. phot.). — **6** : 200—202, 216—219 (Palmgren, 35).
Valmari, J. — **16** : 106, 129 (Palmgren, 66).
Vierhapper, F. — **9** : 201, 219 (Palmgren, 43).
Wallèen, K. M. M. — **10** : 447, 460 (Levander in Palmgren, 49).
Wangerin, W. — **14** : 144, 155 (Palmgren, 59).
Warén, E. J. — **4** : 246—247, 269 (Palmgren, 32).
Wartiainen, I. M. (im. phot.). — **19** : 245—246, 282—283 (A. Luther in Palmgren, 69).
Wasastjerna, B. R. — **4** : 247, 269—270 (Frey in Palmgren, 32).
Wegelius, K. H. R. — **10** : 489, 462 (Linkola in Palmgren, 49).
Wettstein, R. — **8** : 332, 353 (Palmgren, 42).
Wilhelmsson, J. H. (im. phot.). — **19** : 232—233, 269—270 (Palmgren, 69).
Winell, B. — **19** : 248—249, 285—286 (Marklund in Palmgren, 69).
Ylönen, P. — **4** : 247—248, 270 (Palmgren, 32).
Zschokke, F. — **12** : 215, 231 (Palmgren, 55).
Äyräpää, (Europaeus), M. A. — **5** : 170, 189 (Palmgren, 33).

EXCURSIONES, ITINERA.

A.

Eklund, O., 25 (*Bot.;* Ab), 32 (*Bot.;* Ab), 33 (*Bot.;* Ab).
Pagerström, L. & Luther, H., 1 (*Bot.;* Kr.).
Frey, R., 19 (*Ent.;* Fenn. bor., 0), 37 (Kola halvön, 0).
Hellén, W., 30 (*Ent.;* Kr.).

Hiitonen, I., 14 (*Bot.;* Esth.).
Häyrén, E., 5 (*Bot.;* Fiskarhalvön, 0), 21 (*Bot.;* Esth.), 37 (*Bot.;* Esth.).
Kalela, A., 3 (*Bot.;* Ab).
Kanerva, N., 1 (*Lep.;* N).
Kotilainen, M. J., 8 (*Bot.;* Kl).
Krogerus, R. & Lemberg, B., 1 (*Ent., bot.*; Ka, Oa, Om).
Linkola, K., 20 (*Bot.;* N).
Societas pro Fauna et Flora Fennica (Kr.) **18** : 61, 88, 89, 217—222, 257—262; **19** : 87, 119, 137, 227—228, 229—230, 258—260, 265, 267—268; **20** : 78, 149, 175—176, 213.

B.

Buch, H., 7 (*Bot.;* NW-Spanien, Frankrike).
Frey, R., 21 (Kanar.öarna, 0), 27 (*Dipt.;* Kanar.öarna, 0), 32 (Azorerna, 0).
Häyrén, E., 32 (*Bot.;* Rumänien, 0).
Johansen, F., 1 (Hudson Bay, 0).
Kaudern, W., 1 (*Zool ;* Celebes, 0).
Kivirikko, K. E., 2 (*Zool.;* Mont. Thianschan., 0).
Lindberg, Har., 1 (Tunisien, 0), 3 (*Bot.;* Tunisien, 0), 5 (*Bot.;* Sicilien, 0), 9 (Marocko, 0), 11 (*Bot.;* Högatlas, 0), 14 (*Bot.;* Spanien, 0), 32 (*Bot.;* Brittiska öarna, 0), 65 (Balkan, 0).
Lynge, B., 1 (*Bot.;* Novaja-Semlja, 0), 2 (Öst-Grönland, 0).
Malin, D., 1 (Anderna, 0).
Skottsberg, C., 2 (Hawaii, 0).

HISTORIA.

Elfving, F., 2 (Naturalhistoriska studier, 0), 3 (Cellkärnans upptäckt), 6 (Societas, 0).
Hintikka, T. J., 14 (P. Kalm, käsikirjoituksia), 15 (P. Kalm, käsikirj.).
Linkola, K., 8 (Verband baltischer Pflanzengeographen).
Palmgren, A., 25 (Minnesord över J. A. Palmén).
—»— (Soc. F. Fl. Fenn.): 24, 27, 28, 32, 33, 35, 38, 42, 43, 49, 52, 55, 57, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 70.
Skepparnabb, Lilli, 1 (E. Tillandz' växtfigurer).

HYDROGRAPHIA, HYDROLOGIA.

Buch, K., 3 (Havsvattnet, 0).
Halme, E., 1 (Fosforitalous, 0).
Lönnfors, F., 1 (Kumo älv).
Willer, A., 1 (Strandgewässer Ostpreussens, 0).

OECONOMIA SOCIETATIS.

Idman, G., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Idman, G. R., 1, 2, 4.
Stockmann, S., 1, 2, 3, 4, 5.

PROVINCIAE BIOGEOGRAPHICAE.

Eklund, O., 45.
Kalela, O., 4.
Klingstedt, H., 2, 7.
Lippmaa, T., 6 (Esth.).
Palmgren, 33, 68.

TUTELA NATURAE.

Buch, H., 7, 17.
Hryniewiecki, B., 2 (Polen, 0).
Hustich, I., 8, 12.
Häyrén, E., 22.
Lindberg, Har., 2 (Plantae).
Linkola, K., 3, 14, 16.
Luther, A., 2 (Cygnus musicus).
Meurman, O., 5.
Palmgren, P., 19 (Larus ridibundus).
Schoultz, Å. von, 2 (Aves).
Stenius, G., 2 (Salix pyrolifolia).
Societas pro Fauna et Flora Fennica **1** : 114, 130; **3** : 94, 105; **4** : 235, 257; **6** : 190, 207; **9** : 197, 214; **11** : 237—238, 251—252; **15** : 50; **17** : 310—311, 330—332; **18** : 188, 227; **19** : 2; **20** : 77—78, 176, 180, 213—214, 217—218.

VARIA.

Buch, K., 2 (Bio-goechemia, 0).
Eklund, O., 62 (Eiszeiten).
Federley, H., 2 (Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, 0), 6 (Spallanzanijubileet i Pavia).

Hustich, I., 11 (Meteorologia, Lkem), 14 (Biologisk fältforskning), 19 (Periodicitet, klimat, Lapp.), 20 (Perioder och växlingar, Lapp.).

Häyrén, E., 10 (Grasbälle), 16 (Seeball).

Klingstedt, F. W., 1 (Biochemia, gränsproblem, 0), 2 (Virus, 0), 3 (Fluorescensmikroskopet, 0).

Klingstedt, H., 3 (Begriff der Art), 14 (Mikroskop. Zeichnen).

Korvenkontio, V. A., 2 (Turkiseläinten kasvattaminen, USA, 0).

Krohn, V., 2 (Kasviserologia, 0).

Lindberg, Har., 56 (Museum botanicum, Leningrad, 0).

Nyberg, C., 1 (Bakteriofager, 0), 2 (Bakterievariationer, 0).

Nyström, E. J., 1 (Norrlinsche Häufigkeitsskala, Nomogramm).

Packalén, K. T., 1 (Virus, 0).

Regel, C., 4 (Halbinsel Athos, 0).

Salovaara, H., 1 (Paedagogia, 0).

Sauramo, M., 1 (Itämeren geolog. historia, 0), 2 (Suom. metsien historia, 0).

Streng, O., 1 (Verityypit, 0), 2 (Verityypit ja antropologia, 0).

Wahl, W., 1 (Tunga metaller hos lägre organismer, 0).

Warén, H., 2 (Kasvien kalsiumtarpeesta, 0).

Ziegenspeck, H., 2 (Schwefel- u. Kohlenstoffkreislauf in den Ostmooren).

Index Sociorum Soc. F. Fl. Fenn. **15** : 293—303.

Statutae Societatis **3** : 113—115.

Pars botanica.

Index systematicus.

ALGAE.

Brander, G., 1.
Cedercreutz, C., 1, 5, 7. 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24.
Cleve-Euler, Astrid, 1.
Collander, R., 2 (0).
Ehnholm, G., 1.
Ekman, Anna-Greta, 1.
Fagerström, L., 1, 16 (p. 123).
Färdig, B. A., 5 (p. 115).
Grönblad, R., 1, 2.
Herlin, N., 5.
Häyrén, E., 2 (0), 8, 9, 10, 12, 19, 25, 30, 33, 35, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 64, 66, 67, 68.
Järnefelt, H., 1.
Kotilainen, M. J., 23.
Lemberg, B., 2.
Lindberg, Har., 18.
Linkola, K., 12.
Luther, H., 2.
Palmgren, A., 58.
Skuja, H., 1.
Svedelius, N. E., 1 (0).
Välikangas, I., 5.
Åberg, G., 7.

BACTERIA.

Elfving, F., 8 (in A. Palmgren, 68).
Häyrén, E., 8, 23, 56, 66.
Nyberg, C., 2 (0), 3 (0).
Segerstråle, C., 16.
Åberg, G., 4.

FUNGI.

Cedercreutz, C., 25.
Eklund, O., 63, 64, 65, 69.
Fagerström, L., 16 (p. 129).
Frey, R., 35, 39, 40, 41.
Hiitonen, I., 16.
Hintikka, T. J., 1.
Häyrén, E., 7, 15, 19, 23, 31, 34, 36, 42, 43, 44, 51, 61, 63, 69.
Lindberg, Har., 26, 35.
Malmström, N., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Munck, L., 5, 6.
Nilsson, K., 1.
Nordman, A. F., 8 (p. 140, 143).
Nyberg, W., 1, 2, 3, 4.
Reuter, E., 20.
Tanner, V., 2.

LICHENES.

Ahlner, S., 1.
Backlund, H. O., 3.
Cajander, A., 1.
Eklund, O., 2, 38, 44, 49.
—»— & Forsius, R., 1.
Elfving, F., 7 (in A. Palmgren, 68).
Erichsen, C. F. E., 1, 2.
Fagerström, L., 6, 15, 16, 21, 23.
Forsius, R., 19.
—»— Vide Eklund, O. & Forsius, R., 1.
Gyelnik, V., 1.
Hustich, I. & Pettersson, B., 2.
Häyrén, E., 3, 6, 9, 13, 21, 24, 26, 37, 39, 48, 49, 51, 53, 54, 58, 62.
Krogerus, R., 1.
Kujala, V., 4.
Lehtonen, L. & Pankakoski, A., 1.
Lemberg, B., 2, 8.
Linkola, K., 4, 10, 11, 12, 21.
Lippmaa, T., 2.

Lynge, B., 3.
Olofsson, P., 1.
Pankakoski, A. — Vide Lehtonen, L. & Pankakoski, A., 1.
Pettersson, B., 9, 10.
—»— Vide Hustich, I. & Pettersson, B., 2.
Roivanen, H., 1.
Räsänen, V., 1, 2.
Tanner, V., 1.
Åberg, G., 7.

MUSCI.

Auer, A. V., 2.
Backlund, H. O., 3.
Buch, H., 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20.
—»— & Hustich, I., 1.
—»— & Tuomikoski, R., 1.
Eklund, O., 2, 29, 36, 40, 43, 46, 48, 55, 59.
Fagerström, L., 4, 7, 8, 15, 16, 20.
Hustich, I., 26.
—»— & Pettersson, B., 2.
—»— Vide Buch, H. & Hustich, I., 1.
—»— Vide Åberg, G. & Hustich, I., 1.
Hällström, E. af, 1.
Häyrén, E., 9, 13, 21, 37, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 57, 59.
Kotilainen, M. J., 1, 2 (0), 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20.
Kujala, V., 4.
Lemberg, B., 2, 8.
Linkola, K., 4, 12, 21.
Lippmaa, T., 2.
Malta, N., 1.
Olofsson, P., 1.
Palmgren, A., 37.
Pettersson, B., 3, 10.
Roivainen, H., 1.
Tanner, V., 1.
Tuomikoski, R., 1, 3 (0).
—»— Vide Buch, H. & Tuomikoski, R., 1.
Åberg, G., 7.
—»— & Hustich, I., 1.

PLANTAE VASCULARES.

Aario, L., 1.
Alfthan, K., 1, 2.
Auer, A. V., 1, 2, 3, 4, 5.
Aulamo, O., 1.
Backlund, H. O., 3.
Backman, A. L., 1 (0).
Björkstén, J., 1.
—»— & Himberg, I., 1.
Brenner, M., 1, 2.
Brenner, W., 1, 2.
Buch, H., 3, 4, 7, 8, 13, 14 (0), 18.
Bäck, R., 2.
Bärlund, H., 1.
Bärlund, Ulla, 1.
Carpelan, J., 1.
Cedercreutz, C., 2, 3, 4, 6, 13, 18, 21, 25.
Collander, R., 3 (0).
Eichwald, K., 1.
Eklund, O., 1, 2, 3, 5, 7, 8 (0), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 70, 71.
Elfving, F., 1 (0).
Englund, B., 1, 2, 3, 4.
Erkamo, V., 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fagerström, L., 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,23.
Forsius, R., 2, 14, 15, 16, 17, 19.
Fortelius, O., 1.
Färdig, B., 1, 2, 3, 4, 5.
Gadolin, A. W., 1, 2, 3, 4.
Galeniek, P., 1.
Gröndahl, O. A., 1.
Gunnarsson, J. G., 1.
Hammerman, A., 1.
Herlin, N., 1, 2, 3, 4.
Hiitonen (Hidén), I., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21.
Himberg, I. — Vide Björkstén, J. & Himberg, I., 1.
Hintikka, T. J., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Holm, K., 1.
Huldén, E., 1 (0).
Hustich, I., 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28.
—»— & Pettersson, B., 1, 2.
Häyrén, E., 1, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 37, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66.

Idman, G. R., 3.
Kairamo, A. O., 1.
Kalela (Cajander), A., 2, 3.
Kanerva, N., 1, 2.
Karling, T. G., 2, 3, 4, 5, 10.
Klingstedt, H., 12.
Klockars, B. & Luther, H., 1.
Knoll, F., 1 (0).
Kotilainen, M. J., 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19 (0), 21, 22, 24.
Krogerus, H., 1.
Krogerus, R., 1, 14, 27.
—»— & Lemberg, B., 1.
Krohn, V., 1.
Kujala, V., 1, 4.
Lagström, H., 1.
Lemberg, B., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
—»— Vide Krogerus, R. & Lemberg, B., 1.
Lindberg, Har., 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 (0), 43 (0), 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 66, 68, 69, 70.
Lindström, A., 1.
Linkola, K., 1 (0), 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16 (0), 18 (0), 19, 21, 22.
Lippmaa, T., 2, 7 (0).
Luotola, V. L., 1, 2.
Luther, A., 11.
Luther, H., 1, 2, 3, 4, 5, 6.
—»— Vide Klockars, B. & Luther, H., 1.
Malmio, B., 1, 2.
Malmström, N., 1.
Malta, N., 2.
Marklund, G., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
Meurman, O., 1, 2, 4.
Mikkola, E., 1.
Montell, J., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Nilsson, K., 2.
Nordberg, S., 1.
Nordman, A. F., 1, 3, 5, 8, 11, 12.
Nybergh, Th., 1, 2, 3.
Odenwall, E., 1, 5.
Olofsson, P., 1.
Olsoni, B., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,.
Palmgren, A., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 68.
—»— Vide Palmgren, Maida & A., 1, 2, 3.
Palmgren, Maida, 1.
—»— & A., 1, 2, 3.
Palmgren, P., 2.
Pesola, V., 1.
Pettersson, B., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
—»— Vide Hustich, I. & Pettersson, B., 1, 2.
Poijärvi, L. A. P., 1.
Preuss, H., 1.
Puolanne, M., 1, 2, 4, 5, 6.
Railonsala, A., 1, 2, 3.
Roivainen, H., 1, 2.
Rühl, A., 1.
Sarvela, J., 1.
Saxén, U., 1, 2, 3, 4.
Segerstråle, C., 1.
Skepparnabb, Lilli, 1.
Skottsberg, C., 1.
Sonck, C. E., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sparre, B., 1.
Spohr, E., 1, 3 (0), 4.
Stenius, G., 2
Stenlid, N., 1.
Sternberg, O., 1.
Södergård, A., 1.
Söyrinki, N., 1.
Tanner, V., 1, 4.
Teräsvuori, K., 1.
Thomson, P. W., 1, 2, 4.
Tuomikoski, R., 2, 3.
Ulvinen, A., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Valle, K. J., 2, 6.
Virtanen, A. I., 1.
Warén (Waris), H., 1.
Zamelis, A., 1, 2.
Åberg, G., 1, 2, 3, 5, 7, 8.

Index rerum.

AGRICULTURA, HORTICULTURA.

FAGERSTRÖM, L., 9.
HINTIKKA, T. J., 7, 8.
HÄYRÉN, E., 1 (Lps).
LINKOLA, K., 14.
STERNBERG, O., 1 (Ficus carica).

BIOCHEMIA.

BJÖRKSTÉN, J., 1 (Plant.).
—»— & HIMBERG, I., 1 (Plant.).
COLLANDER, R., 4 (Char., 0).
VIRTANEN, A. I., 1 (Plant.).

BIOLOGIA, OECOLOGIA.

Generalia.

EKLUND, O., 20 (Terminologia).
ZÄMELIS, A., 2 (Monogenesis).

Algae.

BRANDER, G., 1 (Diat.).
CEDERCREUTZ, C., 7, 15 (Chara tomentosa), 17 (Bulbochaete), 19 (Zygnemac.), 20 (Felsenalgen).
FAGERSTRÖM, L., 16.
GRÖNBLAD, R., 2 (Netrium digitus, copulatio).
HÄYRÉN, E., 8, 9 (Prasiola stipitata), 10 (Grasbälle), 12, 19 (Hibernatio), 33, 47 (Oscillatoriaceae, cop.), 50 (Vegetationsfärgning), 59 (Nitella flexilis), 66.
HERLIN, N., 5.
JÄRNEFELT, H., 1 (Phormidium mucicola).
KOTILAINEN, M. J., 23.
LEMBERG, B., 2.
VÄLIKANGAS, I., 5 (Eudesme virescens).

Fungi, Bacteria.

EKLUND, O., 64.
ELFVING, F., 8 (Bakteriernas härstamning).
FAGERSTRÖM, L., 16 (p. 129).
FREY, R., 40.
HIITONEN, I., 16 (Elaphomyces).
HÄYRÉN, E., 23 (auf krankem Gasterosteus), 44 (Peziza repanda), 61 (Saprolegnia dioica, Schwärmer), 69 (Saprolegnia, Achlya).
MALMSTRÖM, N., 3 (Frostverkan), 6, 7, 10, 11.
NYBERG, C., 3 (Bakteriernas fortplantning, 0).
SEGERSTRÅLE, C., 16 (Sphaerotilus natans, skadegörare på sikrom).

Lichenes.

EKLUND, O., 2, 38 (Parmelia scortea), 48 (Archidium alternifolium), 49 (Parm. scortea).
—»— & FORSIUS, R., 1 (Parm. scortea).
FAGERSTRÖM, L., 23.
HUSTICH, I. & PETTERSSON, B., 2.
HÄYRÉN, E., 6 (Siphula ceratites), 9, 13 (Siph. cer.), 54, 58.
LEHTONEN, L. & PANKAKOSKI, A., 1.
LEMBERG, B., 2.
LINKOLA, K., 11 (Ramalina angustissima), 21.
ROIVAINEN, H., 1.
TANNER, V., 1.

Musci.

BUCH, H., 9 (Scapania Simmonsii), 10 (Archidium alternifol.), 12 (Calypogeia).
—»— & HUSTICH, I., 1 (Diplophyllum obtusifolium).
EKLUND, O., 2, 29 (pH-Werte), 36, 40.
FAGERSTRÖM, L., 16.
HUSTICH, I., 26.
—»— & PETTERSSON, B., 2.
—»— Vide BUCH, H. & HUSTICH, I., 1.
—»— Vide ÅBERG, G. & HUSTICH, I., 1.
HÄYRÉN, E., (Hypnum orthothecioides), 54, 57, 59.
KOTILAINEN, M. J., 2 (Tunturisammal, 0), 3 (Fontinalis dichelymoides c. sporog.), 9 (Felsenmoose, Methodi), 11.
LEMBERG, B., 2.
LINKOLA, K., 21.
ROIVAINEN, H., 1.
TANNER, V., 1.
TUOMIKOSKI, R., 1.
ÅBERG, G. & HUSTICH, I., 1 (Rhytidiadelphus loreus).

Plantae vasculares.

Auer, A. V., 2.
Aulamo, O. I., 1.
Brenner, M., 2 (Picea).
Brenner, W., 1 (Ophioglossum).
Bärlund, Ulla, 1.
Cedercreutz, C., 21.
Eklund, O., 2, 5 (Keimungs- u. Schwimmvermögen der Samen), 9, 13, 15 (Cuscuta halophyta), 18, 19 (Eupatorium), 20 (Verbreitungsbiol., Terminologie), 24 (Diasporenproduktion), 25, 26 (Verbreitungsbiol.), 28, 29 (pH-Werte), 34, 35 (Crambe), 37, 40, 43 (Tarax.), 50 (Hypericum hirsutum), 51, 53 (Anthropochoren), 56, 58 (Potentilla procumbens), 61 (Fimbulvintern 1940).
Englund, B., 1, 2 (Sorbus suecica), 3 (Ranunc. ophioglossifolius), 4 (Carex distans × extensa).
Erkamo, V., 1 (Alisma gramineum).
Fagerström, L., 8 (Lamium galeobdolon), 10 (Juncus squarrosus), 11 (Cinna latifolia), 16, 17 (Epilobium).
Färdig, B. A., 5.
Gadolin, A. W., 3.
Hiitonen, I., 12, 18, 20 (Sorbus aucuparia).
Huldén, E., 1 (Fraxinus, 0).
Hustich, I., 13 (Perioditveget., Labrador), 17 (Picea, Pinus, p. 37—40), 20 (Pinus), 21 (Fjällflora), 22, 23, 26.
—»— & Pettersson, B., 2.
Häyrén, E., 9, 10 (Grasbälle), 20 (Tulipa, groddknopp), 21, 28 (Ruppia, Zannichellia), 49 (Schärenzonen), 54, 57, 59, 62, 66.
Kanerva, N., 2 (Crambe).
Klockars, B. & Luther, H., 1.
Knoll, F., 1 (Blütenbiol., 0).
Kotilainen, M. J., 6 (Moore, aciditas), 19 (Magnesiumsilikaattisubstratista, 0), 24.
Krohn, V., 1 (Vivipare Pflanzenformen).
Kujala, V., 4 (Waldtypen).
Lemberg, B., 2, 3 (Zwergwuchs), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Lindberg, Har., 31 (Juncus Welwitschii).
Linkola, K., 4 (Melica ciliata), 5 (Samenkeimlinge), 6 (Samenkeiml.), 9, 13 (Ajuga genevensis, Campanula aparinoides), 16 (Niittykasvien nuoruusaika, 0), 18 (Wiesenstauden, Jugendstadium, 0), 19 (Radices), 21, 22 (Poa compressa).
Luotola, V. L., 1 (Botrychium), 2.
Luther, H., 3 (Utricularia neglecta), 6 (Najas marina).
—»— Vide Klockars, B. & Luther, H., 1.
Malmström, N., 1 (Valeriana salina).
Marklund, G., 1 (Potentilla argentea, P. impolita), 10 (Atriplex), 11 (Empetrum).
Mikkola, E., 1 (Rubus humulifolius).
Montell, J., 4 (Sedum villosum).
Nordberg, S., 1 (Allium ursinum).
Nordman, A. F., 3 (Rubus arcticus).
Olsoni, B., 2, 6, 7 (Ruppia, Zannichellia), 9 (Valeriana offic.), 10 (Silene rupestris), 17 (Bombade tomters flora).
Palmgren, A., 5 (Juncus balticus), 6 (Suaeda), 10 (Pyrola media), 20 (Lycopod. clavatum), 37 (Blechnum spicant), 39 (Suaeda), 41 (Carex aquatilis), 46 (Betula f. Palmieri), 47.
Palmgren, Maida & A., 1 (Rubus arcticus).
Pettersson, B., 1. (Erratic Blocks, Modes of Dispersal), 2 (Tree Stumps), 3 Burnt Ground), 4 (Extreme Temperatures), 6, 10 (Arctostaphylos alpina).
—»— Vide Hustich, I. & Pettersson, B., 2.
Puolanne, M. E., 5 (Tarax.).
Roivainen, H., 1 (Regenvälder Feuerlands), 2 (Chillania pusilla).
Segerstråle, C., 1 (Utricularia, förtärande fisklarver).
Spohr, E., 1, 3 (Wasserpflanzen, Tiefenverbreitung, 0), 4 (Stratiotes aloides).
Södergård, A., 1 (Keimpflanzen).
Söyrinki, N., 1 (Vermehrung in alpin. Veget., Lps).
Tanner, V., 1, 4 (Fjällväxter vid havsstranden, Lps).
Teräsvuori, K., 1 (Niittytutkimuksia).
Tuomikoski, R., 3 (Kasvipeite vesijättömaalla).
Åberg, G., 3 (Crambe).

CECIDIA (Vide Pars Zoologica).

COLLECTIONES SOCIETATIS. (FLORA).

HÄYRÉN, E., 4.
LINDBERG, HAR., 6, 12, 16, 20, 23, 27, 29, 34, 41, 44, 50, 55, 59, 63, 64, 67.
MARKLUND, G., 12, 14, 15.

CYTOLOGIA.

COLLANDER, R., 4 (Cytoplasma, Characeae, 0).
ELFVING, F., 3 (Nucleus).
FEDERLEY, H., 5 (Kromosomtalets betydelse, 0).
JÄRVI, O., 1 (Lipokondrit, 0).
MARKLUND, G., 1 (Potentilla argentea, P. impolita, Chromos.).
MEURMAN, O., 1 (Aucuba japonica, Chromosomenketten), 2 (Cornaceae, Chromosome Numbers), 3 (Kromosomiluvun konstanssi, 0), 4 (Acer platanoides, Polyploid Biotypes).

FLORA. [1]

Algae.

CEDERCREUTZ, C., 5 (Lps), 9 (Lps), 11 (Fenn.), 14 (Fenn.), 16 (Ks), 17 (Fenn.), 18 (Fenn.), 19 (Al, Ob, Ok), 20 (Fenn.), 22 (Al, Ab), 24 (Labrador).
CLEVE-EULER, ASTRID, 1 (Al).
EHNHOLM, G., 1 (Oa).
FAGERSTRÖM, L., 1 (Ik), 16 (Ik).
GRÖNBLAD, R., 1 (N).
HERLIN, N., 5 (Ka).
HÄYRÉN, E., 2 (Lps, 0), 8 (N), 12 (St), 25 (Esth.), 30 (0m), 33 (N, Ka), 38 (Esth.), 51 (Ab), 53 (St), 56 (N), 64 (N), 66 (Fenn.), 67 (Ik), 68 (N).
LINKOLA, K., 12 (Lett).
LUTHER, H., 2 (Li).
SKUJA, H., 1 (Fenn.).
ÅBERG, G., 7 (Esth.).

Fungi.

EKLUND, O., 64 (Ab), 69 (Ab).
FREY, R., 41 (Al).
HIITONEN, I., 16 (Fenn.).
HÄYRÉN, E., 51 (Ab).
MALMSTRÖM, N., 2 (Fenn.), 3 (N), 6 (N), 13 (Ab, N), 14 (N).
NYBERG, W., 1 (N), 2 (N), 3 (N).

Lichenes.

AHLNER, S., 1 (Ks).
EKLUND, O. & FORSIUS, R., 1 (Al, Ab).
ERICHSEN, C. F. E., 1 (Ab, N, Kl), 2 (Fenn., Esth.).
FAGERSTRÖM, L., 6 (Fenn.), 21 (Kr), 23 (Ik).
FORSIUS, R., 19 (Al).
—»— Vide EKLUND, O. & FORSIUS, R., 1.
HUSTICH, I. & PETTERSSON, B., 2 (Newfoundland-Labrador).
HÄYRÉN, E., 24 (Esth.), 37 (Esth.), 39 (Esth.), 51 (Ab), 53 (St).
LINKOLA, K., 12 (Lett.).
RÄSÄNEN, V., 1 (Fenn.), 2 (Fenn.).
ÅBERG, G., 7 (Esth.), 10 (Esth.).

Musci.

BUCH, H., 11 (Fennoscandia), 12 (Fennoscandia).
EKLUND, O., 36 (Al, Ab), 46 (Al, Ab), 55 (Esth.).
FAGERSTRÖM, L., 16 (Ik), 20 (Kr).
HUSTICH, I. & PETTERSSON, B., 2 (Newfoundland-Labrador).
HÄLLSTRÖM, E. AF, 1 (Ks).
HÄYRÉN, E., 37 (Esth.), 40 (Esth.), 52 (Ab), 53 (St).
KOTILAINEN, M. J., 12 (Fennoscandia).
LINKOLA, K., 12 (Lett.).
TUOMIKOSKI, R., 1 (Kb).
ÅBERG, G., 7 (Esth.).

Plantae vasculares.

AARIO, L., 1 (St).
AUER, A. V., 1 (Ob, Ok, Lkem), 2 (Ob, Ok, Ks, Lkem), 3 (Ab), 4 (Fenn. bor.), 5 (Fenn.).
AULAMO, O. I., 1 (Ta).
BUCH, H., 18 (Fenn.).
CEDERCREUTZ, C., 4 (N).
EKLUND, O., 1 (Ab), 3 (Fenn.), 7 (Esth.), 17 (Ab), 18 (Ab), 22 (Esth.), 24 (Ab, Ka),

[1] Vide etiam Collectiones Societatis.

25 (Ab), 32 (Ab), 33 (Ab), 35 (Al, Ab, N), 37 (Al, Ab), 40 (Al, Ab), 43 (Tarax., Al, Ab), 45 (Al, Ab), 47 (Al, Ab), 50 (Al, Ab), 52 (Al, Ab), 54 (Esth.), 55 (Esth.), 56 (Esth.), 59 (Al, Ab).

Englund, B., 1 (Suecia).

Erkamo, V., 2 (Fenn.), 6 (Tb).

Fagerström L., 5 (Al, Ab, N, Ik), 9 (Ik), 11 (Fenn.), 16 (Ik), 17 (Ab, N), 18 (N), 20 (Kr), 23 (Ik).

Forsius, R., 19 (Al).

Färdig, B. A., 5 (N).

Gadolin, A. W., 1 (Al), 3 (Al), 4 (N).

Gunnarsson, J. G., 1 (Fennoscandia).

Herlin, N., 1 (Ks), 2 (Kr).

Hutonen (Hidén), I., 1 (Fenn.), 7 (Fenn.), 13 (Fennoscandia bor.), 14 (Esth.).

Hustich, I., 4 (Lkem, Le), 5 (Lkem), 6 (Lapp.), 26 (Kr), 28 (Kr).

—»— & Pettersson, B., 1 (Newfoundland-Labrador), 2 (Newf.-Labr.).

Häyrén, E., 18 (Lps), 37 (Esth.), 51 (Ab), 53 (St), 55 (Ob), 56 (N), 57 (N), 60 (Ka), 65 (Ta, Tb), 66 (Fenn.).

Idman, G. R., 3 (Ta, St).

Klockars, B. & Luther, H., 1 (Li).

Kujala, V., 3 (Lith.).

Lemberg, B., 4 (Fenn.), 6 (N), 7 (N), 8 (N).

Lindberg, Har., 8 (Fenn.), 21 (Fenn.), 22 (Fenn.), 39 (Fenn.), 42 (California, 0), 48 (Bromus, Fenn.).

Linkola, K., 2 (Ob, Lkem), 9 (Kl), 12 (Lett.), 21 (Ab), 22 (Fenn.).

Luotola, V. L., 1 (Ab).

Luther, H., 3 (Fenn.), 5 (N), 6 (Fenn.).

—»— Vide Klockars, B. & Luther, H., 1.

Marklund, G., 1 (Fenn.), 3 (N, Ta, Ob, Le, Lkem), 4 (Fenn.), 5 (Al, Ab, N, Ik, St), 7 (Fenn.), 8 (Ab, N, Ta).

Montell, J., 32 (Lkem).

Olsoni, B., 2 (Ka), 3 (Ab), 4 (Ab), 13 (Ab), 14 (Ka), 16 (Ab).

Palmgren, A., 47 (Al).

Pettersson, B., 1 (Erratic Blocks, N), 2 (Tree Stumps, N), 3 (Burnt Ground, N), 5 (Tarax., Al, Ab), 6 (Kl), 7 (Tarax., Esth.), 11 (Imp., N, 0).

Puolanne, M., 5 (Tarax., N).

Railonsala, A., 1 (Oa), 2 (Oa), 3 (Oa).

Sarvela, J., 1 (Oa).

Sonck, C.-E., 3 (Kb), 4 (Kb).

Sparre, B., 1 (Kr).

Tanner, V., 4 (Lps).

Tuomikoski, R., 2 (Kb).

Ulvinen, A., 1 (Ka), 2 (N, Sa), 5 (N, Ta, Sa, Ka).

Valle, K. J., 6 (Lps).

Åberg, G., 2 (Ab), 7 (Esth.), 8 (Ab).

FORESTALIA.

Hustich, I., 25 (Skogsgränsproblemet).

—»— & Pettersson, B., 2 (Forest limit, Labrador).

Kujala, V., 4 (Waldtypen).

Porkka, O., 1 (Metsien hiilenravitsemus, 0).

GENETICA.

Federley, H., 1 (Kongress, 0), 3 (Kongress, 0), 5 (Kromosamtalets betydelse, 0), 7 (Kongress, 0).

Palmgren, A., 49 (Nomencl., p. 443, 456).

Pettersson, B., 4 (Viola, Lamium).

Zamelis, A., 1, 2 (Monogenesis).

LIMNOLOGIA, HYDROBIOLOGIA, PLANCTON.

Buch, K., 1 (Havets produktion, 0).

Halme, E., 1 (Fosforitalous, planktontuotanto, 0).

Häyrén, E., 27 (Kongress, 0).

Järnefelt, H., 2 (Sjötyper), 3 (Petsamon limnologia, 0).

Kotilainen, M. J., 7 (Vetyionikonsentratio, 0).

Valle, K. J., 1 (Kl, 0).

Välikangas, I., 15 (Kongress, 0).

Willer, A., 1 (Strandgewässer Ostpreussens, 0).

MONSTROSITATES, TERATOLOGIA.[1]

Brenner, M., 1 (Pinus silv.).

Forsius, R., 17 (Alnus glut., fasciatio).

Hiitonen, I., 17 (Secale, Lolium multiflorum).

---

[1] Vide etiam Pathologia.

HINTIKKA, T. J., 5 (Pyrus malus), 7 (Pyr. mal.), 8 (Pyr. mal.), 9 (Barbarea vulgaris), 11 (Syringa), 12 (Pyr. mal.).
LINDBERG, HAR., 6 (Bellis, Hier. umbellat., fasc.), 23 (Campan. rotundif.), 27 (Camp. rotundif.; Fraxinus, Lilium croceum, Picea, fasc.), 34 (Athyr. filix fem., Lepidium ruderale, fasc., Linaria vulgaris, Plantago major, Nuphar luteum, fasc.), 41 (Alnus glutin., fasc., Calendula offic., Picea, fasc.), 44 (Angelica silv.), 50 (Galeopsis speciosa, Rubus idaeus), 55 (Anemone ranunc., Geum rivale, Knautia arvens., Pyrola rotundif., Salix phylicif.), 63 (Capsella, Picea), 67 (Secale, Lilium sp., fasc.).
MALMSTRÖM, N., 7 (Lentinus lepideus).
NILSSON, K., 2 (Elymus).

MORPHOLOGIA, ANATOMIA.

Algae.

CEDERCREUTZ, C., 8 (Spirogyra fluviatilis).
EKMAN, ANNA-GRETA, 1 (Laminaria digitata).

Lichenes.

ELFVING, F., 7 (Organisatio).
LINKOLA, K., 10 (Peltigera lepidophora).

Plantae vasculares.

EKLUND, O., 42 (Sorbus fennosuecica).
FORSIUS, R., 15 (Pinus silv.).
HUSTICH, I., 3 (Caltha).
LEMBERG, B., 3 (Zwergwuchs).
MALMSTRÖM, N., 1 (Valeriana salina).
NYBERGH, T., 3 (Sagittaria sagittifolia).

PALAEONTOLOGIA.

BACKMAN, A. L., 1 (Najas marina, 0).
BRANDER, G., 1 (Diat.).
CLEVE-EULER, ASTRID, 1 (Diat.).
GALENIEKS, P., 1 (Lett.).
HAMMERMANN, A., 1 (Plant.).
LINDBERG, HAR., 42 (Corylus, Trapa).
ODENWALL, E., 1 (Corylus).
THOMSON, P. W., 1 (Esth.), 2 (Lith.).
VOLTERIS, E., 1 (Lith., 0).

PATHOLOGIA.[1]

BRENNER, M., 2 (Picea).
HIITONEN, I., 9 (Prunus padus, Hexenbesen).
HINTIKKA, T. J., 1 (Solan. tuber., Synchytrium endobioticum), 2 (Prunus padus, Hexenb.), 4 (Pr. padus, Hexenb.), 5 (Pyrus malus), 6 (Pinus silv.), 10 (Betula), 13 (Thuya occid., Armillaria mellea).
JÄRNEFELT, H., 1 (Coelosphaerium Naegelianum, Phormidium mucicola).
KAIRAMO, A. O., 1 (Prun. padus, Hexenb.).
LINDBERG, HAR., 35 (Sol. tuber., Synchytr. endobiot.).

PHAENOLOGIA.

CEDERCREUTZ, C., 2, 21, 35.
HUSTICH, I., 22, 26 (p. 49—51, Herbstflora tion), 27 (Acer platanoides).
OLSONI, B., 18.
SPOHR, E., 2 (Arbeitsprogramm, 0).

PHYLOGENIA.

NYBERGH, T., 3 (Sagittaria sagittifolia).

PHYSIOLOGIA.

BJÖRKSTÉN, J., 1 (Äggvitesyntes).
—»— & HIMBERG, I., (Assimilatio).
BUCH, H., 4 (Phototropismus).
BÄRLUND, H., 1 (Permeatio).
COLLANDER, R., 1 (Chara, cellsaft, 0), 2 (Chara, permeatio, 0), 3 (Hormoner, 0), 5 (Radioaktiva indikatorer, 0).
EKLUND, O., 5 (Keimungs- u. Schwimmvermögen von Samen), 9 (Keimung), 23 (Resistibility of Seeds).
ELFVING, F., 1 (Mimosans »nerver». 0).
HUSTICH, I., 21 (Fjällfloran).
LINKOLA, K., 19 (Radices).
PETTERSSON, B., 4 (Action of Extreme Temperatures), 8 (Germination, pH-Action).
POIJÄRVI, L. A. P., 1 (Permeatio), 2 (Permeatio, 0).

---

[1] Vide etiam Monstrositates, Teratologia.

Porkka, O., 1 (Metsienhiilenravitsemus, 0).
Svedelius, N. E., 1 (Lamentaria rosea, 0).
Waris, H., 4 (Hiilihapon oton määräämi-nen, 0).

PHYTOGEOGRAPHIA.

Generalia.

Cajander, A. K., 1 (0).
Eklund, O., 20 (Terminolog. Begriffsbil-dung), 28 (Methodi), 45 (Neueinteilung SW-Finnlands), 53 (Anthropochoren).
Hryniewiecki, B., 1 (Pflanzenareale, Po-len, 0).
Hustich, I., 14 (Fennia, Kartierung), 18 (Forskningsuppgifter i Lappland), 25 (Skogsgränsproblemet).
—»— & Pettersson, B., 2 (Forest limit, Labrador).
Häyrén, E., 21 (Kongress), 29 (Kongress), 37 (Kongress), 48 (Kongress), 49 (Schä-renzonen).
Kotilainen, M. J., 24 (Fennoskandian kaakkoisraja), 25 (D:o).
Kujala, V., 3 (Kongress), 5 (Kasvillisuus-raja, Fenn., 0).
Kupffer, K. R., 1 (Ostbalticum, 0), 2 (Methodi), 3 (Ostbalticum, Kartierung).
Linkola, K., 12 (Kongress).
Lippmaa, T., 6 (Phytogeogr. Provinzen, Esth.).
Malta, N., 2 (Florenelemente, Curonia).
Palmgren, A., 29 (Tillfälligheten som bio-geogr. faktor, 0) 34 (Methodi), 50 (Ru-deratflora).
Regel, C., 3 (Strandvegetation, N-Europa), 5 (Begrenzung von Gebieten).
Stamm, I., 1 (Pharmakogeographische Ar-beitsgemeinschaft).
Thomson, P. W., 4 (Arktisch-alpine Re-likte, Esth.).
Zamelis, A., 1 (Bedeutung der Genetik).
Ziegenspeck, H., 1 (Kurische u. Leba-Nehrung, 0).

Algae.

Cedercreutz, C., 11 (Characeae; Fenn.).
Fagerström, L., 16 (Ik).
Häyrén, E., 19 (Meereseis u. Algen).

Fungi.

Fagerström, L., 16 (Ik).
Hiitonen, I., 16 (Elaphomyces; Fenn.).

Lichenes.

Eklund, O., 49 (Parmelia scortea; Al).
—»— & Forsius, R., 1 (Parm. scortea; Al, Ab).
Hustich, I. & Pettersson, B., 2 (New-foundland-Labrador).
Linkola, K., 11 (Ramalina angustissima; Fenn.) 22 (Ab).
Roivainen, H., 1 (Feuerland).

Musci.

Buch, H., 10 (Archidium alternifolium), 12 (Calypogeia).
Eklund, O., 36 (Al, Ab), 48 (Archid. alternifol.; Ab).
Fagerström, L., 16 (Ik), 20 (Kr.).
Hustich, I. &. Pettersson, B., 2 (New-foundl.-Labrador).
Kotilainen, M. J., 15 (Anoectangium compactum; Kl), 12 (Fennoscandia).
Linkola, K., 22 (Ab).
Malta, N., 1 (Ostbalticum).
Roivainen, H., 1 (Feuerland).

Plantae vasculares.

Bärlund, Ulla, 1 (Al).
Cedercreutz, C., 6 (Potamogeton zosteri-folius; Al), 10 (N).
Eichwald, K., 1 (Rubus arcticus; Esth.).
Eklund, O., 3 (Rumex thyrsiflorus; Fenn.), 5, 9, 13 (Epilob. adenocaulon; Ka), 14, 15 (Cuscuta halophyta; Ab), 16 (Potentilla Egedi; Ab), 21 (Halophyta), 22 (Esth.), 25 (Ab), 26 (Allium ursinum; Ab), 34 (Alliaria officinalis, Festuca polesica; Ab), 35 (Crambe maritima; Al, Ab, N), 37 (Al, Ab), 41 (Viola »epipsila»× palustris; Al, Ab), 42 (Sorbus fennosuecica; Al), 43 (Tarax.; Al, Ab), 47 (Al, Ab), 50 (Hyperic. hirsutum; Al, Ab), 51 (Ab), 58 (Potentilla procumbens; Ab), 59 (Al, Ab), 60 (Al, Ab; termisk faktor).

ENGLUND, B., 3 (Ranunc. ophioglossifolius; Gotland), 4 (Carex distans × C. extensa; Gotland).

ERKAMO, V., 1 (Alisma gramineum; Ka), 2 (Fenn.), 4 (Geran. bohemicum; SE-Fenn.).

FAGERSTRÖM, L., 8 (Lamium galeobdolon; Fenn.), 11 (Cinna latifolia; N), 12 (Epilob. adenocaulon; Fenn.), 13 (Thlaspi alpestre; Al), 16 (Ik), 17 (Epilobium; Ab, N), 18 (N), 19 (Kr), 20 (Kr).

FORSIUS, R., 14 (Lepidium latifolium; Al), 16 (Lemna gibba; Al).

HIITONEN (HIDÉN), I., 2 (Ob), 4 (Festuca gigantea; N), 12, 13 (Arenaria; Fennoscandia bor.), 19 (Agropyrum junceum; Ab), 21 (Poa glauca; Ta).

HUSTICH, I., 1 (Le), 5 (Lkem), 9 (Elymus arenarius; Le, Li), 22 (Li), 24 (Kr), 26 (Kr), 27 (Acer platanoides; Kr), 28 (Kr).

—»— & PETTERSSON, B., 2 (Newfoundl.-Labrador).

HÄYRÉN, E., 60 (Antropokorer, apofyter; Ka).

KALELA, A., 2 (Carex polygama; Fenno-Balticum).

KOTILAINEN, M. J., 8-(Kl), 16 (Carex paniculata; Ik, St).

KUJALA, V., 1 (Geranium pratense; Ka).

LEMBERG, B., 4 (Polygonum foliosum; Fenn.), 5 (Corylus; N), 6 (N), 7 (N), 8 (N), 11 (Rumex thyrsiflorus; N), 12 (Viola Selkirkii; N).

LINDBERG, HAR., 19 (Puccinellia phryganodes; Om), 21 (Leonurus cardiaca; Fenn.), 31 (Juncus Welwitschii; Britannia), 39 (Juncus ranarius; Fenn.), 68 (Relikter; Oa, Om, Ob), 69 (Relikter; Ab).

LINKOLA, K., 4 (Melica ciliata; Ab), 9 (Kl), 13 (Ajuga genevensis, Campan. aparinoides; Sa, Ta), 21 (Ulmus scabra; Ab), 22 (Poa compressa; Fenn.).

LUTHER, H., 3 (Utricularia neglecta; Fenn.), 6 (Najas marina; Fenn.).

MALTA, N., 2 (Curonia).

MARKLUND, G., 1 (Potentilla decora; Fenn. P. impolita ssp. acutifida; N.).

MONTELL, J., 22 (Carex lapponica et hybr.; Lkem, Le, Li).

OLSONI, B., 10 (Silene rupestris; SW-Fenn.).

PALMGREN, A., 1 (Juncus balticus; N), 2 (Torilis Anthriscus; Al), 3 (Epilobium rubescens; Al), 4 (Carex brunnescens; Al), 5 (Juncus balticus; Al), 6 (Suaeda maritima; Al), 7 (Salix repens * rosmarinifolia; Al), 8 (Geranium pratense; Al), 9 (Thymus chamaedrys; Al), 10 (Pyrola media; Al), 11 (Potamogeton polygonifolius; Al), 12 (Calamagrostis arundinacea; Al), 13 (Carex arenaria; Al), 14 (Fritillaria Meleagris; Al), 15 (Polygonum Persicaria; Al), 16 (Lepidium campestre; Al), 17 (Ajuga pyramidalis, Al), 18 (Thymus Serpyllum; Al), 19 (Botrychium multifidum; Al), 20 (Lycopodium clavatum; Al), 21 (Ruppia spiralis; Al), 22 (Aquilegia vulgaris; Al), 23 (Litorella uniflora; Al), 37 (Blechnum spicant; Al), 39 (Suaeda maritima; Al), 41 (Carex aquatilis; Al), 46 (Torilis Anthriscus; Al), 47 (Al), 51 (Herminium monorchis; Al).

PALMGREN, MAIDA & A., 1 (Rubus arcticus; Al), 2 (Myagrum perfoliatum; Al), 3 (Potentilla norvegica; Al).

PETTERSSON, B., 1, 3, 5 (Tarax.; Al, Ab), 10 (Arctostaphylos alpina; Ab).

PUOLANNE, M. E., 1 (Rumex maritimus; N), 5 (Tarax.; N).

ROIVAINEN, H., 1 (Feuerland).

RÜHL, A., 1 (Esth.).

SKOTTSBERG, C., 1 (Juan Fernandez).

THOMSON, P. W., 4 (Relikte; Esth.).

ULVINEN, A., 1 (Ka).

PHYTOSOCIOLOGIA.

Generalia.

HUSTICH, I., 15 (Växttopografi o. växtsociologi), 18 (Forskningsuppgifter i Lappland).

LIPPMAA, T., 1 (Begriff u. Begrenzung der Assoziationen), 2 (Einschichtassoziation), 5 (Phytosoziolog. Kartierung, Esth.).

REGEL, C., 3 (Strandvegetation, N-Europa).

WARIS, H., 3 (Kombinationskreise).

Varia.

CEDERCREUTZ, C., 20 (Felsenalgen; Fenn.).

EKLUND, O., 14 (Ab), 36 (Al, Ab), 43 (Al, Ab).

Fagerström, L., 4 (Ik), 20 (Kr).
Hiitonen, I., 14 (Esth.).
Hustich, I., 26 (Kr), 28 (Kr).
—»— & Pettersson, B., 2 (Newfoundl.-Labrador).
Häyrén, E., 9 (Lps), 41 (N, 0), 49 (N), 54 (N), 59 (N).
Krogerus, R. & Lemberg, B., 1 (Ka, Om).
Lemberg, B., 2 (N), 6 (N), 7 (N), 8 (N), 9 (N), 12 (N).
Linkola, K., 2 (Ob, Lkem), 4 (Ab), 9 (Kl).
Lippmaa, T., 7 (Esth.).
Olsoni, B., 2 (Ka).
Palmgren, A., 47 (Al).
Pettersson, B., 10 (Ab).
Skottsberg, C., 1 (Juan Fernandez).
Söyrinki, N., 1 (Lps).
Tanner, V., 1 (Lps).

SYNONYMIA, NOMENCLATURA.

Cedercreutz, C., 19 (Alg.).
Lindberg, Har., 46 (Lactuca), 62 (Carex).
Malmström, N., 8 (Calvatia), 12 (Gyrodon).
Palmgren, A., 53 (Carex).

SYSTEMA ET FORMAE NOVAE.

Generalia.

Zamelis, A., 1 (Bedeutung der Genetik).

Algae.

Brander, G., 1 (Diat.).
Cedercreutz, C., 8 (Spirogyra), 9 (Desmid.), 11 (Charac.), 14 (Zygnemac.), 19 (Zygnemac.).
Cleve-Euler, Astrid, 1 (Diat.).
Grönblad, R., 1 (Desmid.).
Häyrén, E., 19 (Hormidium).

Fungi.

Frey, R., 40 (Tricholoma).
Häyrén, E., 19 (Phlyctochytrium), 44 (Peziza).
Malmström, N., 8 (Calvatia), 9 (Peziza), 10 (Boletus), 11 (Boletus), 12 (Boletus, Gyrodon).
Nyberg, W., 1 (Boletus, Sclerotinia), 4 (Bovistella).

Lichenes.

Erichsen, C. F. E., 1 (Verrucaria, Schismatomma, Parmelia, Xanthoria), 2 (Pertusaria).
Gyelnik, V., 1 (Peltigera).
Häyrén, E., 26 (Gyrophora).
Lynge, B., 3 (Rhizocarpon).
Räsänen, V., 1 (Haematomma, Gyrophora), 2 (Usnea).

Musci.

Buch, H., 1 (Cladopodiella), 6 (Lophozia, Sphenolobus), 12 (Calypogeia), 15 (Lophocolea), 19 (Sphenolobus, Lophozia).
—»— & Tuomikoski, R., 1 (Scapania).

Plantae vasculares.

Buch, H., 3 (Origanum, fl. ros.), 13 (Tanacetum).
Eklund, O., 1 (Myosotis), 10 (Myosotis), 11 (Sedum), 12 (Allium), 13 (Epilobium), 14 (Juncus), 15 (Cuscuta), 16 (Potentilla), 22 (Centaurium), 25 (Sonchus), 30 (Polygonatum), 37 (Epilobium), 40 (Sorbus, Aster), 41 (Viola), 42 (Sorbus), 43 (p. 201, Tarax.), 52 (Odontites), 58 (Potentilla).
Englund, B., 1 (Carex).
Fagerström, L., 10 (Juncus), 14 (Roripa), 17 (Epilobium).
Gunnarsson, J. G., 1 (Betula).
Hiitonen (Hidén), I., 1 (Carex), 7 (Valeriana), 10 (Sorbus), 11 (Intermediäre Arten), 13 (Arenaria).
Häyrén, E., 18 (Salix).
Kalela, A., 2 (Carex).
Kotilainen, M. J., 21 (Carex).
Lindberg, Har., 24 (Lamium, mut.), 31 (Juncus), 36 (Alnus), 37 (Valeriana), 38 (Myosotis), 39 (Juncus), 43 (Tarax., 0), 52 (Utricularia), 58 (Erigeron), 62 (Carex).
Lindström, A., 1 (Rosa).
Luther, H., 3 (Utricularia).
Marklund, G., 1 (Potentilla), 3 (Carex, Potentilla), 4 (Ranunculus), 5 (Potentilla), 6 (Potentilla), 7 (Odontites), 8 (Plantago), 9 (Sonchus), 10 (Atriplex), 11 (Empetrum).

Montell, J., 1 (Heleocharis), 6 (Alsine), 9 Luzula), 11 (Draba), 12 (Stellaria), 13 (Stellaria), 14 (Carex), 15 (Carex), 16 (Cystopteris), 18 (Agropyron), 20 (Carex), 21 (Agrostis), 22 (Carex), 25 (Calamagrostis, Deschampsia, Carex), 26 (Euphrasia), 28 (Calamagrostis), 29 (Calamagrostis), 31 (Rhinanthus), 33 (Calamagrostis), 34 (Achillea).

Palmgren, A., 37 (Blechnum), 44 (Calamagrostis), 45 (Betula), 56 (Carex), 68 (Carex).

Roivainen, H., 2 (Chillania).

Saxén, U., 1 (Carex), 3 (Carex).

Sonck, C.-E., 3 (Utricularia).

TECHNICA, METHODI.

Björkstén, J., 1 (Plant., Biochem.).

Eklund, O., 28 (Floristik).

Kotilainen, M. J., 9 (Felsenmoose).

Kupffer, K. R., 2 (Phytogeogr.).

Lindberg, Har., 30 (Plant., gråpapper), 40 (Rosa).

Palmgren, A., 34 (Phytogeogr., Floristik).

TOPOGRAPHIA.

Eklund, O., 2 (Ab), 8 (Ik).

Fagerström, L., 5 (Ik), 9 (Ik), 20 (Kr).

Färdig, B. A., 5 (N).

Hustich, I., 15 (Generalia), 26 (Kr).

Lemberg, B., 2 (N), 11 (N).

Olsoni, B., 2 (Ka).

VEGETATIO.

Buch, H., 5 (NW-Spanien), 14 (N, 0).

Eklund, O., 8 (Esth.).

Hustich, I., 10 (Lapp., 0), 26 (p. 52—61, Kr).

Häyrén, E., 2 (Alg., Lps, 0), 9 (Lps), 17 (Lps).

Kujala, V., 2 (Canada, 0).

Lemberg, B., 1 (Kustdyner, 0), 2 (Sandstränder, N), 6 (N), 7 (N).

Lindberg, Har., 3 (Tunisien, 0), 11 (Högatlas, 0).

Linkola, K., 9 (Kl).

Lippmaa, T., 3 (Esth., 0).

Motyka, J., 1 (Polen, 0).

Rantaniemi, P. A., 1 (Ob, 0).

Regel, C., 1 (Lith., 0), 2 (Balkan, 0), 3 (Strandvegetation, N-Europa).

Skottsberg, C., 1 (Juan Fernandez).

Spohr, E., 1 (Embach-Tal).

Söyrinki, N., 1 (Lps), 2 (Bayern, 0), 3 Oulankajoki, Pääjärvi, 0).

Thomson, P. W., 1 (Esth.), 3 (Esth.).

VERBAND FENNO-BALTISCHER PFLANZENGEOGRAPHEN.

Häyrén, E., 21, 29, 37, 48.

Kujala, V., 3.

Linkola, K., 12.

Index specierum.

ALGAE.

Achnanthes affinis **12** : 182.
— Biasolettiana f. minuta **10** : 298.
— brevipes **10** : 298.
— — v. intermedia **10** : 298.
— Clevei **10** : 298.
— delicatula v. rostrata **10** : 298.
— exigua **10** : 298.
— exilis **10** : 298.
— Hauckiana **10** : 298.
— lanceolata **12** : 182.
— — v. dubia **10** : 298.
— linearis **10** : 298; **14** : 60.
— — v. pusilla **10** : 298.
— longipes **10** : 298.
— marginulata **14** : 60.
Achnanthes microcephala **12** : 182.
— minutissima **10** : 298; **12** : 182; **14** : 60.
— — v. cryptocephala **12** : 182; **14** : 60.
Actinastrum Hantzschii **13** : 38; **20** : 8.
Actinocyclus **10** : 315.
— crassus **10** : 289, 298.
— Ehrenbergii **10** : 298.
Aegagropila **4** : 96.
— Martensii **4** : 187, 189, 191; **6** : 80; **7** : 176; **9** : 173; **10** : 96, 239; **12** : 255; **13** : 23, 24; **14** : 109, 172; **15** : 196; **20** : 147, 152.
Amphiprora sp. **4** : 65; **10** : 290.
Amphora acutiuscula **10** : 298.
— baltica **9** : 174 (fig.).
— capitata **9** : 174 (fig.), 175.

Amphora coffaeiformis **10** : 289; **12** : 182.
— — v. borealis **10** : 298.
— commutata **10** : 298.
— cruciata **9** : 174 (fig.), 175.
— libyca **10** : 298.
— macilenta v. typica **10** : 298, 318.
— marina **10** : 298.
— mexicana v. major **9** : 174; **10** : 293, 295, 296, 298.
— Normani **12** : 182.
— ovalis **10** : 296, 297, 298; **12** : 182; **14** : 60.
— — f., v. gracilis **10** : 298; **12** : 182.
— — v. pediculus **12** : 182.
— pediculus **10** : 298.
— veneta **10** : 292, 298; **12** : 182.
— sp. **4** : 66, 78, 82; **10** : 290.
Anabaena augstumalis **20** : 10.
— baltica **16** : 2, 3.
— cylindrica **17** : 78.
— flos aquae **13** : 47.
— laxa **5** : 156; **7** : 247.
— oscillarioides **7** : 247; **17** : 106, 115.
— subcylindrica **12** : 52; **13** : 47.
— sp. **4** : 50, 186, 187; **5** : 156; **6** : 80; **7** : 247; **10** : 264; **14** : 61; **17** : 77; **19** : 83, 85; **20** : 6, 10.
Anabaeniopsis **5** : 156.
Ankistrodesmus falcatus **10** : 264; **12** : 47, 183; **13** : 38; **17** : 127; **19** : 218; **20** : 7, 10.
— — v. acicularis **19** : 218.
— — v. radiatus **20** : 6.
— — v. spirilliformis **20** : 10.
— spiralis **14** : 56.
Anomoeoneis brachysira **10** : 298.
— exilis **12** : 182; **14** : 60.
— polygramma **10** : 294, 298.
— sculpta **9** : 174; **10** : 298.
— serians v. brachysira **14** : 60.
— sphaerophora **10** : 298, 318.
Aphanizomenon flos aquae **9** : 172; **13** : 47; **16** : 2, 3; **20** : 6.
Aphanocapsa distans **10** : 264.
— elachista **10** : 264; **14** : 61; **20** : 8.
— — v. conferta **7** : 246.
— Grevillei **17** : 6, 105.
— montana **5** : 141, 154; **17** : 105 . . . 120.
— muscicola **13** : 47; **17** : 105, 107 . . . 113, 128.
— pulchra **5** : 154; **14** : 61; **20** : 5.
— rivularis **5** : 154.
— sp.? **5** : 154.
Aphanochaete repens **10** : 264; **13** : 38; **17** : 127.
Aphanothece Castagnei **4** : 51, 52, 187, 189; **5** : 154; **6** : 174—176; **7** : 175, 246; **12** : 181; **14** : 61; **16** : 3; **17** : 77; **20** : 5, 7.
— endophytica **19** : 83.
— microscopica **5** : 141, 154; **7** : 238, 246; **10** : 264; **12** : 51; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 105, 111; **20** : 5.
Aphanothece microspora **5** : 154; **7** : 246.
— Naegelii **7** : 175; **17** : 105 . . . 116.
— nidulans **20** : 5.
— pallida **5** : 141, 154, 155, 157; **7** : 246; **17** : 105 . . . 117.
— saxicola **5** : 141, 154; **7** : 246; **12** : 51; **17** : 105 . . . 120; **20** : 147.
— stagnina **6** : 80; **20** : 6, 7.
Arthrodesmus bifidus **5** : 152.
— Bulnheimii **13** : 44.
— convergens **5** : 152; **13** : 44; **17** : 128; **19** : 86.
— impar **10** : 262.
— incus **5** : 152; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 221.
— — f. minor **14** : 58.
— — v. extensus **5** : 152; **10** : 262; **13** : 44; **14** : 58.
— — v. indentatus **10** : 262.
— — v. Ralfsii **5** : 152; **13** : 44.
— — v. subquadratus **10** : 262.
— — v. — forma **10** : 262.
— — v. — f. minor **10** : 262.
— octocornis **5** : 152; **10** : 262; **13** : 45; **17** : 106, 113, 128; **19** : 85.
— tenuissimus **7** : 245; **12** : 50; **13** : 45.
— triangularis **7** : 245; **10** : 262; **13** : 45; **17** : 128; **19** : 221.
— — f. triquetra **5** : 152.
Asterionella sp. **20** : 8.
Asterocystis ramosa **6** : 175, 178; **7** : 177; **9** : 173; **17** : 78.
Bambusina Borreri **10** : 264; **12** : 51; **13** : 34, 46; **14** : 58; **19** : 222.
— Brébissonii **5** : 154; **7** : 246.
Bangia atropurpurea **4** : 188; **20** : 152.
— fuscopurpurea **13** : 23, 25.
Batrachospermum arcuatum **9** : 140.
— corbula **9** : 140.
— ectocarpum **9** : 140.
— Dillenii **9** : 140.
— helminthosum **9** : 140.
— moniliforme **9** : 140.
— — ssp. helminthoideum **9** : 140.
— — ssp. scopula **9** : 140.
— pyramidale **9** : 140.
— sporulans **9** : 140.
— vagum **10** : 258; **19** : 85, 86; **20** : 9.
— — ssp. keratophyllum **9** : 140; **12** : 51; **13** : 46.
— virgato-Decaisneanum **9** : 141.
Binuclearia tatrana **20** : 8, 10.
— tectorum **17** : 107 . . . 113; **19** : 218.
Botryococcus Braunii **10** : 264; **12** : 47, 183; **13** : 39; **16** : 3; **17** : 106, 112, 113, 127; **19** : 85, 86, 218.
— protuberans **10** : 264.
Brachiomonas simplex **20** : 10.
— submarina **20** : 10.

Bulbochaete angulosa **14** : 26.
— borealis **14** : 26.
— Brébissonii **14** : 26.
— crassiuscula **14** : 26.
— crenulata **14** : 26.
— dispar **14** : 26.
— gigantea **14** : 26.
— insignis **14** : 26.
— intermedia **12** : 47; **13** : 38; **14** : 26.
— megastoma **14** : 26.
— minor **14** : 26.
— mirabilis **5** : 139, 148; **12** : 47; **14** : 26; **19** : 85, 86.
— monile **14** : 26.
— nana **14** : 26.
— Nordstedtii **5** : 148; **14** : 26.
— polyandria **14** : 26; **19** : 85.
— pygmaea **14** : 26; **19** : 85.
— pyrulum **14** : 26.
— quadrata **14** : 26.
— rectangularis **13** : 38; **14** : 26; **19** : 85.
— repanda **14** : 26.
— sessilis **12** : 47; **14** : 26.
— setigera **14** : 26.
— subintermedia **14** : 26.
— tenuis **13** : 38; **14** : 26.
— valida **14** : 26.
— varians **14** : 26.
— sp. **4** : 187, 188; **5** : 141, 148; **7** : 241; **13** : 24; **14** : 56; **19** : 85, 218; **20** : 9.
Caelastrum vide Coelastrum.
Caelosphaerium vide Coelosphaerium.
Caloneis aemula **10** : 298.
— amphisbaena **10** : 298.
— — v. subsalina **10** : 298.
— brevis **10** : 298.
— formosa v. holmiensis **9** : 174; **10** : 298.
— furcata **9** : 175.
— silicula **10** : 289, 298.
— — v. inflata **10** : 298.
— — v. undulata **10** : 298.
— — v. ventricosa **10** : 300.
Calothrix Braunii **17** : 106, 115; **19** : 85; **20** : 7, 8, 10.
— parietina **10** : 225; **17** : 28, 79, 106 . . . 120.
— scopulorum **1** : 7; **4** : 53, 187, 188, 190; **5** : 139; **6** : 175, 176; **7** : 175; **12** : 181; **13** : 24; **15** : 191; **19** : 217; **20** : 7.
Campylodiscus bicostatus **10** : 300.
— clypeus **9** : 174; **10** : 292—297, 300, 315, 318.
— echineis **10** : 300, 322.
Castagnea virescens **4** : 59.
Ceramium Areschougii **19** : 217.
— diaphanum **4** : 51, 52, 58, 183; **6** : 179; **7** : 176, 177; **9** : 172; **12** : 185; **13** : 23, 25; **15** : 223, 225; **17** : 78; **20** : 147, 152, 153.
— gracillimum **20** : 152.
— rubrum **6** : 179.
Ceramium tenuissimum **4** : 188; **6** : 177, 179.
— sp. **9** : 173.
Ceratium carolineanum **19** : 217.
— cornutum **10** : 264.
— hirundinella **6** : 159.
Ceratoneis arcus **14** : 59.
— — v. amphioxys **14** : 59.
— — v. linearis **14** : 59.
Chaetoceras Clevei **10** : 318, 319.
— curvisetum **10** : 300, 318, 319.
— groenlandicum **10** : 300, 318, 319.
— paradoxum **10** : 319.
Chaetomorpha tortuosa **17** : 77.
— sp. **10** : 239; **13** : 24.
Chaetophora elegans **5** : 148; **13** : 38; **17** : 123, 127; **20** : 7.
— incrassata **6** : 80.
— tuberculosa **20** : 5.
Chamaesiphoneae sp. **5** : 142.
Chaetosphaeridium Pringsheimii **10** : 264.
Chantransia chalybaea **20** : 9.
Chara aspera **4** : 51 . . . 56, 187 . . . 191; **5** : 139; **6** : 80, 178; **7** : 176; **8** : 243, 244, 248, 250; **12** : 184; **13** : 25; **14** : 109; **15** : 45, 107, 195; **17** : 26, 44, 78, 344; **20** : 5.
— baltica **4** : 189, 190; **8** : 244, 248, 250; **12** : 184.
— ceratophylla **4** : 56; **6** : 6.
— contraria **14** : 108, 172; **20** : 5.
— coronata **8** : 248, 249; **11** : 269.
— crinita **4** : 189; **8** : 244, 248, 249.
— foetida **14** : 108.
— fragilis **4** : 187, 188, 190; **6** : 80; **8** : 233, 242, 243, 248, 252; **12** : 47; **15** : 45, 275.
— — v. delicatula **8** : 253.
— hispida **12** : 184.
— horrida **8** : 244, 248, 250.
— intermedia **8** : 242, 248, 250; **20** : 5.
— strigosa **14** : 108—110 (mp.).
— tomentosa **4** : 51, 56, 189; **7** : 157; **8** : 244, 248, 249, 275; **11** : 191—192; **13** : 25; **15** : 195; **17** : 78.
— sp. **2** : 41, 111; **8** : 253; **17** : 48.
Characium Braunii? **10** : 264.
— urnigerum **10** : 264.
Chlamydomonas sp. **5** : 135—138; **20** : 6, 7, 10.
Chlorella vulgaris **17** : 107 . . . 120.
— sp. **17** : 120.
Chlorochytrium sp. **4** : 187, 188, 190.
Chlorococcum infusionum **20** : 7.
— sp. **11** : 205.
Chlorophyceae sp. [**4** : 75].
Chlorosarcina elegans **6** : 175, 177.
— — f. minor **6** : 177.
Chodatella ciliata **10** : 264, 269 (fig.).
Chorda filum **4** : 57, 59, 65; **7** : 177; **15** : 223; **17** : 78; **20** : 153.
Chroococcus cohaerens **12** : 178, 181; **17** : 106, 107.
— cumulatus **5** : 154.

Chroococcus dispersus **7** : 246; **14** : 61.
— giganteus **19** : 83.
— lithophilus **17** : 106, 107.
— macrococcus **5** : 154.
— — f. stipitatus **5** : 154.
— minor **14** : 61; **20** : 5.
— minutus **4** : 187—189; **5** : 154; **7** : 246; **10** : 264; **13** : 47; **17** : 29, 106, 114, 128.
— montanus **17** : 106, 112, 115; **19** : 83.
— pallidus **17** : 28, 106, 107.
— schizodermaticus **17** : 106, 121.
— spelaeus v. violascens **17** : 106, 107, 108 (fig.), 116, 117.
— tenax **17** : 106 . . . 116.
— turgidus **4** : 187—189; **5** : 141, 154; **6** : 175, 176; **7** : 237, 246; **10** : 264; **12** : 51, 181; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 29, 79, 106 . . . 115; **19** : 217; **20** : 5.
— varius **6** : 175, 176; **17** : 106; **20** : 148.
— Westii **5** : 141, 155; **17** : 106, 107.
— sp. **7** : 246; **10** : 264.

Cladophora crispata **6** : 80.
— crystallina **4** : 55, 56, 188, 191; **6** : 177; **7** : 176.
— fracta **6** : 80, 175—178; **7** : 175, 176; **9** : 173; **12** : 181, 183; **13** : 24; **14** : 129; **17** : 26, 77, 78; **20** : 147, 153.
— glomerata **4** : 51, 56, 183 . . . 191; **5** : 140; **6** : 177, 178; **7** : 157, 176; **9** : 172; **12** : 183; **13** : 23, 24; **15** : 223, 225; **16** : 2; **17** : 26, 77, 78; **20** : 147, 152, 153.
— marina **4** : 50, 51, 56, 186 . . . 191; **17** : 77, 78.
— rupestris **4** : 51, 55, 186 . . . 191; **6** : 177; **9** : 172, 173; **12** : 183; **13** : 23, 24; **15** : 191.
— sericea **4** : 186.
— sp. **4** : 51, 65, 187.

Closterium abruptum **13** : 40.
— — v. brevius **7** : 241 (fig.).
— acerosum **10** : 260.
— acutum **10** : 260; **12** : 47; **13** : 40.
— angustatum **5** : 148; **10** : 260; **13** : 40; **19** : 218.
— Archerianum **13** : 40.
— attenuatum **12** : 47.
— Baileyanum **10** : 260; **12** : 47; **13** : 40; **17** : 127; **19** : 218.
— cornu **10** : 260; **13** : 40.
— costatum **5** : 148; **10** : 260; **12** : 47; **13** : 40; **17** : 127; **19** : 86, 218.
— cynthia **10** : 260; **13** : 40; **14** : 56; **17** : 127; **19** : 218.
— Dianae **5** : 148; **7** : 241; **10** : 260; **13** : 40; **19** : 218.
— — v. pseudodianae **12** : 47.
— didymotocum **13** : 40.
— eborascense **19** : 218.
— Ehrenbergii **13** : 40.
— exiguum **10** : 260, 265, 266 (fig.), 267.
— gracile **5** : 148; **10** : 260; **13** : 40; **19** : 218.
— — v. elongatum **10** : 260.

Closterium incurvum **10** : 260; **13** : 40.
— intermedium **7** : 241; **10** : 260; **12** : 48; **13** : 40; **17** : 127; **19** : 86, 218.
— Jenneri **5** : 148; **10** : 260; **13** : 40; **17** : 127.
— juncidum **10** : 260; **19** : 219.
— — v. brevius **13** : 40; **17** : 127; **19** : 219.
— Kuetzingii **5** : 148; **10** : 260; **12** : 48; **13** : 40; **19** : 219.
— Leibleinii **7** : 241 (fig.); **12** : 48; **14** : 56.
— libellula **7** : 241; **12** : 48; **13** : 40; **14** : 56; **17** : 127; **19** : 86, 219.
— — v. intermedium **7** : 241; **10** : 260; **12** : 48; **14** : 56; **19** : 219.
— lineatum **5** : 148; **13** : 40; **19** : 219.
— lunula **10** : 260; **12** : 48; **13** : 40; **17** : 127; **20** : 6.
— moniliferum **10** : 260;[1] **12** : 48; **13** : 40; **17** : 127; **19** : 219.
— navicula **5** : 149; **10** : 260; **13** : 40; **19** : 219.
— nematodes v. proboscideum **10** : 260.
— parvulum **5** : 141, 149; **7** : 237, 241; **12** : 48, 184; **13** : 40; **14** : 56; **17** : 106 . . . 121; **19** : 86, 219.
— — v. angustum **10** : 260.
— porrectum **19** : 219.
— pronum **10** : 260.
— pseudodianae **10** : 260.
— pseudolunula **7** : 241; **13** : 40; **17** : 127.
— pusillum **19** : 219.
— — v. monolithum **7** : 241 (fig.); **17** : 106.
— Ralfsii **19** : 219.
— — v. hybridum **10** : 260; **12** : 48; **13** : 40; **19** : 219.
— regulare **5** : 149; **13** : 40.
— rostratum **5** : 149; **7** : 242; **12** : 48; **13** : 40; **14** : 56; **17** : 127; **20** : 8.
— — v. brevirostratum **10** : 260.
— setaceum **10** : 260; **13** : 40; **19** : 219.
— spetsbergense v. laticeps **10** : 260.
— striolatum **5** : 149; **7** : 242; **10** : 260; **12** : 48; **13** : 40; **17** : 127; **19** : 219; **20** : 6.
— subulatum **7** : 242.
— tumidum **7** : 242; **13** : 40; **14** : 56; **19** : 219.
— — v. nylandicum **7** : 242; **14** : 56.
— turgidum **12** : 48; **13** : 40; **17** : 127.
— Ulna **7** : 242; **10** : 260; **12** : 48; **13** : 40; **17** : 127.
— Venus **5** : 149; **10** : 260; **12** : 48; **13** : 40; **14** : 56; **17** : 127; **19** : 219.
— sp. **5** : 142; **7** : 238; **20** : 7.
Coccomyxa dispar **17** : 107 . . . 120 (fig.); **19** : 83; **20** : 148.

Cocconeis flexella **10** : 217, 289.
— pediculus v. baltica **10** : 300.
— placentula **10** : 296, 300.
— scutellum **10** : 292—296, 300, 315.

[1] Per errorem moniliforme.

Cocconeis scutellum v. ornata **10** : 300.
— — v. stauroneiformis **10** : 300.
— sp **4** : 50.
Coelastrum (Caelastrum) cambricum **10** : 264; **13** : 38; **19** : 86.
— microporum **10** : 264; **12** : 47, 183; **13** : 38; **17** : 127.
— morus **10** : 264, 266 (fig.), 267.
— proboscideum **13** : 38.
— scabrum **10** : 264.
— sphaericum **10** : 264.
Coelosphaerium (Caelo-) Kuetzingianum **5** : 155; **10** : 264; **12** : 181; **13** : 47.
— Naegelianum **6** : 149—151 (fig.); **12** : 51, 181; **13** : 47; **20** : 6.
Coleochaete divergens **10** : 264; **19** : 85.
— irregularis **12** : 47; **19** : 85.
— orbicularis **20** : 8.
— scutata **13** : 38; **19** : 85.
— soluta **19** : 85.
— sp.? **10** : 264.
Corallina officinalis **12** : 255.
Coscinodiscus **9** : 174.
— asteromphalus **10** : 300.
— hyperboreus **10** : 316, 319.
— lacustris v. hyperboreus **10** : 319.
— septentrionalis **10** : 300, 316, 319.
— subsalsus **10** : 319.
Cosmarium abbreviatum **10** : 261; **14** : 57.
— — f. germanicum **10** : 261.
— — f. minus **10** : 261.
— abruptum **13** : 42.
— abscissum **17** : 106, 112.
— adelochondrum **10** : 261; **17** : 106, 115.
— amoenum **5** : 150; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **19** : 86, 220.
— anceps **5** : 142, 150; **7** : 238; **12** : 49; **17** : 106, 121.
— angulosum **14** : 57; **17** : 127.
— — v. concinnum **10** : 261; **12** : 49, 184; **13** : 42; **14** : 57; **17** : 127.
— anisochondrum **19** : 220.
— arctoum **17** : 106, 110, 121.
— — v. tatricum **7** : 238, 243 (fig.); **10** : 261; **14** : 57.
— asphaerosporum **17** : 110.
— — v. desectum **17** : 106.
— — v. strigosum **19** : 220.
— bacillare **10** : 261.
— binum **13** : 42.
— bioculatum **13** : 42.
— — v. hians **10** : 261; **12** : 184.
— biretum **19** : 220.
— Blyttii **5** : 150; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 85, 86, 220.
— — v. Novae Sylvae **7** : 243; **14** : 57.
— Boeckii **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42.
— botrytis **5** : 150; **7** : 243; **10** : 261; **12** : 49, 184; **13** : 42; **17** : 127; **19** : 86, 220.
— Brébissonii **5** : 150.
Cosmarium caelatum **5** : 150; **7** : 243; **13** : 42; **17** : 106, 110, 116, 121, 127; **19** : 220.
— calcareum **5** : 150; **10** : 261.
— carinthiacum **12** : 49.
— clepsydra **7** : 243.
— connatum **10** : 261; **12** : 49, 184; **13** : 42; **17** : 127; **19** : 85, 220.
— conspersum **5** : 150; **12** : 49; **13** : 42.
— contractum **5** : 150; **10** : 261, 267; **13** : 42; **14** : 57; **19** : 85, 220.
— — v. ellipsoideum **5** : 150; **7** : 243; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 220.
— controversum **5** : 150; **19** : 86, 220.
— costatum **7** : 243 (fig.); **12** : 49.
— crassiusculum **13** : 42.
— crenatum **5** : 150; **10** : 261; **12** : 49; **14** : 57; **17** : 106, 110, 113, 121; **19** : 220.
— cruciferum **17** : 106, 110, 120; **19** : 220.
— — v. pluriradians **17** : 106, 114.
— cucumis **5** : 150; **7** : 243; **13** : 42; **17** : 127.
— cucurbita **5** : 150; **7** : 243; **10** : 262; **12** : 49; **13** : 34, 42; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 220.
— — v. attenuatum **19** : 220.
— cucurbitinum **5** : 150; **7** : 243; **12** : 49; **13** : 42; **17** : 106, 121.
— — f. minus **5** : 150; **10** : 262, 266 (fig.), 267.
— curtum **17** : 106, 110, 115, 117.
— cyclicum v. arcticum **5** : 142, 150; **7** : 238, 243; **12** : 49; **13** : 43.
— cylindricum **13** : 43.
— cymatonotophorum v. *granulatum* **10** : 262, 267, 269 (fig.).
— Debaryi **5** : 150; **10** : 262; **12** : 49; **13** : 43; **17** : 127; **19** : 220.
— decedens **10** : 262; **14** : 57; **17** : 106, 110, 113 . . . 120.
— depressum **7** : 243; **13** : 43; **14** : 57.
— — v. achondrum **5** : 150; **7** : 243; **12** : 49; **13** : 43.
— — v. reniforme **5** : 150.
— difficile **5** : 150; **7** : 243; **12** : 49; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 86, 220.
— — v. sublaeve **17** : 106, 121.
— elegantissimum v. simplicius **7** : 243; **13** : 43; **19** : 86.
— elongatum **19** : 86.
— excavatum f. duplo-maior **10** : 262, 266 (fig.), 267, 268.
— exigerum **19** : 220.
— fastidiosum **12** : 184.
— fontigenum **10** : 262.
— formosulum **7** : 243; **10** : 262; **12** : 184; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 106, 121, 127; **19** : 85.
— — v. Nathorstii **13** : 43.
— furcatospermum **13** : 43; **17** : 128.
— galeritum **5** : 142, 150; **7** : 238; **14** : 57; **17** : 106, 110, 114; **19** : 220.
— globosum **5** : 150; **7** : 238, 244; **10** : 262; **12** : 49; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 128.

Cosmarium globosum v. minus **14** : 57.
— granatum **7** : 244; **10** : 262; **12** : 49, 184; **13** : 43; **14** : 57; **19** : 86, 220.
— granulatum **5** : 141, 150.
— Hammeri **17** : 106, 110, 113.
— — v. homalodermum **5** : 142, 150; **7** : 238.
— hexalobum **5** : 142, 150; **7** : 238, 244; **14** : 57; **17** : 106, 110, 112.
— — forma **10** : 262.
— — v. minus **7** : 244.
— — v. rossicum **17** : 115.
— holmiense v. integrum **5** : 141, 142, 151; **7** : 238, 244; **17** : 106, 110, 121; **19** : 220.
— hornavanense **5** : 151; **7** : 244; **14** : 57.
— humile **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262; **12** : 49, 184; **13** : 43; **17** : 128; **19** : 85, 220.
— — v. danicum **7** : 244.
— impressulum **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262, 267; **12** : 49, 184; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 128; **19** : 86.
— — f. tholiforme **19** : 220.
— inconspicuum **5** : 151; **7** : 244.
— indentatum **10** : 262.
— isthmium **5** : 151; **7** : 244; **19** : 220.
— isthmochondrum **19** : 220.
— laeve **5** : 151; **12** : 49, 184; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 106, 121, 128; **19** : 86, 220.
— — v. septentrionale **12** : 49; **14** : 57; **19** : 220.
— logiense **19** : 220.
— — f. expansum **5** : 151; **14** : 57, 220.
— Luetkemuelleri **17** : 106.
— Lundellii v. ellipticum **13** : 43; **17** : 106, 121, 128.
— margaritatum **7** : 244; **10** : 262; **12** : 49, 184; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 128; **19** : 86, 220.
— margaritiferum **5** : 141, 151; **7** : 237, 244; **12** : 49; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 128; **19** : 86, 220.
— Meneghinii **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262, 267; **13** : 43; **17** : 128.
— — v. granatoides **7** : 244 (fig.).
— — v. Reinschii **10** : 262, 266 (fig.), 267; **12** : 49; **13** : 43; **17** : 128.
— — v. — f. latiusculum **10** : 262.
— microsphinctum **17** : 106, 110, 114, 115, 117.
— minimum **10** : 262.
— minutum **7** : 244.
— moniliforme **10** : 262, 266 (fig.), 267; **13** : 43.
— Mooreanum **12** : 49.
— nanum **10** : 262, 269 (fig.).
— nasutum **5** : 142, 151; **7** : 238, 244; **13** : 43; **17** : 128; **19** : 220.
— — f. granulatum **7** : 244; **13** : 35, 43.
— nitidulum **12** : 49.
Cosmarium norvegicum **19** : 220.
— novaesemliae v. sibiricum **7** : 238, 244.
— Nymannianum **5** : 151; **10** : 262.
— obliquum **10** : 262; **17** : 106, 110, 113 . . . 120.
— obsoletum **13** : 43.
— obtusatum **10** : 262; **12** : 49; **13** : 43; **17** : 128; **19** : 85.
— ocellatum **10** : 262; **13** : 43; **17** : 128.
— ochthodes **5** : 141, 142, 151; **7** : 238; **10** : 262; **12** : 49; **13** : 35, 43; **17** : 128.
— — v. amoebum **19** : 85.
— ordinatum **10** : 262.
— ornatum **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262; **13** : 43; **17** : 128; **19** : 220.
— orthostichum **5** : 151; **10** : 262; **19** : 220.
— ovale **10** : 262; **13** : 43.
— pachydermum **12** : 49; **13** : 43; **17** : 128; **19** : 86.
— palangula **12** : 49.
— perforatum **12** : 50; **13** : 43; **17** : 128; **19** : 85.
— perincisum **7** : 244.
— *petsamoënse* **7** : 244 (fig.); **10** : 269; **17** : 106, 110 . . . 118.
— phaseolus **5** : 151; **7** : 244; **12** : 50.
— — f. minus **10** : 262, 266 (fig.), 267; **13** : 43; **19** : 220.
— — v. elevatum **14** : 57.
— pluviale **5** : 151.
— polonicum **10** : 262, 266 (fig.), 267, 268.
— polygonum **5** : 151.
— portianum **5** : 151; **7** : 244; **12** : 50; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 128; **19** : 220.
— — v. nephroideum **13** : 43.
— — v. reniforme **10** : 262.
— praegrande **12** : 50.
— praemorsum **10** : 262; **13** : 43.
— protractum **5** : 151; **12** : 50.
— pseudamoenum **5** : 151; **10** : 262; **13** : 43.
— pseudarctoum **5** : 142, 151; **7** : 238.
— pseudoconnatum **10** : 262; **13** : 43; **19** : 221.
— pseudoexiguum v. hexagonum **13** : 43; **17** : 128.
— pseudonitidulum v. validum **13** : 32; **17** : 128; **19** : 221.
— pseudoornatum **12** : 50; **14** : 57.
— pseudoprotuberans **13** : 43; **19** : 221.
— pseudopyramidatum **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 128; **19** : 221.
— pseudoretusiforme **10** : 262; **13** : 43.
— pseudotaxichondrum v. Foggii **19** : 221.
— punctulatum **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262; **12** : 50, 184; **13** : 43; **14** : 57; **17** : 128; **19** : 85.
— — v. mesoleium **19** : 221.
— — v. subpunctulatum **5** : 151; **10** : 262, 268; **13** : 43.

Cosmarium pygmaeum **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 43; **17** : 128; **19** : 221.
— pyramidatum **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **17** : 128; **19** : 86, 221.
— quadratulum **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **14** : 57.
— quadratum **5** : 141, 151; **7** : 244; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **14** : 57; **17** : 106, 115, 128; **19** : 86, 221.
— — v. Willei **17** : 106.
— quadrifarium **12** : 50; **19** : 221.
— — f. hexasticha **5** : 151.
— quadrum **5** : 151; **13** : 44; **19** : 221.
— quinarium **10** : 262; **13** : 44; **17** : 128; **19** : 221.
— — f. irregularis **19** : 86.
— Raciborskii **12** : 50; **19** : 221.
— Ralfsii **5** : 151; **13** : 44.
— rectangulare **14** : 57.
— — v. Eichlerianum **13** : 44; **17** : 128.
— Regnellii **10** : 262; **13** : 44; **19** : 221.
— Regnesi **13** : 44.
— reniforme **5** : 151; **7** : 244; **10** : 262; **12** : 50, 184; **13** : 44; **14** : 57; **17** : 128; **19** : 86.
— retusiforme v. alpinum **19** : 221.
— saxicolum **14** : 58 (fig.); **17** : 110, 112, 115.
— simplicius **10** : 262.
— sinostegos **10** : 262.
— speciosissimum **5** : 151.
— speciosum **5** : 142, 151; **7** : 238, 245; **12** : 50, 184; **13** : 35, 44; **17** : 106, 110 . . . 121.
— — v. biforme **7** : 245.
— — v. Rostafinskii **5** : 152; **13** : 44; **17** : 114, 128.
— — v. simplex **5** : 151; **7** : 245; **10** : 262, 266 (fig.), 267, 269.
— sphagnicolum **5** : 152; **7** : 245; **10** : 262, 268; **12** : 50; **17** : 106.
— — forma **10** : 266 (fig.), 267.
— sphalerostichum **14** : 58.
— striolatum **12** : 50.
— *subadoxum* **10** : 262, 268, 269 (fig.).
— subcostatum **5** : 152; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **14** : 58.
— — f., v. minus **13** : 44; **19** : 85, 221.
— subcrenatum **5** : 152; **7** : 245; **13** : 44; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 221.
— — v. subsolidum **5** : 152.
— subcucumis **5** : 141, 152; **7** : 245; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **14** : 58; **17** : 106; **19** : 221.
— subdanicum **13** : 44.
— subgranatum **5** : 152.
— subprotumidum **12** : 50; **14** : 58.
— subrectangulare **12** : 50; **13** : 44.
— subretusiforme **5** : 152.
— subspeciosum **5** : 141, 142, 152; **7** : 238, 245; **12** : 50; **13** : 35, 44; **14** : 58; **17** : 106, 110.
Cosmarium subtumidum **5** : 152; **7** : 245. **12** : 50; **13** : 44; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 221;
— — v. Klebsii **14** : 58.
— subundulatum **7** : 238, 244, 245; **10** : 262; **19** : 86, 221.
— succisum **10** : 262; **19** : 221.
— — v. hians **10** : 266 (fig.), 267, 268.
— sulcatum **13** : 44; **19** : 221.
— tatricum **13** : 35, 44; **17** : 128.
— taxichondrum **10** : 262; **13** : 44; **19** : 221.
— tenue **5** : 152.
— tetragonum **5** : 152.
— — v. Dawidsonii **5** : 141, 152; **17** : 106, 110.
— — v. Lundellii **5** : 152; **7** : 245.
— tetraophthalmum **5** : 152; **7** : 245; **12** : 50, 184; **13** : 44; **17** : 128; **19** : 86, 221.
— tinctum **5** : 152; **7** : 245; **10** : 262, 268; **12** : 50; **13** : 44; **14** : 58; **19** : 221.
— — formae **10** : 266 (fig.), 267.
— — v. tumidum **10** : 262, 268.
— tuddalense **12** : 50.
— tumidum **19** : 221.
— turgidum **13** : 44; **17** : 128.
— Turpinii **5** : 152; **12** : 184.
— — v. eximium **5** : 142, 152; **7** : 238, 245; **12** : 50; **13** : 35, 44; **17** : 106, 121, 128.
— undulatum **5** : 141, 152.
— Ungerianum **12** : 50.
— variolatum **19** : 221.
— venustum **5** : 152; **7** : 245; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **19** : 221.
— — f. minus **13** : 44.
— — v. hypohexagonum **5** : 152.
— vexatum **13** : 44; **17** : 128.
— vogesiacum **10** : 262.
— sp. **7** : 239; **20** : 6.
Cosmocladium pusillum **14** : 58.
Crucigenia apiculata **10** : 264.
— irregularis **10** : 264; **13** : 38.
— rectangularis **5** : 147; **7** : 241; **10** : 264; **12** : 183; **13** : 38.
— tetrapedia **13** : 38.
Cyclotella comta v. radiosa **10** : 289.
— laevissima **10** : 300.
— operculata **10** : 300.
Cylindrocystis Brébissonii **5** : 148; **7** : 241; **10** : 260; **12** : 47; **13** : 39; **14** : 56; **17** : 106 . . . 120, 127; **19** : 218; **20** : 148.
— crassa **17** : 106 . . . 120.
Cylindrospermum maius **13** : 47.
— stagnale **5** : 156.
— sp. **19** : 217; **20** : 8, 9.
Cymatonema **19** : 84.
Cymatopleura elliptica **10** : 297, 314.
— — v. nobilis **10** : 293, 297, 300.
— solea **10** : 295, 300; **12** : 182.
Cymbella aequalis **10** : 289, 300.
— affinis **12** : 182; **14** : 60.
— amphicephala **10** : 300.
— amphioxys **14** : 60.

Cymbella aspera **10** : 289, 300; **12** : 182; **14** : 60.
— — v. minor **10** : 300.
— cistula **10** : 300; **14** : 60.
— — v. maculata **10** : 300.
— cymbiformis **10** : 289, 300; **12** : 182.
— Ehrenbergii **10** : 289, 293, 296, 297, 300, 318.
— gracilis **10** : 300; **14** : 60.
— helvetica **10** : 289, 300.
— lanceolata **10** : 300; **14** : 60.
— lata **12** : 182.
— naviculiformis **12** : 182.
— Nerei v. caldostagnensis **10** : 300.
— — v. inflata **10** : 300.
— parva **10** : 289, 300; **12** : 182.
— prostrata **14** : 60.
— pusilla **10** : 300; **14** : 60.
— suecica **10** : 316.
— tumida **10** : 316.
— turgida **10** : 300.
— ventricosa **10** : 300; **14** : 60.
— — v. caespitosa **10** : 289, 302.
— — v. ovata **10** : 302.
Cystococcus humicola **17** : 106, 112, 120.
Dactylococcopsis raphidioides **5** : 155; **13** : 47; **20** : 7.
Desmidiaceae sp. [**4** : 75].
Desmidium aequale **19** : 222.
— aptogonum **19** : 85.
— assymetricum **10** : 264; **19** : 222.
— coarctatum **13** : 46.
— graciliceps **19** : 222.
— Grewillii **10** : 264; **13** : 46; **17** : 128.
— longatum **19** : 222.
— pseudostreptonema **19** : 222.
— quadratum v. doliiforme **19** : 217, 222.
— Swartzii **5** : 154; **10** : 264; **12** : 51; **13** : 46; **17** : 128; **19** : 85, 222.
Diatoma elongatum **12** : 182; **14** : 59.
— tenue **10** : 289.
— vulgare **14** : 59.
— — v. ovalis **14** : 59.
Diatomaceae [**4** : 51, 72, 75, 187]; [**5** : 139, 140]; **18** : 114; **20** : 6, 7.
Dichothrix compacta **5** : 142, 155; **17** : 106; **20** : 10.
— gypsophila **5** : 139; **6** : 175, 176; **7** : 176; **8** : 235; **13** : 24; **14** : 129; **17** : 20, 106, 114.
— orsiniana **12** : 52.
Dictyosiphon foeniculaceus **4** : 57, 188; **6** : 178; **7** : 177; **9** : 172; **15** : 191; **19** : 218; **20** : 153.
— sp. **4** : 60.
Dictyosphaerium Ehrenbergianum **10** : 264, 269 (fig.), 270.
— pulchellum **10** : 264; **13** : 38.
Dimorphococcus lunatus **10** : 264; **13** : 38.
Dinobryon bavaricum **10** : 264.
— divergens **10** : 264.
— stipitatum **10** : 264.
Dinobryon sp. **10** : 264.
Diploneis carpathorum **10** : 316.
— decipiens **10** : 302.
— didyma **10** : 302.
— elliptica **10** : 297, 302.
— fennica **10** : 316.
— hyalina **10** : 302.
— incurvata **10** : 302.
— interrupta **10** : 302.
— maeandra **10** : 316.
— major **10** : 302.
— praeclara **10** : 316.
— puella **12** : 182.
— Smithii **10** : 302.
— — v. rhombica **10** : 302.
— subrhombica **10** : 316.
— sp. **10** : 294.
Docidium baculum **10** : 261; **13** : 40.
— undulatum v. dilatatum **12** : 48; **13** : 40.
Draparnaldia glomerata **5** : 148.
— plumosa **7** : 241; **12** : 47; **13** : 38; **14** : 56; **17** : 127; **20** : 5, 8.
— sp. **20** : 8.
Ectocarpus confervoides **4** : 57; **9** : 172.
— siliculosus **4** : 57, 186, 188, 191; **6** : 178; **7** : 177; **12** : 185; **13** : 23, 25; **15** : 223; **16** : 2; **17** : 77, 78; **20** : 152.
— sp. **6** : 178.
Elachista fucicola **4** : 57; **6** : 178; **7** : 177; **12** : 185.
Elakatothrix gelatinosa **10** : 264; **19** : 218.
Enteromorpha clathrata **4** : 54, 55, 188; **6** : 176, 177.
— crinita **4** : 54; **6** : 176, 177; **20** : 147.
— — v. ramosa **7** : 176.
— — v. procera-ramulifera **7** : 176.
— Hopkirkii **4** : 51, 53, 54, 188, 191; **6** : 175, 177; **7** : 176, 177; **13** : 23, 24; **15** : 225; **20** : 147, 152.
— intestinalis **4** : 54; **6** : 176, 177; **9** : 173; **12** : 183; **13** : 23, 24; **15** : 223; **17** : 78; **20** : 147, 153.
— linza **4** : 54.
— salina **4** : 51, 52, 54; **6** : 175, 177;
— — v. polyclados **6** : 176, 177.
— torta **6** : 176, 177.
— tubulosa **6** : 177; **19** : 218.
— — f. prolifera **4** : 54; **9** : 173; **19** : 218.
Entoderma Wittrockii **7** : 176.
Entophysalis granulosa **12** : 181.
Epithemia argus **10** : 302.
— — v. alpestris **10** : 302.
— cistula **10** : 302.
— Muelleri **12** : 182.
— sorex **10** : 289, 302.
— turgida **10** : 302.
— — v. capitata **12** : 183.
— — v. granulata **10** : 289.
— — v. Westermannii **10** : 294, 295, 302, 315, 322.
— zebra **10** : 289, 302.

Epithemia turgida v. porcellus **14** : 61.
— — v. proboscidea **10** : 302.
— sp. **4** : 50, 65, 66, 78; **10** : 290, 292, 293.
Eremosphaera viridis **10**:264; **13**:37; **17**:127.
Euastrum affine **10** : 261; **13** : 41; **19** : 219.
— ampullaceum **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **19** : 219.
— ansatum **5** : 141, 149; **7** : 237, 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 86, 219.
— — v. pyxidatum **13** : 41.
— bidentatum **5** : 141, 149; **7** : 237, 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 219.
— binale **5** : 141, 149; **7** : 237, 242; **10** : 261, 265; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 219.
— — forma **10** : 266 (fig.), 267.
— — f. Gutwinskii **5** : 149; **10** : 261; **13** : 41; **19** : 219.
— — f. sectum **13** : 41.
— Boldtii **5** : 149; **7** : 242; **13** : 41; **14** : 57; **19** : 219.
— crassicolle **17** : 106, 110, 115; **19** : 219.
— crassum **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **19** : 219.
— denticulatum **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 219.
— — v. angusticeps **13** : 41; **17** : 127.
— — v. granulatum **13** : 41.
— didelta **5** : 149; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **17** : 127; **18** : 219.
— divaricatum **10** : 261; **13** : 41; **19** : 219.
— dubium **5** : 149; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **17** : 106; **19** : 86.
— elegans **5** : 141, 149; **7** : 237, 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 86, 219.
— — v. ornatum **19** : 219.
— erosum v. *granulosum* **7** : 242 (fig.).
— — v. notabile **7** : 242.
— gayanum **10** : 261.
— gemmatum **5** : 149; **19** : 219.
— germanicum **17** : 127.
— humerosum **10** : 261; **13** : 41; **19** : 219.
— inerme **13** : 41; **19** : 219.
— insigne **5** : 149; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41.
— insulare **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48, 184; **13** : 41; **17** : 127; **19** : 85, 219.
— intermedium **12** : 48; **13** : 41.
— Luetkemuelleri **12** : 48; **13** : 41.
— montanum **5** : 142, 149; **7** : 242; **12** : 48; **13** : 33, 41; **14** : 57.
— notabile f. simplicior **7** : 242.
— oblongum **5** : 149; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127.
— pectinatum **5** : 141, 149; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 85, 86, 219.
— — v. inevolutum **13** : 41.
— pinnatum **5** : 149; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **17** : 127; **19** : 219.
Euastrum pseudoboldtii **12** : 48.
— pulchellum **17** : 127.
— — v. retusum **12** : 48; **13** : 41.
— rostratum **5** : 149; **13** : 41.
— sibiricum **5** : 149; **10** : 261.
— — f. exsectum **10** : 261; **13** : 42.
— — f. sectum **17** : 127.
— sinuosum **13** : 42; **19** : 219.
— sublobulatum v. subdissimile **10** : 261, 265.
— Turneri(i) **5** : 149; **13** : 42.
— validum **10** : 261; **13** : 42; **19** : 219.
— verrucosum **5** : 150; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **17** : 127; **19** : 86, 219.
— sp. **5** : 142; **7** : 238, 239; **20** : 8.
Eucapsis alpina **10** : 264; **19** : 217; **20** : 9.
Eucocconeis flexella **12** : 182; **14** : 60.
— — v. alpestris **14** : 60.
— lapponica **14** : 60.
Eudesme virescens **4** : 59—60.
— — f. baltica **4** : 59.
Eudorina elegans **10** : 264; **20** : 6.
— sp. **20** : 7.
Euglena acus **20** : 9.
— deses **20** : 7.
— viridis **20** : 7, 8.
— sp. **20** : 9.
Eunotia **9** : 174.
— arcus **12** : 182; **14** : 59.
— — v. bidens **12** : 182.
— Clevei **5** : 77.
— diodon **14** : 59.
— exigua v. compacta **14** : 59.
— faba **14** : 59.
— fallax **14** : 59.
— — v. gracillima **14** : 59.
— formica **10** : 302, 316, 317.
— gracilis **10** : 302.
— lapponica **10** : 292, 302, 317.
— lunaris **10** : 302; **12** : 182; **14** : 59.
— — v. capitata **14** : 59.
— major **10** : 302.
— — v. curta **10** : 302.
— monodon **14** : 59.
— — v. bidens **14** : 59.
— parallela **14** : 59.
— — v. minor **14** : 59.
— pectinalis **14** : 59.
— — v. biconstricta **10** : 316.
— — v. borealis **10** : 302.
— — v. ventralis **14** : 59.
— polydentula **14** : 59.
— praerupta **10** : 317.
— — v. bidens **10** : 302.
— — v. inflata **14** : 59.
— robusta **10** : 316, 317.
— — varr. **10** : 316.
— — v. diadema **10** : 292, 302.
— — v. hexaodon **10** : 302.
— — v. tetraodon **10** : 302; **14** : 59.
— septentrionalis **14** : 59.

Eunotia sudetica **14** : 59.
— — v. bidens **14** : 59.
— tenella **14** : 59.
— triodon **14** : 59.
— valida **14** : 59.
— veneris **10** : 302; **14** : 60.
Flagellata sp. [**4** : 75].
Fragilaria brevistriata **10** : 302.
— capucina **12** : 182; **14** : 59.
— — v. lanceolata **12** : 182.
— — v. mesolepta **10** : 289, 302.
— construens **10** : 289, 302.
— — f. cruciata **10** : 302.
— — v. assymetrica **10** : 302.
— — v. binodis **14** : 59.
— — v. major **10** : 302.
— — v. trigona **10** : 302.
— intermedia **12** : 182.
— — v. capitellata **10** : 302.
— — v. distans **10** : 302.
— mutabilis **10** : 289, 290, 293, 294, 304.
— — v. elliptica **10** : 293, 295, 304.
— — v. intercedens **10** : 304.
— — v. — f. Martyi **10** : 304.
— virescens v. exigua **10** : 289.
— — v. subsalina **10** : 304.
— sp. **4** : 66, 82; **10** : 290, 292—295.
Frustulia amphipleuroides v. debilis **10** : 316.
— rhomboides v. saxonica **14** : 60.
— — v. — f. capitata **14** : 60.
Fucus serratus **20** : 43.
— vesiculosus **2** : 11; **3** : 50; **4** : 16, 50 . . . 57, 60, 65, 127, 188; **5** : [47, 70, 71], 114, 126; **6** : 178; **7** : 48, [157, 161, 162, 207], 220; **8** : 16, 309, 322; **9** : 165, [166]; **10** : [17, 18], 146, 161, 190, 195, 198, [209, 210]; **11** : [31, 52], 217 . . . 226; **12** : [144], 174 . . . 185; **13** : 20, 172; **14** : [21, 23], 36; **15** : 46, 191, 193, 195, 223; **17** : 78, 145—147, 197—199; **19** : 5, 21, 22; **20** : 39, 152, 153.
— — f. v. angustifolius **4** : 183, 186; **6** : 178, 232; **7** : 176, 177, 321; **10** : 288; **12** : 185; **20** : 152.
— — f. nanus **6** : 178; **15** : 222.
— — f. subecostatus **6** : 177, 178; **12** : 185.
Furcellaria fastigiata **4** : 51, 52, 57, 58, 186, 188; **6** : 174, 178, 179; **7** : 321; **9** : 172, 173; **12** : 185; **13** : 23, 25; **15** : 191.
Geminella minor **4** : 187, 188, 191.
Genicularia spirotaenia **13** : 39.
Gloeocapsa aeruginosa **5** : 141, 155.
— alpina **5** : 141, 155; **17** : 105, 107 . . . 115.
— atrata **17** : 105, 107, 113 . . . 117.
— compacta **17** : 105, 107, 112.
— conglomerata **5** : 155.
— dermochroa **17** : 105, 107, 112, 116; **19** : 83.
— Itzigsohnii **14** : 61; **17** : 105, 107, 112, 121.
Gloeocapsa magma **5** : 141, 155; **7** : 246; **14** : 61; **17** : 6, 79, 105 . . . 120.
— montana **5** : 155; **17** : 28, 29, 79, 105 . . . 120; **19** : 83; **20** : 148.
— polydermatica **17** : 106, 107, 114, 118; **20** : 148.
— punctata **14** : 61; **17** : 106—108 (fig.), 112, 114; **19** : 83.
— rupestris **5** : 141, 155; **12** : 51; **17** : 106, 107, 112, 120, 121.
— rupicola **17** : 106, 107.
— sp. **17** : 113.
Gloeococcus Schroeteri **10** : 264; **19** : 85; **20** : 6, 8.
Gloeocystis ampla **17** : 106, 113; **20** : 148.
— rupestris **5** : 147; **17** : 79, 106 . . . 117; **19** : 83.
— sp. **17** : 113.
Gloeocystopsis limneticus **10** : 264.
Gloeothece fusco-lutea **17** : 106 . . . 117.
— Heufleri **10** : 225.
— palea **14** : 61.
— rupestris **5** : 141, 155; **17** : 106 . . . 120.
— vibrio **20** : 5.
Gloeotrichia (Gloiotrichia) echinulata **6** : 80; **18** : 115.
— intermedia **19** : 85.
— pisum **4** : 53; **5** : 139.
— salina **4** : 53.
Gobia baltica **4** : 57; **7** : 177.
Gomphonema **4** : 65; **9** : 174.
— acuminatum **12** : 182.
— — v. Brébissonii **10** : 304.
— — v. coronatum **12** : 182; **14** : 60.
— — v. laticeps **10** : 304.
— — v. Pantocsekii **10** : 304.
— angustatum **10** : 290.
— — v. productum **12** : 182.
— constrictum **10** : 304; **14** : 60.
— — v. capitatum **10** : 304.
— gracile **10** : 290, 304; **12** : 182.
— — v. auritum **10** : 290, 304.
— helveticum v. tenue **14** : 61.
— intricatum v. fossile **10** : 304.
— longiceps v. montanum **14** : 61.
— — v. — f. suecicum **14** : 61.
— — v. subclavatum **14** : 61.
— — v. — f. gracile **14** : 61.
— montanum **10** : 304.
— micropus **10** : 304.
— olivaceum **10** : 304; **12** : 182; **14** : 61.
— — v. calcareum **14** : 61.
— — v. minutissimum **12** : 182.
— parvulum **10** : 290, 304; **12** : 182; **14** : 61.
— — v. exilissimum **12** : 182.
— sphaerophorum **10** : 290, 304, 318.
Gomphosphaeria aponina **6** : 175, 176; **12** : 51, 181; **18** : 115; **19** : 217.
— compacta **4** : 187, 189; **16** : 2; **20** : 6.
— lacustris **10** : 264; **14** : 61; **19** : 85, 217.

Gonatozygon Brébissonii **5** : 148.
— Kinahani **13** : 39.
— monotaenium **10** : 260; **12** : 47; **13** : 39; **14** : 56; **19** : 85.
— — v. pilosellum **10** : 260, 266 (fig.), 267; **19** : 218.
Gonium pectorale **10** : 264.
Grammatophora oceanica **9** : 174; **10** : 290, 294, 304.
Gyrosigma attenuatum **10** : 297, 304.
— balticum **9** : 174; **10** : 294, 295, 304.
— Spencerii **10** : 293, 294, 296, 304.
— strigilis **10** : 296, 304.
Haematococcus sp. **20** : 5.
Hantzschia **4** : 66.
— amphioxys **10** : 290, 304.
— dubravicensis **10** : 316.
Hapalosiphon fontinalis **13** : 47; **17** : 181; **20** : 5.
— hibernicus **5** : 155; **7** : 247; **12** : 51; **13** : 47; **14** : 61; **19** : 83, 85, 217; **20** : 148.
— intricatus **5** : 155; **7** : 237, 247; **13** : 47; **20** : 5, 8, 9.
— luteolus **5** : 155.
Hildenbrandtia rosea **13** : 25; **20** : 152, (153).
Homoeothrix cartilaginea **20** : 8.
Hormidium flaccidum **5** : 134—138 (fig.); **17** : 107 . . . 120; **20** : 5, 6, 7.
— parietinum **15** : 226; **20** : 5.
Hyalodiscus scoticus **9** : 174; **10** : 292, 293, 295, 296, 304, 315, 321.
Hyalotheca dissiliens **5** : 154; **7** : 246; **10** : 264; **12** : 51; **13** : 46; **17** : 128; **19** : 85, 222; **20** : 7.
— — f., v. tatrica **5** : 154; **7** : 246; **10** : 264; **14** : 58;[1] **19** : 222.
— — v. hians **5** : 154; **12** : 51; **13** : 46.
— indica **7** : 246; **13** : 46; **19** : 222.
— mucosa **4** : 188; **5** : 154; **7** : 246; **10** : 264; **12** : 51; **13** : 46; **20** : 6.
— neglecta **10** : 264, 266 (fig.), 267, 269; **19** : 222.
Hydrodictyon **18** : 91.
Hydrurus foetidus **19** : 88—89.
Hyella caespitosa **6** : 175, 176.
Ilea fulvescens **4** : 55; **6** : 178; **19** : 218.
Isthmoploea sphaericola **19** : 218.
Kirchneriella lunaris **10** : 264; **13** : 38; **20** : 148.
— obesa **5** : 147; **10** : 264; **12** : 183; **13** : 38.
Laminaria [**10** : 369].
— digitata **7** : 28.
Lemanea fluviatilis **9** : 141; **12** : 51.
— fucina **9** : 141.
— rigida **9** : 141; **12** : 51.
— sp. **5** : 154.
Leptonema lucifugum **12** : 185.
Licmophora sp. **10** : 290.
Lithothamnion **9** : 94—96, 98—100, 102; [**10** : 371].
Lomentaria rosea **12** : 75.
Lyngbya aerugineo-coerulea **5** : 156; **20** : 5.
— aestuarii **4** : 50—52, 187—190; **6** : 174—176; **7** : 175; **12** : 181; **13** : 23, 24, 47; **16** : 2, 3; **17** : 77, 78; **20** : 152.
— Kuetzingii **5** : 157; **9** : 173; **12** : 181; **13** : 24; **19** : 217; **20** : 147.
— — v. distincta **5** : 157.
— limnetica **7** : 247; **20** : 8.
— majuscula **17** : 77.
— mucicola **5** : 155, 157.
— perelegans **5** : 157.
— semiplena **4** : 53, 187—189; **5** : 157; **13** : 23; **17** : 77.
Mastogloia **4** : 65, 66; **10** : 292, 293, 295.
— baltica **10** : 304.
— Braunii **10** : 294, 304.
— Dansei **10** : 304.
— elliptica **10** : 304.
— Grevillei **10** : 304.
— lanceolata **10** : 304.
— pumila **10** : 304.
— Smithii **10** : 304.
— — v. amphicephala **10** : 304; **12** : 182.
Melosira arctica v. *bornholmiensis* **10** : 304, 319.
— arenaria **10** : 304, 314.
— Borreri **10** : 304.
— distans **14** : 59.
— granulata **10** : 304.
— hyperborea **10** : 319.
— islandica ssp. helvetica **10** : 316, (317); **14** : 59.
— italica **14** : 59.
— — v. valida **10** : 216.
— undulata **10** : 316.
— Westii **10** : 293, 294, 295, 304, 319.
— — v. *nuda* **10** : 306, 319, 320 (fig.).
— sp. **4** : 50.
Meridion circulare **12** : 182; **14** : 59.
— — v. constrictum **14** : 59.
Merismopedia elegans **10** : 264.
— glauca **4** : 50, 52; **5** : 155; **7** : 246; **10** : 264; **12** : 51; **13** : 47; **17** : 128; **19** : 217; **20** : 6—9.
— punctata **7** : 246; **12** : 181; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 128; **19** : 217.
— tenuissima **10** : 264; **12** : 181; **13** : 47; **14** : 61.
— sp. **10** : 264.
Mesogloia zosterae **4** : 59.
Mesotaenium chlamydosporum **17** : 79, 106 . . . 120 (fig.); **19** : 83; **20** : 148.
— — v. violascens **17** : 79, 106 . . . 120; **20** : 148.
— Endlicherianum **14** : 56; **17** : 106, 107, 110, 112.

[1] Per errorem dissilicus.

Mesotaenium macrococcum **17** : 106 ... 119.
— — v. micrococcum **17** : 112.
— sp. **5** : 148; **19** : 83; **20** : 6.
Micrasterias americana **13** : 42; **17** : 127.
— angulosa **5** : 150; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42.
— apiculata **13** : 42.
— brachyptera **12** : 49; **13** : 42.
— conferta **10** : 261.
— — v. hamata **10** : 261.
— crux melitensis **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **17** : 127.
— denticulata **13** : 42; **14** : 57; **17** : 127.
— depauperata v. Kitchelii **19** : 220.
— fimbriata **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42.
— Jenneri **13** : 42.
— mahabuleshwarensis **10** : 261.
— — v. Wallichii **13** : 42.
— muricata v. simplex **19** : 217, 220 (fig.).
— papillifera **5** : 150; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 220.
— pinnatifida **5** : 150; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42.
— radiata **10** : 261; **13** : 42.
— rotata **5** : 150; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 220.
— sol **7** : 243; **13** : 42; **19** : 220.
— Thomasiana **5** : 150; **10** : 261; **13** : 42.
— — f. ad denticulata **10** : 261.
— truncata **10** : 261; **12** : 49; **13** : 42; **17** : 127; **19** : 220.
— — v. quadrata **10** : 261; **12** : 49.
— sp. **7** : 238, 239.
Microcoleus chthonoplastes **4** : 51, 52, 187—189; **5** : 140; **10** : 225; **17** : 77.
— tenerrimus **4** : 187—189.
— vaginatus **12** : 181; **20** : 6, 10.
Microcystis aeruginosa **10** : 264; **13** : 47; **16** : 3; **20** : 6, 10.
— elabens **7** : 246; **14** : 61; **19** : 217.
— flos aquae **10** : 264; **20** : 5.
— minutissima **19** : 83.
— pulverea **20** : 9, 10.
Microspora amoena **13** : 38; **17** : 127.
— floccosa **20** : 8, 9.
— Loefgreni **20** : 7.
— pachyderma **12** : 47; **13** : 38; **14** : 56; **20** : 5.
— stagnorum **20** : 7, 10.
— sp. **17** : 111, 113.
Monostroma balticum **6** : 178; **12** : 183; **15** : 123.
Mougeotia capucina **11** : 123, 125; **19** : 218.
— genuflexa **11** : 124.
— gelatinosa **11** : 125.
— gracillima **11** : 126; **15** : 177.
— laetevirens **4** : 186, 188, 190; **6** : 80; **11** : 123, 125; **13** : 39.
— laevis **11** : 124; **12** : 47; **13** : 39; **15** : 177.
— nummuloides **11** : 123, 124; **17** : 106, 113.
Mougeotia parvula **4** : 50, 54; **5** : 148; **7** : 241; **11** : 123; **15** : 177.
— pulchella (**11** : 124).
— quadrangulata **11** : 125; **13** : 39; **15** : 177.
— robusta **11** : 124; **12** : 184; **13** : 39; **17** : 127.
— scalaris **7** : 241; **11** : 124.
— — f. macrospora **11** : 124.
— sphaerocarpa **11** : 124.
— thylespora **15** : 177.
— varians **11** : 125; **13** : 39.
— viridis **11** : 123, 126; **13** : 39.
— sp. **4** : 187, 188; **5** : 141; **7** : 237; **10** : 264; **13** : 25; **14** : 56, 129; **16** : 2; **17** : 77, 121; **19** : 85, 86; **20** : 7—10.
Navicula **4** : 65, 66, 78; **10** : 293, 294; **20**: 6, 8.
— americana **10** : 306, 316, 317.
— ammophila **10** : 306.
— anglica v. subsalsa **10** : 306.
— arenariaeformis **10** : 306.
— bacilliformis **10** : 306.
— cincta **12** : 182.
— — v. Heuflerii **10** : 306.
— — v. leptocephala **10** : 306.
— cocconeiformis **14** : 60.
— crucicula v. obtusata **10** : 319.
— cryptocephala v. intermedia **12** : 182.
— — v. pumila **10** : 306.
— cuspidata **10** : 294, 295, 306, 318.
— digito-radiata **10** : 306.
— — v. elliptica **10** : 306.
— divergens **10** : 320.
— dubium **10** : 290.
— elegans **10** : 306.
— — v. cuspidata **9** : 174 (fig.), 175; **10** : 306.
— falaisiensis **12** : 182.
— gastrum **10** : 318; **14** : 60.
— — f. minor **10** : 306.
— — v. exigua **10** : 306.
— gregaria v. thurholmiensis **10** : 306, 319.
— humerosa **10** : 306.
— hungarica **10** : 306.
— — v. capitata **10** : 306.
— — v. linearis **12** : 182.
— Hustedtii **12** : 182.
— leptogongyla **10** : 320.
— libellus **10** : 306.
— Lundstroemii **10** : 319.
— minima **12** : 183.
— minuscula **12** : 183.
— muralis **10** : 306.
— oblonga **10** : 290, 306, 318; **12** : 183.
— — v. subcapitata **12** : 183.
— obtusata **10** : 306, 319.
— — v. *alandica* **10** : 306, 319, 320 (fig.).
— peregrina **9** : 174; **10** : 290, 293, 306, 315.
— — v. kefvingensis **10** : 306.
— phyllepta **10** : 306.
— placentula **12** : 183.
— plicata **10** : 306.
— protracta **10** : 319; **12** : 183.

Navicula pseudobacillum **10** : 306.
— pseudoscutiformis **14** : 60.
— punctulata v. cluthensis **9** : 174 (fig.), 175; **10** : 306.
— pupula **10** : 306.
— — v. capitata **14** : 60.
— pusilla **10** : 290.
— pygmaea **10** : 306.
— radiosa **10** : 290, 293, 295, 306; **12** : 183; **14** : 60.
— — v. acuta **10** : 306.
— rhombica **10** : 306.
— rhynchocephala **10** : 290, 306; **14** : 60.
— — v. amphiceros **10** : 306.
— salinarum **10** : 290, 306.
— — v. intermedia **10** : 308.
— scopulorum v. belgica **10** : 308.
— spicula **10** : 308.
— subtilissima **14** : 60.
— tabellaria **10** : 320.
— tumida **10** : 295, 308.
— tuscula **10** : 290; **12** : 183.
— viridula v. rostellata **10** : 308.
— — v. slesvicensis **10** : 308.
Neidium affine v. amphirhynchus f. majus **10** : 308.
— — v. — f. triundulatum **10** : 308.
— — v. capitatum **14** : 60.
— — v. undulatum **10** : 308.
— amphigomphus **10** : 290, 308.
— bisulcatum **10** : 308, 317; **12** : 183.
— Hitchcockii **10** : 316.
— iridis **10** : 308; **14** : 60.
— — v. ampliata **10** : 308.
— — v. firma **10** : 308.
— — v. oblonga **10** : 308.
— — v. subampliata **10** : 308.
— productum **12** : 183.
Nephrocytium Agardhianum **10** : 264.
Netrium digitus **5** : 141, 148; **7** : 237, 241; **10** : 260; **12** : 47; **13** : 34, 39, 130—131; **14** : 56; **17** : 106 ... 121, 127; **19** : 86, 218.
— — f. parva **19** : 218.
— — v. lamellosum **13** : 39; **17** : 127.
— interruptum **5** : 148; **13** : 39; **17** : 127; **19** : 218.
— Naegelii **7** : 241 (fig.); **13** : 39.
— oblongum **7** : 241; **12** : 47; **13** : 39.
— — v. cylindricum **7** : 241.
Nitella batrachosperma **8** : 243, 245, 247.
— flexilis **4** : 188; **8** : 242, 243, 245; **14** : 54, 56; **15** : 45; **17** : 44; **18** : 63, 271.
— gracilis **8** : 243, 245, 246.
— hyalina **8** : 243, 245, 247; **11** : 269; **14** : 108.
— mucronata **4** : 188; **8** : 243, 245, 246.
— opaca **8** : 242, 245.
— Wahlbergiana **4** : 188; **8** : 242, 245, 246, 247; **11** : 269.
— sp. **2** : 111; **7** : 177.
Nitzschia **10** : 294.
— acuminata **10** : 308.
— angustata **10** : 290.
— Brébissonii **10** : 308.
— circumsuta **9** : 174; **10** : 308.
— denticulata **10** : 290.
— flexa **14** : 61.
— gracilis **12** : 183.
— hungarica **10** : 308.
— linearis **12** : 183.
— marginulata **10** : 308.
— obtusa **10** : 308.
— palea **10** : 290.
— punctata **10** : 308.
— — v. elongata **10** : 308.
— recta **12** : 183.
— romana **10** : 308.
— scalaris **9** : 174; **10** : 292—296, 308.
— sigma **9** : 174, 176; **10** : 294, 308.
— — v. rigida **10** : 308.
— — v. sigmatella **9** : 176.
— sigmoidea v. armoricana **10** : 308.
— socialis v. baltica **10** : 308.
— spectabilis **10** : 316.
— tryblionella **10** : 308.
— — v. ambigua **10** : 308.
— — v. salinarum **10** : 308.
— — v. subsalina **10** : 308.
Nodularia Harveyana **19** : 217.
— spumigena **16** : 2, 3.
— — v. litorea **16** : 3.
— — v. maior **16** : 3.
Nostoc coeruleum **13** : 47.
— commune **5** : 156; **10** : 224; **12** : 52, 181; **17** : 28— 30, 106 ... 121.
— Kihlmani **14** : 129.
— Linckia **19** : 217.
— macrosporum **17** : 106 ... 112.
— microscopicum **5** : 156; **12** : 52; **17** : 106 ... 121.
— minutum **4** : 186 ... 190; **5** : 156; **17** : 28, 29.
— sphaericum **5** : 156; **6** : 175, 177; **12** : 52; **17** : 106, 112.
— sphaeroides **17** : 6.
— sp. **5** : 142; **6** : 175; **10** : 264; **13** : 37; **17** : 117; **19** : 85.
Oedogonium australe **19** : 218.
— Cleveanum **12** : 184.
— crispum **12** : 47, 184; **13** : 38; **19** : 85, 86.
— cymatosporum **12** : 47.
— fragile **12** : 184.
— Franklinianum **13** : 35, 38.
— intermedium **17** : 77.
— nodulosum v. commune **12** : 47; **13** : 38; **19** : 85.
— oblongum **12** : 184.
— Reinschii **19** : 84 (fig.), 85.
— rufescens **17** : 107, 117.
— — v. exiguum **17** : 107, 117.

Oedogonium undulatum **10** : 264; **12** : 47; **13** : 38; **17** : 127; **19** : 85.
— sp. **4** : 187, 188; **5** : 148; **7** : 241; **10** : 264; **13** : 24; **14** : 56, 129; **17** : 26, 78, 111, 117; **19** : 84, 86; **20** : 7, 8, 9.
Onychonema filiforme **13** : 46.
Oocystis Naegelii **5** : 147.
— parva **7** : 240.
— submarina **5** : 147.
Opephora Martyi **12** : 183.
Ophiocytium capitatum **20** : 8, 9.
— cochleare **20** : 8.
Oscillatoria Agardhii **20** : 8.
— amoena **5** : 156; **7** : 247; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 128.
— amphibia **5** : 142, 156; **14** : 129; **17** : 106; **20** : 8.
— — v. robusta **14** : 129.
— angusta **20** : 148.
— chalybaea **7** : 247; **13** : 47; **20** : 8.
— curviceps **12** : 181; **14** : 129; **20** : 6, 7, 8.
— formosa **5** : 156; **7** : 247; **20** : 6, 8.
— geminata **20** : 6.
— irrigua **20** : 6.
— lacustris **5** : 156; **14** : 61.
— limnetica **14** : 61.
— limosa **5** : 156; **16** : 3; **17** : 26, 78; **20** : 6—10.
— ornata **20** : 9.
— princeps **12** : 52; **13** : 47.
— pseudogeminata **20** : 6.
— sancta **12** : 181; **13** : 47.
— simplicissima **10** : 225.
— splendida **13** : 47; **14** : 129; **17** : 128; **19** : 217; **20** : 8.
— tenuis **4** : 187, 188; **5** : 142, 156; **12** : 52; **13** : 47; **14** : 61, 129; **16** : 3; **17** : 106, 128; **20** : 6—10.
— — v. natans **4** : 189.
— sp. **6** : 158, [159], 161; **7** : 247; **20** : 9.
Pandorina morum **20** : 7, 10.
Paralia sulcata **10** : 292—296, 308, 315.
Pediastrum **18** : 91.
— angulosum **10** : 264; **13** : 37.
— biradiatum **7** : 240.
— Boryanum **5** : 141, 147; **7** : 237, 240; **10** : 264; **12** : 46, 184; **13** : 37; **17** : 127; **19** : 85, 218.
— — v. granulatum **6** : 178.
— Braunii **5** : 147; **7** : 237, 238, 240; **10** : 264; **19** : 218.
— duplex **13** : 37.
— — v. cohaerens **13** : 37.
— — v. rotundatum **13** : 37.
— integrum **13** : 37; **17** : 127.
— muticum v. longicorne **10** : 264.
— simplex **12** : 47.
— tetras **10** : 264; **12** : 47; **13** : 37; **14** : 56; **17** : 127; **19** : 85, 218.
— tricornutum **5** : 147.
Penium crassiusculum **10** : 260; **12** : 47.
— cucurbitinum **10** : 267.
— cylindrus **5** : 148; **13** : 39; **14** : 56; **17** : 127; **19** : 218.
— exiguum **10** : 260; **13** : 39; **14** : 56.
— — f. majus **5** : 148; **10** : 260.
— libellula **20** : 6.
— margaritaceum **10** : 260; **13** : 39.
— minutissimum **10** : 269.
— polymorphum **7** : 241; **10** : 260; **12** : 47; **13** : 39; **14** : 56; **17** : 106 . . . 121, 127; **19** : 218.
— rufescens **13** : 39.
— spinospermum **17** : 106, 117.
— spirostriolatum **5** : 148; **7** : 241; **13** : 40; **17** : 127; **19** : 218.
— truncatum **17** : 106.
Percursaria percursa **4** : 50, 51, 55, 186, 188, 191; **6** : 176, 178; **17** : 77.
Peridinium anglicum **12** : 183.
— cinctum **12** : 183.
— Volzii **19** : 86.
— Willei **10** : 264.
— sp. **6** : 159; **19** : 217.
Peronia erinacea **14** : 59.
Petalonema velutinum **12** : 181; **17** : 79, 106, 107.
Phormidium ambiguum **9** : 173.
— au(c)tumnale **4** : 187—189; **5** : 142, 156; **10** : 225; **12** : 181; **13** : 23; **17** : 106 . . . 120; **19** : 83, 217; **20** : 5, 9.
— corium **4** : 187—189; **5** : 140; **12** : 181; **13** : 23, 24; **15** : 176; **17** : 6, 106 . . . 118; **18** : 114; **20** : 6, 7.
— foveolarum **12** : 181.
— laminosum **5** : 156; **7** : 247; **17** : 109, 117.
— molle **19** : 83.
— mucicola **6** : 149—151 (fig.).
— Retzii **5** : 140; **12** : 52; **17** : 106 . . . 121.
— — v. nigroviolacea **5** : 156.
— subuliforme **1** : 44, 147, 158.
— tenue **4** : 187—189; **5** : 139, 142, 156; **7** : 247; **17** : 106 . . . 118; **20** : 148.
— uncinatum **12** : 52; **17** : 109.
— valderianum **17** : 106 . . . 117; **20** : 7.
— sp. **4** : 50; **17** : 108, 113, 121.
Phyllophora Brodiaei **4** : 58; **6** : 174, 179; **9** : 173; **10** : 12; **12** : 185; **13** : 23, 25; **15** : 191.
— — f. elongata **6** : 179.
Pinnularia **4** : 66, 82; **9** : 174; **10** : 292, 296.
— acrosphaeria **10** : 316.
— *alandica* (Lagerheimii v.?) **10** : 310, 320 (fig.).
— appendiculata **14** : 60.
— bicapitata **10** : 310.
— — v. lata **10** : 310.
— biclavata **10** : 310, 318, 320.
— — v. minor **10** : 292, 310.
— borealis **10** : 290, 317.
— Brandelii **10** : 316.

Pinnularia Brébissonii v. hybrida **10** : 310.
— — v. truncata **10** : 310, 320.
— brevicostata **10** : 316.
— — v. elongata **9** : 174 (fig.), 176.
— — v. leptostauron **10** : 310.
— cardinalis **10** : 310, 318.
— cuneata **10** : 310, 318, 320.
— — v. reducta **10** : 310, 320 (fig.).
— dactylus **10** : 316.
— distinguenda **10** : 293, 295, 310.
— divergens **10** : 310; **14** : 60.
— episcopalis **10** : 316.
— esox **10** : 310.
— gentilis **10** : 310.
— gibba **14** : 60.
— globiceps **10** : 290.
— gracillima **12** : 183; **14** : 60.
— interrupta **10** : 310; **14** : 60.
— — v. crassior **10** : 290, 310.
— karelica **10** : 316.
— Lagerheimii **10** : 320.
— lata **10** : 292, 310, 317.
— laticeps **10** : 316.
— legumen **10** : 310.
— — v. florentina **10** : 310.
— macilenta **10** : 316.
— major **10** : 310; **12** : 183; **14** : 60.
— — v. Kuetzingii **10** : 310.
— mesolepta v. stauroneiformis **10** : 310.
— microstauron **14** : 60.
— nobilis **10** : 292, 310.
— — v. horrida **10** : 310.
— nodosa **10** : 316, 317.
— — f. capitata **10** : 310.
— parallela v. linearis **10** : 310, 320.
— petsamoënsis **14** : 60.
— platycephala **10** : 316.
— quadratarea v. subproducta **10** : 310.
— rangoonensis **10** : 310.
— semicruciata **10** : 316.
— stauroptera **10** : 310.
— — v. parva **10** : 310; **14** : 60.
— stomatophora **10** : 310; **14** : 60.
— streptoraphe **10** : 310.
— subsolaris **10** : 310.
— — v. *constricta* **10** : 310, 320.
— undulata **14** : 60.
— viridis **10** : 310, 320; **12** : 183; **14** : 60.
— — v. commutata **10** : 290, 310.
— — v. intermedia **12** : 183; **14** : 60.
— — v. leptogongyla **10** : 320.
— — v. rupestris **10** : 312, 317.
— — v. sudetica **12** : 183.
Plectonema Boryanum **20** : 9.
— Hansgirgi **15** : 176.
— norvegicum **12** : 181.
— nostocorum **17** : 106, 111, 116.
— — f. *discolor* **5** : 155, 157.
— notatum **7** : 247; **12** : 52; **13** : 47; **14** : 61; **15** : 176; **19** : 85; **20** : 5, 9.
— phormidioides **20** : 6.
Plectonema sp. **17** : 115.
Pleurocapsa fuliginosa **6** : 175, 177; **12** : 181.
— minor **17** : 106.
Pleurochloris polychloris **20** : 6.
Pleurococcus **5** : 139.
— vulgaris **12** : 178; **20** : 5, 6, 7.
— — f. Meneghini **13** : 93.
Pleurosigma angulatum v. finmarchicum **10** : 312.
Pleurotaenium coronatum **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 40; **19** : 219.
— Ehrenbergii **5** : 149; **7** : 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 40; **17** : 127; **19** : 219.
— minutum **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **17** : 127; **19** : 219.
— nodosum **10** : 261; **13** : 41.
— rectum **10** : 261; **19** : 219.
— trabecula **5** : 141, 149; **7** : 237, 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **17** : 127; **19** : 86.
— — v. rectum **5** : 149; **7** : 242; **12** : 48.
— truncatum **5** : 149; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **17** : 127.
— — v. Farquharsonii **12** : 48.
Polysiphonia nigrescens **4** : 58; **6** : 179; **12** : 185; **15** : 191.
— violacea **4** : 51, 58; **17** : 78; **19** : 217.
Prasiola crispa **5** : 141, 148; **15** : 226; **17** : 107 . . . 120.
— stipitata **4** : 99; **15** : 192, 226.
Protococcus viridis **12** : 178; **17** : 107, 111, 120.
Protoderma viride f. marinum **1** : 7.
Pseudanabaena catenata **5** : 156.
Pylaiella litoralis **4** : 51, 57, 188; **6** : 178; **9** : 172, 173; **12** : 185; **13** : 23, 25; **15** : 225; **17** : 77, 78; **19** : 218; **20** : 152, (153).
Quadrigula lacustris **13** : 38.
— Pfitzeri **10** : 264; **13** : 38; **17** : 127.
Rhabdoderma lineare **10** : 264, 266 (fig.), 267.
— sigmoidea **20** : 6.
Rhabdonema **9** : 174; **10** : 292, 294, 295, 296, 315, 321.
— arcuatum **10** : 312.
— minutum **10** : 312.
Rhizoclonium crispum **20** : 9.
— hieroglyphicum **5** : 140.
— riparium **4** : 51, 55, 186 . . . 191; **5** : 140; **6** : 175, 176, 178, 179; **7** : 176; **9** : 172, 173; **10** : 96; **12** : 184; **13** : 24; **17** : 26, 77, 78; **20** : 147, 152.
— — f. implexum **4** : 55.
— — v. validum **19** : 218.
Rhodochorton Rothii **12** : 177, 181, 185; **19** : 217.
Rhodomela subfusca **4** : 58; **15** : 191.
Rhoicosphaenia **4** : 66; **10** : 315.
— curvata **10** : 312; **14** : 60.
— — v. fracta **10** : 312.
Rhopalodia **4** : 66.
— gibba **10** : 290, 312; **12** : 183.

Rhopalodia gibba v. ventricosa **10**: 312.
— musculus **10** : 312.
— parallela **12** : 183.
Rivularia atra **1** : 7; **4** : 53.
— Biasolettiana **4** : 51, 53, 187, 189, 190; **5** : 139, 140, 155; **6** : 175, 177; **7** : 176; **9** : 173; **12** : 181; **13** : 23, 24; **14** : 129.
— nitida **1** : 7; **4** : 52, 53; **5** : 140.
Roya anglica **17** : 106.
— pseudoclosterium **13** : 35, 39.
Scenedesmus abundans **13** : 37; **17** : 127.
— acuminatus **13** : 37; **20** : 148.
— acutiformis **10** : 265; **13** : 37; **17** : 127; **20** : 148.
— arcuatus **13** : 37.
— — v. capitatus **10** : 265.
— bijuga(tus) **4** : 50, 54; **5** : 147; **10** : 265; **12** : 184; **13** : 38; **17** : 127; **19** : 85; **20** : 7, 148.
— — v. alternans **10** : 265, 266 (fig.), 267, 269 (fig.), 270; **13** : 38; **17** : 127.
— brasiliensis **10** : 265.
— curvatus **10** : 265.
— denticulatus **5** : 147; **7** : 240; **13** : 38; **19** : 85.
— dimorphus **10** : 265; **13** : 38.
— hystrix **13** : 38; **17** : 127.
— obliquus **10** : 265; **13** : 38; **17** : 127.
— ovalternus v. Graevenitzii **10** : 270.
— quadricauda **7** : 240; **10** : 265; **12** : 47, 184; **13** : 38; **17** : 127; **19** : 218; **20** : 5, 6, 148.
— — v. Westii **13** : 38.
— serratus **10** : 265, 269 (fig.).
Schizochlamys delicatula **19** : 83.
— gelatinosa **10** : 265; **12** : 184; **13** : 37; **17** : 127; **20** : 7.
Schizophyceae [**4** : 75].
Schizothrix antarctica **5** : 157.
— calcicola **12** : 178, 181; **15** : 176.
— Friesii **17** : 106 . . . 119.
— Heufleri **12** : 181.
— lardacea **5** : 157.
— Naegelii **12** : 181.
Scytonema crustaceum **17** : 106, 107, 112.
— Hofmannii **17** : 106 . . . 120.
— mirabile **5** : 156; **7** : 247; **8** : 235; **12** : 181; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 106 . . . 121; **19** : 83, 86, 217; **20** : 9.
— — v. Leprieurii **5** : 156; **7** : 247; **20** : 9.
— myochrous **17** : 106 . . . 116.
— ocellatum **17** : 6, 106 . . . 120.
— sp. **5** : 156; **17** : 113, 114.
Selenastrum gracile **7** : 240; **13** : 38.
— Westii **13** : 38.
Sirodotia fennica **9** : 139.
— suecica **9** : 139.
Sirogonium sticticum **4** : 188.
Sorastrum americanum **13** : 38; **17** : 127.
— spinulosum **13** : 38.
Sphacelaria racemosa **4** : 57, 186, 188, 192; **6** : 178; **9** : 173; **12** : 185; **13** : 23, 25; **15** : 191.
Sphaerozosma excavatum **10** : 263; **13** : 46; **19** : 222.
— granulatum **5** : 154; **7** : 246; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 46; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 222.
— vertebratum **13** : 46; **17** : 128.
Spirogyra bellis **11** : 123, 132.
— calospora **11** : 127.
— catenaeformis **4** : 50, 52, 54, 192; **11** : 129.
— Collinsii **19** : 218.
— daedalea **11** : 130.
— esthonica **11** : 130; **15** : 177, 179.
— fennica **11** : 129; **19** : 85.
— fluviatilis **6** : 131—132 (fig.); **11** : 131.
— — v. africana **6** : 132.
— foveolata **15** : 177—179 (fig.).
— gracilis **11** : 129; **13** : 39; **15** : 177.
— Grevilleana **11** : 123, 128; **13** : 39.
— Grossi **6** : 132.
— Hassallii **11** : 129.
— inflata **11** : 128; **15** : 177.
— Juergensii **11** : 130.
— kuusamoënsis **7** : 241; **11** : 129; **15** : 177—179 (fig.).
— Lagerheimii **11** : 131.
— longata **11** : 123, 130; **13** : 39.
— — f. major **11** : 130.
— majuscula **11** : 123, 132; **13** : 39.
— maxima **11** : 132; **20** : 9.
— mirabilis **11** : 123, 127; **13** : 39.
— Naegelii **11** : 127; **13** : 39; **19** : 86.
— parvula **11** : 129.
— pellucida **11** : 131, 132.
— protecta **5** : 148; **11** : 131.
— punctata **11** : 131 (fig.); **12** : 47; **15** : 179.
— — f. major **11** : 131.
— reticulata **11** : 129.
— scrobiculata **9** : 141; **11** : 130.
— setiformis **11** : 131.
— sphaerospora **11** : 131, 132.
— Spreeiana **10** : 265; **11** : 123, 128; **12** : 47, 184; **13** : 39; **15** : 177; **17** : 127; **19** : 86.
— stictica **11** : 127.
— subsalina **11** : 129.
— tenuissima **5** : 148; (**11** : 127).
— ternata **11** : 131.
— varians **9** : 141; **11** : 123, 130; **13** : 39.
— Weberi **11** : 128.
— Willei **11** : 129; **19** : 87.
— sp. **4** : 188; **5** : 141; **6** : 80; **7** : 237; **10** : 265; **13** : 25; **14** : 56, 129; **15** : 47; **17** : 77, 121; **19** : 86; **20** : 6, 7, 9, 10.
Spirotaenia condensata **10** : 260; **13** : 39.
— endospira **17** : 106 . . . 116.
— fusiformis **17** : 106.
— obscura **10** : 260.

Spirulina Jenneri **20** : 9.
— maior **19** : 217.
— subsalsa **4** : 187, 188, 190; **5** : 156.
— subtilissima **4** : 187, 188, 190.
Spondylosium pulchellum **10** : 263; **13** : 46; **17** : 128.
— secedens **10** : 263.
Staurastrum acarides **5** : 142, 153; **7** : 238.
— aciculiferum **10** : 263; **12** : 50; **13** : 45; **14** : 58; **19** : 221.
— alpinum **8** : 235.
— alternans **5** : 153; **12** : 184; **13** : 45; **17** : 128; **19** : 221.
— americanum v. longiradiatum **19** : 221.
— anatinum **10** : 263; **12** : 50; **13** : 45; **19** : 221.
— — v. curtum **13** : 45.
— — v. denticulatum **10** : 263.
— — v. longibrachiatum **10** : 263; **19** : 221.
— apiculatum **10** : 263; **12** : 50; **13** : 45; **17** : 128.
— arachne **5** : 153; **10** : 263; **13** : 45; **19** : 221.
— arctiscon **10** : 263; **19** : 221.
— arcuatum **10** : 263; **13** : 45.
— aristiferum **10** : 263; **19** : 221.
— aversum **10** : 263; **19** : 221.
— avicula **5** : 153; **7** : 245; **13** : 45; **17** : 128; **19** : 85, 221.
— — v. subarcuatum **5** : 153.
— Bieneanum **10** : 263; **13** : 45.
— Borgeanum **10** : 263; **17** : 110; **19** : 221.
— — v. compactum **17** : 106.
— brachiatum **10** : 263; **13** : 45.
— brachycerum **10** : 263, 266 (fig.), 267, 269.
— brasiliense v. Lundellii **10** : 263; **12** : 50.
— Brébissonii **5** : 153; **13** : 45; **17** : 128; **19** : 221.
— — v. *maximum* **7** : 245 (fig.).
— brevispinum **7** : 245; **12** : 50; **13** : 45.
— capitulum **13** : 45; **17** : 106, 110, 128; **19** : 221.
— — f. Borgei **17** : 106.
— cerastes **13** : 45; **19** : 221.
— cingulum **19** : 222.
— — v. obesum **19** : 222.
— clepsydra v. sibericum f. trigonum **14** : 58.
— Clevei **10** : 263; **13** : 45; **19** : 222.
— connatum **10** : 263; **13** : 45; **19** : 222.
— controversum **10** : 263; **13** : 45.
— cosmospinosum **10** : 263.
— crenulatum **14** : 58.
— cristatum **5** : 153; **12** : 50; **13** : 45.
— cumbricum **13** : 45.
— curvatum **10** : 263.
— cuspidatum **5** : 153; **10** : 263; **12** : 50; **13** : 45; **14** : 58; **19** : 85, 222.
Staurastrum dejectum **7** : 245; **12** : 50; **13** : 45; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 222.
— — v. Debaryanum **10** : 263.
— — v. patens **12** : 50.
— diacanthum **19** : 222.
— Dickiei **10** : 263; **13** : 45; **17** : 128.
— — v. circulare **19** : 85.
— dilatatum **5** : 153; **7** : 245; **10** : 263; **13** : 45; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 222.
— — v. hibernicum **19** : 222.
— dimazum **10** : 263.
— disputatum **10** : 263.
— echinatum **14** : 58.
— erasum **19** : 222.
— forficulatum **7** : 245; **13** : 45.
— furcatum **13** : 45.
— — v. subsenarium **7** : 245.
— furcigerum **5** : 153; **12** : 50; **13** : 45.
— — f. armigerum **13** : 45; **17** : 128.
— glabrum **13** : 45; **14** : 58.
— gladiosum **13** : 45; **17** : 128.
— — v. delicatulum **19** : 222.
— gracile **5** : 153; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 45; **17** : 128.
— — v. nanum **5** : 153; **13** : 45; **17** : 128.
— grande v. parvum **5** : 153; **19** : 222.
— granulosum **10** : 263, 266 (fig.), 267; **14** : 58.
— — v. acutum **7** : 245.
— haeboeliense **10** : 263.
— hexacerum **5** : 153; **10** : 263.
— hirsutum **5** : 153; **10** : 263.
— Hoehnei **19** : 222.
— hystrix **5** : 153; **12** : 51; **13** : 45; **19** : 222.
— — v. paucispinosum **13** : 45.
— inconspicuum **10** : 263; **12** : 51; **13** : 45; **14** : 58; **19** : 222.
— inflexum **12** : 51; **13** : 45; **17** : 128.
— insigne **5** : 153.
— jaculiferum **7** : 245; **13** : 45.
— Johnsonii **19** : 222.
— lanceolatum **5** : 153; **7** : 245.
— lapponicum **12** : 51; **13** : 45; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 85, 222.
— leptodermum **10** : 263.
— longispinum **10** : 263; **12** : 51; **13** : 45; **19** : 222.
— lunatum **5** : 153; **10** : 263; **13** : 45; **17** : 128.
— — forma **10** : 266 (fig.), 267.
— — v. luxurians **10** : 263.
— — v. planctonicum **12** : 51.
— Manfeldtii **12** : 51; **13** : 45; **19** : 85.
— — v. annulatum **10** : 263.
— margaritaceum **5** : 153; **7** : 246; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 45; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 222.
— — forma **10** : 263.
— — v. coronulatum **10** : 263.
— megacanthum **7** : 246 (fig.); **10** : 263; **12** : 51; **13** : 45; **19** : 222.
— — v. scoticum **19** : 222.

Staurastrum Meriani **13** : 35, 45; **17** : 106 . . . 121, 128.
— micron **13** : 45.
— minutissimum **5** : 153; **7** : 246.
— monticulosum **5** : 153; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 46; **17** : 128.
— mucronatum **10** : 263, 269 (fig.).
— muricatum **10** : 263.
— muticum **7** : 246; **10** : 263; **12** : 51; **14** : 58.
— natator **10** : 263.
— Omearii (O' Meari) **10** : 263; **13** : 46.
— ophiura **10** : 263; **13** : 46.
— orbiculare **13** : 46; **14** : 58; **17** : 128.
— — v. depressum **5** : 153; **7** : 246; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 46.
— — v. hibernicum **13** : 46; **17** : 128.
— — v. Ralfsii **14** : 58.
— ornatum **10** : 263, 266 (fig.), 267.
— oxyacantha **10** : 263.
— pachyrhynchum **13** : 35, 46; **14** : 58.
— paradoxum **5** : 153; **10** : 263; **13** : 46; **19** : 222.
— — v. longipes **10** : 263.
— — v. parvum **19** : 222.
— pentacerum **19** : 222.
— polymorphum **7** : 246; **10** : 263; **12** : 51, 184; **13** : 46; **14** : 56; **17** : 128; **19** : 85, 222.
— polytrichum **13** : 46; **17** : 128.
— pseudopachyrhynchum **19** : 222.
— pseudopelagicum **19** : 222.
— pseudotetracerum **5** : 153; **10** : 263; **13** : 46.
— punctulatum **5** : 141, 153; **7** : 246; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 46; **14** : 58; **17** : 106, 113, 121, 128; **19** : 222.
— — v. Kjellmani **10** : 263.
— — v. — forma **10** : 263.
— — v. pygmaeum **10** : 263.
— pungens **13** : 46.
— pyramidatum **5** : 153; **14** : 58.
— scabrum **5** : 153; **10** : 263; **13** : 46; **14** : 58.
— Sebaldii **5** : 153; **7** : 246; **13** : 46; **19** : 222.
— — v. productum **10** : 263.
— senarium **5** : 153.
— senticosum **10** : 263.
— setigerum **10** : 263; **13** : 46.
— — v. pectinatum **13** : 46.
— sexangulare **10** : 263.
— sexcostatum **5** : 142, 153; **7** : 238; **10** : 263; **13** : 35, 46; **14** : 58; **17** : 128.
— — v. productum **14** : 58.
— Simonyi **7** : 246; **12** : 51; **13** : 46; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 222.
— spongiosum **5** : 154; **7** : 246; **10** : 263, **13** : 46; **19** : 222.
— subavicula **5** : 154; **10** : 263; **13** : 46.
Staurastrum subcruciatum **5** : 154; **13** : 46.
— subnudibrachiatum v. incisum **10** : 263.
— subpygmaeum **10** : 263.
— subscabrum **12** : 51; **13** : 46.
— teliferum **5** : 154; **7** : 246; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 46; **14** : 58; **17** : 128; **19** : 222.
— tetracerum **5** : 154; **10** : 263; **12** : 51; **13** : 46; **19** : 222.
— tohopekaligense **10** : 263; **13** : 46.
— turgescens **10** : 263.
— vestitum **10** : 263; **12** : 51; **13** : 46; **19** : 222.
— — forma **5** : 154.
— sp. **20** : 7.
Stauroneis acuta **10** : 293, 296, 312.
— anceps **10** : 312.
— — v. fossilis **10** : 312.
— Gregorii **10** : 312.
— parvula v. prominula **10** : 312.
— phoenicenteron **10** : 296, 312; **14** : 60.
— — v. amphilepta **10** : 312.
— — v. gracilis **10** : 312.
Steiniella Graevenitzii **10** : 265, 266 (fig.), 267, 269 (fig.), 270.
Stephanodiscus astraea v. minutula **10** : 290.
Stephanosphaera pluvialis **20** : 5.
Stichococcus bacillaris **17** : 107.
Stichogloea olivacea **10** : 265.
Stictyosiphon tortilis **4** : 55, 57, 188; **7** : 176, 177; **9** : 172; **12** : 185; **13** : 23, 25; **17** : 78.
Stigeoclonium nudiusculum **4** : 188, 191.
— tenue **5** : 148; **13** : 38; **20** : 7, 9.
— sp. **6** : 122; **20** : 6, 148.
Stigonema hormoides **17** : 106 . . . 119; **19** : 83; **20** : 148.
— informe **17** : 106 . . . 119.
— mamillosum **5** : 155; **7** : 247; **17** : 6, 106 . . . 117; **20** : 148.
— minutum **17** : 79, 106 . . . 116; **19** : 83.
— ocellatum **5** : 155; **7** : 237, 247; **12** : 51; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 79, 106 . . . 115; **19** : 85, 217; **20** : 148.
— panniforme **17** : 79, 106, 107.
— tomentosum **14** : 61; **17** : 79, 106 . . . 118; **19** : 83; **20** : 5, 148.
— turfaceum **5** : 155; **17** : 79, 106 . . . 113; **20** : 148.
— sp. **5** : 155; **17** : 114, 121.
Surirella **4** : 66.
— Astridae **10** : 316.
— biseriata **10** : 312.
— Capronii **10** : 312.
— gemma **10** : 296, 312.
— ovalis **10** : 312.
— robusta **10** : 312.
— — v. splendida **10** : 312.
— striatula **10** : 295, 312, 321.
Symploca hydnoides **4** : 52, 53.
— muscorum **12** : 181; **17** : 106 . . . 115.

Synechococcus aeruginosus **5** : 155; **7** : 247; **10** : 265; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 106 . . . 121, 128; **19** : 83.
— maior **7** : 246, 247; **10** : 265; **12** : 51; **13** : 47; **14** : 61; **17** : 106, 109, 128.
Synechocystis sallensis **14** : 61.
Synedra **4** : 66.
— actinastroides **12** : 183; **14** : 59.
— acus **10** : 290, 312; **12** : 183.
— — v. acula **10** : 312.
— affinis **10** : 312; **12** : 183; **14** : 59.
— — v. delicatula **10** : 312.
— — v. rostrata **10** : 312.
— crystallina **10** : 312.
— pulchella **10** : 312.
— rumpens **14** : 59.
— tabulata **9** : 174.
— ulna **12** : 183; **14** : 59.
— — v. amphirhynchus **10** : 312.
— — v. danica **10** : 312; **12** : 183.
— — v. longissima **10** : 290.
Tabellaria binalis **14** : 59.
— fenestrata **10** : 312; **14** : 59; **20** : 8.
— — v. asterionelloides **14** : 59.
— — v. intermedia **10** : 312.
— flocculosa **10** : 265, 290, 312; **14** : 59; **20** : 8.
— sp. **20** : 8.
Tetmemorus Brébissonii **5** : 149; **13** : 41; **17** : 127; **19** : 219.
— — v. minor **5** : 149; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **17** : 127; **19** : 219.
— granulatus **5** : 141, 149; **7** : 237, 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 127; **19** : 86, 219.
— laevis **5** : 149; **7** : 237, 242; **10** : 261; **12** : 48; **13** : 41; **14** : 57; **17** : 106 . . . 121, 127; **19** : 219.
Tetracyclus lacustris **10** : 312, 316; **14** : 59.
Tetraëdron caudatum **7** : 240; **19** : 85.
— limneticum **13** : 37.
— lobulatum **13** : 37.
— minimum **7** : 240; **10** : 265; **12** : 184; **13** : 37; **17** : 127; **20** : 5.
— muticum v. punctulatum **13** : 37.
— regulare **10** : 265; **13** : 37; **17** : 107, 118.
— trigonum **13** : 37; **19** : 218.
— — v. minimum **10** : 265.
— sp. **10** : 265.
Tetrapedia glauca **10** : 265.
— setigera **10** : 265.
Tetraspora cylindrica **12** : 46.
— lubrica **12** : 46; **14** : 56; **20** : 7.
— sp. **7** : 241; **13** : 37; **17** : 127.
Thalassiosira baltica **10** : 312, 316.
Tolypella nidifica **4** : 189; **7** : 177; **8** : 244, 247; **13** : 23, 25; **17** : 77, 78, 344.
— Stenhammariana **10** : 288.
Tolypellopsis stelligera **8** : 243, 248; **10** : 288, 289; **11** : 269.
Tolypothrix Bouteillei **17** : 7.
— distorta **5** : 155; **13** : 47; **17** : 78; **20** : 7, 8, 9.
— lanata **12** : 52, 181; **13** : 47; **14** : 61, 172; **17** : 26, 106, 113, 116.
— limbata **5** : 155; **7** : 247; **12** : 52; **19** : 217.
— tenuis **4** : 53, 187, 188, 190; **5** : 140, 141, 142, 155; **7** : 175, 237, 247; **12** : 181; **13** : 24, 47; **14** : 61, 129; **17** : 77, 106; **19** : 85, 86, 217; **20** : 7, 8, 152.
Trentepohlia aurea **10** : 225, 227; **12** : 47, 181, 184, 192; **17** : 107, 111, 116.
— jolithus **17** : 107, 111; **20** : 148.
Tribonema affine **20** : 6.
— bombycinum **18** : 114; **20** : 6, 8.
— minus **5** : 141, 148; **12** : 47; **13** : 39; **14** : 56; **17** : 106, 111, 112, 114; **18** : 114; **19** : 218; **20** : 6, 7, 8.
— obsoletum **20** : 7.
— tenerrimum **5** : 148.
— viride **5** : 148; **7** : 241; **20** : 6.
— vulgare **19** : 86; **20** : 6.
— sp. **7** : 241; **20** : 9.
Triploceras gracile **13** : 41; **19** : 219.
Tropidoneis **10** : 290.
Ulothricaceae **5** : 136.
Ulothrix aequalis **4** : 187, 188, 191.
— limnetica **10** : 265.
— pseudoflacca **4** : 50, 55.
— subflaccida **4** : 55; **5** : 135, 137; **20** : 7.
— subtilissima **5** : 147; **14** : 56.
— tenerrima **20** : 6.
— tenuissima **13** : 38.
— variabilis **5** : 147.
— zonata **4** : 188, 191; **5** : 147; **6** : 178; **7** : 176; **17** : 77; **20** : 9, 10.
— sp. **14** : 56; **20** : 5.
Vaucheria hamata **20** : 148.
— terrestris **12** : 47.
— uncinata **4** : 188; **13** : 39.
— sp. **4** : 188, 189; **5** : 148; **7** : 175, 176; **10** : 289; **13** : 24; **16** : 2; **17** : 77, 78; **19** : 218; **20** : 10.
Volvox aureus **10** : 265.
Westella botryoides? **10** : 265.
Xanthidium antilopaeum **5** : 152; **7** : 245; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44; **17** : 128; **19** : 85, 221.
— — v. dimazum **7** : 245; **10** : 262; **13** : 44.
— — v. ornatum **10** : 262; **13** : 44.
— — v. polymazum **10** : 262; **19** : 221.
— armatum **5** : 152; **7** : 245; **10** : 262; **12** : 50; **13** : 44.
— — v. fissum **19** : 221.
— concinnum v. varians **13** : 44.
— controversum **13** : 44.
— cristatum **5** : 152; **10** : 262; **13** : 44; **17** : 128; **19** : 221.
— — v. Delpontei **12** : 50.
— — v. uncinatum **13** : 44.

Xanthidium cristatum v. uncinatum f. longispinum **13** : 44.
— fasciculatum **5** : 152; **13** : 44.
— — v. longispinum **13** : 44.
Zygnema cruciatum **4** : 188, 190; **11** : 126.
— cyanosporum **11** : 126; **19** : 218.
— decussatum **11** : 126.
— inconspicuum **11** : 126.
— insigne **11** : 127.
— leiospermum **10** : 265.
— pectinatum **5** : 148; **19** : 86.
— peliosporum **10** : 265; **11** : 126.
— Ralfsii **19** : 86.
— stellinum **4** : 188; **7** : 241; **11** : 123, 127; **19** : 86.
— subtile **11** : 126.
— Vaucherii **19** : 86.
— sp. **4** : 50, 53, 187, 188; **5** : 141; **6** : 80; **7** : 175, 176, 237; **14** : 56, 129; **17** : 106, 121; **19** : 85; **20** : 6, 7.
Zygogonium ericetorum **17** : 79.

BACTERIA.

Azotobacter chroococcum **9** : 182.
Beggiatoa alba **20** : 8.
— arachnoidea **20** : 8.
— leptomitiformis **6** : 122; **20** : 6.
— sp. **17** : 78.
Chromatium sp. **20** : 6.
Cladothrix dichotoma **20** : 7, 148.
Rhodococcus sp. **20** : 8.
Rhodocystis gelatinosa **20** : 6.
Sphaerotilus natans **4** : 51, 187; **6** : 122; **17** : 191, 192; **20** : 7.
Spirochaete plicatilis **20** : 8.
Streptococcus sp. **20** : 10.
Thiopolycoccus ruber **20** : 6.
Thiospirillum sanguineum **20** : 6.

FUNGI.

Abrothallus parmeliarum **12** : 11.
Acetabula vulgaris **17** : 189.
Achlya **18** : 91.
— polyandra **20** : 149.
— spinosa **20** : 149.
Agaricus aureus **7** : 5.
Aleuria aurantia (-ca) **18** : 20; **20** : 12.
Amanita mappa **18** : 4, 18; **19** : 8.
— muscaria **18** : 18, 75; **19** : 7, 8, 10.
— pantherina **12** : 74; **13** : 49; **17** : 182—187 (fig.); **18** : 4, 18; **19** : 8.
— phalloides **18** : 3, 18.
— porphyria **18** : 5, 18; **19** : 10.
— rubescens **18** : 18; **19** : 8, 10.
— spissa **18** : 4, 18.
— umbrina **18** : 18; **19** : 7, 8.
— vaginata **18** : 18.
— — v. fulva **18** : 18.
— virosa **18** : 18.
Amanitopsis strangulata **19** : 10, 216.
— vaginata **18** : 18, 75; **19** : 10; **20** : 12.
— — v. badia **18** : 78.
— — v. fulva **18** : 78; **19** : 10.
— — v. fungites **18** : 78; **19** : 216.
Androsaceus rotula? **19** : 18.
Aphanomyces **18** : 91.
Apodachlya **18** : 91.
Apodya lactea **6** : 124; **20** : 7, (8).
Arcyria incarnata **18** : 20.
Armillaria caligata **18** : 25; **19** : 42, 306.
— mellea **17** : 281, 283; **18** : 18.
Ascobolus furfuraceus **18** : 20.
Ascophanes merdarius **19** : 216.
Aspergillus niger **6** : 119.
— — f. altipes **8** : 80.
— — f. proteus **8** : 80.
Asterodon ferruginosum **18** : 7.
Barlaea fulgens **19** : 17.
Bolbitius Boltoni **19** : 213.
— titubans **19** : 213.
— vitellinus **18** : 5, 10; **19** : 13.
Boletinus cavipes **19** : 8.
Boletus aestivalis **18** : 3, 10.
— badius **13** : 50; **18** : 5, 10, 70, 75.
— bovinus **13** : 104, 107, 108; **18** : 5, 10, 77; **19** : 15.
— castaneus **18** : 70, 72—73; **19** : 213.
— cavipes **10** : 20—21; **18** : 77.
— chrysenteron **18** : 3, 10.
— — var. **10** : 20.
— cyanescens **18** : 73—74.
— edulis **18** : 19; **19** : 15; **20** : 12.
— — f. pinicola **18** : 9.
— — f. typica **18** : 9.
— elegans **19** : 8, 9.
— erythropus **18** : 69.
— felleus **18** : 5, 9; **19** : 15.
— flavidus **13** : 104, 107; **18** : 5, 10; **19** : 8.
— granulatus **18** : 5, 10; **19** : 15.
— luridus **18** : 3, 5, 9, 68—70.
— luteus **13** : 104, 107; **18** : 5, 10; **19** : 8, 15.
— miniatoporus **18** : 3, 9, 68—71.
— piperatus **18** : 5, 10; **19** : 15.
— pseudo-scaber **19** : 7.
— pulverulentus **18** : 70—72.
— rufus **18** : 4, 9; **20** : 12; **19** : 15.
— satanas **18** : 2, 5, 6, 9, 24, 69.
— scaber **8** : 37; **13** : 104, 106, 107; **18** : 9; **19** : 7, 15; **20** : 12.
— — v. niveus **13** : 104, 107.
— subtomentosus **18** : 10, 70; **19** : 8.
— tumidus **18** : 75.
— variegatus **18** : 5, 10; **19** : 15.
— viscidus **19** : 8.
Bovista nigrescens **17** : 188, 189; **18** : 19.
— plumbea **18** : 19.
— sp. **20** : 154.
Bovistaria gigantea **17** : 187, 189.
Bovistella ammophila **20** : 154.

Bovistella echinella **20** : 153.
— *Karsteni* **20** : 153—155.
— lycoperdoides **20** : 154.
— ohiense **20** : 153.
— paludosa **20** : 153.
— pedicellatum **13** : 50; **20** : 153.
Calocera cornea **18** : 7.
— furcata **18** : 7.
— viscosa **9** : 73, 80, 82, 83, 90; **18** : 4, 6.
Calodon geogenius **13** : 50.
— suaveolens **17** : 7.
Calvatia bovista **17** : 344.
— caelata **18** : 19.
— gigantea **12** : 74; **17** : 187—189 (fig.); **18** : 19.
— saccata (v. pistilliformis) **18** : 19.
Camarophyllus niveus **19** : 14.
Cantharellus aurantiacus **9** : 73, 87; **18** : 5, 13; **19** : 15.
— cibarius **9** : 73, 83, 90; **18** : 13; **19** : 15.
— deflectens **13** : 50.
— infundibuliformis **9** : 74, 79, 82—84, 87, 90.
— tubiformis **18** : 13.
— umbonatus **9** : 73, 74, 80, 82, 84, 85, 87, 90; **18** : 13.
— sp. **8** : 241.
Ceratiomyxa fruticulosa **18** : 20.
Cintractia caricis **1** : 90; **13** : 172.
Clavaria abietina **18** : 4, 7.
— anomala **19** : 7.
— botrytis **18** : 4, 7.
— cristata **18** : 7.
— fennica **18** : 4, 7.
— fistulosa **13** : 50, 52.
— flava **18** : 4, 7.
— fusiformis **13** : 50.
— inaequalis **19** : 212.
— ligula **9** : 73, 80, 82, 83, 90; **18** : 4, 7.
— pistillaris **10** : 21; **18** : 4, 7.
— purpurea **13** : 50; **18** : 7.
— rosea v. attenuata **17** : 129.
— vermicularis **19** : 212.
— sp. **20** : 12.
Clavariella decolorans **19** : 17.
— sp. **9** : 73.
Claviceps purpurea **18** : 19.
Clitocybe adsentiens **19** : 215.
— aggregata v. sphaerospora **18** : 78.
— angustissima **9** : 75, 87, 91.
— cerussata **19** : 215.
— — v. difformis **9** : 75, 77, 78, 80.
— clavipes **18** : 5, 17.
— conglobata **18** : 78.
— cyathiformis **9** : 73, 74, 76, 80, 90; **18** : 16.
— decastes **19** : 11.
— diatreta **9** : 76; **18** : 16.
— ditopus **9** : 73, 74, 77, 79, 81, 84, 87, 90.
— fragrans **9** : 72—74, 80, 81, 83, 90; **18** : 4, 16; **19** : 11.
— geotropa **18** : 17.
Clitocybe gigantea **4** : 24—25; **13** : 51; **18** : 5, 17.
— gilva **9** : 73, 74, 77, 79, 80.
— infundibuliformis **18** : 17; **19** : 11.
— — var. **19** : 11.
— inversa **18** : 17.
— laccata **18** : 16.
— — v. amethystina **18** : 16.
— — v. proxima **18** : 16.
— — v. rosella **18** : 16, 78.
— maxima **18** : 17.
— metachroa **9** : 73, 74, 81—84, 87, 90; **18** : 5, 16.
— nebularis **13** : 50, 51; **18** : 4, 17; **19** : 18.
— — f. albin. **13** : 50.
— — v. alba **19** : 10.
— obsoleta? **9** : 73, 74, 90.
— odora **18** : 17; **19** : 10.
— pithyophila **18** : 5, 16.
— squamulosa **18** : 17; **19** : 315.
— subinvoluta **19** : 215.
— tortilis **18** : 78; **19** : 17.
Clitopilus prunulus **18** : 12.
Collybia atrata **9** : 76, 79, 87, 90.
— butyracea **9** : 83, 86, 91; **18** : 16.
— cessens **9** : 79, 80, 91.
— cirrhata **13** : 104, 107; **18** : 16.
— clusilis **13** : 108, 109.
— confluens **19** : 215.
— dryophila **13** : 104, 106; **18** : 16.
— fusipes **9** : 84.
— leucomyosotis **13** : 103, 105, 108, 109; **18** : 79.
— macilenta **19** : 215.
— maculata **19** : 215.
— platyphylla **9** : 84, 86; **19** : 215.
— radicata **18** : 3, 16, 79.
— rancida **19** : 215.
— tenacella **9** : 75, 77, 80—85, 91; **18** : 16.
— tuberosa **19** : 11.
— velutipes **9** : 76, 79, 83—85, 90.
Coniosporum physciae **20** : 168.
Coprinus atramentarius **18** : 5, 12; **19** : 14.
— comatus **18** : 5, 11; **19** : 14.
— fimetarius **18** : 5, 11.
— hemerobius **19** : 214.
— impatiens **19** : 214.
— micaceus **18** : 5, 12.
— niveus **18** : 5, 12.
— plicatilis **18** : 5, 12; **19** : 14.
— radiatus **18** : 5, 12.
Cordyceps ophioglossoides **10** : 22.
Coriolus abietinus **19** : 16.
— hirsutus **19** : 16.
— pubescens **19** : 16.
— unicolor **19** : 16.
— velutinus **19** : 16.
— zonatus **19** : 16.
Cortinarius anomalus **19** : 12, 213.
— armillatus **18** : 11; **19** : 12.
— balteatus **18** : 11.

Cortinarius brunneus **19** : 12.
— camphoratus **18** : 5, 11.
— cinnamomeus **18** : 11; **19** : 12.
— collinitus **18** : 3, 11; **19** : 12.
— croceus **18** : 11.
— decoloratus v. betuleti **9** : 74, 79, 84, 90.
— delibutus **19** : 12.
— elatior **19** : 213.
— emollitus **19** : 12.
— fulgens **18** : 5, 11.
— glandicolor v. curtus **19** : 12.
— glaucopus **18** : 11; **19** : 12.
— heterosporus **19** : 12.
— macropus **18** : 79.
— malachius **18** : 5, 11; **19** : 12.
— multiformis **19** : 213.
— obturans **19** : 213.
— pavonius **10** : 21.
— sanguineus **18** : 5, 11; **19** : 12.
— semisanguineus **18** : 5, 11; **19** : 12.
— traganus **19** : 12.
— triumphans **18** : 11; **19** : 12.
— trivialis **18** : 79.
— violaceus **17** : 7;[1] **18** : 11; **19** : 12.
— sp. **9** : 73.
Craterellus cornucopioides **18** : 4, 7.
— lutescens **17** : 7; **19** : 212.
Crepidotus applanatus **19** : 213.
— calolepis **18** : 10.
— haustellaris **19** : 213.
— mollis **18** : 10.
Cricunopus cavipes **10** : 20.
Crucibulum vulgare **18** : 19.
Cryptomycina pteridis **18** : 19.
Cudonia circinans **18** : 20; **20** : 12.
Cyathus campanulatus **9** : 69.
— olla **9** : 69.
— striatus **9** : 69, 238.
— vernicosus **9** : 69.
Cyphella galeata **9** : 85.
Daedalea quercina **18** : 3, 9.
— unicolor **18** : 9.
Decomia atrorufa **9** : 83, 85, 91.
Dryodon caput ursi **19** : 17.
— cirrhatum **19** : 16.
— coralloides **11** : 47—48; **12** : 255.
Eccilia rusticoides **18** : 3, 12.
Elaphomyces cervinus v. asperulus **10** : 22.
— granulatus **8** : 375; **12** : 255; **14** : 131—133; **15** : 275.
— muricatus **14** : 133—134; **15** : 275.
— variegatus **14** : 133.
Empusa aulicae **18** : 140, 143, 173.
— grylli **18** : 140.
Entoloma clypeatum **19** : 214.
— Magnusii **15** : 275.
— maiale **19** : 214.
— rhodopolium **19** : 8.
Entoloma sericeum **19** : 214.
— sp. **9** : 78.
Exidia pithya **18** : 4, 6.
Exoascus alnitorquens **5** : 213.
Exobasidium andromedae **18** : 7.
— myrtilli **18** : 7.
— vaccinii **18** : 7.
Fistulina hepatica **17** : 7, 11; **18** : 3, 9; **19** : 15.
Flammula penetrans **9** : 76, 78, 90; **18** : 5, 11.
— spumosa **18** : 11.
Fomes betulinus **19** : 16.
— conchatus **18** : 9.
— fomentarius **18** : 9; **19** : 16.
— fraxineus **19** : 16.
— igniarius **18** : 9.
— ungulatus **18** : 9; **19** : 16.
Fuligo septica **18** : 20.
Fusarium aquaeductum **20** : 9.
Galera badipes **19** : 13.
— hypnorum **18** : 10; **19** : 13.
— lactea **19** : 13.
— — f. semiglobata **19** : 13.
— lateritia **19** : 13.
— paludosa **18** : 79.
— sphaerobasis **19** : 13.
— sphagnorum **13** : 103, 106; **19** : 13, 213.
— tenera **18** : 5, 10; **19** : 13.
— vittaeformis **19** : 13, 213.
Ganoderma applanatum **19** : 213.
— lucidum **10** : 21; **18** : 3, 9.
Geaster Bryantii **9** : 68, 238.
— calyculatus **9** : 68; **10** : 21.
— fimbriatus **12** : 146; **13** : 51, 172.
— floriformis **12** : 146.
— pectinatus **9** : 68; **17** : 7; **19** : 216.
— quadrifidus **18** : 5, 19.
— rufescens **12** : 146.
— sp. **8** : 375.
Geoglossum hirsutum **14** : 172.
— — f. capitatum **13** : 51.
Geopyxis catinus **19** : 16.
Gloeoporus amorphus **18** : 9.
Gomphidius glutinosus **18** : 11; **19** : 14.
— roseus **18** : 11; **19** : 14.
— viscidus **18** : 5, 11; **19** : 14.
Gonapodya polymorpha **5** : 97.
Gymnosporangium juniperinum **18** : 20.
Gyrodon **18** : 74, 75.
— caespitosus **18** : 74.
— labyrinthicus **18** : 75, 76; **19** : 16.
— lividus **18** : 73—77; **19** : 16.
— rubescens **18** : 76.
— sistotrema **18** : 74, 75.
— volvatus **18** : 74, 75.
Gyromitra caroliniana **18** : 20.
— curtipes **19** : 137.
— esculenta **18** : 20.
Hebeloma crustuliniforme **13** : 104, 107; **18** : 4, 11; **19** : 13.
— mesophaeum **18** : 4, 11; **19** : 12.
— sinapizans **18** : 4, 11; **19** : 12.

[1] Per errorem violascens.

Helotium aeruginosum **18** : 20.
— citrinum **19** : 216.
— virgultorum **19** : 216.
Helvella crispa **19** : 216.
— infula **19** : 216.
— lacunosa **19** : 216.
Homostegia Piggotii **12** : 11.
Hydnotrya Tulasnei **10** : 22, 23.
Hydnum aurantiacum **18** : 4, 8.
— auriscalpium **18** : 4, 7.
— cirrhatum **18** : 7.
— coralloides **11** : 47—48; **18** : 7.
— corrugatum **19** : 212.
— cyathiforme **18** : 7.
— ferrugineum **18** : 4, 8.
— imbricatum **18** : 4, 8.
— melaleucum **18** : 7.
— repandum **18** : 8; **19** : 16.
— rufescens **18** : 8.
— scrobiculatum **18** : 8.
— septentrionale **19** : 212.
— suaveolens **18** : 4, 8.
Hygrocybe cantharellus **19** : 7.
— conica **19** : 14.
— miniata **19** : 14.
— nitrata **19** : 14.
— punicea **19** : 14.
— Reai **19** : 14.
— turundus **19** : 14.
Hygrophorus agathosmus **18** : 4, 13.
— caprinus **18** : 4, 13.
— ceraceus **18** : 13.
— chlorophanus **18** : 4, 13.
— coccineus **19** : 214.[1]
— conicus **18** : 13.
— cossus **18** : 13.
— eburneus **9** : 82; **18** : 4, 13.
— erubescens **18** : 13.
— hypothejus **9** : 75, 80, 82, 83, 85, 86, 90; **18** : 4, 13.
— miniatus **13** : 103, 105; **19** : 214.[1]
— nitratus **19** : 214.[1]
— niveus **19** : 214.[1]
— olivaceo-albus **18** : 13.
— pratensis **18** : 13.
— psittacinus **19** : 214.[1]
— puniceus **18** : 13; **19** : 42.
— pustulatus **18** : 4, 13.
— tephroleucus? **9** : 83.
— turundus **19** : 212, 214.[1]
— unguinosus **18** : 4, 13.
— virgineus **18** : 3; **19** : 214.[1]
— vitellum **9** : 85.
— sp. **9** : 71, 73.
Hypholoma Candolleanum **18** : 12; **19** : 13.
— capnoides **18** : 12.
— fasciculare **18** : 12.
— sublateritium **19** : 214.
Hypomyces chrysospermus **18** : 19.
Inocybe abjecta **19** : 213.
— calospora **18** : 4, 11, 80.
— deglubens **18** : 4, 10.
— fastigiata **18** : 10.
— flocculosa **19** : 12, 213.
— geophylla **18** : 10; **19** : 12.
— lacera **13** : 103, 105; **18** : 5, 10.
— — v. gracilis **19** : 213.
— — v. halophila **19** : 213.
— lanuginella **18** : 80; **19** : 213.
— napipes **19** : 12, 213.
— obscura **19** : 213.
— petiginosa **19** : 212, 213.
— praetervisa **18** : 80.
— proximella **19** : 12, 213.
— putilla **19** : 12.
— rhodiola **19** : 212, 213.
— trechispora **18** : 80; **19** : 12.
— umboninota **18** : 80; **19** : 213.
— umbrina **18** : 80.
Irpex fuscoviolaceus **13** : 104, 106.
Isaria brachiata **18** : 20.
Laccaria laccata **9** : 72—74, 80, 81, 83, 84, 90; **13** : 103, 104; **19** : 18.
— tortilis **19** : 17.
Lachnea hemisphaerica **19** : 216.
— scutellata **19** : 216.
Lacrymaria lacrymabunda **19** : 13.
Lactarius aspideus **19** : 215.
— aurantiacus **19** : 14.
— controversus **18** : 3, 14.
— cyathula **19** : 215.
— deliciosus **13** : 104, 107; **18** : 4, 14; **19** : 15; **20** : 12.
— flexuosus **18** : 14; **19** : 14.
— fuliginosus **18** : 4, 14.
— — f. albipes **19** : 14.
— glyciosmus **18** : 4, 15.
— helvus **9** : 75, 79; **13** : 104, 107; **18** : 4, 15; **19** : 8.
— hysginus **19** : 215.
— lignyotus **19** : 215.
— mitissimus **18** : 3, 15; **19** : 14.
— obnubilus **19** : 215.
— obscuratus **18** : 80.
— piperatus **18** : 14.
— pyrogalus **18** : 3, 14.
— quietus **19** : 215.
— repraesentaneus **19** : 7, 8.
— resimus **18** : 14.
— roseozonatus **19** : 14.
— rufus **13** : 104, 106, 107; **18** : 4, 15; **19** : 8.
— scrobiculatus **18** : 4, 14.
— subdulcis **13** : 104, 107; **18** : 4, 15; (**19** : 7).
— thejogalus **19** : 7.
— torminosus **18** : 14; **20** : 12; **19** : 14.
— trivialis **18** : 15.
— turpis **18** : 4, 14.
— uvidus **18** : 14; **19** : 14.
— vellereus **18** : 4, 14.

[1] Per errorem Hydrophorus.

Lactarius vietus **18** : 14.
— volemus **10** : 21; **13** : 51; **18** : 3, 15; **19** : 15.
— sp. **20** : 11.
Lentinus lepideus **17** : 182, 185—187 (fig.); **18** : 4, 15.
— — f. monstrosa **12** : 74.
— — v. ceratoides **17** : 185—187.
Lenzites abietina (?) **19** : 213.
— betulina **18** : 9.
— heteromorpha **13** : 51.
— quercina **19** : 16.
— saepiaria **18** : 5, 9.
Lenzitina abietina **13** : 51.
Leocarpus fragilis **18** : 20.
Leotia lubrica **17** : 182.
Lepiota amianthina **18** : 18; **19** : 10.
— Brébissonii v. cretacea **18** : 25.
— charcharias **9** . 72, 75, 79, 81, 83, 90; **18** . 18; **19** : 10.
— clypeolaria **18** : 18; **19** : 10.
— excoriata **18** : 18.
— fulvella **19** : 18.
— granulosa **9** : 72, 81, 82, 84, 90; **19** : 10.
— leucothites **18** : 25, 80; **19** : 216.
— lutea **18** : 25.
— procera **18** : 18.
— rhacodes **9** : 75, 77, 86, 90; **18** : 18; **19** : 10.
— semiinuda **18** : 25, 81.
— umbonata **19** : 10.
Leptoglossum musigenum **13** : 51.
Leptomitaceae sp. **4** : 50.
Leptomitus lacteus **6** : 121, 122.
Leptonia asprella **13** : 103, 105, 107.
— sericella **19** : 214.
— serrulata **18** : 13.
Leucoporus lacteus **19** : 16.
Limacium agathosmum **19** : 14.
— olivaceo-album **19** : 14.
— pustulatum **19** : 14.
Lycogala epidendron **18** : 20.
Lycoperdon furfuraceum **20** : 153, 154.
— gemmatum **17** : 129; **18** : 19.
— perlatum **17** : 129.
— polymorphum **13** : 51; **20** : 153.
— pratense **13** : 51; **18** : 19.
— pusillum **13** : 51, 52; **20** : 153.
— pyriforme **18** : 19.
— umbrinum **18** : 19.
Marasmiopsis erythropus **18** : 81; **19** : 17.
— subannulata **18** : 81.
Marasmius androsaceus **8** : 36; **9** : 73, 80, 81, 83, 85, 89; **18** : 15; **19** : 11.
— calopus **19** : 11.
— ceratopus **19** : 17.
— chordalis **19** : 11.
— cohaerens **19** : 17.
— epiphyllus **18** : 4, 15.
— graminum **9** : 83, 87.
— oreades **18** : 15; **19** : 11.
Marasmius perforans **9** : 83, 85, 89; **18** : 5, 15; **19** : 11.
— peronatus **9** : 72, 73, 74, 79, 82, 84, 85, 90; **18** : 5, 15.
— ramealis **18** : 15; **19** : 11.
— rotula **9** : 73, 75, 76, 79; **18** : 4, 15; **19** : 11.
— scorodonius **9** : 73, 74, 76, 77, 79—81, 84, 85, 87, 89; **18** : 15; **19** : 11.
Merisma palmatum **17** : 7.
Merulius domesticus **18** : 8.
— fugax **18** : 8.
— tremellosus **9** : 79; **18** : 8.
Mitrula paludosa **12** : 255; **17** : 129; **19** : 216.
— phalloides **17** : 129.
Monoblepharis brachyandra **18** : 89.
— polymorpha **18** : 89.
Morchella conica **18** : 20.
Mucronella calva **19** : 212.
Mycena alcalina **9** : 79, 83, 90.
— — v. chlorinella **19** : 215.
— balanina **19** : 17.
— cinerella **9** : 80, 91.
— debilis **19** : 215.
— elegans **9** : 80, 91; **19** : 11.
— epipterygia **9** : 75, 80, 81, 83, 91; **19** : 11.
— excisa **13** : 104, 106, 107; **18** : 81; **19** : 11.
— fagetorum **18** : 81.
— flavoalba **9** : 76, 79, 87, 90; **18** : 16.
— galericulata **9** : 72, 75, 76, 78, 90; **13** : 104, 106; **18** : 16; **19** : 11.
— galopus **19** : 11.
— haematopus **19** : 11.
— inclinata **18** : 3, 16.
— lactea **18** : 16.
— — v. pithya **19** : 11.
— laevigata **19** : 11.
— metata **9** : 73, 75, 77, 80—85, 90, 91.
— parabolica? **19** : 215.
— polygramma **9** : 83, 91; **18** : 3, 16.
— pura **18** : 16; **19** : 11.
— rorida **19** : 11.
— rubromarginata **13** : 104, 106.
— sanguinolenta **13** : 104, 106.
— vitilis **18** : 16.
— vulgaris **9** : 75, 91; **19** : 11.
Mycenastrum corium **13** : 101, 172.
— ohiense **20** : 153.
Naematoloma capnoides **9** : 73, 74, 80, 82, 83, 85, 87, 90.
— fasciculare **9** : 76, 78, 90.
— lateritium **9** : 74, 77, 79, 87, 90.
Naucoria conspersa **19** : 13.
— furfuracens **9** : 85.
— Jennyae **19** : 213.
— myosotis **13** : 103, 106.
— semiorbicularis **19** : 13.
Nectria cinnabarina **11** : 186.
Nidularia campanulata **9** : 69.
— vernicosa **9** : 69.
Nolanea hirtipes **18** : 81.

Nolanea mammosa **18** : 13.
— pascua **18** : 13.
Nyctalis asterophora **18** : 13.
Odontia fimbriata **18** : 7.
Omphalia campanella **18** : 5, 16.
— fibula **18** : 16.
— gracillima **19** : 215.
— grisea **9** : 83, 91.
— griseo-pallida **19** : 11.
— leucophylla **19** : 11.
— rustica **19** : 215.
— setipes **19** : 215.
— sphagnicola **13** : 103, 104, 108.
— striaepileus? **9** : 75.
— umbellifera **18** : 16.
— umbilicata **9** : 75, 91; **18** : 3, 16.
Onnia tomentosa **13** : 51.
Otidea cochleata **19** : 216.
— onotica **18** : 20.
Panaeolus acuminatus **19** : 212, 214.
— campanulatus **18** : 5, 12; **19** : 14.
— fimicola **9** : 75, 76, 85.
— — v. ater **19** : 14.
— papilionaceus **18** : 12.
— retirugis **18** : 81.
— separatus **18** : 5, 12.
— sphinctrinus **19** : 214.
— subbalteatus **19** : 214.
Panus conchatus **18** : 81.
— flabelliformis **18** : 15.
— stipticus **18** : 3, 15.
Paxillopsis prunulus **19** : 8, 13.
Paxillus atrotomentosus **18** : 5, 10; **19** : 13.
— involutus **9** : 73; **13** : 104, 106; **18** : 10, 77; **19** : 13.
— panuoides **18** : 5, 10.
Paxina hispida **19** : 216.
Peziza **7** : 126.
— acetabulum **17** : 189—191 (fig.); **18** : 271.
— badia **18** : 20.
— fulgens **19** : 137.
— repanda **14** : 125—126, 172; **18** : 20.
— scutellata **13** : 103, 104.
— tuberosa **3** : 129.
— vesiculosa **19** : 216.
Phallus impudicus **18** : 3, 19.
Pharcidia epicymatica **12** : 11.
Phellinus igniarius **19** : 16.
Phlyctochytrium vernale **5** : 138 (fig.).
Pholiota aegerita **19** : 212, 213.
— aurea **7** : 321; **12** : 255.
— blattaria **19** : 17.
— caperata **18** : 11.
— destruens **18** : 11.
— erebia **18** : 82; **19** : 8.
— flammans **18** : 11; **19** : 12.
— heteroclita **19** : 12.
— marginata **9** : 73, 74, 77, 79, 86, 90; **18** : 11.
— muricata **19** : 18.
Pholiota mutabilis **18** : 11; **19** : 12.
— mycenoides **13** : 103, 105, 108, 109; **18** : 79.
— praecox **18** : 11; **19** : 12.
— radicosa **18** : 82.
— spectabilis **18** : 11, 82.
— sphaleromorpha **18** : 82.
— squarrosa **9** : 76; **18** : 11.
Phragmidium arcticum **12** : 159.
Pisolithus arenarius **13** : 102, 172; **14** : 172.
Plasmophagus oedogoniarum v. ulothricis **5** : 137.
Plectanea coccinea **18** : 20.
Pleurodon auriscalpium **9** : 75, 79, 82; **19** : 16.
Pleurotus corticatus **19** : 215.
— dryinus **19** : 215.
— lignatilis **18** : 16.
— mitis **9** : 80—82, 85, 90.
— mutilus **19** : 212, 215.
— perpusillus **18** : 5, 15.
— salignus **9** : 84, 86.
— serotinus **9** : 76, 79, 90; **18** : 16
— striatulus **18** : 5, 15.
Pluteus cervinus **18** : 4, 13; **19** : 11.
— umbrosus **18** : 3, 13.
Polypilus caudicinus **10** : 21.
Polyporellus squamosus **10** : 21.
— varius **19** : 15.
Polyporus adustus **18** : 8.
— albidus **19** : 212.
— betulinus **18** : 8.
— borealis **18** : 4, 8.
— brumalis **18** : 8.
— confluens **18** : 4, 8.
— erubescens **19** : 213.
— fumosus **19** : 212.
— lepideus **18** : 8.
— leucomelas **18** : 8.
— melanopus **18** : 8.
— ovinus **18** : 4, 8; **19** : 15.
— Schweinitzii **19** : 213.
— sulphureus **19** : 15, 213.
— sp. **9** : 85.
Polysaccum crassipes **13** : 102.
Polystictus abietinus **18** : 4, 9.
— perennis **18** : 4, 9.
— pubescens **18** : 8.
— Schweinitzii **10** : 21.
— tomentosus **19** : 213.
— velutinus **18** : 8.
— versicolor **18** : 8.
— zonatus **18** : 9.
Poria calcea **18** : 8.
— mucida **18** : 8.
— rufa **18** : 4, 8.
Psalliota abruptibulba **18** : 12.
— arvensis **18** : 12.
— augusta **18** : 12; **19** : 18.
— campestris **18** : 12; **19** : 13.
— comptula **19** : 13.

Psalliota dulcidula **19** : 212, 214.
— haemorrhoidaria **18** : 3, 12.
— hortensis **18** : 5, 12.
— rusiophylla **19** : 212, 214.
— semota **19** : 212, 214.
— silvatica **18** : 12.
— Vaillantii **19** : 212, 214.
Psathyra atomata **19** : 14.
Psathyrella disseminata **18** : 12.
Pseudocoprinus disseminatus **19** : 14.
Psilocybe bullacea **18** : 5, 12; **19** : 214.
— dichroa **19** : 13.
— elongata v. polytrichi **19** : 13.
— foenisecii **19** : 214.
— merdaria **18** : 5, 12.
— spadicea **9** : 76, 78, 87, 90; **18** : 4, 12.
— uda **13** : 103, 106; **19** : 214.
Puccinia epilobii **12** : 140.
Radulum orbiculare **18** : 7.
Ramaria **17** : 184.
Rhizidium vernale **5** : 138.
Rhizina inflata **19** : 16, 18.
Rhizophidium sphaerocarpum **20** : 6.
Rhizopogon luteolus **18** : 5, 19.
— roseolus **18** : 19.
Rhodophyllus Cordae **19** : 11.
— junceus **19** : 11.
— minutus **19** : 11.
Russula adusta **18** : 13.
— aeruginea **18** : 4, 14; **19** : 15.
— albonigra **19** : 214.
— alutacea **18** : 4, 14; **19** : 15.
— aurata **19** : 212, 215.
— badia **19** : 15.
— consobrina **19** : 214.
— decolorans **18** : 14, 83.
— delica **18** : 4, 13.
— densifolia **19** : 214.
— emetica **18** : 13.
— fallax **18** : 82.
— flava **19** : 215.
— foetens **18** : 4, 14; **19** : 15.
— fragilis **18** : 14; **19** : 15.
— graveolens **19** : 7.
— heterophylla **18** : 3, 14.
— integra **18** : 14.
— lepida **19** : 214.
— lilacea **19** : 215.
— lutea **18** : 4, 14; **19** : 7, 8.
— melliolens **19** : 7.
— nigricans **18** : 13.
— paludosa **18** : 14, 82; **19** : 15.
— puellaris **13** : 104, 107; **18** : 4, 14.
— rosacea **18** : 14.
— sanguinea **18** : 4, 14.
— venosa **19** : 7.
— versicolor **19** : 7.
— vesca **19** : 214.
— vinosa **18** : 14; **19** : 7.
— xerampelina **18** : 14.
Saccharomyces [**6** : 6, 114]; [**8** : 80].
Saprolegnia **6** : 121; **17** : 154, 157.
— asterophora **4** : 50.
— dioica **18** : 89—92.
— monoica **20** : 148, 149.
Saprolegniaceae sp. **4** : 50.
Sarcodon imbricatum **19** : 16.
Sarcoscypha coccinea **19** : 16.
— hiemalis **1** : 147.
Schizophyllum alneum **13** : 51.
— commune **18** : 15.
Scleroderma aurantium **9** : 69, 238; **19** : 216.
— cepa **9** : 69.
— lycopodioides **20** : 154.
— ohiense **20** : 153.
— vulgare **9** : 69.
Sclerotinia *caricis ampullaceae* **10** : 22—23, 474; **17** : 344; **18** : 271.
— scirpicola **13** : 103, 104, 107.
Simocybe sideroides **9** : 80, 85, 86, 91.
Sparassis crispa **18** : 4, 7; **19** : 17.
Spathularia flavida **18** : 20.
Stemonitis fusca **18** : 20.
Stereum hirsutum **1** : 18; **18** : 7.
— purpureum **19** : 212.
— rugosum **18** : 3, 7.
Stropharia aeruginosa **9** : 74, 76, 77, 79, 80, 90; **18** : 5, 12; **19** : 13; **20** : 12.
— — v. albocyanea **9** : 76, 82, 86.
— coprophila **19** : 13.
— coronilla **19** : 13.
— depilata **18** : 12.
— melasperma **13** : 51.
— merdaria **19** : 13.
— psathyroides **18** : 83.
— semiglobata **13** : 104, 106; **18** : 5, 12; **19** : 13.
— separata **19** : 13.
— stercoraria **19** : 214.
Synchytrium endobioticum **1** : 43, 158; **10** : [1, 475].
Taphrina betulae ssp. carnea **18** : 20.
— cerasi **11** : 176.
— crataegi **18** : 20.
— potentillae **18** : 20.
— pruni **11** : 177; **18** : 20
— Sadebeckii **18** : 20.
— sp. **11** : 97, 175.
Taricium megaspermum **18** : 140.
Thelephora caryophyllaea **19** : 212.
— laciniata **13** : 104, 106.
— terrestris **18** : 4, 7.
Torula lichenum **12** : 11.
Trametes cinnabarina **18** : 9; **19** : 16.
— heteromorpha **18** : 4, 9; **19** : 16.
— odorata **18** : 4, 9.
— suaveolens **18** : 9.
— subsinuosa **19** : 16.
Tremella foliacea **19** : 212.
Tremellodon gelatinosus **9** : 74; **18** : 4, 6.
Trichia decipiens **18** : 20.
Tricholoma albobrunneum **18** : 5, 17; **19** : 8.

Tricholoma album **18** : 4, 17.
— colossus **19** : 18.
— columbetta **18** : 3, 17.
— equestre **18** : 5, 17.
— flavobrunneum **18** : 18.
— gambosum **18** : 17.
— grammopodium **19** : 17.
— imbricatum **18** : 5, 17; **19** : 8, 10.
— inamoenum **18** : 5, 17.
— lentum **19** : 216.
— melaleucum **19** : 10.
— myomyces **18** : 17.
— nudum **18** : 5, 17.
— personatum **9** : 72, 75, 86, 90.
— pessundatum **19** : 8.
— portentosum **18** : 17.
— psammopus **19** : 9.
— pubifolium **19** : 212, 215.
— rutilans **18** : 5, 17; **19** : 10.
— saponaceum **18** : 17; **19** : 10.
— sejunctum **18** : 5, 17.
— strictipes **19** : 215.
— subpulverulentum **19** : 10.
— sulphureum **18** : 3, 17; **19** : 215.
— vaccinum **18** : 5, 17; **19** : 9.
— virgatum **18** : 17.
Tubaria furfuracea **9** : 75, 76, 79, 80, 82—85, 90; **18** : 10; **19** : 13.
— inquilina **9** : 74, 82, 86.
— pellucida **18** : 3, 10.
Tulostoma brumale **12** : 175.
Tyrodon rufescens **9** : 73, 83, 90.
Tyromyces ptychogaster **19** : 18.
Uromyces alchemillae **15** : 232.
Ustilago grandis **7** : 235.
— longissima **12** : 255; **15** : 95.
Volvaria loveiana **12** : 255;[1] **13** : 51.
— parvula **10** : 21.
— speciosa **18** : 5, 13.
Xanthochrous perennis **19** : 16.
Xylaria hypoxylon **18** : 19.

LICHENES.

Acarospora sinopica **12** : 7.
Alectoria bicolor **12** : 53.
— cana v. setacea **20** : 158, 160, 166.
— chalybaeiformis **7** : 264; **12** : 186; **14** : 130; **20** : 156, 158, 160, 166.
— divergens **11** : 231.
— Fremontii **12** : 53; **18** : 271.
— — ssp. olivacea **12** : 53.
— implexa **12** : 53; **20** : 145, 158, 160, 166.
— jubata **1** : 18; **20** : 156, 166.
— — v. prolixa **20** : 145.
— nidulifera **12** : 53; **18** : 271; **20** : 166.
— ochroleuca **6** : 147.
— sarmentosa **12** : 53.
— simplicior **12** : 52.
Alectoria thrausta **6** : 124; **12** : 186.
— sp. **7** : 195; **15** : 202, 204, 209; **20** : 36.
Anaptychia ciliaris **6** : 123, 124, 128; **10** : 226; **12** : 185, 186; **18** : 29; **20** : 158, 161, 165, 168.
— — f. leptophylla **12** : 11.
— — v. melanosticta **10** : 25; **12** : 7; **14** : 130, 131.
— — v. saxicola **15** : 226.
— fusca **14** : 130, 131; **15** : 226.
Arthonia astroidea **15** : 220.
— punctiformis **15** : 220.
— radiata **12** : 7; **20** : 159, 161.
— — f. applanata **20** : 170.
Arthopyrenia alba **18** : 109.
Aspicilia calcarea **10** : 225.
— cinerea **7** : 264; **12** : 7.
— — v. depressa **20** : 143.
— gibbosa **7** : 264.
— leprosescens **15** : 226.
— sp. **12** : 177.
Bacidia alpina **11** : 114, 269.
— Beckhausii f. planior **12** : 7.
— chlorococca **12** : 7.
— minuscula v. planior **12** : 7.
Biatora lucida v. thejotea **20** : 159, 162, 170.
— symmicta **20** : 156.
— vernalis **20** : 143.
— sp. **17** : 28.
Bilimbia chlorococca **12** : 7.
Bryopogon chalybaeiforme **20** : 157.
— implexum **20** : 156, 157.
Buellia atrata **6** : 146.
— coniops **7** : 267.
— disciformis **10** : 226; **20** : 156, 158, 161, 168.
— — v. minor **20** : 157, 168.
— parasema **20** : 156, 168.
Calicium corynellum **8** : 49.
— quercinum v. horreicola **10** : 226.
— sp. **1** : 18; **6** : 232.
Caloplaca decipiens **6** : 123, 124; **10** : 226; **17** : 26.
— murorum **15** : 226.
— scopularis **15** : 191.
— verruculifera **4** : 29; **15** : 226.
— sp. **11** : 136; **12** : 177; **15** : 192, 223.
Candelaria concolor **17** : 26; **18** : 29.
Candelariella aurella **12** : 9.
— cerinella **12** : 9.
— coralliza **12** : 7, 9.
— pulvinata **12** : 9.
— vitellina **7** : 264.
Cetraria aculeata **4** : 71; **6** : 124; **10** : 223, 225—228, 237, 242; **12** : 173, 187; **20** : 157, 166.
— aleurites **6** : 124; **12** : 187; **20** : 156, 157, 165.
— caperata **6** : 125; **20** : 144, 156—158, 160, 162, 166.
— chlorophylla **6** : 125; **17** : 7, 26; **20** : 157.

[1] Per errorem lovesiana.

Cetraria crispa **6** : 125; **15** : 23; **17** : 73; **20** : 157.
— cucullata **11** : 231; **12** : 53.
— Delisei **17** : 26.
— glauca **6** : 124, 125; **20** : 157, 158, 160, 162, 165.
— — v. fusca **15** : 3.
— islandica **6** : 88, 146 (mp.), 147; **10** : 223, 225, 227, 237; **12** : 179; **13** : 18; **15** : 23, 99, 100, 104; **17** : 73; **20** : 34—36, 156—158, 163, 166.
— — v. crispa **11** : 231.
— juniperina **6** : 125; **10** : 223, 225; **12** : 187.
— — f. terrestris **12** : 187.
— nivalis **6** : 147; **10** : 225—228, 237; **12** : 53; **14** : 15; **15** : 23—25 (mp.), 95, 202, 204, 209; **17** : 72—73; **19** : 306; **20** : 44, 157, 158, 163, 166.
— pinastri **4** : 74; **6** : 125; **12** : 11.
— saepincola **10** : 225; **12** : 187; **20** : 157, 158, 160, 162, 165.
— scutata **20** : 158, 160, 165.
— — v. Klementi **20** : 165.
— tenuifolia **20** : 158, 163, 166.
— — v. crispa **10** : 225.
— sp. **7** : 195; **8** : 40; **20** : 35, 36.
Chaenotheca hispidula **12** : 6.
— trichialis v. ferruginella **20** : 159, 162, 170.
Cladina vide Cladonia.
Cladonia alpestris **6** : 125, 147; **8** : 62; **12** : 179, 187; **14** : 14, 15; **15** : 23, 99, 100, 104, 202, 209; **17** : 73; **20** : 157, 158, 163, 169.
— alpicola **6** : 147.
— amaurocraea **12** : 53; **20** : 144.
— bacillaris **20** : 144, 169.
— bacilliformis **6** : 125; **12** : 53; **17** : 7; **20** : 144.
— bellidiflora **6** : 146, 147.
— botrytes **12** : 187; **20** : 156, 157, 159, 162, 163, 170.
— cariosa **17** : 28—31.
— — f. corticola **17** : 29.
— — f. cribrosa **17** : 30.
— — f. squamulosa **17** : 30.
— — ssp. hungarica **8** : 46.
— cenotea **6** : 125; **12** : 179.
— ceranioides **20** : 156, 157.
— chlorophaea **20** : 143.
— coccifera **13** : 18; **20** : 143, 144, 157, 169.
— — v. ssp. pleurota **6** : 125; **12** : 187.
— cornuta **6** : 125; **15** : 23, 99, 100; **20** : 159, 163, 169.
— crispata **6** : 125; **20** : 157.
— — v. dilacerata **20** : 159, 163, 169.
— — v. elegans **20** : 159, 163, 169.
— cyanipes **12** : 53.
— deformis **15** : 23, 99, 100, 104; **20** : 157, 158, 163, 169.
Cladonia degenerans **6** : 125; **12** : 187; **15** : 23; **20** : 159, 163, 169.
— destricta **12** : 7.
— digitata **6** : 125.
— elongata **11** : 144; **12** : 53.
— fimbriata **6** : 125; **17** : 28, 31.
— — v. chordalis **20** : 156.
— — v. cornutoradiata **20** : 143.
— — v. — f. radiata **20** : 159, 163, 170.
— — v. — f. subulata **20** : 159, 163, 170.
— — v. simplex **20** : 157, 159, 162, 163, 170.
— — v. — f. maior **20** : 159, 163, 170.
— — v. — f. prolifera **20** : 159, 163, 170.
— Floerkeana **20** : 156, 158, 163, 169.
— furcata **6** : 125; **8** : 42; **10** : 165, 226; **12** : 175; **15** : 191; **17** : 28, 32, 73; **20** : 143, 157.
— — f., v. palamaea **12** : 187; **17** : 28; **20** : 158, 163.
— — v. pinnata **20** : 157, 158, 163, 169.
— — v. — f. foliolosa **20** : 156, 169.
— — v. racemosa **20** : 143, 169.
— — v. rigidula **12** : 187.
— — ssp. surrecta **12** : 187.
— gracilis **4** : 74; **6** : 125, 147; **10** : 25; **11** : 231; **12** : 175; **15** : 23; **17** : 28; **20** : 159, 163, 169.
— — v. chordalis **17** : 73.
— — v. dilatata **20** : 143, 144, 157, 159, 163, 169.
— — v. — f. anthocephala **20** : 159, 163, 169.
— — v. — f. subprolifera **20** : 143, 159, 163, 169.
— Grayi **20** : 143.
— leptophylla **20** : 156, 170.
— mitis **12** : 7; **20** : 143, 144, 158, 163, 169.
— nemoxyna **20** : 143, 144.
— papillaria **15** : 211; **17** : 26.
— pleurota **20** : 144.
— pyxidata **6** : 125; **8** : 45; **10** : 25, 34; **12** : 187; **13** : 18; **15** : 104; **17** : 28, 31; **20** : 145, 156, 157, 159, 163, 170.
— — v. neglecta **4** : 26; **10** : 227; **20** : 143, 144.
— — v. pocillum **10** : 226; **12** : 175, 177.
— rangiferina **4** : 26, 71; **8** : 42; **12** : 7, 179; **13** : 17, 18; **15** : 14, 23, 99, 100, 104, 191, 194; **17** : 28, 32, 73; **18** : 83; **20** : 36, 44, 143, 157, 158, 163, 169, 170.
— — v. silvatica **20** : 156.
— rangiformis **13** : 18.
— — v. muricata **12** : 187.
— — v. pungens **10** : 226; **12** : 187.
— silvatica **4** : 26, 71; **6** : 147; **8** : 42; **12** : 7, 179; **13** : 18; **14** : 31; **15** : 99, 100, 104, 191, 194; **17** : 28, 29, 32, 73; **20** : 36, 143, 157, 158, 163, 169.
— strepsilis **17** : 26; **20** : 143.
— subcervicornis **12** : 187.

Cladonia symphycarpia **8** : 46; **10** : 165, 285 (mp.), 286; **18** : 42.
— turgida **6** : 125.
— uncialis **6** : 147; **8** : 41, 42; **10** : 165; **15** : 23; **17** : 32, 73; **20** : 144, 158, 163, 169.
— verticillata **20** : 143, 157, 170.
— Zopfii **12** : 7.
— sp. **1** : 18; **2** : 50, 51; **7** : 69, 195; **8** : 40, 41, 53; **11** : 154, 155; **12** : 123; **14** : 46, 64, 65; **15** : 191, 225; **16** : 76; **17** : 4, 27, 29, 196, 197; **18** : 42; **20** : 34—38, 44.
Coenogonium germanicum **17** : 26.
Collema crispum **6** : 125.
— flaccidum **4** : 27.
— furvum **6** : 125; **10** : 226.
— nigrescens **18** : 33.
— pulposum **6** : 125.
— rupestre **12** : 53; **18** : 33, 42; **20** : 143.
— sp. **9** : 9; **17** : 28.
Coniocybe sulphurea **12** : 6.
Coriscium viride **13** : 172.
Cornicularia odontella **12** : 53; **20** : 144.
— tenuissima **20** : 158, 163, 166.
— — v. campestris **10** : 225.
Crocynia membranacea **20** : 143.
— neglecta **20** : 144.
Cystocoleus ebeneus **8** : 49.
Dermatocarpon aquaticum **12** : 53.
— fluviatile v. Weberi **20** : 145.
— laatokkaënse **20** : 145.
— miniatum **12** : 53; **17** : 7.
— — v. complicatum **18** : 42, 43.
Diploschistes bryophilus **20** : 144.
Emprostea lepidophora **12** : 54.
Endocarpon adscendens **18** : 42.
— miniatum **4** : 27.
Ephebe lanata **18** : 43.
— pubescens **18** : 43; **20** : 148.
Eumitria **8** : 186.
Evernia divaricata **12** : 54.
— furfuracea **10** : 225; **20** : 156, 158, 160, 162.
— — v. ceratea **20** : 158, 160, 167.
— — f., v. scobicina **20** : 157, 167.
— mesomorpha **12** : 54.
— prunastri **1** : 18; **4** : 74; **6** : 124, 125; **10** : 225; **12** : 186, 187; **15** : 101, 220; **18** : 33; **20** : 156—158, 160, 162, 167.
Fulgensia bracteata **10** : 271—272, 385.
— fulgens **10** : 271.
Graphis scripta **1** : 18.
— — v. vulgaris **20** : 159, 161, 170.
Gyrophora arctica **6** : 180; **8** : 183, 184.
— corrugata **8** : 183, 184.
— crustulosa **8** : 184.
— — v. depressa **8** : 184.
— cylindrica **8** : 183.
— decussata **8** : 183.
— — v. *sublaevigata* **8** : 183.
— deusta **20** : 143, 144.
— — f. biatora **20** : 143.
Gyrophora discolor **8** : 183.
— erosa **7** : 264; **15** : 216.
— esculenta **8** : 184.
— fuliginosa **6** : 180; **8** : 184.
— hyperborea **6** : 146, 180; **8** : 183, 184.
— Muehlenbergii **8** : 184.
— Nylanderiana **8** : 184.
— polyphylla **8** : 184.
— proboscidea **6** : 180; **8** : 183.
— reticulata **8** : 183.
— rigida **19** : 328.
— rugifera **5** : 80; **8** : 184.
— spodochroa **4** : 27.
— tylorrhiza **8** : 184.
— vellea **5** : 80.
— sp. **15** : 191; **20** : 34, 35.
Haematomma coccineum **8** : 183.
— — v. ochroleucum **8** : 183.
— — v. porphyrium **8** : 183.
— elatinum **8** : 183.
— lapponicum **8** : 182, 185.
— — v. *violascens* **8** : 182.
— ventosum **8** : 182; **15** : 212.
Isidium phymatodes **12** : 9.
Lecanora albescens **10** : 225. 226.
— angulosa **1** : 18; **20** : 157.
— carpinea **20** : 158, 160, 167.
— cateilea f. pallido-testacea **10** : 225.
— chlarona **18** : 33; **20** : 158, 161, 167.
— cinerea **12** : 7.
— epixantha **12** : 9.
— glaucoma **17** : 7.
— — f. pseudosubcarnea **17** : 7.
— Hageni **20** : 158, 161, 167.
— leptyrodes **20** : 158, 161, 167.
— pallida v. angulosa **20** : 156.
— poliophaea **4** : 99.
— polytropa **6** : 146.
— — f. illusoria **12** : 7.
— rupicola **12** : 7, 11.
— salina v. aberrans **12** : 9.
— sambuci **20** : 158, 160, 167.
— subfusca **20** : 156.
— varia **20** : 158, 161, 167.
— sp. **15** : 101; **20** : 35, 36.
Lecidea contigua **6** : 146.
— euphorea **10** : 226.
— geographica **6** : 146.
— goniophila **20** : 143.
— neglecta **18** : 109.
— olivacea **10** : 226.
— uliginosa **4** : 71.
— sp. **1** : 18; **4** : 70; **15** : 220.
Lepraria sp. **12** : 9.
Leptogium cyanescens **18** : 34; **20** : 144, 145.
— lacerum **6** : 125.
— lichenoides **6** : 125.
— saturninum **20** : 143, 145.
— scotinum **10** : 226.
— tremelloides **20** : 145.

Letharia divaricata **12** : 187; **20** : 145.
— thamnodes **20** : 158, 160, 167.
Lobaria pulmonaria **6** : 123, 125; **12** : 54, 186, 187; **17** : 7; **20** : 143, 145.
— — v. papillaria **20** : 145.
— scrobiculata **17** : 7.
Massalongia carnosa **17** : 7; **18** : 43.
Melanotheca gelatinosa **12** : 6.
Nephroma (Nephromium) arcticum **2** : 111; **8** : 76; **9** : 182; **11** : 269; **12** : 255; **14** : 14.
— helveticum **20** : 143, 144.
— laevigatum **12** : 54, 187.
— parile **12** : 54, 187; **20** : 143—145.
— resupinatum **18** : 33; **20** : 143—145.
— sp. **20** : 105.
Neuropogon **8** : 186.
Ochrolechia androgyna **18** : 111.
— variolosa **12** : 8.
Opisteria arctica **19** : 49.
Parmelia **6** : 66.
— acetabulum **2** : 58, 116.
— alpicola **6** : 146.
— ambigua **6** : 124; **20** : 156—158, 160, 162, 165.
— aspera **6** : 125.
— aspidota **6** : 125; **17** : 7.
— centrifuga **12** : 54; **15** : 212; **20** : 144.
— cetrarioides **20** : 143, 144.
— conspersa **4** : 27; **7** : 264; **12** : 10; **14** : 130; **17** : 7.
— — v. isidiata **12** : 187.
— diffusa **20** : 156, 165.
— encausta **12** : 54.
— — v. multipunctata **12** : 54.
— exasperata **6** : 125.
— exasperatula **6** : 125.
— farinacea **17** : 7.
— fraudans **12** : 54.
— fuliginosa **12** : 187.
— — f. *sublaciniosa* **12** : 4, 10.
— — v., ssp. laetevirens **6** : 125; **12** : 186.
— — v. — f. setiformis **18** : 111.
— — v. *pygmaea* **12** : 4, 10.
— furfuracea **4** : 74.
— hyperopta **1** : 18; **20** : 156.
— intestiniformis **15** : 212.
— isidiotyla **7** : 264; **12** : 187; **17** : 7.
— laetevirens **12** : 186, 187.
— molliuscula **12** : 54.
— obscurata **12** : 54.
— olivacea **1** : 18; **4** : 74; **10** : 225; **15** : 101; **20** : 156—158, 160, 162, 165.
— olivaria **20** : 143, 144.
— omphalodes **12** : 7, 168, 187; **15** : 212; **17** : 26.
— pallescens **20** : 156.
— papulosa **6** : 125; **20** : 158, 160, 162, 165.
— physodes **1** : 18; **4** : 74; **6** : 124, 126; **7** : 264; **10** : 26, 225; **12** : 186, 187; **15** : 101; **20** : 157, 158, 160, 162, 165.
— — f. labrosa **20** : 156.
Parmelia physodes f. vittatoides **20** : 145.
— placorodia **6** : 124.
— prolixa **12** : 10; **14** : 130.
— pubescens **15** : 212.
— saxatilis **4** : 74; **7** : 264; **10** : 25; **12** : 7, 10, 11; **13** : 17; **14** : 130; **15** : 3, 191, 225, 226; **17** : 73; **20** : 143, 144, 158, 160, 165.
— — v. Aizonii **12** : 7.
— scortea **9** : 92; **10** : 23—31; **11** : 9—10, 58, 108; **12** : 178, 188; **14** : 130—131; **15** : 226.
— soralifera **17** : 7.
— sorediata **7** : 264; **12** : 10.
— stenophylla **7** : 264; **12** : 188; **20** : 144.
— stygia **12** : 188.
— subaurifera **1** : 18; **6** : 126; **12** : 188; **15** : 220; **20** : 158, 160, 165.
— sulcata **1** : 18; **6** : 126; **7** : 264; **10** : 225; **12** : 7, 186, 188; **15** : 101, 220; **20** : 156—158, 160, 162, 165.
— — f. prolifera **12** : 10.
— — f. subrevoluta **12** : 10.
— tiliacea **7** : 266; **8** : 45; **9** : 92; **10** : 23; **12** : 178, 188.
— tubulosa **6** : 126; **12** : 188; **17** : 7; **20** : 145, 157, 158, 160, 165.
— verruculifera **6** : 123, 126.
— vittata **12** : 54.
— sp. **8** : 49.
Parmeliella lepidiota **20** : 143.
— microphylla **18** : 43; **20** : 143.
Parmeliopsis ambigua **6** : 126.
— hyperopta **12** : 54.
Parmularia muralis v. subcartilaginea **20** : 144.
Peltidea vide Peltigera.
Peltigera apht(h)osa **8** : 43; **12** : 136; **13** : 18; **15** : 99, 100; **20** : 156—158, 163, 169.
— canina **1** : 17; **7** : 260; **8** : 41; **10** : 25—27, 34, 165; **12** : 175; **18** : 33; **20** : 156—158, 162, 163, 168.
— erumpens **8** : 47; **17** : 7; **20** : 143, 144, 158, 162, 169.
— Hazslinskyi **12** : 188; **20** : 158, 163, 169.
— horizontalis **17** : 7.
— lepidophora **6** : 126; **7** : 259—260; **12** : 54, 55 (fig., c. ap.), 188.
— leucophlebia **12** : 54; **17** : 28—32.
— malacea **17** : 7; **20** : 157, 169.
— polydactyla(-lon) **6** : 126; **8** : 41, 45; **10** : 165, 226; **12** : 188; **18** : 33; **20** : 143, 145, 158, 161, 163, 169.
— — f. collina **6** : 126.
— — v. lophyra **20** : 143.
— — v. microcarpa **20** : 145, 158, 162, 169.
— *ponojensis* **7** : 143—145 (fig.).
— praetextata **6** : 126; **12** : 175, 188; **17** : 182; **18** : 34, 36.
— rufescens **6** : 126; **7** : 260; **10** : 226; **12** : 188; **17** : 28, 29, 30, 32; **20** : 143, 158, 163, 168.

Peltigera rufescens f. incusa **6** : 126.
— — f. spuria **7** : 143.
— — v. palmata **20** : 158, 163, 169.
— scutata **9** : 9; **17** : 7.
— spuria **6** : 126; **7** : 143, 144 (fig.); **20** : 158, 163, 169.
— subcanina **6** : 94, 126.
— variolosa **6** : 126; **12** : 188; **20** : 143, 144, 158, 163, 169.
— sp. **6** : 232.
Pertusaria alpina v. occulta **12** : 7.
— amara **1** : 18; **12** : 9; **18** : 33, 109—111; **20** : 158, 161.
— — f. macrosora **12** : 8.
— — f. sanguinascens **20** : 167.
— — v. alnea **18** : 109.
— — v. — f. carpini **18** : 109.
— — v. — f. macrosora **18** : 109.
— ceuthocarpa v. isidioidea **12** : 9.
— coccodes **12** : 8, 9; **18** : 109.
— — f. albocincta **12** : 8.
— — f. albomarginata **18** : 110.
— — f. bacillosa **12** : 9.
— — v. farinosa **18** : 110.
— — v. verruculosa **12** : 8.
— dactylina **6** : 146.
— discoidea **12** : 8; **18** : 110; **20** : 143.
— — f. minor **12** : 8.
— globulifera **12** : 8.
— hemisphaerica **12** : 8.
— Henrici **12** : 8, 9; **18** : 110.
— — f. saepincola **12** : 9.
— leioplaca **12** : 8; **18** : 110; **20** : 167.
— leucostoma **12** : 8; **18** : 110.
— — v. *interrupta* **18** : 109, 110.
— lutescens **12** : 8.
— maculata **18** : 110.
— orbiculata **12** : 8.
— pertusa **18** : 110.
— — v. polycarpa **18** : 110.
— phymatodes **12** : 9; **18** : 110.
— — v. faginea **12** : 9.
— protuberans **12** : 7, 11.
— Raesaenenii **12** : 9.
— scutellata **12** : 8.
— speciosa **12** : 8.
— taeniata **18** : 110.
— tiroliensis **18** : 110.
— sp. **1** : 18; **20** : 158, 161, 167.
Phlebia leucophlebia **12** : 54.
Phlyctis agelaea **18** : 111.
— largena **18** : 33, 111.
— *perpityrea* **18** : 109, 111.
Physcia a(d)scendens **6** : 93, 127; **12** : 177, 185, 188; **15** : 220; **18** : 29.
— aipolia **6** : 93, 123, 126; **12** : 185, 188.
— — v. anthelina **20** : 158, 161, 168.
— — v. subincisa **6** : 127.
— aquila **4** : 27.
— caesia **4** : 27; **6** : 127; **8** : 45; **10** : 25; **12** : 188; **15** : 220.
Physcia constipata **12** : 55.
— cycloselioides **3** : 129.
— cycloselis **10** : 225.
— grisea **6** : 123, 127; **17** : 26; **18** : 29.
— — v. leucoleiptes **12** : 11.
— — v. — f. argyphaeoides **12** : 11.
— — v. — f. enteroxanthella **12** : 11.
— — v., ssp. pityrea **6** : 127; **18** : 29.
— — v. semifarrea **12** : 11; **18** : 29.
— hispida **20** : 158, 161, 162, 168.
— — v. adscendens **20** : 158, 161, 162, 168.
— lanuginosa **20** : 158, 161, 168.
— leptalea **20** : 158, 161, 168.
— marina **10** : 25; **12** : 188; **14** : 130.
— muscigena **12** : 55.
— nigricans **6** : 127.
— obscura f. ciliata **20** : 158, 161, 168.
— orbicularis **10** : 225; **18** : 29.
— — v. elongata **20** : 158, 161, 168.
— perisidiosa **12** : 10.
— pulverulenta **6** : 123, 127; **12** : 188; **17** : 26; **18** : 29, 33; **20** : 156, 158, 161, 165, 168.
— — f. angustata **20** : 168.
— — f. venusta **6** : 127.
— — v. argyphaea **6** : 127.
— stellaris **6** : 123, 127; **12** : 188.
— — v. radiata **20** : 158, 161, 165, 168.
— — v. rosulata **6** : 127; **20** : 158, 161, 162, 168.
— tenella **12** : 185, 188; **18** : 29.
— tribacia **6** : 127; **12** : 7; **17** : 26; **18** : 29; **20** : 158, 161, 168.
— virella **6** : 127; **12** : 188; **17** : 26.
— sp. **12** : 175; **15** : 101, 192.
Placodium aurantiacum **20** : 158, 161, 168.
— callopismum **10** : 226.
— cerinum **20** : 158, 161, 167.
— chrysodetum **18** : 36; **20** : 143.
— crenulatum **10** : 226.
— murorum **10** : 226.
Placynthium nigrum **12** : 175.
Polychidium muscicola **18** : 43.
Pseudocyphellaria **6** : 66.
Ramalina angustissima **7** : 261—267 (mp.); **8** : 185; **14** : 130, 131.
— calicaris **12** : 172, 185, 186, 188.
— — v. canaliculata **12** : 186, 188.
— dilacerata **6** : 127; **12** : 55; **20** : 145, 158, 160, 167.
— farinacea **1** : 18; **6** : 127; **8** : 184; **12** : 55, 175, 186, 188; **15** : 220; **18** : 33.
— — v. flavescens **8** : 184, 185.
— — v. gracilenta **8** : 185.
— — v. minutula **8** : 185.
— — v. multifida **8** : 185.
— — v. normalis **8** : 184, 185; **10** : 225; **20** : 158, 160, 162, 166.
— — v. — f. gracilenta **20** : 158, 160, 166.
— — v. — f. multifida **20** : 158, 160, 166.
— — v. — f. phalerata **20** : 158, 160, 166.

Ramalina farinacea v. normalis f. submultifida **20** : 158, 160, 166.
— — v. pendula **8** : 185.
— — v. phalerata **8** : 185.
— — v. rubescens **8** : 184, 185; **12** : 55.
— — v. sulfurea **8** : 184, 185.
— fraxinea **6** : 127; **10** : 225, 475; **12** : 189; **15** : 220; **17** : 26; **18** : 29; **20** : 158, 160, 164, 165, 166.
— nervosa **20** : 158, 160, 166.
— obtusata **6** : 128; **12** : 55, 189; **20** : 144.
— pollinaria **12** : 55; **17** : 7; **18** : 33.
— pollinariella **20** : 143.
— polymorpha **12** : 7, 189; **15** : 192, 226; **17** : 26.
— populina **6** : 128; **10** : 225; **12** : 185, 189; **15** : 220.
— scopulorum **7** : 265, 266.
— subfarinacea **7** : 261; **8** : 185; **12** : 7; **15** : 226.
— thrausta **12** : 56.
— sp. **6** : 232.
Rhizocarpon albopunctatum **7** : 146.
— atroalbescens **7** : 146.
— atroalbum **7** : 146.
— Copelandi **7** : 146.
— geographicum **10** : 226; **12** : 7; **15** : 4; **20** : 159, 162, 170.
— hyperboreum **7** : 146.
— *nitidum* **7** : 145—146 (fig.).
— obscuratum **12** : 7.
— orphinum f. deroratum **20** : 143.
— phalerosporum **20** : 143.
— sp. **15** : 191.
Rinodina cacuminum(-nea) **12** : 7.
— demissa **12** : 7.
— milvina **17** : 7.
— pyrina **20** : 158, 161, 168.
— sp. **15** : 226.
Schismatomma pericleum v. *jennicum* **12** : 4, 6, 7 (fig.).
Siphula ceratites **4** : 48—49; **5** : 4—6 (fig.).
Solorina crocea **11** : 231; **12** : 56; **14** : 172.
— saccata **12** : 56, 189, 255.
Sphaerophorus corallioides **11** : 231; **15** : 216.
— fragilis **15** : 212, 216; **17** : 7, 26.
— globosus v. congestus **15** : 212.
Squamaria cartilaginea **1** : 147; **7** : 264—266; **14** : 131; **15** : 226.
— saxicola **8** : 45, 50; **17** : 7.
Stereocaulon paschale **10** : 242; **15** : 23, 99; **17** : 28, 73; **20** : 157, 158, 162, 163, 167.
— squamescens **20** : 144.
— tomentosum **20** : 143, 158, 162, 167.
— sp. **8** : 40; **11** : 155; **12** : 123; **16** : 76; **20** : 34—36.
Stereonema chthonoblastes **8** : 234.
Sticta **6** : 66.
— pulmonacea **7** : 321.
Tomasiella gelatinosa **12** : 6.
Umbilicaria pennsylvanica **8** : 184.
— corrugata **8** : 184.
— pustulata **7** : 264.
Urceolaria scruposa **17** : 7.
Usnea **6** : 66, 232; **8** : 185—188.
— australis v. Vainioi **8** : 186.
— barbata **8** : 185, 186; **20** : 157.
— — v. hirta **20** : 156.
— — v. — f. sorediifera **20** : 156.
— caucasica? **20** : 145.
— — v. europaea **8** : 186.
— cinchonarum v. borealis **8** : 186.
— comosa **8** : 186; **20** : 145, 158, 160, 167.
— — v. crosula **8** : 186.
— dasypoga **1** : 18; **8** : 186; **20** : 145, 158, 160, 167.
— — v. sorediata **8** : 186.
— — v. spinosissima **8** : 186.
— — v. subscabrata **8** : 186.
— diplotypus **8** : 186.
— esthonica **8** : 186; **20** : 158, 160, 167.
— extensa **8** : 186, 187; **20** : 145.
— florida (**8** : 187); **20** : 157.
— — v. hirta **20** : 157.
— — v. pilina **8** : 187.
— foveata **8** : 186.
— glabrata **8** : 186, 187.
— glabrescens **8** : 186; **20** : 158, 160, 167.
— — v. compacta **8** : 186, 187.
— — v. fulvoreagens **8** : 186.
— — v. glabrella **8** : 186.
— glaucescens **8** : 186.
— hirta **8** : 186; **10** : 225; **20** : 145, 158, 160, 162, 167.
— — v. comiformis **8** : 187.
— — v. laevior **8** : 187; **20** : 158, 160, 167.
— — v. subrugulosa **8** : 187.
— — v. villosa **8** : 187.
— Hyyppaei **8** : 186.
— laricina **8** : 186; **10** : 145.
— lapponica **8** : 186.
— leucosticta **8** : 186, 187.
— *leucostictoides* **8** : 186, 187.
— longissima **8** : 186; **10** : 475.
— major **8** : 186, 187.
— monstruosa **8** : 186.
— prostrata **8** : 186.
— *ramulosa* **8** : 186, 187.
— rugulosa **8** : 186.
— scabrata **8** : 186.
— silesiaca **8** : 186.
— similis **8** : 186; **20** : 145, 158, 160, 167.
— sorediifera **8** : 186.
— subcomosa **8** : 186.
— sublaxa **8** : 186; **20** : 158, 160, 167.
— Wassmuthii **20** : 145.
Varicellaria rhodocarpa **12** : 9.
— rhodocarpa v. constans **18** : 111.
— microsticta **12** : 9.
Verrucaria acrotella f. fumosa **12** : 6.

Verrucaria aractina **12** : 6.
— ceuthocarpa **4** : 99; (**12** : 5).
— Erichsenii **12** : 5, 6.
— *Häyrénii* **12** : 5—6.
— maura **4** : 99; **11** : 136; **12** : 4, 5, 177; **15** : 191.
— microspora **12** : 5.
— nigrescens **10** : 226; **12** : 175, 177.
— scotina **12** : 6.
Xanthoria aureola v. *extensa* **12** : 4, 10.
— candelaria **6** : 128; **10** : 25; **12** : 7, 189; **15** : 220.
— fallax **6** : 128.
— lychnea **6** : 128; **12** : 189; **15** : 192.
— parietina **6** : 93, 123, 128; **10** : 25; **11** : 55; **12** : 7, 175—177, 189; **15** : 101, 192, 220, 226; **17** : 26; **18** : 29; **20** : 156, 158, 161, 162, 168.
— — v. aureola **15** : 226.
— polycarpa **4** : 74; **6** : 93, 123, 128; **12** : 189; **15** : 220; **20** : 157, 158, 161, 162, 168.
— ramulosa **8** : 184.
— subramulosa **8** : 184.
— substellaris **8** : 184; **17** : 26; **18** : 29.

MUSCI. (Bryophyta).

Acrocladium cuspidatum **8** : 37 . . . 47, 67, 73; **10** : 159, 168; **12** : 45, 56, 191; **15** : 101; **17** : 126, 233; **20** : 53.
Adelanthus **6** : 66.
Alicularia sp. **5** : 5.
Amblyodon dealbatus **12** : 191.
Amblystegiella alpicola **13** : 94.
— Sprucei **7** : 61; **10** : 386, 387; **12** : 191; **18** : 36.
Amblystegium fluitans **10** : 256—258.
— radicale **10** : 159, 387.
— riparium **6** : 175, 179; **10** : 387; **12** : 191.
— serpens **8** : 46, 47, 52, 71; **10** : 159; **12** : 45; **17** : 16; **18** : 33, 36.
— uncinatum ssp. orthothecioides **4** : 291.
— sp. **4** : 76, 81; **8** : 282; **9** : 173; **13** : 35, 36; **20** : 9.
Amphidium lapponicum **8** : 57; **17** : 8, 14.
— Mougeotii **18** : 36.
Anastrophyllum **8** : 289, 296, 297.
— Michauxii **8** : 284, 285 (fig.), 289.
— Reichardtii **8** : 284, 285 (fig.), 289.
Andreaea crassinervis **10** : 385.
— petrophila **4** : 48; **7** : 59, 61; **8** : 49, 50, 54; **11** : 229; **17** : 6, 7.
— — v. rupestris **10** : 384.
— rupestris **17** : 13.
Anisothecium crispum **17** : 14, 20.
— Grevilleanum **7** : 58.
— humile **10** : 385.
— rubrum **8** : 48, 56.
— squarrosum **11** : 134.
— vaginale **10** : 385.
Anoectangium compactum **11** : 133—135.
Anomobryum concinnatum **10** : 202, 474.
Anomodon attenuatus **1** : 110; **18** : 33, 36.
— longifolius **8** : 51—53, 70; **9** : 9; **12** : 190, 191; **18** : 33, 36.
— Rugelii **7** : 61.
— viticulosus **8** : 70; **9** : 9; **12** : 190; **17** : 16; **18** : 36.
Anthelia Juratzkana **5** : 5; **11** : 196.
— nivalis **6** : 145—148.
Antitrichia curtipendula **7** : 60, 61; **8** : 48, 50, 52, 53, 69; **10** : 24—27; **12** : 45.
Aplozia **17** : 285, 286.
Archidium alternifolium **10** : 382—284; **11** : 8—9, 107.
Asterella Lindenbergiana **11** : 195.
— Ludwigii **18** : 36.
— pilosa **8** : 375.
Astomum crispum **8** : 48, 59; **10** : 386.
Atrichum tenellum **17** : 19, 20.
— undulatum **17** : 19.
Aulacomnium androgynum **7** : 60; **8** : 40, 51, 53, 67; **12** : 191.
— palustre **6** : 108; **8** : 37 . . . 48, 67; **10** : 159, 168;, 227; **11** : 50, 159; **12** : 45; **15** : 104, 105, 107, 108, 191; **17** : 15, 126; **19** : 37; **20** : 53, 58, 118, 121.
— turgidum **9** : 142.
— sp. **9** : 15.
Barbilophozia **8** : 283 . . . 293, 294—296, 297; **17** : 285 . . . 289.
— atlantica **17** : 289.
— attenuata **17** : 289.
— badensis **17** : 289.
— bantriensis **17** : 289.
— barbata **8** : 291 (fig.), 295; **17** : 286, 289.
— Binsteadii **17** : 289.
— elongata **17** : 289.
— Floerkei **17** : 289.
— Gilmanii **17** : 289.
— harpanthoides **17** : 289.
— Hatcheri **8** : 291 (fig.), 295; **17** : 286, 289.
— heterocolpos **17** : 289.
— Kaurinii **17** : 289.
— Kunzeana **17** : 289.
— lycopodioides **8** : 295; **17** : 286, 289.
— Muelleri **17** : 289.
— obtusa **17** : 289.
— quadriloba **17** : 289.
— Schultzii **17** : 289.
— trifida **17** : 289.
— turbinata **17** : 289.
— subg. *Barbicaulis* **8** : 295; **17** : 286, 289.
— subg. *Barbifolium* **8** : 295; **17** : 286, 289.
— subg. Leiocolea **17** : 289.
— subg. *Obtusifolium* **17** : 287, 289.
— subg. Orthocaulis **17** : 289.
Barbula convoluta **8** : 44 . . . 51, 60; **10** : 25—27, 32, 271, 285 (mp.), 385; **12** 45; **17** : 21.

Barbula fallax **10** : 386; **18** : 2.
— reflexa **10** : 384, 386.
— rigidula **8** : 42 . . . 51, 60.
— ruralis **11** : 153.
— spadicea **7** : 60; **8** : 235.
— unguiculata **10** : 386.
Bartramia Halleriana **17** : 16.
— ithyphylla **8** : 50, 51, 68; **17** : 16.
— pomiformis **8** : 50, 67; **17** : 16.
— — v. crispa **8** : 48, 50, 51, 67.
Blepharostoma trichophyllum **5** : 79; **17** : 181, 182.
Blindia acuta **10** : 384, 385; **13** : 93; **17** : 14, 19.
Brachythecium albicans **8** : 38, 39, 73; **10** : 34, 159, 387; **12** : 45; **17** : 17, 20, 21.
— — f. denticulatum **8** : 73.
— curtum **8** : 53, 74; **15** : 105, 108; **17** : 17.
— erythrorrhizon **17** : 17.
— glareosum **8** : 38, 44, 50, 73; **9** : 21; **10** : 152, 285; **12** : 46.
— latifolium **7** : 58.
— plumosum **7** : 58; **17** : 18; **18** : 33.
— populeum **8** : 50, 74; **17** : 18; **18** : 33.
— reflexum **8** : 36, 38, 74; **10** : 159; **14** : 31; **15** : 102; **17** : 17.
— rivulare **8** : 49, 73; **12** : 56; **13** : 95; **17** : 17.
— rutabulum **8** : 36, 73; **12** : 191.
— salebrosum **1** : 17; **8** : 36—42, 46—48, 53, 73; **10** : 159, 165, 168; **12** : 46; **15** : 29; **17** : 7, 17.
— Starkei **17** : 17.
— velutinum **8** : 74; **17** : 17; **18** : 33.
— sp. **15** : 101, 102, 105; **17** : 126.
Bryum affine **8** : 39, 48, 65; **13** : 95.
— alpinum **8** : 45, 46, 65; **10** : 32.
— arctogaeum **8** : 239, 375.
— argenteum **8** : 42 . . . 49, 65; **10** : 24—27; **17** : 20.
— bimum **8** : 43, 49, 65.
— Blindii **7** : 58, 61.
— caespiticium **8** : 65.
— capillare **8** : 53, 66; **10** : 25, 27; **15** : 102, 107; **17** : 15; **18** : 33.
— cirratum **13** : 94.
— crispulum **8** : 238.
— Duvalii **12** : 56; **15** : 26; **17** : 15, 19.
— elegans **8** : 62, 65; **18** : 34.
— globosum **8** : 237, 238, 375.
— inclinatum **8** : 49, 64.
— lapponicum **8** : 47, 49, 65.
— Marratii **5** : 79.
— neodamense v. ovatum **8** : 238.
— nitidulum **8** : 239, 375.
— pallens **8** : 64; **12** : 191; **17** : 15, 20, 126.
— pendulum **8** : 64.
— pseudotriquetrum **17** : 15, 126.
— ventricosum **6** : 108; **8** : 37—39, 42—47, 55, 65, 67; **9** : 21; **10** : 32, 159, 168; **12** : 45, 56, 191; **15** : 105, 106; **17** : 139, 181, 182; **20** : 121.
Bryum sp. **4** : 79, 81; **5** : 71; **6** : 93; **7** : 59; **8** : 41, 45—48, 51; **10** : 25—27, 34, 159—161, 165; **17** : 19, 28, 29, 31, 126; **18** : 64.
Buxbaumia aphylla **17** : 19.
— viridis **6** : 232.
Calliergon cordifolium **8** : 37, 42, 73; **10** : 168; **15** : 101, 104, 105; **17** : 17, 21, 126; **18** : 63, 64.
— giganteum **8** : 42, 67, 73; **10** : 228; **12** : 191; **17** : 17, 126; **19** : 190.
— megalophyllum **17** : 17.
— Richardsoni **7** : 61; **17** : 17, 19.
— stramineum **15** : 86, 105; **17** : 17, 126.
— trifarium **20** : 5.
— turgescens **7** : 61; **12** : 190, 191.
Calliergonella cuspidata **17** : 17.
Calypogeia **11** : 197—214.
— arguta **11** : 197, 201, 213.
— fissa **11** : 198 (fig.), 200 . . . 207, 209—210.
— Meylanii **8** : 36;[1] **11** : 198 (fig.), 200, 204—203 . . . 210; **12** : 190; **15** : 104; **17** : 26, 182, 292—294 (fig.).
— Muelleriana **11** : 208, 209; **17** : 292—294 (fig.).
— Neesiana **11** : 198 (fig.), 200 . . . 203—207 . . . 210; **12** : 190; **17** : 182, 292—294 (fig.).
— — v. laxa **11** : 200, 202, 203; **17** : 294.
— — v. repanda **17** : 294.
— sphagnicola **11** : 200 . . . 211, 212—213 (fig.).
— submersa **11** : 200, 212, 213.
— suecica **11** : 198 (fig.),[2] 200 . . . 208, 210—212, 213; **17** : 182.
— trichomanis **11** : 198 (fig.), 200—213; **15** : 100; **17** : 292—294.
— — v. erecta **17** : 292.
— — v. intermedia **11** : 208.
— — v. paludosa **11** : 208.
Camptothecium **8** : 225; **12** : 133; **14** : 116.
— lutescens **8** : 38, 46, 73; **10** : 159, 285 (mp.), 286, 388; **12** : 45. 167, 190, 191; **20** : 100.
— nitens **9** : 142.
— trichoides **10** : 152, 388; **12** : 191; **13** : 129; **20** : 53.
Campylium chrysophyllum **8** : 51, 71; **10** : 32, 152, 285, 388; **17** : 16.
— Halleri **7** : 88.
— helodes **10** : 384, 388.
— hispidulum v. Sommerfeltii **10** : 25, 387; **17** : 16.
— polygamum **8** : 43, 46, 47, 72; **10** : 159, 383, 386; **17** : 16.

[1] Per errorem meyalii.
[2] Per errorem cnecica.

Campylium protensum **8** : 37 . . . 53, 71; **10** : 152, 285; **12** : 45; **14** : 113; **18** : 2.
— stellatum **8** : 37 . . . 46, 71, 225; **10** : 159, 168; **12** : 45, 191; **13** : 129; **14** : 117; **17** : 16, 181, 182; **19** : 132, 190.
Catharinea angustata **7** : 60.
— tenella **8** : 42, 48, 56, 76.
— undulata **6** : 94; **8** : 42, 48, 76; **15** : 101, 102, 108; **17** : 126; **18** : 34, 63, 64.
Catoscopium nigritum **7** : 61; **12** : 45, 165; **13** : 94.
Cephalozia bicuspidata **5** : 5; **11** : 203 ;**15** : 100, 104; **17** : 26, 182.
— Loitslesbergii **3** : 44, 136; **11** : 203.
— media **11** : 203; **17** : 26.
Cephaloziella **8** : 288; **17** : 284.
— alpina **11** : 197.
— striatula **3** : 45, 136.
Cephaloziellaceae **8** : 288, 296, 297.
Ceratodon purpureus **4** : 70; **8** : 39 . . . 51, 56; **9** : 84; **10** : 25—27, 34, 159, 165; **12** : 45, 173, 191; **15** : 6, 99, 100; **17** : 14, 20, 28 . . . 32; **18** : 42.
— — ssp. conicus **10** : 385.
Chandonanthus **17** : 289.
— setiformis **8** : 294; **11** : 229.
Chiloscyphus polyanthus **15** : 105.
— — v. fragilis **18** : 64.
Chomocarpon quadratus **8** : 40, 43, 45, 48; **10** : 152.
Cinclidium stygium **7** : 61.
Cinclidotus danubicus **7** : 58, 60.
Cirriphyllum piliferum **12** : 192; **15** : 108; **17** : 20.
— Vaucheri **1** : 110, 158; **7** : 88.
Cladopodiella **1** : 89—90, 158; **17** : 294—295.
Cladopus **1** : 89; **17** : 294—295.
Clevea hyalina **11** : 195.
— suecica **11** : 195.
Climacium dendroides **1** : 17; **8** : 36—44, 46, 48, 69; **9** : 180; **10** : 34, 159, 165, 168; **12** : 45; **14** : 31; **15** : 101, 102, 105, 107, 108; **17** : 16, 126; **18** : 33; **20** : 111, 123.
Cnestrum Schistii **11** : 133; **17** : 14.
Conostomum tetragonum **4** : 48; **8** : 237.
Cratoneurum(-ron) commutatum **8** : 235.
— decipiens **13** : 94, 95.
— falcatum **12** : 174, 180; **13** : 95; **14** : 117.
— filicinum **8** : 43, 45, 46, 72; **10** : 386; **12** : 45, 190, 192.
— glaucum v. falcatum **12** : 190, 192.
Crossocalyx **17** : 285.
— Hellerianus **17** : 285.
Cryptothallus mirabilis **14** : 172.
Ctenidium molluscum **7** : 61; **12** : 46, 190, 192.
Cynodontium alpestre **7** : 88.
— polycarpum **8** : 57; **10** : 385.
— strumiferum **8** : 50, 52, 57; **17** : 14.
Cynodontium suecicum **10** : 384, 385.
— tenellum **8** : 57; **17** : 14.
Desmatodon cernuus **7** : 58, 61; **8** : 235.
— latifolius **15** : 275.
Dichelyma falcatum **7** : 59, 61; **17** : 16, 181; **18** : 63, 64.
Dicranella cerviculata **8** : 42, 48, 56, 76; **15** : 100; **17** : 14, 20.
— heteromalla **8** : 57; **17** : 19.
— subulata **17** : 19.
Dicranoloma **6** : 66.
Dicranoweisia crispula **17** : 14, 19.
Dicranum angustum **13** : 93.
— Bergeri **8** : 40, 41, 58; **10** : 227; **12** : 45; **15** : 105; **17** : 14.
— Bonjeani **8** : 39, 41, 58; **10** : 165; **12** : 45; **15** : 99; **17** : 14, 21; **20** : 53.
— congestum **10** : 388.
— fuscescens **8** : 57; **17** : 14.
— — v. congestum **8** : 58; **12** : 192.
— — v. flexicaule **11** : 144; **17** : 14.
— majus **8** : 36, 48, 53, 58; **15** : 105; **17** : 14.
— Muehlenbeckii **7** : 61; **12** : 192.
— robustum **7** : 58, 61; **10** : 385; **12** : 179, 192; **17** : 14.
— Schreberi **13** : 17.
— scoparium **1** : 17; **4** : 26; **5** : 6; **8** : 36 . . . 58; **10** : 34, 165; **12** : 45, 167 174—176, 192; **15** : 99—101, 105, 107; **17** : 14; **20** : 53.
— spurium **8** : 59; **12** : 179.
— strictum **7** : 58.
— undulatum **8** : 58; **11** : 152; **12** : 167, 179; **15** : 100 . . . 105; **17** : 14.
— sp. **6** : 147; **11** : 231; **14** : 15; **20** : 34, 35.
Didymodon rubellus **8** : 42 . . . 50, 60; **10** : 32, 285 (mp.); **12** : 45; **13** : 8.
Dilophozia **8** : 284; **17** : 287.
Diplophyllum **6** : 66.
— obtusifolium **11** : 231—232.
— ovatum **8** : 290.
— plicatum **11** : 229.
— subg. Macrodiplophyllum **11** : 229.
Discelium nudum **7** : 61.
Distichium capillaceum **11** : 195.
— inclinatum **8** : 43 . . . 56; **10** : 386; **12** : 190, 192.
— montanum **8** : 42 . . . 56; **10** : 159, 227, 285; **11** : 195; **12** : 146.
Distichophyllum **6** : 66.
Ditrichum cylindricum **17** : 13.
— flexicaule **8** : 42—46, 48, 50, 51, 55, 56; **9** : 142; **10** : 32, 159, 165, 227, 285 (mp.), 345; **12** : 45, 146, 190, 192; **13** : 8; **17** : 27—32; **18** : 36, 42.
— homomallum **7** : 58; **13** : 93.
— pusillum **17** : 13, 20.
— tenuifolium **17** : 20.
Douinia **8** : 290, 296, 297; **17** : 289.
— ovata **8** : 290.

Drepanocladus **11** : 155, 159.
— aduncus **10** : 32, 159, 289; **17** : 17, 20; **20** : 53.
— — v. polycarpus **8** : 38, 72.
— — v. typicus **8** : 43—45, 48, 72; **12** : 45.
— badius **7** : 59, 61; **13** : 129; **17** : 17.
— exannulatus **4** : 53; **8** : 48, 53, 72; **15** : 86; **17** : 17, 126.
— fluitans **5** : 146; **8** : 42, 48, 53, 72; **10** : 228; **15** : 45, 46; **17** : 17; **20** : 121.
— intermedius **8** : 37 . . . 46, 72, 225; **10** : 152, 159; **12** : 45, 190, 192; **13** : 129; **15** : 16; **18** : 2; **19** : 132, 190; **20** : 5.
— lycopodioides **5** : 143; **8** : 43 . . . 48, 72, 73; **10** : 32, 228, 229, 230, 285; **12** : 45, 190, 192.
— polycarpus **20** : 53.
— procerus **17** : 17, 20.
— revolvens **8** : 49, 72; **17** : 17.
— Sendtneri **12** : 192.
— — v. Wilsoni **12** : 192.
— uncinatus **8** : 37, 39, 48, 72; **10** : 159, 168; **12** : 45; **15** : 102, 105; **17** : 17, 182; **18** : 34, 64; **20** : 100.
— vernicosus **17** : 17; **19** : 132, 190; **20** : 53, 121.
— sp. **15** : 47, 108; **17** : 44, 181, 343, 344.
Eucalypta affinis **7** : 86.
— contorta **8** : 42 . . . 51, 61; **10** : 159, 227, 285, 385; **12** : 146, 192; **18** : 36.
— extinctoria **8** : 45; **10** : 285, 386.
— laciniata **11** : 133.
— rhabdocarpa **7** : 61; **8** : 45, 61; **10** : 285, 385, 386; **12** : 192.
— — v. arctica **10** : 202.
— sp. **12** : 190.
Ephemerum **8** : 301.
Eucladium verticillatum **7** : 60; **8** : 235, 240.
Eurhynchium hians **10** : 388; **18** : 34.
— striatum **6** : 94; **11** : 137, 144; **12** : 172, 190, 192.
— strigosum **10** : 388; **17** : 18.
— — v. praecox **10** : 388.
Eusphenolobus **8** : 289.
Fissidens adiantoides **6** : 108; **8** : 37—40, 43—48, 50, 51, 54, 55; **10** : 32, 152, 159, 160, 165, 168, 386; **12** : 45; **13** : 8, 93; **17** : 13.
— Arnoldii **7** : 58, 60.
— crassipes **7** : 60.
— Julianus **7** : 58, 60.
— osmundoides **8** : 45, 55; **10** : 385; **12** : 45; **13** : 93; **17** : 13, 181, 182.
Fontinalis antipyretica **4** : 53; **8** : 40, 53, 69; **10** : 258, 289; **12** : 56, 192; **15** : 103, 106; **17** : 16; **18** : 63, 64; **19** : 85; **20** : 8, 9.
— dalecarlica **17** : 16.
— dichelymoides **2** : 38—39, 111, 116; **20** : 9.
— gracilis **15** : 275.
— hypnoides **14** : 172.
Frullania dilatata **12** : 186, 190.
Funaria fascicularis **10** : 384, 386.
— hygrometrica **7** : 122, 127; **8** : 39, 47, 48, 63; **10** : 25; **12** : 45, 192; **17** : 15, 20, 21.
— mediterranea **7** : 58.
Geocalyx graveolens **12** : 190.
Georgia pellucida **8** : 36, 40, 53, 63.
Grimaldia sibirica **11** : 195.
Grimmia alpicola v. rivularis **17** : 20.
— angusta **13** : 93.
— anodon **11** : 133.
— apocarpa **8** : 50, 62; **10** : 25, 226, 227; **12** : 45, 192; **17** : 21; **18** : 63, 64.
— — v. gracilis **8** : 62, 71; **10** : 32; **18** : 34, 42.
— commutata **4** : 27; **8** : 61; **11** : 133; **17** : 7, 8; **18** : 42, 43.
— elatior **7** : 86, 264; **11** : 133.
— gracilis **4** : 27; **17** : 8.
— Hartmani **7** : 61; **8** : 49, 62, 65; **18** : 34.
— hypnoides **15** : 194, 212.
— lanuginosa **18** : 43.
— maritima **8** : 49, 51, 62, 68.
— Muehlenbeckii **8** : 50, 61, 62; **12** : 45; **17** : 14.
— patens **8** : 61, 62, 65.
— pulvinata **12** : 192.
— torquata **17** : 14.
— unicolor **7** : 86; **18** : 43.
— sp. **17** : 114.
Gymnocybe palustris **19** : 132.
Gymnomitrium concinnatum **11** : 196.
— coralloides **11** : 231.
— varians **11** : 195.
Gymnostomum aeruginosum **10** : 227.
— calcareum **7** : 60.
— rupestre **7** : 61.
Haplodon Wormskjoldii **7** : 61.
Haplozia sp. **8** : 282, 283; **11** : 231.
Hedwigia albicans **7** : 264; **8** : 50, 62, 69; **10** : 26; **12** : 45; **15** : 4; **18** : 34.
— ciliata **17** : 16.
Helodium Blandowii **17** : 16.
— lanatum **8** : 37, 71; **10** : 387; **12** : 45; **15** : 105; **20** : 53.
Heterocladium squarrosulum **17** : 16, 182.
Heterophyllium Haldanianum **17** : 18, 20.
Homalia trichomanoides **8** : 51, 52, 70; **12** : 190, 192; **17** : 16; **18** : 34, 36.
Homalothecium sericeum **8** : 43, 50—52, 71, 73; **10** : 27; **12** : 45, 177, 190, 192; **17** : 8; **18** : 33, 36.
Homomallium incurvatum **10** : 387.
— incurvum **18** : 33.
Hygrohypnum ochraceum **17** : 17.
— rivulare **13** : 95.
Hylocomium parietinum **2** : 42; **5** : 6; **14** : 14, 15.
— proliferum **1** : 17; **2** : 42; **7** : 179, 184; **8** : 39—43, 48, 53, 76; **9** : 182; **10** : 159, 165, 228; **11** : 16, 50, 148; **12** : 46, 167,

174—176, 179; **14** : 113, 117; **15** : 99 . . . 105; **20** : 111, 116, 123.
Hylocomium pyrenaicum **12** : 255; **17** : 14, 18, 19.
— Schreberi **13** : 18.
— splendens **6** : 94; **9** : 142; **11** : 16; **13** : 17; **15** : 4; **17** : 18; **18** : 33.
— squarrosum **13** : 17; **17** : 8.
— triquetrum **2** : 42; **6** : 51, 94; **7** : 179, 181; **12** : 167, 173; **20** : 111, 116.
— umbratum **8** : 36, 76; **17** : 18.
— sp. **11** : 157, 172; **18** : 83; **20** : 105.
Hymenostomum microstomum **8** : 48, 59; **10** : 386.
Hymenostylium curvirostre **8** : 235; **10** : 227; **12** : 190, 192.
Hypnum albicans **15** : 6.
— arcuatum **10** : 388; **17** : 8, 18, 126.
— Bambergeri **8** : 238.
— callichroum **7** : 58.
— cupressiforme **1** : 17, 18; **7** : 60; **8** : 41 . . . 52, 75; **10** : 25, 27, 34, 165; **12** : 46, 167, 174—176; **17** : 18; **18** : 33.
— — v. filiforme **8** : 52, 75.
— — v. lacunosum **12** : 192.
— — ad v. Vaucheri **8** : 75.
— — ssp. mamillatum **8** : 50, 75.
— exannulatum **19** : 189.
— fluitans **15** : 191.
— orthothecioides **4** : 100.
— pallescens **7** : 60; **17** : 18.
— pratense **12** : 192.
— Schreberi **15** : 194.
— splendens **18** : 83.
— uncinatum **13** : 16;[1] **17** : 8.
— sp. **2** : 50; **5** : 146; **6** : 51, 89; **8** : 282; **9** : 15, 84; **17** : 78.
Isopaches **8** : 283, 287—288, 296, 297; **17** : 284, 285, 288, 289.
— bicrenatus **8** : 284, 285 (fig.), 288; **17** : 182, 284, 285, 289, 293 (fig.).
— decolorans **8** : 288; **17** : 284, 285, 289.
— Hellerianus **8** : 284, 285 (fig.), 288, 289; **17** : 284, 285, 289.
Isopterygium elegans **8** : 49, 52, 74; **17** : 19; **18** : 64.
— Muellerianum **7** : 58.
— pulchellum v. nitidulum **17** : 18.
— repens **10** : 388; **12** : 192.
— silesiacum **7** : 60.
Isothecium myosuroides **8** : 49, 51, 70; **17** : 16.
— myurum **12** : 172, 190, 192; **17** : 16.
— viviparum **8** : 49, 51, 70; **11** : 5; **12** : 190, 192.
Jungermania Kaurini **11** : 196.
— tristis **14** : 127.
— sp. **1** : 18; **8** : 282 . . . 295; **17** : 285, 286, 290.
Kantia calypogeia **11** : 197, 210.
— trichomanis **11** : 197, 203.
— — v. Neesiana **17** : 294.
Kiaeria Blyttii **4** : 48; **7** : 58; **8** : 50, 57; **17** : 14.
— falcata **8** : 237.
Leiocolea **8** : 283, 288, 293—297; **17** : 286—289.
— badensis **12** : 190; **17** : 289.
— bantriensis **11** : 196; **12** : 190; **17** : 289.
— Gilmanii **17** : 289.
— harpanthoides **17** : 289.
— heterocolpa (-pos) **8** : 284, 285 (fig.); **17** : 289.
— Muelleri **17** : 289.
— obtusa **8** : 284, 285 (fig.), 288.
— Schultzii **17** : 289.
— turbinata **17** : 289.
— subg. *Eu-Leiocolea* **17** : 289.
— subg. *Obtusifolium* **17** : 289.
Leioscyphus **6** : 66.
Lejeunea cavifolia **12** : 190; **17** : 287.
— lamaserina **17** : 287.
Lepidolaena **6** : 66.
Lepidozia **6** : 66.
— reptans **17** : 26.
Leptobryum pyriforme **8** : 43, 45, 46, 64; **10** : 24, 152, 285, 386; **17** : 15, 20, 21.
Leptostomum **6** : 66.
Lepyrodon **6** : 66.
Leskea nervosa **11** : 133.
Leskeella nervosa **8** : 50, 51, 71; **12** : 45; **18** : 33, 34.
Leucobryum glaucum **7** : 60; **8** : 36, 40, 41, 59; **12** : 192.
— — v. albidum **7** : 61.
Leucodon sciuroides **8** : 44, 51—53, 70; **10** : 25—27, 386; **12** : 45, 177, 186, 190, 192; **17** : 8; **18** : 33.
Lophocolea **6** : 66.
— bidentata **12** : 191.
— cuspidata **12** : 149.
— heterophylla **12** : 148 (fig.), 149; **15** : 105.
— incisa **12** : 148 (fig.), 149.
— minor **12** : 191.
Lophozia **8** : 282—297; **10** : 228; **11** : 197; **17** : 283—291.
— alpestris **8** : 286; **11** : 196; **17** : 288; 290.
— atlantica **17** : 286.
— attenuata **17** : 286.
— Binsteadii **17** : 286.
— confertifolia **17** : 290.
— elongata **8** : 286.
— excisa **8** : 286; **17** : 287, 288.
— Floerkei **17** : 285, 268.
— gracilis **8** : 50.
— gracillima **8** : 286; **17** : 288.
— grandiretis **8** : 287; **17** : 287, 288.
— heterocolpos **8** : 43, 51.
— Hornschuchiana **11** : 196.

[1] Per errorem uncialis.

Lophozia incisa **8**: 287, 290; **17**: 182, 287, 288.
— Jensenii **17**: 288.
— Jurensis **8**: 286, 288; **17**: 288.
— Kiaerii **17**: 288.
— Kunzeana **17**: 286.
— longidens **8**: 286; **17**: 288.
— longiflora **17**: 288.
— marchica **8**: 286; **17**: 287, 288.
— Mildeana **8**: 286; **17**: 287, 288.
— opacifolia **17**: 288.
— obtusa **17**: 286, 287.
— porphyreoleuca **8**: 286; **17**: 182, 288, 290.
— quadriloba **17**: 285, 286.
— quinquedentata **17**: 285.
— silvicola **8**: 284, 285 (fig.), 286; **17**: 26, 182, 288, 290—291.
— ventricosa **8**: 286; **17**: 182, 288, 290—291.
— violascens **17**: 288.
— Wenzelii **8**: 284, 285 (fig.), 286; **17**: 288, 290.
— subg. Dilophozia **17**: 287, 288.
— subg. Massula **17**: 287, 288.
Madotheca platyphylla **8**: 44.
Marchantia polymorpha **5**; 95; **7**: 122, 126, 127; **8**: 47; **15**: 101; **17**: 80, 126; **19**: 30, 31; **20**: 146.
Marsupella **8**: 293.
— aemula **11**: 196.
— apiculata **11**: 195.
— Beckii **11**: 196.
— condensata **11**: 196.
— filiformis **11**: 196, 197.
— intricata **11**: 196.
Marsupidium **6**: 66.
Massula **17**: 287, 288.
Meesea trichodes **8**: 43, 67.
— triquetra **13**: 94; **17**: 15.
— — f. dupliseta **13**: 95.
— sp. **19**: 132.
Mesoptychia **17**: 290.
— Sahlbergii **17**: 290.
Metzgeria furcata **8**: 51, 71; **18**: 34.
Microthuidium minutulum **7**: 60.
Mniobryum albicans **13**: 93; **20**: 121.
Mnium affine **8**: 66; **11**: 137; **12**: 193; **15**: 29, 105; **18**: 64.
— cinclidioides **8**: 40, 67; **12**: 136; **15**: 26, 102, 105; **17**: 15, 139; **18**: 63, 64; **20**: 53, 122, 123.
— cuspidatum **1**: 17; **8**: 36 . . . 52, 66, 71; **10**: 168; **11**: 137; **12**: 45, 191, 193; **17**: 15; **18**: 33; **20**: 100.
— Drummondii **7**: 60; **12**: 255; **15**: 26 (mp.).
— hornum **7**: 60; **8**: 36 . . . 53, 66; **10**: 39; **17**: 19, 26.
— hymenophylloides **11**: 195.
Mnium hymenophyllum **7**: 88.
— marginatum **12**: 193.
— medium **8**: 36, 66; **15**: 29, 105; **17**: 15.
— orthorrhynchum **7**: 88.
— pseudopunctatum **10**: 386; **12**: 193; **15**: 26; **17**: 15, 139, 181.
— — f. dioecum **15**: 105.
— punctatum **8**: 36, 38, 40, 66, 67; **10**: 165, 386; **12**: 193; **15**: 102; **17**: 15, 181, 182; **18**: 64.
— rostratum **10**: 285, 386, 387; **12**: 45.
— rugicum **12**: 56, 58, 193; **13**: 94; **17**: 15; **20**: 53.
— Seligeri **8**: 37, 40, 66; **10**: 32, 386; **12**: 45, 193; **15**: 108; **17**: 15.
— stellare **8**: 36, 37, 45, 50, 66; **12**: 45; **17**: 15; **18**: 36.
— undulatum **6**: 94; **8**: 36, 37, 40, 66; **10**: 168; **11**: 137; **12**: 45, 193.
— sp. **2**: 42; **12**: 190; **14**: 31; **15**: 101, 102, 108; **17**: 7, 123; **20**: 116.
Moerchia Blyttii **11**: 195.
— Flotowiana **11**: 195.
Mollia tenuirostris **17**: 181.
— tortuosa **4**: 27; **12**: 173.
Myurella Careyana **7**: 58.
— julacea **7**: 61; **8**: 37 . . . 51, 70; **10**: 271, 285, 385; **11**: 133; **12**: 190, 193.
— — v. scabrifolia **10**: 387.
— tenerrima **7**: 58.
Nardia Breidleri **11**: 196.
— geoscyphus **17**: 182, 287.
— scalaris **17**: 287.
Neckera complanata **7**: 60; **8**: 51, 52, 70; **12**: 172, 186, 190; **17**: 16.
— oligocarpa **17**: 16.
Neesiella pilosa **10**: 228.
Oligotrichum incurvum **6**: 145—148 (mp.).
Oncophorus virens **14**: 117.
— Wahlenbergii **7**: 61; **17**: 14, 19, 20.
Orthocaulis **8**: 283 . . . 291, 293—294, 296; **17**: 286, 288, 289.
— atlanticus **8**: 291 (fig.), 294.
— Binsteadii **8**: 294.
— Floerkei **8**: 291 (fig.), 294.
— gracilis **8**: 294.
— Kunzeanus **8**: 289, 293, 294, 296.
— quadrilobus **8**: 283, 291 (fig.), 293—296; **17**: 289.
— trifidus **8**: 294.
Orthodicranum flagellare **8**: 57; **17**: 14, 20, 26.
— montanum **8**: 51, 53, 57; **17**: 14.
— — f. propaguliferum **8**: 49, 57.
Orthothecium chryseum **13**: 95.
— intricatum **8**: 237, 238, 375.
— rufescens **13**: 95.
— strictum **7**: 88; **13**: 95.
Orthotrichum affine **7**: 60; **10**: 387.
— alpestre **7**: 86.
— anomalum **7**: 86; **8**: 50, 69.

Orthotrichum cupulatum **12** : 190, 193.
— diaphanum **7** : 60.
— fastigiatum **7** : 60; **10** : 387; **17** : 8.
— leiocarpum **7** : 60.
— Lyellii **7** : 58, 60.
— patens **7** : 60.
— pumilum **8** : 52, 69.
— rupestre **4** : 27; **8** : 50, 51, 69; **9** : 9; **10** : 25, 26; **12** : 193; **17** : 16.
— speciosum **1** : 18; **8** : 52, 53, 68, 69; **10** : 387; **12** : 45, 193; **15** : 102; **17** : 16; **18** : 29, 33?
— sp. **6** : 66; **8** : 53.
Paludella squarrosa **8** : 42, 67; **14** : 120; **15** : 86; **17** : 16; **19** : 132, 190; **20** : 53, 121.
Paraleucobryum longifolium **8** : 49, 50, 59, 62; **17** : 14; **18** : 33.
Pellia epiphylla **15** : 103, 105.
— Neesiana **17** : 126, 181; **18** : 64.
— sp. **4** : 76; **18** : 63.
Peltolepis grandis **11** : 195.
Phascum acaulon **10** : 386.
Philonotis alpicola **5** : 212.
— calcarea **13** : 94.
— capillaris **10** : 387.
— fontana **6** : 108; **8** : 40 . . . 49, 67, 68, 74; **12** : 45; **17** : 16, 126; **20** : 121.
— seriata **13** : 94.
— tomentella **8** : 48, 68; **17** : 8; **18** : 33, 36.
— — forma **8** : 68.
Physcomitrium pyriforme **12** : 193.
Plagiobryum Zierii **10** : 202; **11** : 134.
Plagiochila **6** : 66.
— asplenioides **2** : 42; **6** : 94; **8** : 36; **10** : 228; **11** : 137; **15** : 4; **18** : 33.
Plagiopus Oederi **8** : 50, 68.
Plagiothecium curvifolium **12** : 193.
— denticulatum **8** : 50, 75; **17** : 18, 182.
— laetum **17** : 18.
— neglectum **12** : 193.
— piliferum **8** : 49, 50, 74; **17** : 18.
— platyphyllum **15** : 275.
— Roeseanum **8** : 50, 52, 75; **17** : 18, 182; **18** : 63, 64.
— Ruthei **17** : 182.
— silvaticum **1** : 17; **8** : 36, 41, 50, 75.
— striatellum **7** : 61; **10** : 388.
— sp. **17** : 181; **18** : 33.
Platygyrium repens **4** : 27; **17** : 18, 20.
Pleuridium alternifolium **8** : 48, 55; **10** : 385, 386.
— subulatum **7** : 58; **10** : 385.
Pleuroclada albescens **11** : 196.
Pleurozia **8** : 296.
Pleurozium Schreberi **1** : 17; **8** : 36 . . . 53, 75; **10** : 165; **11** : 16, 50; **12** : 46, 179; **14** : 113, 117; **15** : 5, 99 . . . 109; **17** : 18; **20** : 100, 111, 116, 122, 123.
— sp. **20** : 105.
Pleurozygodon aestivus **11** : 133.
Pogonatum urnigerum **17** : 19, 20.
Pohlia annotina **17** : 15, 20.
— bulbifera **17** : 15.
— cruda **8** : 50, 51, 64; **17** : 15.
— erecta **8** : 237—238, 375.
— grandiflora **17** : 15, 20.
— nutans **8** : 39—42, 47, 48, 53, 64; **10** : 25, 27, 34, 165, 168; **12** : 45; **15** : 99—101, 105, 110; **17** : 15.
— proligera **17** : 15.
— pulchella **10** : 386; **17** : 15.
— sp. **11** : 231; **20** : 35.
— ssp. Cacodon **8** : 237.
Polytrichadelphus **6** : 66.
Polytrichum alpinum **8** : 51, 77; **17** : 19.
— attenuatum **8** : 77; **11** : 144.
— commune **7** : 180, 181; **8** : 24, 77; **11** : 37, 38, 50; **13** : 17; **15** : 99 . . . 108; **17** : 19; **18** : 82; **20** : 49, 123.
— formosum **17** : 19.
— gracile **8** : 77; **15** : 105; **17** : 19, 21.
— juniperinum **1** : 17; **3** : 12; **4** : 26, 70; **5** : 5; **8** : 39—42, 48, 77; **10** : 165; **12** : 46; 179; **13** : 18, 102; **14** : 121; **15** : 6, 100, 105; **17** : 19, 21, 25, 28, 29, 31, 196; **18** : 10.
— piliferum **6** : 108; **8** : 40 . . . 48, 77; **10** : 165; **11** : 231; **12** : 123; **15** : 99; **17** : 19, 28, 31; **20** : 35.
— Swartzii **15** : 105; **17** : 19.
— strictum **8** : 36, 77; **11** : 231; **17** : 19.
— sp. **7** : 127; **9** : 15, 75; **10** : 242; **11** : 172; **15** : 5, 101, 102, 191; **17** : 73; **18** : 79, 83; **20** : 58, 121, 124.
Pottia **8** : 301.
— Heimii **8** : 47, 49, 51, 61; **10** : 159; **12** : 45; **12** : 193.
— Randii **7** : 58.
— truncatula **10** : 386, 388.
Preissia quadrata **10** : 227, 228; **11** : 166; **18** : 2.
Prionolobus **8** : 288.
Pseudoleskeella catenulata **7** : 61.
Pterygoneurum pusillum **7** : 58, 60.
Pterygynandrum filiforme **7** : 264; **8** : 49, 50, 52, 74, 75; **17** : 18; **18** : 34.
— — v. decipiens **8** : 74; **17** : 8.
Ptilidiaceae **8** : 294.
Ptilidium ciliare **4** : 71; **6** : 51; **8** : 53; **9** : 142; **15** : 4.
Ptilium crista castrensis **2** : 42; **8** : 36, 40, 75; **15** : 100; **17** : 18.
Pylaisia polyantha **8** : 53, 75; **12** : 46; **15** : 102; **17** : 18; **18** : 33.
Radula complanata **1** : 18; **8** : 52, 53; **10** : 387; **12** : 186, 190, 191; **15** : 102; **18** : 33; **20** : 100.
Reboulia hemisphaerica **3** : 45, 136.
Rhacocarpus **6** : 66.
Rhacomitrium aviculare **8** : 62; **17** : 15.
— canescens **8** : 47, 62, 77; **15** : 99; **17** : 15, 21, 73.

Rhacomitrium fasciculare **8** : 50, 62; **17** : 15.
— heterostichum **8** : 49, 62; **12** : 45; **17** : 19.
— hypnoides **8** : 40, 44, 49, 51, 62.
— microcarpum **17** : 15.
— sudeticum **8** : 49, 62.
— sp. **20** : 35.
Rhodobryum roseum **8** : 36, 40, 51, 66; **12** : 190; **14** : 31; **15** : 102; **17** : 15, 20; **20** : 116.
Rhynchostegiella compacta **8** : 235.
Rhynchostegium rusciforme **13** : 95.
— murale **7** : 60.
Rhytidiadelphus calvescens **8** : 37, 38, 76.
— loreus **8** : 76; **9** : 182.
— squarrosus **1** : 17; **8** : 36 . . . 42, 76; **10** : 159, 165, 168; **12** : 46; **15** : 105, 107; **17** : 18, 20.
— — v. calvescens **17** : 18.
— triquetrus **1** : 17; **6** : 109; **8** : 36—38, 76; **9** : 142; **10** : 34, 168; **11** : 16, 137; **12** : 46, 172, 174—176; **13** : 17; **14** : 14, 113; **15** : 100, 101, 105; **17** : 18; **20** : 100.
Rhytidium rugosum **7** : 86; **9** : 142; **11** : 133.
Riccardia latifrons **12** : 191; **17** : 126.
— multifida **15** : 275.
— palmata **12** : 191.
— pinguis **12** : 191.
Riccia **8** : 301.
— fluitans **3** : 129; **5** : 212; **10** : 474; **11** : 269; **12** : 255; **13** : 172; **18** : 271.
— glauca **18** : 36, 42.
— Lescuriana **18** : 36.
— natans **3** : 129; **10** : 474; **13** : 52.
Ricciocarpus natans **2** : 111; **12** : 255; **15** : 275; **16** : 153.
Saccobasis **8** : 283, 291—293, 296, 297; **17** : 285, 289, 290.
— polita **8** : 290, 291 (fig.), 292; **17** : 289.
Saelania glaucescens **17** : 13.
Sauteria alpina **11** : 195.
Scapania **11** : 197, 229.
— aequiloba **19** : 305.
— compacta **11** : 210.
— Degenii **18** : 1.
— mucronata **17** : 181, 182.
— paludosa **12** : 149.
— Simmonsii **9** : 142.
— *sphaerifera* **11** : 227—229 (fig.); **12** : 255.
— spitzbergensis **11** : 197; **15** : 275.
— umbrosa **11** : 229.
— undulata **11** : 229; **15** : 103; **17** : 181; **18** : 63, 64.
— verrucosa **11** : 229.
Schistidium alpicola v. rivulare **17** : 14.
— angustum **7** : 61; **17** : 15, 19.
— apocarpum **17** : 14.
— gracile **17** : 14.
Schistochila **6** : 66.
Schistostega osmundacea **8** : 234; **10** : 386.
Scleropodium purum **7** : 60; **12** : 168, 193.
Scorpidium **8** : 225.
— scorpioides **5** : 32; **8** : 40, 53, 73; **10** : 228, 229, 230; **12** : 45, 133, 135, 141, 146, 190, 193; **13** : 95, 129; **14** : 113, 114, 115; **17** : 17; **19** : 61, 132, 190; **20** : 5.
Seligeria Anodus **7** : 58.
— calcarea **10** : 227.
— Douiana **7** : 61.
— pusilla **7** : 61.
— subimmersa **14** : 135; **17** : 50.
Sphagnum acutifolium **14** : 31; **15** : 100; **17** : 134; **19** : 189.
— amblyphyllum **17** : 126.
— angustifolium **7** : 64, 180; **15** : 104.
— apiculatum **15** : 104.
— centrale **7** : 179, 180; **15** : 104; **17** : 126, 139.
— compactum **5** : 5.
— contortum **17** : 126; **19** : 60.
— cuspidatum **5** : 146; **19** : 189.
— cymbifolium **16** : 8.
— Dusenii **15** : 104; **17** : 126; **19** : 58.
— fuscum **6** : 108; **8** : 224; **11** : 212; **12** : 141, 174, 191; **14** : 122; **15** : 86, 104; **19** : 54, 59, 62; **20** : 121—124.
— Girgensohnii **7** : 180; **8** : 36; **15** : 104, 105; **20** : 123.
— imbricatum **12** : 191; **19** : 63.
— magellanicum **7** : 64; **12** : 191.
— medium **15** : 104; **17** : 126; **20** : 121, 123, 124.
— obtusum **15** : 104; **19** : 60.
— palustre **12** : 191; **19** : 189.
— papillosum **19** : 3, 57, 63, 68, 75, 189.
— platyphyllum **11** : 269; **18** : 271; **19** : 3, 75.
— plumulosum **12** : 191.
— riparium **15** : 104.
— Russowii **12** : 191; **15** : 100, 104.
— squarrosum **7** : 179; **15** : 104; **17** : 139.
— subbicolor **15** : 104.
— subnitens **12** : 191.
— subsecundum **8** : 225; **13** : 32; **15** : 104; **17** : 126, 134, 139.
— teres **12** : 56, 136; **17** : 126, 139; **19** : 132, 190; **20** : 53, 118, 121.
— Warnstorfii **8** : 255; **12** : 174, 191; **13** : 129; **14** : 116, 117; **15** : 86; **17** : 126, 139; **19** : 58; **20** : 53, 118, 121.
— Wulfii **12** : 255.
— sp. **2** : 52; **4** : 76, 81, 102; **5** : 146; (**6** : 109); **7** : 181, 195, 208, 222; **8** : 24, 30, 41, 42, 59; 276, 281; **9** : 15, 19, 109, 157, 160, [174]; **10** : [22], 241, 256—258, 295; **11** : 142, 161, 201 . . . 213; **12** : 17, 141, 143, 152; **13** : 34—37, 103 . . . 108, 129, 130, 172; **14** : 26, 28, 31, 55; **15** : 5, 91, 92, 102, 105, 108; **16** : 83; **17** : 123, 125, 132—134; **18** : 79, 81, 82, 154; **19** : 3, 83, 93, 128; **20** : 7, 32, 36, 38, 43—45, (111), (115), (116), 118, 123, 124.

Sphenolobus **8** : 282—297; **17** : 283—290.
— Hellerianus **8** : 289.
— Kunzeanus **8** : 289.
— Michauxii **8** : 289.
— minutus **8** : 284, 285 (fig.), 288, 289; **11** : 229; **17** : 26, 290.
— politus **17** : 285.
— saxicolus **8** : 289; **11** : 229; **17** : 290.
Splachnum ampullaceum **8** : 53, 63; **12** : 193, 255; **17** : 15, 126.
— luteum **8** : 53, 63, 375; **17** : 15.
— melanocaulon **13** : 94; **15** : 275.[1]
— pedunculatum **8** : 53, 63.
— rubrum **6** : 232; **7** : 59, 61; **17** : 15, 20.
— sphaericum **7** : 59, 61.
— vasculosum **7** : 59, 61; **10** : 386.
Stroemia obtusifolia **10** : 387; **17** : 16.
Tayloria lingulata **13** : 94.
— tenuis **7** : 59, 61; **8** : 53, 63.
Temnoma **8** : 294, 296; **17** : 289.
— setiformis **8** : 291 (fig.), 294; **11** : 229.
Tetraphis pellucida **17** : 15.
Tetraplodon angustatus **13** : 94.
— bryoides **4** : 48; **8** : 53, 63; **13** : 94.
— Wormskjoldii **14** : 172.
Thamnium alopecurum **10** : 387.
Thuidium abietinum **6** : 141; **8** : 38 . . . 52, 71; **10** : 25, 27, 34, 165, 223, 226, 227, 237; **12** : 45, 167, 174—176; **17** : 16, 20, 21; **18** : 34, 42.
— Philibertii **10** : 223, 226, 227, 237, 387; **12** : 45, 190, 193; **18** : 33.
— recognitum **6** : 93; **8** : 37 . . . 50, 71; **10** : 159, 165, 168; **12** : 45, 190, 193; **15** : 101, 107; **17** : 16, 20, 21.
— tamariscifolium **10** : 227; **11** : 5.
Timmia austriaca **8** : 51, 52, 68.
— b a v a r i c a **3** : 6, 136; **7** : 61; **8** : 375.
— comata **7** : 88.
Tomenthypnum nitens **17** : 17.
Tortella fragilis **8** : 43—46, 51, 60; **10** : 32, 159, 285, 385; **12** : 193; **13** : 8, 93.
— i n c l i n a t a **7** : 61; **10** : 384—386; **12** : 193.
— tortuosa **5** : 32; **6** : 108; **7** : 37; **8** : 36 . . . 52, 59; **9** : 9, 20; **10** : 32, 159, 165, 285 (mp.), 385; **11** : 166; **12** : 45, 146, 193; **13** : 93; **17** : 8, 14; **18** : 36, 42.
— sp. **12** : 190.
Tortula lingulata **8** : 234.
— muralis **8** : 50, 61; **12** : 193.
— pulvinata **7** : 60.
— ruralis **6** : 109—111; **8** : 39 . . . 50, 61; **10** : 24—27, 159, 165, 226, 227; **12** : 45, 173—177, 193; **17** : 8, 20, 21; **18** : 34, 36, 42.
— subulata **12** : 45.
Trichostomum crispulum **7** : 61.
— cylindricum **17** : 14, 20, 181.
Tritomaria **8** : 283, 289—292, 296, 297; **17** : 285, 289.
— exsecta **8** : 290, 296, 297; **17** : 289.
— exsectiformis **8** : 285 (fig.), 290, 297; **17** : 289.
— polita **8** : 283, 290.
— quinquedentata **8** : 284, 285 (fig.), 290; **17** : 289.
— s c i t u l a **5** : 79; **8** : 285 (fig.), 290; **17** : 289.
— trilobata **8** : 290.
Ulota **6** : 66.
— americana **7** : 58, 61; **10** : 387; **17** : 8.
— Bruchii **7** : 60; **10** : 384, 387.
— crispula **8** : 52, 68; **10** : 387; **12** : 168, 190, 193.
— curvifolia **8** : 49, 68; **13** : 94.
— Ludwigii **7** : 60.
— phyllantha **8** : 49, 51, 68; **10** : 40.
— ulophylla **8** : 52, 53, 68.
Weymouthia **7** : 250.
Zygodon viridissimus **7** : 58, 60; **11** : 133.
— — v. rupestris **8** : 51, 68.

[1] Per errorem melanocarpum.

PTERIDOPHYTA.

Adiantum pedatum **7** : 189.
Allosurus crispus **10** : 279; **11** : 134; **14** : 47, 48.
Arthropteris altescandens **7** : 250.
Aspidium filix femina **18** : 145.
— filix mas **6** : 88; **12** : 164; **18** : 44.
— lobatum **1** : 34.
— lonchitis **6** : 232; **8** : 259; **12** : 166.
— spinulosum **3** : 18; **6** : 88; **7** : 127, 130.
— thelypteris **12** : 164.
— sp. **7** : 234; **18** : 151.
Asplenium adulterinum **8** : 239.
— obliquum **7** : 249.
— ruta muraria **4** : 23; **7** : 37; **11** : 133; **12** : 142.
— septentrionale **4** : 26, 87—89; **5** : 36; **7** : 95, 184; **11** : 133; **15** : 4, 92; **17** : 8, 195; **18** : 42; **20** : 132.
— — × trichomanes **2** : 4, 111; **7** : 36; **12** : 143; **15** : 92, 274; **17** : 343.
— trichomanes **1** : 92, 155; **2** : 111; **4** : 26, 89, 90, 173; **5** : 36; **11** : 133; **15** : 4, 92; **17** : 8, 195; **18** : 42; **20** : 19, 132.
— — ssp. viride **1** : 92.
— viride **3** : 15, 134; **7** : 86; **11** : 133, 155; **17** : 222; **19** : 45.
Athyrium alpestre **7** : 184; **8** : 259; **14** : 48; **19** : 195; **20** : 38, 40.
— crenatum **7** : 86; **19** : 45, 47, 53, 56; **20** : 112, 132.
— cyclosorum **7** : 184.
— filix femina **3** : 18, 22; **4** : 86, 195; **5** : 36; **6** : 26, 48; **7** : 95; **8** : 25, 201; **10** : 97, 228, 406; **11** : 156, 157; **12** : 33, 111; **15** : 7, 8, 29, 32, 92, 94, 103, 113; **17** : 36, 51, 56,

59, 123, 134; **18**: 119; **20**: 19, 40, 65, 98, 102, 105, 111, 112, 116.
Athyrium filix femina f. complicatum **7**: 95.
— — f. monstrosa **9**: 238.
Blechnum amabile **7**: 184, 190—193.
— chilense **7**: 250.
— cycadifolium **7**: 250, 251.
— doodioides **7**: 188, 190.
— longicauda **7**: 254.
— magellanicum **6**: 64.
— nipponicum **7**: 184, 190—192.
— Schottii **7**: 250.
— spicant **1**: 33, 34; **5**: 101; **7**: 178—193 (fig., mp.); **8**: 375; **10**: 280; **11**: 139.
— — v. japonicum **7**: 192.
— — v. subserratum **7**: 192.
Botrychium boreale **9**: 14, 15, 20; **10**: 32; **11**: 5; **12**: 254; **14**: 112; **17**: 75.
— lanceolatum **6**: 26; **9**: 14, 15; **11**: 155; **12**: 143; **19**: 58; **20**: 88.
— lunaria **1**: 96; **3**: 22; **4**: 86, 195; **5**: 36; **7**: 95; **8**: 202; **9**: 14, 15, 20; **10**: 32, 147, 162, 228, 413; **11**: 5; **15**: 92, 113; **17**: 35, 222; **19**: 144, 195; **20**: 19, 35, 37, 65, 106, 132.
— — f. incisum **9**: 14, 15.
— — f. subincisum **9**: 14, 15.
— — ssp. boreale **8**: 259.
— matricariae **1**: 95—97; **19**: 144.
— matricariifolium **8**: 194; **9**: 14, 15; **12**: 143; **15**: 92, 113.
— multifidum **1**: 95—97, 156; **9**: 15; **10**: 403, 404; **12**: 66; **13**: 6, 33; **14**: 112; **15**: 113; **19**: 58, 94, 98; **20**: 19, 65, 106, 118, 119, 132.
— rutaefolium **1**: 95, 96.
— simplex **9**: 20.
— ternatum **3**: 22; **4**: 90; **7**: 95; **8**: 202, 274; **11**: 155; **17**: 222.
— virginianum **1**: 93; **3**: 6, 135; **6**: 88; **15**: 275.
— sp. **7**: 184.
Ceropteris triangularis **7**: 184.
Cheilanthes argentea **7**: 189.
Cryptogramme crispa **15**: 2—4, 274; **17**: 50.
Cystopteris fragilis **1**: 92; **3**: 22; **4**: 86; **5**: 36; **8**: 201, 259; **10**: 228; **11**: 155; **12**: 33, 37, 67, 164; **14**: 48; **17**: 8, 36, 178, 222; **18**: 33, 42; **19**: 144, 196; **20**: 34, 38, 40, (64).
— — v. angustata **17**: 178.
— — v., ssp. Dickieana **17**: 178; **19**: 196; **20**: 40.
— — v. regia **17**: 178.
— — ssp. Dickieana v. woodsioides **17**: 178.
— — ssp. eu-fragilis **20**: 19.
— montana **1**: 25; **8**: 259; **11**: 155, 156, 160; **14**: 46, 47, 48, 112, 117, 119; **19**: 46.
Dennstaedtia punctiloba **7**: 189.
Dicksonia Berteroana **7**: 250.
— — sp. **7**: 252, 253.
Dryopteris austriaca **5**: 30, 36; **6**: 110; **10**: 280; **12**: 67, 111; **13**: 32, 89; **15**: 7, 29, 32, 103, 113; **17**: 34, 36, 123, 181, 196; **19**: 45, 58, 196; **20**: 31, 37, 65.
— — v. pseudospinulosa **19**: 45.
— cristata **4**: 172, 195; **10**: 406; **11**: 4; **15**: 113; **17**: 8, 36, 124, 134, 138; **19**: 58, 104; **20**: 66, 119, 132.
— — × spinulosa **17**: 8.
— dilatata **10**: 228, 430; **20**: 98.
— filix mas **1**: 92, 156; **2**: 54; **4**: 195; **5**: 36, 65; **6**: 4, 26; **10**: 97, 405; **11**: 156; **12**: 67, 111, 164; **15**: 8, 29, 32, 103, 113; **17**: 34, 36, 51, 59, 123, 124; **18**: 33, 42, 119, 120; **20**: 19, 53, 65, 66, 99, 102, 103, 105, 112.
— fragrans **12**: 63, 75, 254; **17**: 216, 224.
— inaequalifolia **7**: 250.
— Linnaeana **4**: 195; **5**: 36, 64; **6**: 26, 29, 30, 41; **8**: 25; **10**: 228, 406; **11**: 17, 156, 163; **13**: 17, 31; **14**: 6, 48, 113; **15**: 31, 32, 103, 113; **16**: 5; **18**: 33, 110; **19**: 93, 98, 196; **20**: 19, 34, 38, 39, 63, 66, 111, 112, 116.
— montana **7**: 184.
— phegopteris **4**: 195; **5**: 36; **6**: 26, 48; **7**: 179; **10**: 98, 406; **11**: 16, 17, 163; **14**: 48; **15**: 29, 32, 103, 105, 113, 233; **17**: 51, 59; **19**: 98, 196; **20**: 19, 33, 44, 66, 111, 112.
— Robertiana **10**: 177; **14**: 112.
— spinulosa **1**: 17; **2**: 54; **4**: 195; **5**: 36, 65; **6**: 26 . . . 41, 48, 51, 52; **8**: 25; **10**: 228, 406; **11**: 17, 24—27, 37, 39; **12**: 111; **13**: 17, 31; **14**: 6; **15**: 4, 7, 8, 29, 32, 103, 105, 113; **16**: 5; **17**: 36, 123, 124; **18**: 33, 119; **19**: 98; **20**: 65, 83, 123,
— thelypteris **10**: 228; **12**: 33, 37; **19**: 58, 122, 190; **20**: (64), 121, 132.
— sp. **7**: 231.
Equisetum arvense **2**: 54; **3**: 13, 22; **4**: 67, 69, 195; **5**: 36; **7**: 96; **8**: 202; **9**: 115; **10**: 58, 145, 156, 167, 228, 406; **11**: 32 . . . 39; **12**: 33, 37, 111; **13**: 10; **14**: 6, 48; **15**: 113; **16**: 5; **17**: 134; **18**: 121; **19**: 98, 196; **20**: 19, 65.
— — f. alpestre **4**: 195.
— — × limosum **1**: 13; **10**: 474.
— fluviatile **2**: 41; **3**: 22; **6**: 1, 79; **7**: 96; **8**: 202; **10**: 406; **13**: 34; **14**: 25; **16**: 3; **18**: 123, 124; **20**: 6, 8, 19.
— — f. limosum **3**: 22; **7**: 96; **8**: 202.
— — f. polystachyum **7**: 96.
— hiemale **3**: 22; **4**: 196; **7**: 96; **8**: 202; **9**: 177; **11**: 154, **12**: 66; **14**: 48, 112; **15**: 7, 8, 110, 113; **17**: 36; **19**: 45, 58, 144; **20**: 19, 63, 132.
— — × variegatum **10**: 66.

Equisetum hiemale × ramosissimum **8** : 234.
— limosum **2** : 54; **4** : 196; **5** : 37; **7** : 127, 129; **9** : 180; **10** : 16, 228; **12** : 33, 37, 136; **14** : 5, 48, 118; **15** : 5, 104, 106, 109, 113; **17** : 80, 82, 124, 134; **18** : 123; **19** : 93, 94, 98, 196; **20** : 5, 53, 55, 56, 61, 63, 65, 112, 118—124.
— — v. linnaeanum **20** : 19, 65.
— — v. verticillatum **4** : 196; **20** : 65.
— palustre **4** : 196; **6** : 145; **8** : 202, 260; **10** : 228; **11** : 163; **12** : 33, 37, 136; **13** : 9, 32, 129; **14** : 48, 116, 117, 122; **15** : 108, 113; **17** : 10, 134; **18** : 2; **19** : 98, 144; **20** : 19, 65, 119, 121, 124.
— — f. polystachyum **12** : 66.
— — f. simplicissimum **19** : 45.
— pratense **2** : 41; **3** : 22; **4** : 195; **6** : 26; **7** : 127; **10** : 228, 406; **11** : 150, 155; **12** : 66; **14** : 48, 114, 118; **15** : 113; **16** : 8; **17** : 34, 36, 134; **18** : 36, 44; **19** : 58; **20** : 65, 98, 105.
— scirpoides **3** : 37, 135; **7** : 88, 320; **10** : 406; **11** : 155, 160; **14** : 48, 112; **15** : 211; **17** : 222; **19** : 45, 46, 58.
— silvaticum **2** : 54; **3** : 22; **4** : 195; **5** : 37, 64; **6** : 26; **7** : 96, 127; **8** : 202; **10** : 98, 406; **11** : 17, 36—39, 163, 164; **14** : 6, 7, 48, 115, 118, 120; **15** : 8, 32, 102, 105, 113; **17** : 134; **18** : 119; **19** : 93, 98, 196; **20** : 19, 36, 55, 56, 63, 65, 111, 112, 116, 123.
— — f. capillare **3** : 22; **7** : 96.
— trachyodon **10** : 66; **11** : 122.
— variegatum **3** : 32; **4** : 196; **10** : 228, 280; **11** : 155; **12** : 13, 20, 21, 33, 37, 169; **14** : 48, 112, 117; **19** : 45.
— — × hiemale **11** : 122.
— sp. **3** : 43; **6** : [159], 164; **7** : 208, 230; **9** : 115; [**12** : 132 . . . 142]; **13** : 37; **14** : 25; **19** : 85; **20** : 9, 44.

Eupteris aquilina **1** : 93, 100, 156; **2** : 54; **5** : 36, 65; **6** : 26; **10** : 288; **11** : 17, 25, 36, 37, 39; **12** : 33, 66, 111; **13** : 17; **14** : 6; **15** : 31, 99, 102, 103, 113; **18** : 99, 119.
Gleichenia quadripartita **7** : 253.
Hymenophyllum **6** : 65.
— falklandicum **7** : 253.
Isoëtes Braunii **19** : 197; **20** : 30, 31.
— echinosporum **2** : 41; **3** : 202; **13** : 34, 96; **14** : 48; **15** : 92, 113; **17** : 36, 76, 80; **18** : 123, 124.
— lacustre **1** : 74; **3** : 22; **6** : 159; **7** : 268; **8** : 202; **10** : 16; **13** : 171; **14** : 48; **15** : 112; **17** : 36; **18** : 123, 124; **20** : 61, 65.
— — f. falcatum **3** : 22.
— macrosporum **19** : 197; **20** : 45.
— sp. **8** : 233.
Lomaria spicant **7** : 191, 192.
Lophosoria quadripinnata **7** : 250.
Lycopodium alpinum **8** : 260; **14** : 48; **19** : 44, 198; **20** : 40.
Lycopodium annotinum **2** : 42, 54; **3** : 22; **4** : 87, 196; **5** : 37; **6** : 26, 48; **7** : 96; **8** : 202; **10** : 406; **11** : 17, 163; **14** : 48; **15** : 32, 105, 112; **17** : 124, 134; **18** : 122; **19** : 93, 98, 198; **20** : 19, 36, 39, 63, 65.
— — f. alpestre **8** : 260.
— clavatum **1** : 97—100, 156; **3** : 22; **6** : 26; **7** : 96; **8** : 202; **12** : 111; **13** : 17, 33; **14** : 48; **15** : 112; **19** : 198; **20** : 19, 34, 63, 65, 105.
— — f., v. lagopus **1** : 97; **8** : 260; **19** : 44.
— complanatum **2** : 54; **3** : 22; **7** : 83, 96; **8** : 202; **14** : 48; **15** : 99, 112; **19** : 93, 98, 198; **20** : 65.
— — f., v. polystachyum **15** : 112; **19** : 44.
— — ssp. anceps **20** : 19.
— — ssp. chamaecyparissus **8** : 260; **15** : 112; **19** : 58; **20** : 63.
— inundatum **7** : 268; **12** : 66, 164; **13** : 31; **14** : 111; **15** : 112, 274; **17** : 35, 39, 42; **19** : 57.
— lucidulum **19** : 198; **20** : 31.
— magellanicum **7** : 253.
— obscurum v. dendroideum **19** : 198; **20** : 38.
— sabinaefolium **19** : 198.
— — v. sitchense **19** : 198; **20** : 34, 45.
— selago **1** : 99; **3** : 22; **4** : 87, 196; **5** : 30, 37; **6** : 26; **7** : 96, 179; **8** : 202; **9** : 182; **10** : 406; **11** : 152; **14** : 48, 117; **15** : 112; **17** : 124, 134, 138; **18** : 122; **19** : 198; **20** : 19, 33, 37, 44, 65, 132.
— — f., v. appressum **8** : 260; **13** : 129; **19** : 57.
— sp. **6** : 88.
Lygodium palmatum **7** : 189.
Onoclea sensibilis **19** : 198; **20** : 43.
— struthiopteris **3** : 22; **7** : 95; **11** : 156, 157; **17** : 56.
Ophioglossum vulgatum **2** : 64; **4** : 87, 195; **5** : 36; **6** : 94—95; **7** : 268; **8** : 22; **9** : 14, 22; **10** : 228; **12** : 37; **17** : 27, 195; **19** : 58, 189; **20** : 3, 55, 65.
Osmunda Claytoniana **19** : 198; **20** : 43.[1]
— javanica **7** : 189.
— regalis **7** : 184.
— spicant **7** : 185.
Phegopteris dryopteris **2** : 41, 42; **3** : 22; **7** : 95; **8** : 201.
— Linnaeana **7** : 127.
— polypodioides **3** : 22; **7** : 95; **8** : 201.
— robertiana **1** : 25.
— sp. **7** : 127, 231.
Polypodium dryopteris **4** : 88; **15** : 4.
— falcatum **7** : 184.
— Scouleri **7** : 184.
— vulgare **2** : 51, 54; **3** : 22, 32; **4** : 86, 195, 228 (mp.); **5** : 36; **6** : 26 . . . 41, 48, 65; **7** : 82, 95, 187, 185; **8**: 201, 259; **11** : 155;

[1] Claytonia.

12 : 37, 66, 111, 145; **14** : 48; **15** : 4; **17** : 36, 222; **18** : 42, 122; **20** : 19, (64).
Polypodium vulgare f. dichotoma **19** : 58.
Polystichum aculeatum **7** : 184.
— — ssp. lobatum **1** : 93.
— Berterianum **7** : 250.
— cristatum **3** : 22; **4** : 172; **8** : 274.
— filix mas **3** : 22; **4** : 86; **8** : 201.
— spinulosum **3** : 22; **4** : 86; **7** : 95; **8** : 201.
— — v. dilatatum **3** : 22; **6** : 145; **8** : 259.
— thelypteris **8** : 274; **10** : 239; **19** : 188.
Pteris (Pteridium) aquilina **3** : 22; **4** : 86, 195; **7** : 95; **8** : 201; **10** : 406; **12** : 164; **18** : 34, 40, 116, 124; **19** : 30; **20** : 19, 62, 65.
— Berteroana **7** : 250.
Schizaea pusilla **7** : 189.
Selaginella ciliata **10** : 401—406, 408.
— selaginoides **3** : 32; **7** : 83, 268; **8** : 260; **10** : 281; **11** : 121, 156; **12** : 132, 164—166; **14** : 48, 111, 112, 113, 117; **17** : 34, 35, 134, 138, 221; **19** : 44, 98, 199, 204; **20** : 39, 45, 88, 118, 132.
— sp. **13** : 32, 33, 129.
Serpyllopsis caespitosa **6** : 65.
Struthiopteris filicastrum **4** : 90; **10** : 97, 98; **12** : 67, 132; **13** : 32; **14** : 113; **15** : 7, 29, 32, 92—94, 102, 103, 113; **17** : 34, 36, 40, 51, 196; **19** : 46, 50, 52, 58, 72; **20** : 66, 102, 105, 112, 132.
— germanica **18** : 36.
— spicant **7** : 191.
Thelypteris Dryopteris **20** : 19.
— Phegopteris **20** : 19.
Thyrsopteris elegans **7** : 250.
Woodsia alpina **14** : 48, 112; **17** : 178; **19** : 45.
— — × ilvensis **14** : 127.
— glabella **14** : 46, 48, 112; **17** : 222; **19** : 46, 200; **20** : 40.
— ilvensis **3** : 22; **4** : 26; **5** : 36; **6** : 26; **7** : 80 (mp.), 82, 95; **8** : 201; **10** : 162, 228; **11** : 156; **12** : 67; **17** : 8, 36; **18** : 42; **19** : 200, 305; **20** : 19, 39—41, (64).
— — v. hyperborea **8** : 259.
Woodwardia radicans **8** : 299.
— spinulosa **7** : 184.

PHANEROGAMAE. (Anthophyta.)

Abies balsamea **19** : 171; **20** : 25, 30, 34, 38, 39, 44.
— Nordmanniana **9** : 190.
— pectinata **6** : 127, 128; **9** : 190; **15** : 223.
— pichta **3** : 22.
— Pinsapo **9** : 190.
— sibirica **11** : 138; **19** : 172.
— sp. **19** : 174.
Abrotanella crassipes **7** : 253.
Abutilon avicennae **14** : 171.
Acaena argentea **7** : 251.
— masafuerana **7** : 253.
Acer ginnala **3** : 28.
— platanoides **3** : 28; **4** : 21, 61, 175; **5** : 53, [95, 98]; **6** : 27, 124—128, 136, 140; **7** : [32], 39, [68], 78, 273; **8** : 52, 68, 69, 75, [233]; [**9** : 84]; **10** : 74—76, 408; **11** : 132, [142], 146; **12**, 35, 42, 167, 168, 172, 173, 178, 186—189; **13** : 13; **15** : 93, [109], 131, 214; **17** : 26, 56, 59, 63, 82, 181, [195], 198; **18** : [28, 29, 32 . . . 44], 110, 111, [130, 132, 171], 181; **19** : 144, 149; **20** : 50—53, 64, 66, 68, 73, 95—104 (mp.), 107.
— sp. **9** : 25, 26; **17** : 81; **20** : 159—161, 165—168.
Achillea borealis **20** : 31; **19** : 194.
— cartilaginea **8** : 200, 220; **10** : 474; **15** : 111, 136; **19** : 2, 40, 41, 121; **20** : 76, 140.
— millefolium **1** : 71 (cecid.); **2** : 56; **3** : 30; **4** : 85, 224; **5** : 14, 26, 130 (cecid.); **6** : 28, 88, 139; **7** : 118; **8** : 220; **9** : 126; **10** : 34, 58, 158, 164, 168, 238; **11** : 39, 150, 164, 165; **12** : 35, 44, 113; **13** : 15, 16; **15** : 33, 108, 109, 136; **16** : 91; **17** : 80, 81, 220—222; **18** : 26, 27, 28, 34, 42, 66, 120, 135, 174, 177, 179; **19** : 39, 40, 91, 96, 150, 194; **20** : 3, 23, 37, 39, 51, 55, 58, 59, 62, 76, 90, 94, 117, 127, 129.
— — f. lanata **8** : 274.
— — f. *Neumani* **20** : 94—95.
— — f. purpurea **19** : 76.
— — f. rosea **7** : 118; **19** : 103.
— — v. *lapponica* **20** : 90, 94—95.
— — v. sudetica **19** : 144; **20** : 94, 95.
— nobilis **1** : 34, 155; **15** : 111, 136; **19** : 95, 103.
— ptarmica **2** : 56; **3** : 30; **4** : 87, 224; **5** : 130 (cecid.); **6** : 28; **7** : 118; **8** : 220; **10** : 142, 407, 408; **11** : 24, 32, 34; **12** : 73; **15** : 136; **17** : 42, 81; **18** : 28, 121; **19** : 39, 40, (97), 150, 194; **20** : 76, 90.
— — f. tubuliflora **6** : 231.
— sp. **9** : 187.
Achroanthes monophyllos **10** : 281; **17** : 136; **20** : 68.
Aconitum cammarum **3** : 26; **10** : 66.
— — f. bicolor **3** : 26.
— napellus **7** : 106.
— — × variegatum **10** : 66.
— panniculatum **3** : 26.
— septentrionale **3** : 59, 84; **7** : 68, 76 (mp.), 80, 81, 86, 87; **17** : 343; **19** : 118, 189; **20** : 21, 54, 57, 58, 68, 70, 71, 97, 100, 102, 111—117, 132—141.
Acorus calamus **5** : 212; **6** : 88; **11** : 149.
Actaea erythrocarpa **10** : 98; **11** : 158; **12** : 139; **14** : 119, 171; **19** : 50; **20** : 48, 70, 111, 113, 115, 136.
— nigra **7** : 77 (mp.), 80, 81; **8** : 211.
— spicata **2** : 41, 115; **3** : 38, 135; **4** : 91; **5** : 30, 46, 65; **6** : 108; **7** : (32), 38; **8** : 277; **10** : 233, **11** : 137; **12** : 15, 22, 34,

40, 65, 70; **14** : 118; **15** : 32, 124, 214; **17** : 9, 34; **18** : 33, 118, 119, 120; **19** : 66; 123, 145; **20** : 21, 48, 50, 70, 98, 100, 102, 106, 111—113, 115, 136.
Actaea erythrocarpa ssp. nigra **3** : 26.
Adonis vernalis **4** : 143.
Adoxa moschatellina **1** : 17; **3** : 38, 135; **4** : 23, 88, 89; **5** : 30, 59; **6** : 108, 109; **7** : (32), 275; **8** : 78, 273, 282; **10** : 172, 238, 274, 275, 409, 432; **11** : 148; **17** : 166, 199; **20** : 23, 49, 65.
Aegopodium podagraria **2** : 40; **3** : 28; **4** : 216; **5** : 13, 23, 30, 54; **6** : 27; **8** : 200, 216, 277; **9** : 24; **10** : 236, 406, 409; **11** : 16, 17, 146, 148; **12** : 35, 42, 168; **15** : 8, 31, 33, 102, 103, 130, 233; **17** : 9, 34, 41, 43, 198; **18** : 33, 44, 99, 119, 121, 122; **20** : 22, 51, 54, 57, 63, 72, 101, 111, 113, 117.
Aëra vide Aira.
Aesculus hippocastanum **6** : 115, 124—128; **12** : 22; [**15** : 109].
Aethusa cynapium **12** : 35; **16** : 11, 13; **19** : 71.
Agrimonia eupatoria **3** : 38, 135; **4** : 23, 62, 87; **5** : 51; **7** : 32, 33, 37; **8** : 277, 279; **10** : 29, 278, 280; **11** : 112; **12** : 168; **17** : 9, 54; **18** : 133, 155, 176; **19** : 68.
— odorata **4** : 96; **7** : 35, 37; **8** : 375; **10** : 33, 179, 275, 281, 409, 429; **11** : 7, 57, 112, 113; **13** : 171; **17** : 145; **18** : 17.
Agropyrum(-ron) acutum **5** : 78; **10** : 62; **15** : 84, 274.
— caninum **4** : 173; **5** : 30, 40; **6** : 26, 48, 54, 139; **7** : 32; **10** : 408; **11** : 24—27, 35, 39, 230; **12** : 69; **13** : 32; **14** : 6; **15** : 120; **17** : 34, 39, 181, 219, 222; **18** : 93; **19** : 63, 123; **20** : (64), 84, 112, 115, 117, 135.
— — v. biflorum **13** : 49.
— — v. glaucescens **18** : 93.
— caninum × latiglume **11** : 230; **13** : 130.
— caninum × mutabile **18** : 93; **20** : 84.
— fibrosum **13** : 49, 130.
— junceum (**4** : 19); **10** : 62; **12** : 153; **15** : 82—85 (mp.), 275.
— — × litorale **4** : 19; **5** : 78; **10** : 62; **15** : 84.
— — × repens **4** : 19; **10** : 62; **15** : 84.
— latiglume **11** : 230; **13** : 49, 130.
— litorale **5** : 78; **10** : 62; **15** : 85.
— — × repens **10** : 62.
— mutabile **13** : 49; **14** : 49; **18** : 93; **20** : 84.
— obtusiusculum **10** : 62; **15** : 84.
— pungens **10** : 62.
— repens **4** : 199; **5** : 40; **6** : 26; **7** : 47; **10** : 145; **11** : 14, 117; **12** : 33, 38, 112; **13** : 15, 16; **14** : 7; **15** : 110, 120; **16** : 14; **18** : 97, 121, 122; **19** : 38, 40, 96, 100, 149, 194; **20** : 20, 68, 83, 84.
— — f. aristatum **19** : 63.
Agropyrum(-ron) repens f. litorale **10** : 156.
— — v. glaucum **4** : 199; **5** : 40; **12** : 33, 38, 112.
— — v. maritimum **4** : 199; **5** : 40.
— trachycaulum v. majus **19** : 194; **20** : 39.
— violaceum **13** : 49.
Agrostemma githago **3** : 25, 39; **4** : 208; **5** : 46; **7** : 105; **8** : 201, 210; **9** : 165; **12** : 40, 70; **15** : 109, 110, 123; **19** : (97), 106; **20**: 85.
— — f., v. nana **3** : 25; **19** : 65.
Agrostis alba **17** : 81, 233.
— borealis **12** : 136; **14** : 49, 116; **18** : 95; **19** : 48, 194; **20** : 31, 35, 44.
— *borealis* × *tenuis* **18** : 95.
— canina **3** : 23; **4** : 198; **5** : 38; **7** : 98; **8** : 203; **9** : 179, 180; **11** : 152; **12** : 37; **13** : 10, 11, 13; **15** : 5, 118; **17** : 124, 135; **18** : 42, 123; **19** : 93, 94, 99, 149; **20** : 20, 67.
— — f. pallida **7** : 98; **8** : 203.
— capillaris **4** : 198; **5** : 38; **10** : 162, 167, 229; **12** : 33, 37, 110, 112; **18** : 119; **20** : 3.
— — f. vivipara **5** : 38.
— clavata **10** : 474.
— *lapponica* **18** : 95.
— rupestris **17** : 219.
— scabra v. septentrionalis **20** : 40, 44.
— — v. — f. retigera **19** : 194.
— stolonifera **1** : 33, 50; **2** : 50, 54; **3** : 11, 13, 23; **4** : 10, 27, 66 . . . 85 (fig.), 198; **5** : 38; **6** : 26, 48, 54, 103; **7** : 98, 121, 125, 136; **8** : 20—22, 42, 49, 203; **10** : 156, 162, 229, 258; **11** : 15, 21, 30—33; **12** : 33, 37, 110, 112; **13** : 12; **14** : 5; **15** : 13, 118, 217; **16** : 58, 62; **17** : 39, 124; **18** : 95, 97; **19** : 39, 141; **20** : 63.
— — f. maritima **7** : 98.
— tenuis **1** : 17; **2** : 50 . . . 54; **6** : 26, 48; **11** : 22, 24, 25, 33, 35—39; **13** : 13 . . . 17, 31, 33, 129; **14** : 121; **15** : 8, 108, 118; **16** : 5; **17** : 124, 135; **18** : 34, 95, 97; **19** : 96, 99; **20** : 20, 53, 67, 128.
— vulgaris **3** : 23; **4** : 74, 76, 85; **6** : 140; **7** : 98; **8** : 203; **9** : 126; **10** : 58.
— sp. **3** : 18; **4** : 51; **18** : 82; **20** : 55.
Aira (Aëra) atropurpurea **8** : 260.
— bottnica **7** : 68, 165; **10** : 240.
— — × caespitosa **7** : 98.
— caespitosa **1** : 48; **2** : 54; **3** : 23; **4** : 69, 71, 72, 76, 86; **7** : 98; **8** : 24, 204; **9** : 131; **10** : 406; **19** : 26.
— — f. altissima **7** : 98.
— — f. pallida **3** : 23.
— flexuosa **2** : 42, 51, 52, 54; **3** : 10, 23; **4** : 86; **5** : 6; **6** : 147; **7** : 98; **8** : 24, 203; **12** : 168; **17** : 25, 32, 183.
— — f. montana **7** : 98.
— praecox **10** : 280, 281; **11** : 152.
— sp. **3** : 18.

Ajuga genevensis **8** : 235; **9** : 178—179.
— pyramidalis **1** : 84—86, 155; **4** : 62, 91; **10** : 409; **11** : 6, 57; **12** : 25, 174; **18** : 44, 118, 120.
— reptans **11** : 148; **12** : 18, 172; **14** : 171; **15** : 133.
Alchemilla acutangula **3** : 27; **4** : 212; **7** : 109; **8** : 214; **10** : 235, 275, 406, 429, 431; **12** : 34, 41; **15** : 127; **17** : 41; **19** : 69; **20** : 21, 51, 54, 57, 59, 63, 65, 71.
— acutidens **2** : 43; **7** : 85; **8** : 269; **15** : 127.
— acutiloba **20** : 21.
— alpestris **3** : 27; **6** : 231; **10** : 179.
— alpina **10** : 64; **11** : 134; **14** : 47, 52.
— filicaulis **3** : 27; **7** : 109; **8** : 214; **10** : 157, 167, 274, 409, 428; **12** : 112; **19** : 194; **20** : 40.
— glomerulans **2** : 43; **7** : 85, 109; **8** : 269; **14** : 52, 119; **19** : 194, 204; **20** : 40.
— micans **10** : 235; **12** : 33; **15** : 127; **17** : 41; **20** : 65, 71.
— minor **9** : 22; **10** : 172, 274, 279.
— — ssp. filicaulis **4** : 212; **5** : 31, 51; **8** : 269, 279.
— Murbeckiana **19** : 52, 204; **20** : 87.
— nebulosa **20** : 71.
— obtusa **4** : 212; **12** : 34, 111; **15** : 235; **17** : 54.
— pastoralis **2** : 49, 55; **4** : 212; **5** : 31, 51; **6** : 27; **7** : 37, 38, 109; **8** : 213, 269, 279; **10** : 167, 235, 274, 406, 409, 428, 429; **12** : 34, 41, 112; **15** : 32, 108, 127; **17** : 41; **18** : 119; **19** : 52, 150; **20** : 21, 65, 71.
— plicata **5** : 31, 51; **10** : 274, 275; **15** : 234; **17** : 54.
— pubescens **2** : 42—43, 115; **3** : 27; **4** : 212; **5** : 30, 51; **10** : 147, 167, 235, 274, 409, 420—430; **12** : 34, 41, 112; **15** : 234; **18** : 2, 44; **19** : 68.
— sarmatica **20** : 21, 63, 106.
— strigosula **15** : 108, 127, 235.
— subcrenata **4** : 212; **5** : 31, 51; **7** : 38; **8** : 213, 269, 279; **10** : 224, 235, 275, 406, 428; **15** : 127; **17** : 41; **18** : 121; **19** : 96, 101; **20** : 87.
— vulgaris **19** : 96, 97, 101.
— sp. **5** : 30, 31; **6** : 84; **7** : 95; **8** : 231; **9** : 3, 7; **10** : 64, 138, 229, 231, 236; **12** : 158; **15** : 6; **17** : 35, 125, 136; **20** : 105, 117.
Alectorolophus crista galli v. septentrionalis **20** : 17.
Alisma arcuatum f. angustissimam **20** : 81.
— gramineum **12** : 75, 253; **13** : 95—97.
— — ssp. Wahlenbergii **13** : 96, 97; **17** : 164, 165; **18** : 102—104; **20** : 81—82.
— graminifolium **11** : 268.
— lanceolatum **17** : 164—166; **18** : 103.
— Michaletii **7** : 97; **8** : 203.
— plantago **2** : 54; **4** : 110; **11** : 15; **17** : 81.
Alisma plantago-aquatica **3** : 50—51, 83; **4** : 197; **5** : 12, 14, 28; **15** : 46, 107, 113; **17** : 124, 164; **18** : 103, 123; **19** : 94, 98; **20** : 19, 61, 63, 66.
— — ssp. Michaletii **3** : 22.
— Wahlenbergii **12** : 115.
Alliaria officinalis **3** : 34; **7** : (32), 33, 35, 38—40 (mp.); **8** : 279; **9** : 164; **10** : 33, 172, 233, 276, 279, 417; **11** : 6; **12** : 15, 20, 21, 144; **15** : 125; **19** : 67.
Allium cepa **3** : 24; [**15** : 109].
— fistulosum **3** : 24.
— oleraceum **3** : 24; **4** : 86, 87, 203; **5** : 42, 79; **7** : 33; **8** : 277; **9** : 176; **10** : 58, 231; **12** : 39; **15** : 114; **17** : 27, 54; **18** : 33, 34.
— sativum **3** : 24.
— schoenoprasum **1** : 33; **2** : 15, 28, 48, 54; **3** : 16, 24, 54, 84; **4** : 7—9 (fig.), 23, 86, 87, 100; **5** : 42, 115; **6** : 26; **7** : 101; **8** : 41; **9** : 177; **10** : 25, 157, 162, 231, 280; **11** : 55; **12** : 39; **13** : 14; **15** : 114, 191; **16** : 58; **17** : 27; **18** : 42, 43, 182; **19** : 59, 74.
— — f. albiflorum (album) **5** : 42; **8** : 92.
— — f. *lilacinum* **4** : 9, 22.
— — v. foliosum **4** : 9.
— — v. *jurmoënse* **4** : 7—9 (fig.), 22—24, 290; **7** : 47.
— — v. orientale **4** : 9.
— — v. sibiricum **20** : 66.
— scorodoprasum **1** : 13; **4** : 61, 86—88, 290; **5** : 30, 32, 42; **7** : 32; **8** : 276; **10** : 280, 281, 408; **12** : 13, 167; **15** : 214; **17** : 25.
— sphaerocephalum **2** : 35, 110, 115.
— strictum **6** : 139, 142; **7** : 86, 87.
— ursinum **1** : 32, 33, 79; **3** : 54, 84; **5** : 30, 32, 42, 64—68; **6** : 3—4, 88, 108; **7** : 28; **8** : 36, 73; **10** : 172, 274, 275, 280, 281, 408, 413—414, 431; **11** : 103; **12** : 13, 23, 172; **15** : 33; **17** : 54.
— vineale **5** : 78, 79.
— sp. **9** : 19; **15** : 110, 114.
Alnus crispa **19** : 173; **20** : 28, 37.
— fruticosa **19** : 173.
— glutinosa **1** : 16, 99; **2** : 15, 48, 52, 54; **3** : 25; **4** : 51, 73, [74 . . . 89], 205; **5** : 44, 64; **6** : 26, 47, 49, 51, 89, [144]; **7** : 32, [37], 104, 121, 124, 128, 136, [257], 272, 275, 276; **8** : 24, 36 . . . 75, [196], 210, 274, 279; **10** : [20, 21], 157, [160], 161, 225, 232, 240, 388, [405, 475]; **11** : [8, 16], 17, 19—28, 32—37, 39, 152; **12** : [13 . . . 19], 34, (39), [56], 68, 69, 112, 137, [138], 144, 172, 185 . . . 191, 193; **13** : 13, 14; **14** : 31; **15** : 7, 29, [92, 100], 106, 120, 195, 196, 214, 216, 217, 222, 224, 225, 228; **16** : 5, 6, [8]; **17** : 26, 39 56, 80, 82, 85, 123—125, 181, [195]; **18** : 20, [36], 75, [80], 110, 111, 118, [167], 177, 182; **19** : 3, 145, [147]; **20** : 3, 8, 20, 68, 106, 159—161, 165—170.

Alnus glutinosa f. *minutifolia* **10** : 91—92 (fig.), 474.
— — l. quercifolia **9** : 237.
— — × incana **3** : 25; **7** : 257; **8** : 210; **12** : 112; **13** : 20.
— incana **2** : 37, 42; **3** : 10, 13, 25; **4** : 10, 176, 206; **5** : 114, 116; **6** : 89; **7** : [68, 73], 104, 255, 256; **8** : 19, 210; **9** : 24, 237; **10** : [97], 216, 223, 225, 226, 232; **11** : [16, 142], 157, [163]; **12** : 7, 14, 22, 34, 39, 112, [135], 136; **13** : 20, 33; **14** : 6, 51; **15** : 29—32, 94, [99], 101, 103, 106, 120; **17** : 10, 11, 80, 124, [217]; **18** : [32], 33, [35, 36, 44], 75; **19** : 64, 93, 100, 190; **20** : 20, 37, 43, 54, 59, 62, 68, 106, 111, 112, 116, 117, 119, 121, 159—161, 165—170.
— — f. cubans **13** : 90.
— — f. laciniata **3** : 17, 128, 135; **4** : 291.
— — v. borealis **8** : 265; **12** : 69.
— — v. glauca **8** : 210.
— — v. glaucophylla **20** : 68.
— — v. hypochlora? **12** : 69.
— — v. vulgaris **20** : 68.
— rotundifolia **8** : 24; **10** : 58.
— viridis **18** : 75.
— sp. [**4** : 109, 112]; [**5** : 98]; [**8** : 187]; [**9** : 23]; [**10** : 430]; [**11** : 142, 153]; [**13** : 31]; [**15** : 105]; **16** : 81; [**17** : 228]; **18** : [78, 98, 116], 180; **20** : 42—44, [47, 52, 53, 58].
Alopecurus aequalis **4** : 10; **5** : 30, 38; **11** : 31; **14** : 49; **15** : 118; **17** : 39, 81, 219, 224; **19** : 94, 99; **20** : 20, 67, 83.
— arundinaceus × geniculatus **2** : 4, 115.
— fulvus **3** : 23; **7** : 94, 97; **8** : 203.
— geniculatus **2** : 49, 54; **3** : 23; **4** : 198; **5** : 38; **6** : 26; **7** : 97; **8** : 42, 203; **10** : 162, 229; **11** : 33, 164; **12** : 33, 37, 112; **15** : 13, 88; **17** : 233; **18** : 121; **19** : 25, 26, 39; **20** : 67, 83.
— — × pratensis **1** : 13; **5** : 38; **17** : 9.
— — × ventricosus **2** : 54; **4** : 20; **6** : 109.
— nigricans **4** : 100.
— pratensis **1** : 25; **3** : 23; **4** : 197; **5** : 38; **6** : 26; **7** : 97; **8** : 203; **10** : 162; **11** : 33, 39, 150, 164; **12** : 112; **13** : 16; **15** : 118; **18** : 121; **19** : 26, 27, 39, 149; **20** : 67, 83, 129.
— ventricosus **2** : 49, 54; **4** : 197; **5** : 30, 38; **8** : 22; **10** : 229, 408; **12** : 110, 112; **19** : 96, 99.
Alsine biflora **8** : 266; **11** : 167, 168; **14** : 171; **16** : 92.
— borealis **19** : 194.
— hirta f. foliosa **10** : 381.
— — f. rubella **10** : 381.
— humifusa **19** : 194; **20** : 33, 37.
— longipes **19** : 194; **20** : 33, 34, 38, 43.
— rubella f. *glaberrima* **10** : 381—382.
— — v. hirta **10** : 381.
— stricta **10** : 382.
Alsine verna **1** : 34; **6** : 140; **17** : 343.
Althaea rosea **3** : 28.
— sp. **18** : 171.
Alyssum calycinum **12** : 34.
— montanum **8** : 234; **10** : 234; **11** : 153; **12** : 33, 173.
Amarantus albus **3** : 128; **4** : 290; **15** : 110, 122, 274.
— retroflexus **9** : 164; **15** : 110, 122; **19** : 40, (97).
Ambrosia tenuifolia **18** : 270.
— trifida **2** : 36, 115; **3** : 128; **7** : 320;[1] **9** : 164; **15** : 111, 136.
Amelanchier Bartramiana **19** : 194; **20** : 30.
— canadensis **3** : 27.
— spicata **12** : 22; **13** : 90; **19** : 70, 107, 110.
— sp. **20** : 34, 44.
Ammi majus **8** : 18.
Ammodenia peploides **2** : 50 . . . 55; **3** : 17; **4** : 67—69, 100, 127; 174, **7** : 272; **8** : 266; **9** : 143; **12** : 174; **15** : 195; **19** : 194; **20** : 31, 36, 37, 39, 43.
Ammophila arenaria **3** : 35; **4** : 198, 216; **7** : 40, 43; **11** : 119; **13** : 19, 20; **15** : 83, 84.
Ammoselinum Popei **8** : 18.
Amsinckia intermedia **7** : 139—140, 320.
Anabasis arctioides **7** : 66.
Anacamptis pyramidalis **12** : 169.
Anagallis arvensis **4** : 291; **12** : 72, 145; **16** : 11, 13.
Anchusa arvensis **3** : 29; **9** : 164; **19** : 145.
— officinalis **3** : 29; **4** : 219; **5** : 30, 56; **8** : 281; **12** : 35; **15** : 111, 132; **16** : 11, 13; **18** : 65, 66; **19** : 105, 110.
Andromeda calyculata **8** : 317.
— hypnoides **8** : 271; **11** : 168.
— polifolia **3** : 28; **4** : 217; **5** : 6; **7** : 113, 196, 229; **8** : 217; **9** : 108; **13** : 36, 129; **14** : 52, 65, 66, 122; **15** : 104, 131; **17** : 220; **18** : 7; **19** : 3, 93, 102, 194; **20** : 22, 62, 73, 124.
— — f. albiflora **8** : 217.
— sp. **19** : 189; **20** : 34, 44.
Androsace(-ces) filiformis **18** : 270; **19** : (97), 182, 188.
— maxima **6** : 185, 186 (fig.).
— septentrionalis **4** : 218; **10** : 236, 281, 377; **11** : 133; **12** : 17, 20, 35, 42; **15** : 111, 131, 211; (**20** : 64).
Anemone hepatica **1** : 98; **4** : 86, 176, 208; **5** : 46, 65; **8** : 93, 277; **9** : 24, [163]; **10** : 58, 233, 406, 408; **11** : 16, 17, 137; **12** : 34, 40, 254; **17** : 9, 181, 197; **18** : 33, 34, 43, 119; **20** : 104.
— — f. alba **8** : 92.
— nemorosa **1** : 17; **3** : 16, 26; **4** : 176, 208; **5** : 13, 19, 46, 65; **6** : 27, 108, 112; **7** : (32), 64, 106, 320; **8** : 25, 93, 211, 277,

[1] Per errorem trifolia; vide **7** : 332.

282; **10** : 167, 223, 233, 274, 406; 408, 428; **11** : 6, 16, 17, 144; **12** : 70, 71, 168, 254; **13** : 13; **14** : 6, 7; **15** : 5, 8, 31, 32, 89, 103, 105, 124; **16** : 5, 8; **17** : 124, 181, 195; **18** : 33, 99, 119; **19** : 104; **20** : 49, 65, 104.
Anemone nemorosa f. rubra **8** : 93.
— — f. rosea **8** : 211.
— — × ranunculoides **9** : 237; **15** : 124.
— parviflora **19** : 194; **20** : 42.
— pratensis × vernalis **12** : 254.
— ranunculoides **4** : 89; **5** : 30, 32, 46, 65; **8** : 278; **10** : 172, 233, 274, 275; **12** : 15, 23, 168; **15** : 124, (233); **18** : 118, 119, 120; **19** : 66; **20** : 65.
— — f. monstr. **13** : 171.
— silvestris **10** : 233; **12** : 34, 40, 111, 165.
— trifolia **12** : 115, 254.
Anethum graveolens **3** : 28; [**15** : 109]; **19** : 107, 110.
Angelica archangelica **8** : 270; **12** : 140; **14** : 52, 121; **15** : 204; **16** : 68; **17** : 220.
— — ssp. litoralis **11** : 149.
— atropurpurea **19** : 194; **20** : 31.
— litoralis **5** : 55; **7** : 47, 112; **9** : 144; **10** : 158, 280; **11** : 21, 24, 32, 33, 39.
— silvestris **2** : 42, 55; **3** : 28; **4** : 88, 127, 217; **5** : 13, 23, 28, 54; **6** : 27, 144; **7** : 112, 122, 133, 134, 136; **8** : 216; **9** : 24; **10** : 158, 236, 406, 413; **11** : 17, 21, 24, 26, 31 . . . 39; **12** : 35; **13** : 9, 10, 13; **15** : 89, 103, 130; **16** : 5; **17** : 81, 132, 137; **18** : 119; **19** : 102; **20** : 3, 22, 54, 63, 72, 88, 117, 120.
— — f. incisa **19** : 53.
— — f. monstrosa **11** : 269.
— sp. **20** : 37.
Antennaria alpina **10** : 65; **11** : 169; **15** : 87—88; **20** : 90.
— — f. rosea **19** : 82.
— canescens **19** : 194; **20** : 33, 40—42.
— carpatica **10** : 65.
— — × dioeca **10** : 65.
— dioica (dioeca) **2** : 51, 56; **3** : 30; **4** : 224; **5** : 60; **6** : 27, 139; **7** : 117; **8** : 219; **9** : 24, 177; **10** : 34, 164, 196, 238; **12** : 35, 44, 113, 168; **13** : 17; **14** : 53; **15** : 99, 108, 135; **17** : 125, 220; **18** : 120; **19** : 98, 103; **20** : 23, 55, 58, 59, 63, 75, 76, 105.
— — f. corymbosa **7** : 117; **19** : 76; **20** : 75.
— — f. hyperborea **20** : 75.
— hudsonica **19** : 195; **20** : 42.
— labradorica **20** : 42; **19** : 195.
— pygmaea **19** : 194; **20** : 42.
Anthelia Juratzkana **20** : 31.
Anthemis arvensis **3** : 30; **4** : 224; **5** : 30, 60; **12** : 3, 35; **15** : 136; **16** : 12, 13; **18** : 121, 122; **19** : 39, 40, 111, 145; **20** : 23, 76, 127, 128.
— cotula **2** : 4, 111, 115; **6** : 231; **7** : 320; **20** : 90.
Anthemis tinctoria **3** : 30; **4** : 224; **5** : 30, 60; **7** : 118; **8** : 200, 220; **9** : 164; **10** : 142; **12** : 35, 71, 73; **15** : 136; **17** : 9, 42; **18** : 121; **19** : 39, 40, 41, 103, 106, 111, 113, 145; **20** : 75, 90, 127—129, 140.
— sp. **9** : 183.
Anthericum ramosum **11** : 147.
Anthoxanthum aristatum **15** : 62, 66, 274.
— odoratum **2** : 28, 52, 54; **3** : 23, 51, 83; **4** : 86, 197; **5** : 12, 15, 37; **6** : 4, 26; **7** : 97, 253; **8** : 24, 203; **9** : 15, 24; **10** : 58, 156, 162, 167, 229, 413; **11** : 17, 36—39, 152, 164, 169, 171; **12** : 33, 37, 112, 168; **13** : 33; **14** : 49; **15** : 5, 32, 62, 108, 118; **17** : 124, 135; **18** : 119; **19** : 96, 99; **20** : 20, 53, 55, 57, 63, 67, 105, 116, 118, 119, 129.
Anthriscus silvestris(-ster) **2** : 55; **3** : 28; **6** : 27; **7** : 112; **8** : 216; **9** : 67, 68; **11** : 24—27, 33, 37, 39, 117, 164, 165; **12** : 167, 175, 177; **13** : 9 . . . 16; **14** : 6, 7; **15** : 8, 33, 130; **17** : 81; **18** : 33, 66, 178, 181; **19** : 39, 96, 102; **20** : 22, 53, 54, 63, 72, 98, 99, 113, 129.
Anthyllis vulneraria **1** : 25; **4** : 213; **5** : 30, 52; **7** : 257, 273; **10** : 223, 225—227, 235, 237, 241, 274—276, 281, 409, 431; **11** : 150; **12** : 35, 41, 112, 167, 168, 179; **15** : 111, 128, 213; **19** : 127.
— — f. carnea **12** : 41.
— — v. maritima **4** : 213.
— — ssp. affinis **10** : 46.
Antirrhinum majus **3** : 29; **15** : 78.
— orontium **19** : 43.
Apera spica venti **3** : 23; **4** : 198; **5** : 12, 15, 27, 38; **7** : 98; **8** : 203; **12** : 33, 37; **13** : 98; **15** : 119; **17** : 39; **19** : 30, 38 . . . 41, 99, 108, 138; **20** : 67, 125, 128, 129, 134.
Aquilegia vulgaris **1** : 102—105, 155; **3** : 26, 59, 84; **5** : 13, 19; **8** : 211; **10** : 281; **11** : 139; **12** : 168, 172; **15** : 124; **17** : 40; **18** : 66, 67; **19** : 66, 107, 108, 145.
Arabidopsis thaliana **2** : 20, 28; **3** : 84; **4** : 210; **5** : 49; **6** : 27; **7** : 48; **10** : 147, 234, 342 . . . 354; **12** : 145; **13** : 90; **15** : 125; **18** : 25, 117, 122; **19** : 39, (97); **20** : 21, 71, 106.
Arabis alpina **8** : 267; **10** : 370; **11** : 168, 169; **14** : 48, 51, 119; **17** : 219, 224; **19** : 51, 195; **20** : 39, 40.
— arenicola **19** : 195; **20** : 42.
— arenosa **10** : 234, 237; **11** : 151; **12** : 34; **15** : 125; **19** : 43, 95, 98, 101; **20** : 71.
— — ssp. suecica **3** : 26.
— Drummondii **19** : 195; **20** : 43.
— hirsuta **2** : 20, 28; **3** : 84; **4** : 23, 61, 86, 210; **5** : 49; **7** : 32, 33; **8** : 277; **9** : 22; **10** : 163, 234, 280; **12** : 34, 40, 111, 169; **15** : 214; **17** : 9, 54; **19** : 67.
— suecica **8** : 212; **9** : 165; **10** : 142; **12** : 71; **15** : 125; **17** : 81; **19** : 145.

Arabis thaliana **2** : 55; **19** : 189.
Aracium paludosum **4** : 226; **6** : 144; **10** : 238, 281; **12** : 36, 45, 111; **15** : 7, 29 . . . 33, 94.
Archangelica litoralis **4** : 127; **15** : 226; **17** : 75.
— officinalis **17** : 75.
— sp. **18** : 145, 168, 177, 178.
Arctium lappa **4** : 225; **12** : 44; **15** : 137; **20** : 76.
— minus **4** : 225; **5** : 61?; **10** : 238; **12** : 44; **15** : 136; **16** : 12, 13; **17** : 35, 43; **18** : 66; **19** : 106, 112, 113; **20** : 23, 76.
— nemorosum **10** : 409.
— tomentosum **2** : 56; **4** : 225; **5** : 61?; **10** : 238; **11** : 117; **12** : 74; **15** : 136; **16** : 12, 13; **17** : 42; **18** : 121, 122; **19** : 105, 112, 113, 150; **20** : 127.
— — f. albiflorum **13** : 171.
— — f. album **20** : 141.
— vulgare **5** : 30, 32, 61; **6** : 109; **7** : 39; **10** : 179, 238, 276, 281; **12** : 44.
— sp. **19** : 103.
Arctophila fulva **5** : 78.
— — v. pendulina **5** : 78.
— pendulina **17** : 75.
Arctostaphylos(-lus) alpina **1** : 65, 66; **5** : 6; **7** : 195, 210; **8** : 271; **9** : 114, 142; **14** : 13, 16, 52, 65, 124, 171; **16** : 9, 95; **17** : 214 (fig.), 215, 220; **19** : 53, 195, 203; **20** : 31—32.
— uva ursi **1** : 38 (cecid.), 89; **2** : 51, 55; **3** : 9—11; **4** : 217; **5** : 55; **6** : 27, 29, 30, 43, 48, 88, 139; **7** : 40, 112, 126, 129; **8** : 217; **10** : 242; **12** : 179, 180; **13** : 17; **14** : 52; **15** : 14, 99, 101, 131; **17** : 4 (fig.), 5, 199; **18** : 7; **19** : 102; **20** : 22, 73.
— — f. angustifolia **1** : 146.
— sp. **20** : 32—37, 44.
Arenaria ciliata **8** : 266; **12** : 60 . . . 65.
— — v. humifusa **10** : 382; **12** : 63.
— — ssp. norvegica **12** : 61, 63 (mp.).
— — ssp. pseudofrigida **12** : 61, 63 (mp.), 64.
— cylindrocarpa **12** : 61.
— graminifolia **12** : 165.
— groenlandica **19** : 195; **20** : 35, 36, 38, 44, 45.
— humifusa **12** : 61—63 (mp.), 64, 65; **19** : 195; **20** : 41.
— lateriflora **8** : 266.
— serpyllifolia **3** : 57, 58, 84; **4** : 23, 91, 207; **5** : 30, 45; **7** : 36; **8** : 48; **9** : 16, 165; **10** : 25, 147, 163, 232, 274, 426, 427, 429; **11** : 55, 57; **12** : 34, 40, 140; **15** : 123; **17** : 27; **18** : 26, 28, 36, 42; **19** : 189; **20** : 70, 85.
— — f. viscida **3** : 25.
— — v. glandulosa **17** : 9.
— trinervia **7** : 105; **8** : 211; **11** : 24, 25; **14** : 6; **16** : 5; **17** : 9.
Arenga saccharifera **15** : 186.
Aristotelia maqui **7** : 249, 253.
Armeria elongata **7** : 165.
— labradorica **19** : 195; **20** : 42.
— rubra major **16** : 68.
— vulgaris **12** : 35; **17** : 54.
— — v. sibirica **10** : 370.
— sp. **5** : 79.
Armoracia rusticana **19** : 107, 109.
Arnica alpina **2** : 111; **8** : 273; **10** : 202; **19** : 195; **20** : 42.
Arnoseris minima **12** : 254.
Arrhenaterum elatius **3** : 23, 38, 135; **4** : 16, 198; **5** : 39; **6** : 26; **7** : 32, 37; **10** : 29, 172, 278, 280; **12** : 174 . . . 177; **13** : 14; **15** : 110, 119; **18** : 133; **19** : 62; **20** : 3, 63.
Artemisia abrotanum **3** : 30; **12** : 19; **19** : 139.
— absinthium **2** : 56; **3** : 30; **4** : 225; **5** : 60; **6** : 88; **8** : 220; **12** : 44, 175; **13** : 99, 100; **15** : 111, 136; **16** : 12, 13, 15; **17** : 42, 199; **18** : 26, 28, 66, 67; **19** : 39, 40, 41, 76, 103, 112, 138, 139, 145; **20** : 76, 127, 140.
— borealis **5** : 78; **19** : 195.
— bottnica **5** : 78; **14** : 172; **17** : 343.
— campestris **2** : 56; **4** : 23, 26, 87, 225; **5** : 30, 60, 78; **6** : 231; **7** : 37; **8** : 282; **9** : 164; **10** : 29, 146, 172, 196, 278, 280, 409, 425—426, 431, 432; **11** : 57; **12** : 35, 44, 74, 113, 167, 168, 179; **13** : 99; **15** : 14, 111, 136; **16** : 12, 13; **17** : 199; **18** : 133, 164, 172, 176, 178, 180; **19** : 2, 28, 40, 76, 104; **20** : 64, 90.
— laciniata **4** : 143.
— macrantha **19** : 139.
— maritima **6** : 103; **12** : 177; **19** : 141.
— pontica **19** : 137—139; **20** : 124, 131, 140.
— rupestris **4** : 143; **10** : 238; **19** : 137—142; **20** : 124, 131, 141.
— vulgaris **1** : 33; **2** : 56; **3** : 30; **4** : 225; **5** : 30, 61; **6** : 28, 140; **7** : 118; **8** : 200, 220; **10** : 429; **11** : 117; **12** : 19, 35, 177; **15** : 136; **16** : 14, 15; **17** : 42; **18** : 37, 66, 97, 121, 122; **19** : 39, 40, 97, 103, 138, 150; **20** : 23, 63, 76, 90, 127, 129.
— — f., v. coarctata **4** : 225; **7** : 47; **10** : 409.
— sp. **18** : 139.
Aruncus silvester **3** : 27.
Arundo phragmites **1** : 33; **8** : 21, 22, 30, 198, 274; **10** : 239, 406.
Asarum europaeum **1** : 34, 148, 155; **3** : 129; **8** : 233; **9** : 23—24, 238; **11** : 137, 146, 148; **15** : 33, 124; **17** : 59; **19** : 129, 183; **20** : 49, 54, 70.
Asparagus officinalis **3** : 24; **11** : 150; **16** : 14, 15.
Asperugo procumbens **2** : 56; **4** : 87, 219; **5** : 47, 56; **7** : 47, 94, 114; **8** : 281; **10** : 143; **13** : 99; **18** : 66; **19** : 33, 39, 53, 145; **20** : 88, 139.

Asperula arvensis **12** : 254.
— odorata **6** : 94, 144, 145, 232; **8** : 233; **9** : 23; **10** : 275, 281, 409; **11** : 7, 137, 144, 146; **12** : 35, 146, 172; **13** : 30, 171; **15** : 33, 135, 215; **17** : 54, 59, 63; **19** : 75.
— rivalis **17** : 57.
— tinctoria **4** : 3, 222, 291; **10** : 153, 281; **12** : 35, 44, 111, 165, 168, 179; **17** : 145.
— sp. **17** : 59.
Aster foliaceus **19** : 195; **20** : 34, 40.
— linosyris **4** : 143.
— nemoralis **19** : 195; **20** : 43.
— puniceus **19** : 195; **20** : 39, 41.
— radula **19** : 195; **20** : 39, 45.
— salicifolius **8** : 201, 219.
— salignus **15** : 110, 135.
— sibiricus **13** : 49; **20** : 89.
— tripolium **2** : 48, 52, 56; **4** : 27, 87, 224; **5** : 60; **7** : 117, 275; **12** : 174; **15** : 195, 217; **16** : 68; **17** : 200; **19** : 76.
— — f. *albiflorum* **10** : 34.
— sp. **12** : 254.
Astilbe japonica **3** : 27.
Astragalus alpinus **7** : 6, 288; **8** : 269; **9** : 111, 142; **12** : 139; **14** : 52; **17** : 215, 217, 220, 221, 224, 225; **19** : 40, 52, 70, 127, 195, 204; **20** : 32, 87.
— — f. albiflorus **11** : 160; **17** : 225.
— arenarius **8** : 201, 214, 233; **11** : 147, 152.
— eucosmos **19** : 195; **20** : 40.
— frigidus **11** : 160; **14** : 52; **17** : 220, 225; **19** : 53.
— glycyphyllus **3** : 35; **6** : 231; **7** : 273.
— sp. **16** : 92.
Astrantia major **3** : 28.
Athamanta libanotis **4** : 90, 228 (mp.); **10** : 409, 431.
Atragene sibirica **1** : 25.
Atriplex deltoideum **4** : 207; **5** : 45.
— hastatum **4** : 66; **5** : 30, 45; **7** : 47, 105; **8** : 21; **10** : 172, 280, 412, 429; **12** : 110, 174, 175; **16** : 73.
— — f., ssp. salinum **4** : 68; **5** : 45.
— hastifolium **2** : 49, 50, 55; **11** : 31, 33.
— laciniatum **2** : 36, 115; **4** : 291.
— latifolium **12** : 34, 112; **15** : 122; **20** : 63.
— litorale **2** : 4, (36), 50, 53, 55; **4** : 174, 207; **7** : 47, 165; **9** : 18, 128; **12** : 112, 174 . . . 177; **19** : 31, 38, 41.
— longipes **16** : 73.
— oblongifolium **8** : 21.
— patulum **2** : 50, 55; **4** : 16, 207; **5** : 45; **7** : 82, 105; **8** : 201, 210; **9** : 165; **10** : 143; **11** : 33; **12** : 34, 39, 70, 112; **13** : 13, 14; **15** : 122; **16** : 73; **17** : 81; **18** : 121, 122; **19** : 30, 38, 39, 40, 149; **20** : 63, 85, 126, 132, 135.
— — f. erectum **3** : 25.
— — v. oblongifolium **16** : 73.
— praecox **16** : 72—74; **19** : 65.
Atriplex prostratum **4** : 207; **7** : 47.
— tataricum **15** : 110, 111, 122; (**19** : 97).
— sp. **4** : 100; **7** : 47; **9** : 19; **12** : 154; **15** : 195; **18** : 145; **19** : 195.
Atropis distans v. pulvinata **4** : 68, 69; **8** : 260.
— maritima **9** : 143.
— phryganodes **8** : 260.
— retroflexa **1** : 49, 50, 51; **8** : 20—22, 260.
— vilfoidea **8** : 260.
Aucuba chinensis **6** : 96, 99.
— japonica **5** : 107; **6** : 95, 96, 99.
Avena elatior **8** : 276; **9** : 164; **20** : 83.
— fatua **1** : 94, 155; **15** : 110, 119; **19** : 39, 40, 99; **20** : 67, 125, 132, 134.
— pratensis **4** : 198; **8** : 78, 195; **9** : 22; **10** : 34, 199, 275, 276, 408, 410, 414, 429, 431, 432; **12** : 33, 37, 111, 112, 167, 168; **13** : 6; **17** : 9; **19** : 62.
— pubescens **2** : 52, 54; **3** : 23; **4** : 198; **5** : 39; **7** : 98; **8** : 276; **10** : 34, 146, 162, 229; **11** : 150, 151; **12** : 33, 37, 112, 175; **17** : 196; (**20** : 64).
— — f. glabra (glabrescens) **7** : 98; **12** : 37.
— sativa **6** : 48; [**9** : 179, 181]; **13** : 98; [**15** : 109]; **19** : 38, 39, 91, 99, 107, 108, 149, [206, 208, 209]; **20** : 67, 83, 129.
— — v. diffusa **3** : 23.
— — v. orientalis **3** : 23.
— strigosa **15** : 110, 119.
— sp. **12** : 199.
Axyris amarantoides **2** : 36, 115; **4** : 291; **7** : 320, 321; **9** : 164, 165; **19** : 95, 98, 100; **20** : 69.
Azalea procumbens **14** : 124.
Azara fernandeziana **7** : 250.
Baldingera arundinacea **2** : 48, 52, 54; **3** : 23; **7** : 97; **8** : 203; **11** : 21, 24, 25, 30, 31, 38, 39; **13** : 10; **15** : 14, 30.
— — f. picta **3** : 23.
Ballota nigra **15** : 111, 132.
Barbarea stricta **2** : 55; **3** : 26; **4** : 10, 89, 127; **5** : 48; **6** : 27; **7** : 47, 107; **8** : 212, 267; **9** : 144; **11** : 21, 26, 34, 39, 164; **14** : 51; **15** : 125; **17** : 40; **18** : 123; **19** : 31, 39; **20** : 21, 65.
— vulgaris **3** : 26; **5** : 48; **6** : 140; **7** : 107; **8** : 211; **10** : 440, 453; **12** : 34, 70; **13** : 99; **15** : 67—79 (fig.), 125; **17** : 40; **18** : 121, 122; **19** : 39, 101, 145; **20** : 70, 86, 131, 137.
— — v. arcuata **20** : 21.
Barringtonia sp. **3** : 48.
Barts(ch)ia alpina **8** : 272; **9** : 142; **10** : 370; **11** : 121; **12** : 140; **13** : 129; **14** : 53, 117, 121; **17** : 220; **19** : 54, 195; **20** : 42.
Batrachium Baudotii **7** : 106.
— circinatum **10** : 241, 289; **15** : 196.
— confervoides **7** : 272.
— heterophyllum **19** : 195.
— marinum **15** : 194.

Batrachium peltatum **8** : 374; **17** : 75.
— — v. septentrionale **3** : 26.
— trichophyllum **17** : 233.
Beckmannia eruciformis **9** : 164, 165.
Begonia sp. **18** : 140.
Bellis perennis **1** : 44, 153; **3** : 30; **4** : 223; **10** : 168; **15** : 110, 135; **19** : 141.
— — f. monstrosa **1** : 147.
Berberis ilicifolia **6** : 64.
— microphylla **6** : 63.
— vulgaris **4** : 209, 228 (mp.); **19** : 66.
Berteroa incana **3** : 26; **4** : 210; **9** : 164; **10** : 142, 234; **11** : 151; **12** : 34, 112; **13** : 99; **15** : 60, 126; **18** : 50, 66, 67; **19** : 67, 97, 101, 106, 109; **20** : 71, 126, 128, 137.
Beta cicla **1** : 147.
— vulgaris **9** : 164; **19** : 107, 108.
— — v. rubra **3** : 25, 55—56, 84.
— — v. cruenta [**15** : 109].
Betula alba [**3** : 10]; **4** :[74, 86, 87]; **6** : 47, 49, 51, 127, 128; **11** : [16, 18, 23], 47, [48, 142, 155, 157, 158, 163], 164; **19** : 93, 100; **20** : 62.
— concinna **4** : 205; **20** : 59, 68.
— — × coriacea × pubescens ssp. suecica × verrucosa f. arbuscula **10** : 53, 54.
— — × — × — ssp. — × — f. Palmeri **10** : 53—56, 371, 473.
— — × — × verrucosa **13** : 90.
— — × nana × pubescens f. parvifolia **13** : 90.
— — × — × — ssp. suecica **13** : 90.
— — × — × verrucosa **13** : 90.
— — × pubescens **4** : 205.
— — × — × verrucosa **13** : 90.
— — × — f. parvifolia × verrucosa **13** : 90.
— — × — ssp. suecica × verrucosa f. *androgyna* **10** : 372.
— — × — ssp. — × — f. exigua **13** : 90.
— — × — ssp. — × — f. *korpoënsis* **10** : 372—373 (fig.).
— — × — ssp. — × — f. Ostrogothia **10** : 371, 372.
— — × verrucosa **4** : 205.
— coriacea × nana × tortuosa × verrucosa f. intermedia **10** : 376—377 (fig.).
— — × pubescens × verrucosa f. incisa **10** : 372.
— — × — ssp. suecica × verrucosa f. *dentato-incisa* **10** : 375—376 (fig.).
— — × — ssp. — × — f. *duplicato-incisa* **10** : 374—375 (fig.).
— — × — ssp. — × — f. *Lindbergii* **10** : 373, 374 (fig.).
— glandulosa **20** : 30 . . . 34, 44.
— humilis **6** : 91—93, 124, 127, 128; **11** : 118.
— intermedia **12** : 69.
— nana **1** : 60, 65, 66; **3** : 25; **4** : 19; **5** : 6; **7** : 104, [168], 170, 195 . . . 229; **8** : 209; **9** : 99, 107, 108; **10** : 277; **11** : 121, 142, 163, 164, 172—174, 231; **12** : 133, 137 . . . 141; **13** : 36, 89, 129; **14** : 44, 51, 65, 69, 70, 114, 116, 120, 121; **15** : 120; **16** : 23; **17** : 163, 219, [226]; **19** : 2, 3, 64, 93, 100; **20** : 20, 68, 124.
Betula nana × odorata **3** : 25; **7** : 104; **8** : 209; **9** : 108, 109; **11** : [16], 17; **13** : 9, 17.
— — × — f. pernana **7** : 104; **8** : 209.
— — × — f. perodorata **7** : 104; **8** : 209.
— — × pubescens **4** : 19; **12** : 137; **13** : 90; **14** : 117.
— — × — f. parvifolia **13** : 90.
— — × — × verrucosa **13** : 90.
— — × — f. parvifolia × verrucosa **13** : 90.
— — × — ssp. suecica × verrucosa **13** : 90.
— — × verrucosa **4** : 19; **7** : 104; **8** : 209; **12** : 137; **13** : 90; **14** : 117; **20** : 68.
— odorata lus. sublobata **10** : 375.
— — × verrucosa **8** : 209.
— papyrifera **20** : 30, 43.
— pubescens **1** : 99; **4** : 205; **5** : 44, 64; **6** : 26 . . . 42, 48, 50, 51, 93; **7** : 32, 121 . . . 136, 195; **8** : 24, 36, 37, 40, 58; **10** : 167, 169, 232, 406; **11** : 21; **12** : 34, 39, 112, 172; **15** : 6, 7, 31, 32, 100, 106, 120, 194, 214; **17** : 85, 124; **18** : 20, 118; **19** : 149; **20** : 68, 112, 117, 119, 121, 123.
— — ssp. suecica **10** : 372; **13** : 90.
— tortuosa **4** : 100; **14** : 117; **15** : 202; **19** : 49; **20** : 28.
— verrucosa **2** : 28, 52, 54; **3** : 13, 25, 54, 84; **4** : 205; **5** : 44; **6** : 26, 29, 30, 42, 108, 140; **7** : 104; **8** : 75, 209; **10** : 232, 373; **11** : [16], 21, 33 . . . 39, 148; **12** : 8, 186 . . . 189; **13** : 9, 7, 18; **15** : 31, 99—101, 106, 120, 194, 214; **17** : 26, 85; **18** : 117, 118; **19** : 3, 149; **20** : 20, 60, 68.
— — f. arbuscula **8** : 195.
— sp. **1** : 37; [**3** : 10]; [**4** : 109, 112]; [**6** : 3, 89, 94]; [**7** : 68, 69, 73, 166, 167], 168, [169—172, 196 . . . 232, 288, 289]; **8** : [63, 77, 187, 194, 225], 226, 229; **9** : [19], 25, 26, 72 . . . 83, 106 . . . 124, 144, 188; **10** : [20, 21], 62, [97, 98, 223], 231, 232, 236, [369—371, 430], 474; **12** : [56, 123, 134—141, 166], 168, [185], 253, 254; [**13** : 31]; **14** : 51, [64—69]; **15** : 16, 101, [105, 109]; [**16** : 76, 77]; **17** : 80, 82, [183, 184, 195, 217]; **18** : [32, 35, 78—81, 98], 111, [116, 117, 126, 127, 132 . . . 178], 180, 182, 183; [**19** : 169, 171, 172]; **20** : [47, 50, 52, 53], 54, 56, [58, 102], 145, 159—161, 165—167.
— sp. forma **7** : 321.
Bidens cernuus **12** : 73, 113; **15** : 107, 136; **17** : 81, 125; **18** : 123; **19** : 76; **20** : 75, 128, 140.
— — f. nanus **15** : 136.
— — f. radiatus **6** : 93; **15** : 107, 136.
— platycephalus **17** : 75.

Bidens radiatus **3**: 4, 135; **5**: 14, 26; **10**: 277; **13**: 91; **15**: 107, 136; **17**: 81; **20**: 75.
— tripartitus **2**: 51, 56; **3**: 30; **4**: 224; **5**: 14, 26, 60; **6**: 28; **7**: 118, 128; **11**: 15, 31, 32, 34; **12**: 73, 113; **13**: 13; **15**: 107, 136; **17**: 80, 81, 125; **18**: 123; **19**: 31, (97); **20**: 23, 62, 75.
— — f. pumilus **3**: 30.
Blyttia suaveolens **17**: 51.
Boehmeria excelsa **7**: 250.
Borrago officinalis **15**: 132.
Brachypodium pinnatum **1**: 25; **3**: 23; **4**: 88; **6**: 232; **8**: 195; **10**: 408, 410—411, 431; **12**: 169; **15**: 33; **17**: 9; **18**: 34, 37; **19**: 127.
— silvaticum **9**: 20; **10**: 281, 408, 432; **12**: 172; **15**: 214.
Brassica campestris **3**: 26; **5**: 48; **6**: 27; **7**: 107; **8**: 212; **15**: 109, 125, 211; **16**: 11, 13; **17**: 40; **19**: 40, 101; **20**: 21, 70, 86.
— — f. oleifera **3**: 26.
— — oblonga **3**: 26.
— — v. rapa **13**: 90; **19**: 107, 109.
— elongata **4**: 291.
— juncea **19**: 105, 109.
— lanceolata **10**: 474.
— napobrassica **19**: 148, 149.
— napus [**15**: 109]; **19**: 107, 109.
— — f. annua **3**: 26.
— — v. napobrassica **3**: 26.
— nigra **12**: 15, 20.
— oleracea [**18**: 146, 165, 181].
— — f. acephala **3**: 26.
— — f. botrytis **3**: 26; [**15**: 109].
— — f. capitata **3**: 26; [**15**: 109].
— — f. gemmifera **3**: 26.
— rapa [**15**: 109].
Braya linearis **12**: 64.
— purpurascens **12**: 62.
— supina **1**: 147; **4**: 210; **12**: 34, 40, 169.
Briza media **1**: 48; **4**: 86, 198; **5**: 39; **6**: 93; **7**: 32; **9**: 15; **10**: 156, 162, 167, 406, 413; **11**: 150; **12**: 33, 38, 110, 112, 168; **15**: 108, 119; **17**: 136, 138, 196; **19**: 128; **20**: 3, 65.
Bromus arvensis **3**: 23; **10**: 142; **11**: 151; **12**: 116—119; **15**: 110, 111; **19**: 38—41, 63, 91, 97, 100; **20**: 68, 125, 128, 129, 134.
— — v., ssp. patulus **12**: 115, 118.
— Benekenii **4**: 32, 290; **8**: 233; **10**: 280; **12**: 172; **15**: 33.
— commutatus **12**: 115, 116, 118, 119.
— erectus **12**: 115, 116.
— fernandezianus **7**: 250.
— hordaceus **12**: 118.
— inermis **4**: 290; **9**: 165; **11**: 117; **12**: 115, 116; **13**: 98, 100; **15**: 109—111, 120; **17**: 9; **18**: 66, 67; **19**: 38, 63, 106, 108, 113, 121, 138, 182; **20**: 68, 132, 134.
Bromus japonicus **12**: 115, 116, 119.
— macrostachys **12**: 119.
— madritensis **12**: 116, 117.
— mollis **4**: 87, 199; **5**: 40; **7**: 269; **8**: 41, 42, 276; **10**: 25, 162, 276; **11**: 56; **12**: 3, 33, 38; **15**: 120; **16**: 10, 12; **17**: 27, 196; **18**: 25, 66, 67; **19**: 31, 38—40, 63; **20**: 68, 84.
— racemosus **12**: 119,[1] 120.[1]
— secalinus **3**: 23; **4**: 199; **5**: 30, 40; **7**: 98; **8**: 204; **12**: 120; **13**: 98; **15**: 120; **17**: 9, 35; **19**: 38—40, 91, 100, 145; **20**: 68, 84, 125, 128, 134.
— squarrosus **12**: 116, 119; **15**: 110, 111, 120.
— — f. uberrimus **12**: 119.
— — v. villosus **12**: 119.
— sterilis **12**: 116, 117.
— tectorum **12**: 115, 117; **15**: 110, 210; **19**: 38.
— — v. nudus **12**: 117.
— unioloides **1**: 94, 156; **12**: 116, 120.
— villosus **6**: 115.
— sp. **7**: 254.
Bruguiera rheedii **3**: 48.
Brunella vide Prunella.
Bryonia alba **4**: 223; **9**: 164.
Bulliarda aquatica **3**: 27; **7**: 273; **8**: 212; **15**: 106; **17**: 75.
— — mf. prostrata **3**: 27.
Bunias orientalis **3**: 39; **4**: 210; **7**: 272; **8**: 200, 212; **9**: 165, 179; **12**: 34, 112, 167; **13**: 99, 100; **15**: 109, 126, 223; **16**: 11, 13; **18**: 66; **19**: 39—41, 67; **20**: 71, 126, 128.
Bupleurum rotundifolium **15**: 274.
Butomus umbellatus **2**: 34, 115; **3**: 22, 33; **4**: 173, 197, 228 (mp.); **5**: 12, 14; **7**: 97; **8**: 203; **10**: 277; **14**: 5; **15**: 107, 113, 196; **18**: 58; **19**: 46, 58; **20**: 48, 61, 66, 132.
Cakile maritima **2**: 49 . . . 55; **4**: 21, 67—69, 209, 228, 229 (mp.); **5**: 30, 48; **7**: 40, 47, 162, 165, 272; **9**: 19, 143; **10**: 280; **12**: 34, 153, 154, 174; **13**: 21; **15**: 83, 84, 125, 195; **18**: 141.
Calamagrostis angermannica **10**: 51.
— arundinacea **1**: 75—78, 156; **2**: 54; **3**: 23; **5**: 12, 15, 38; **6**: 26, 139; **8**: 203; **10**: 32, 404, 405—409; **11**: 144, 152; **12**: 112; **13**: 31; **15**: 89, 119, 233; **18**: 34, 35, 119; **19**: 76, 77; **20**: 20, 53, 67, 111, 112, 117.
— — (× lanceolata) **8**: 203.
— canadensis **19**: 195; **20**: 37.
— epigejos **2**: 51, 54; **3**: 23; **4**: 198; **5**: 38; **6**: 26, 48, 139; **7**: 98, 130; **8**: 203; **9**: 24; **10**: 156, 229; **11**: 17, 21, 22, 24—27, 30—39; **12**: 112, 179; **13**: 10, 11, 13,

[1] Per errorem racempus.

33; **15** : 32, 118; **18** : 42, 119, 135, 153; **19** : 30, 39, 98; **20** : 3, 13—16, 67, 91—93, 128.
Calamagrostis epigejos × lanceolata **10** : 62; **20** : 13—16, 91, 93.
— — × neglecta **10** : 66.
— epigejos × purpurea **20** : 91—94.
— gracilescens **8** : 197; **10** : 51, 52, 66.
— Huebeneriana **10** : 51.
— lanceolata **3** : 23; **5** : 38; **8** : 197, 203; **10** : 51, 52; **12** : 33, 37, 112; **14** : 49; **15** : 118; **17** : 39, 51, 59, 135; **19** : 48, 93, 94, 99; **20** : 14—16, 63, 94.
— — v. canescens **19** : 81.
— — × neglecta **8** : 197; **10** : 51—52, 66.
— Langsdorffii **19** : 195.
— lapponica **8** : 260; **11** : 144; **12** : 136; **14** : 49, 116; **19** : 99, 115, 116, 117.
— *lapponica* × *neglecta* (*ponojensis*) **19** : 115—117.
— neglecta **1** : 33; **4** : 198; **5** : 38; **6** : 26, 109; **7** : 125; **8** : 21, 22, 30, 197; **9** : 180; **10** : 51; **11** : 31—33; **12** : 33, 37; **13** : 7, 13; **14** : 49; **15** : 108, 118; **17** : 135, 219, 222; **19** : 115, 116, 117, 195; **20** : 37, 39, 67, 118.
— — f. atrorubens **19** : 115.
— — × purpurea **10** : 51, 52, 66.
— Neumaniana **20** : 13—16.
— obtusata **9** : 143.
— phragmitoides **3** : 23; **8** : 203.
— purpurea (**1** : 16); **3** : 18; **4** : 198; **6** : 26, 29, 30, 42, 48; **7** : 98; **8** : 24; **10** : 51, 52, 61, 62, 98, 229; **11** : 17; **12** : 136; **13** : 9, 10; **14** : 49; **15** : 118; **17** : 39, 82, 135; **18** : 123; **19** : 93, 99; **20** : 13, 14, 67, 91—94, 122, 123.
— — v. glaucescens **20** : 13.
— stricta **3** : 11, 23; **4** : 74, 76, 80, 82; **5** : 115; **7** : 98; **8** : 203; **10** : 370; **13** : 106.
— strigosa **10** : 66.
— sp. **9** : 237; **11** : 55; **15** : 103.
Calamintha acinos **9** : 164; **10** : 242, 409, 428, 430, 432; **11** : 57; **18** : 42.
— — v. verticillata **19** : 145.
— clinopodium **8** : 277, 281; **18** : 34, 35.
Calandrinia Menziesii **2** : 35—36, 115.
— speciosa **2** : 36.
Calendula officinalis **3** : 30; **7** : 118; **19** : 77, 107, 112.
— — forma **10** : 474.
Calla palustris **2** : 54; **3** : 43; **6** : 164; **7** : 101; **8** : 205, 318; **9** : 180; **10** : 239; **13** : 32; **15** : 109, 114; **17** : 123, 124; **18** : 117, 123, 124; **19** : 99, 195; **20** : 19, 43, 66.
Callistephus chinensis **3** : 30.
Callitriche au(c)tumnalis **2** : 41; **3** : 28; **4** : 53, 107; **7** : 266; **8** : 243, 280; **10** : 239; **11** : 7; **12** : 145; **14** : 109; **15** : 106, 130; **17** : 44; **19** : 71; (**20** : 64).
Callitriche hamulata **12** : 140.
— heterophylla **19** : 195.
— palustris **19** : 195; **20** : 31.
— polymorpha (**4** : 214); **7** : 111; **8** : 215, 280; **15** : 106, 130; **20** : 63, 72, 107.
— stagnalis **4** : 214.
— verna **2** : 55; **3** : 28, 86; **4** : 214; **5** : 53; **7** : 111; **8** : 215; **15** : 106, 130; **17** : 78; **18** : 63, 102, 123; **20** : 7, 22, 61, 62, 72.
— sp. **15** : 106, 107; **17** : 125, 234; **20** : 6.
Calluna vulgaris **1** : 59, 87; **2** : 48, 51, 55; **3** : 28, 62; **4** : 77, 85, 218; **5** : 55; **6** : 26, 27, 109, 139; **7** : 68, 69, 113, 126, 128, 134, 218; **8** : 25, 39, 217, 271, 307; **9** : [19], 107, 178; **10** : [22], 34, 164, 406; **11** : 102, 142, 143; **12** : 35, 113, [132], 153, 168, 174, 179, 180, 191; **13** : 18, 31, 33; **14** : 14, 46, 52; **15** : [92], 99 . . . 108, 131, 194; **17** : 4 (fig.), 5, 25, 32, 73; **18** : 42, 83, 122, 123, 133 . . . 180; **19** : 3, 59, 93, 102; **20** : 22, 51, 57, 58, 60, 62, 73, 110.
— — f. albiflora (alba) **3** : 28; **7** : 113; **8** : 92, 217; **11** : 161; **12** : 72; **19** : 72, 95, 102, 145; **20** : 73, 139.
Caltha palustris **1** : 33, 48; **2** : 55; **3** : 26; **4** : 77, 208; **5** : 46; **6** : 109, 144; **7** : 106, 232; **8** : 22, 30, 211, 266; **9** : 24; **10** : 157, 233, 245; **11** : 31—33, 163; **12** : 34, 40, 112; **13** : 10, 11; **14** : 51; **15** : 124; **17** : 71, 136, 220, 223; **18** : 123; **19** : 101; **20** : 10, 21, 50, 63, 70, 113, 122.
— — f. submersa **11** : 159.
— — v. decumbens **10** : 245.
— — v. procumbens **10** : 245.
— — v. radicans **10** : 245; **11** : 158, 159, 163.
— — v. zeetlandica **10** : 245.
Calypso borealis **6** : 232; **7** : 189; **17** : 75.
— bulbosa **3** : 16; **11** : 157; **19** : 48.
Calystegia sepium **10** : 431; **11** : 150.
— turguriorum **7** : 254.
Camelina alyssum **4** : 210; **15** : 110, 125; **20** : 86.
— foetida **7** : 107; **8** : 212; (**20** : 64).
— glabrata **8** : 201, 212.
— linicola **9** : 164; **19** : 145.
— — ssp. foetida **3** : 26.
— — ssp. macrocarpa **3** : 26.
— microcarpa **13** : 99, 100; **15** : 110, 125.
— sativa **15** : 110, 125; **19** : 39, 41, 67, 138; **20** : 131, 137.
Campanula aparinoides **9** : 179—182.
— cervicaria **3** : 30, 36; **4** : 91, 176, 223; **7** : 116; **10** : 277; **13** : 32; **18** : 120; **19** : 76, 145; **20** : 55, 75.
— — f. albiflora **20** : 75.
— glomerata **1** : 37; **3** : 30; **4** : 91, 223; **5** : 14, 26, 28; **6** : 27; **8** : 219; **9** : 24; **10** : 238; **11** : 150; **12** : 35, 44, 111; **15** : 110,

135; **17** : 9, 81; **18** : 121, 122; **19** : 111, 145; **20** : 23, 51, 63, 75, 111, 114, 116, 117.
Campanula glomerata f. albiflora **3** : 30; **20** : 75.
— latifolia **3** : 30; **10** : 281, 409; **11** : 146; **12** : 172; **15** : 135, 230; **19** : 76, 188; **20** : 49, 74, 75.
— — f. albiflora **3** : 30; **20** : 75.
— — f. albinea [**5** : 65].
— patula **2** : 40; **3** : 30; **4** : 223; **5** : 14, 26, 28; **6** : 27; **7** : 116; **8** : 219; **10** : 142; **11** : 17, 36, 39; **14** : 122; **15** : 109, 135; **17** : 81; **18** : 121; **19** : 55, 145; **20** : 23, 51, 63, 75, 89.
— — f. albiflora (alba) **3** : 30; **8** : 92; **12** : 73; **14** : 171.
— — f. micrantha **20** : 75.
— persicifolia **2** : 26—28; **3** : 30, 77, 84; **4** : 223; **5** : 60; **6** : 138; **7** : 33, 116; **8** : 219; **10** : 406; **12** : 35, 44, 73, 168, 198, 199; **17** : 9; **18** : 26, 27, 28, 34; **19** : 76, 145; **20** : 23, (64), 114, 117, 140.
— — f. albiflora (alba) **3** : 30; **19** : 76.
— rapunculoides **4** : 62, 223; **6** : 138; **7** : 116; **8** : 200, 219; **9** : 164; **12** : 35, 44; **13** : 99; **15** : 135; **16** : 12, 13; **19** : 76, 106, 107, 111, 145; **20** : 23, 75, 114, 128, 140.
— rotundifolia **2** : 48, 56; **3** : 30; **4** : 26, 85, 87, 223; **5** : 59; **6** : 27, 138; **7** : 116; **8** : 219; **9** : 24; **10** : 34, 164, 168, 238; **11** : 164; **12** : 35, 44, 113; **14** : 53; **15** : 108, 135; **17** : 217, 220, 221, 225; **18** : 27, 28, 121; **19** : 96, 103, 145, 195; **20** : 23, 51, 57, 59, 63, 75, 89.
— — f. albiflora (alba) **8** : 92; **12** : 73; **15** : 135; **17** : 225; **19** : 76.
— — f. micrantha **20** : 75.
— — f. monstr. **6** : 231; **7** : 321.
— — ssp. lapponica **20** : 89.
— trachelium **2** : 62, 64; **4** : 87; **5** : 32, 59; **7** : 38; **8** : 86, 95; **10** : 281, 409, 432; **12** : 19; **15** : 7, 8, 110, 135, 214; **17** : 54.
— uniflora **12** : 62, 64; **19** : 195; **20** : 40.
Cannabis sativa **3** : 25; **9** : 164; **15** : 121; **19** : 40, 100, 105, 108; **20** : 69.
— gigantea **3** : 25.
Capsella bursa pastoris **2** : 19, 28, 51, 55; **3** : 26, 84; **4** : 210; **5** : 12, 13, 20, 28, 48; **6** : 27; **7** : 107; **8** : 212; **10** : 163, 234; **11** : 34, 151, 164, 165; **12** : 34, 40, 112; **14** : 51; **15** : 59, 79, 125, 275; **16** : 14; **17** : 219; **18** : 27, 28, 66, 121, 122; **19** : 31, 39, 96, 101, 149, 195; **20** : 21, 62, 71, 86, 126.
— — f. apetala **1** : 14, 156; **19** : 67.
Caragana arborescens **3** : 27; **7** : 258; **13** : 90; **15** : 109.
Cardamine amara **3** : 26; **4** : 174, 210, 228 (mp.); **6** : 93; **7** : 272; **10** : 233, 277; **12** : 34, 56, 58, 71; **15** : 109, 125; **17** : 59, 123, 124, 136, 197; **18** : 36, 44, 63; **19** : 67, 145; **20** : 71, 106.
Cardamine bellidifolia **8** : 267; **11** : 168; **14** : 51; **17** : 219, 224; **19** : 195.
— dentata **4** : 210; **5** : 48.
— flaccida **7** : 250.
— flexuosa **10** : 281.
— hirsuta **2** : 19, 28; **3** : 34, 84; **4** : 23, 210, 228 (mp.); **5** : 48; **7** : 32, 37, 47; **8** : 278; **9** : 22; **10** : 40, 58, 147, 163, 172, 278, 280; **15** : 214; **17** : 197; **18** : 133; **19** : 67.
— impatiens **10** : 59, 233, 474; **12** : 114; **13** : 20; **17** : 54.
— palustris **10** : 370; **13** : 129.
— parviflora **10** : 277; **11** : 31, 32, 34;[1] **12** : 144; **13** : 20.
— pratensis **3** : 26; **4** : 210; **5** : 48; **7** : 107; **8** : 99, 212; **9** : 180; **10** : 157, 167, 233, 406; **11** : 163; **12** : 40; **14** : 51; **15** : 109, 125; **17** : 124, 136, 219, 233; **18** : 123; **19** : 195; **20** : 21, 70, 106, 122.
— — f., v., ssp. dentata **12** : 70; **17** : 67; **20** : 21.
— — f. uniflora **19** : 67.
Carduus acanthoides **9** : 164.
— crispus **3** : 30; **4** : 89; **5** : 61; **6** : 142; **7** : 117; **8** : 200, 219; **11** : 164, 165; **12** : 35, 44, 74; **15** : 137; **16** : 12, 13; **17** : 75; **18** : 34; **19** : 103, 106, 112, 113; **20** : 23, 76, 90, 127, 128.
— — f. albiflorus **19** : 77.
— nutans **4** : 62; **7** : 275; **15** : 111, 137.
Carex acuta **3** : 24; **7** : 100; **8** : 205; **15** : 30; (**20** : 64).
— acutiformis **6** : 231; **9** : 238; **10** : 231, 378; **12** : 33, 254; **17** : 195; **19** : 122, 133, 190.
— aenea **19** : 195; **20** : 43.
— albescens **1** : 91.
— alpina **4** : 107; **8** : 262; **10** : 370.
— ampullacea **3** : 24; **10** : 22.
— — × vesicaria **5** : 78.
— angarae **19** : 195; **20** : 39.
— angustior **19** : 195; **20** : 39.
— aquatilis **4** : 80, 83, 173; **7** : 100, 270, 275; **8** : 30—31, 205, 262, 276, 375; **10** : 230?, 370, 412; **11** : 163, **13** : 7; **14** : 50; **15** : 117; **17** : 38, 162; **19** : 195; **20** : 67.
— — v. stans **8** : 31.
— — × rigida **17** : 75.
— *aquatilis* v. *stans* × *rigida* **17** : 75.
— aquatilis × salina **6** : 54.
— — × — ssp. cuspidata v. kattegatensis **19** : 61.
— arctogena **19** : 195; **20** : 33, 35, 37 . . . 41, 45.
— arenaria **1** : 78—79, 156; **3** : 8, 16, 33; **4** : 69, 201; **5** : 71; **7** : 28, 40; **10** : 281, 411—412; **11** : 152, 153; **12** : 164, 173, 179; **15** : 83, 116; **17** : 54; **19** : 38, 41.
— aristata **8** : 374; **12** : 135, 136; **14** : 171.

[1] Per errorem parvifolia **11** : 275.

Carex atrata **3** : 15, 134; **8** : 262; **10** : 370; **11** : 166, 167.
— atratiformis **19** : 195; **20** : 30, 39, 41.
— atrofusca **19** : 195.
— Banksii **7** : 253.
— *Bergrothii* **19** : 89, 90; **20** : 131, 134.
— Berteroniana **7** : 251.
— Boenninghauseniana **17** : 194.
— brunnescens **1** : 45—47, 90, 156; **6** : 26 . . . 42, 48; **7** : 34; **8** : 25; **9** : 21; **14** : 44, 50; **15** : 116; **17** : 38; **18** : 112, 113; **19** : 61, 93, 99, 195; **20** : 19, 43, 57, 84, 88.
— — × lapponica **18** : 112, 113, 270.
— — × loliacea **1** : 90—91, 154, 156; **19** : 47.
— — v. silvatica × loliacea **1** : 91.
— Buxbaumii **8** : 262; **20** : 20, (64).
— caespitosa **1** : 48; **3** : 34; **4** : 22; **8** : 262; **10** : 230; **11** : 163; **12** : 34, 38, 68, 110, 136, 142; **14** : 50; **15** : 116; **17** : 34, 38, 135, 138, 219; **19** : 94, 99; (**20** : 64).
— canescens **2** : 28, 54; **3** : 18, 24; **4** : 75, 201; **5** : 41; **6** : 26; **7** : 100, 121, 127, 136; **8** : 25, 30, 205; **10** : 230; **11** : 33, 163, 164, 171, 172; **12** : 136; **13** : 9, 10; **14** : 50; **15** : 85—87, 104, 109, 116; **17** : 67, 124, 135, 194; **18** : 112, 123; **19** : 61, 99, 195; **20** : 19, 43, 44, 67, 128.
— — v. subloliacea **15** : 85; **18** : 112.
— — v. subvitilis **12** : 135.
— — × dioeca **8** : 200, 205; **10** : 66.
— — × lapponica **18** : 112, 270.
— — × loliacea **10** : 202, 474; **18** : 112.
— — × norvegica **9** : 176.
— canescens × paniculata **17** : 193—194 (fig.).
— — × tenuiflora **1** : 91.
— capillaris **4** : 86, 202; **6** : 93; **10** : 32, 149, 152, 179, 180, 231, 274, 281, 286 (mp.), 370, 405, 408, 429; **11** : 156, 167; **12** : 34, 110, 135; **13** : 129; **14** : 50, 115, 117; **15** : 214; **17** : 135, 219, 222; **19** : 48, 195; **20** : 30, 32—34, 40, 45, 118, 134.
— — f. minima **8** : 261.
— capitata **8** : 263; **10** : 370; **12** : 134; **14** : 114; **17** : 129; **19** : 46, 122.
— caryophyllea **10** : 408.
— chordorrhiza **3** : 24; **7** : 101; **8** : 262, 276; **10** : 229, 230; **12** : 33, 67, 135; **13** : 89, 129; **14** : 50; **15** : 31, 116; **17** : 38, 132, 135; **19** : 93, 99; **20** : 63, 119, 122.
— concolor **19** : 195; **20** : 35, 36, 44.
— contigua **7** : 32, 37; **8** : 277; **10** : 156; **12** : 38; **20** : 3.
— curta **1** : 46.
— cyperoides **10** : 474.
— Davalliana **2** : 28; **3** : 50, 52—53, 83; **6** : 91; **10** : 224, 230; **12** : 33, 180.
— — × dioeca **3** : 34.
— deflexa **19** : 195; **20** : 38.
Carex diandra **4** : 201, 228 (mp.); **10** : 230; **12** : 38, 56, 57; **13** : 34; **15** : 31, 115; **17** : 132, 135; **19** : 47, 60, 66, 99, 122, 132; **20** : 19, 55, 67, 119 . . . 123.
— diandra × paniculata **17** : 193—195.
— digitata **3** : 24; **4** : 90, 201; **5** : 41, 64; **6** : 26, 29, 31, 42, 48, 139; **7** : 100; **8** : 200, 205, 277; **10** : 224, 230, 274, 275, 406, 408; **11** : 6; **12** : 68; **14** : 113, 115; **15** : 8, 31, 32, 89, 117; **17** : 34, 38; **18** : 32, 119; **19** : 47, 49, 55, 127; **20** : 20, 57, 67, 106.
— dioica (dioeca) **3** : 24; **4** : 200; **6** : 93, 109; **7** : 269; **8** : 205; **10** : 230, 274, 275, 404, 405, 408, 429; **12** : 38, 67, 110, 180; **13** : 129; **14** : 50; **15** : 31, 115; **16** : 83; **17** : 34, 38, 132, 135, 219; **19** : 99; **20** : 19, 55, 67, 116, 119, 122, 133.
— distans **4** : 87; **6** : 103—107 (fig.); **10** : 181, 281, 408, 431, 432; **11** : 5; **12** : 171; **15** : 217; **18** : 84—87.
— — × extensa **6** : 103—107 (fig.); **18** : 83—88.
— disticha **1** : 48, 79; **3** : 4, 129, 135; **4** : 61, 201; **5** : 41; **7** : 257; **10** : 167, 230; **12** : 33, 38, 110, 167; **15** : 60; **17** : 9; **19** : 60.
— diversicolor **4** : 201; **8** : 38, 73; **9** : 21; **10** : 32, 149, 152, 179, 274, 276, 281, 286 (mp.), 405. 408, 432; **12** : 34, 38, 110, 167, 169, 180.
— echinata **3** : 18, 24; **4** : 76.
— elata **10** : 230, 237 (fig.); **12** : 33; **15** : 90, 116; **17** : 38; **19** : 3, 94, 99; **20** : 20, 67.
— elata × Goodenowii ssp. juncea **15** : 89—90.
— elongata **7** : 269, 275; **8** : 200, 205, 276; **10** : 230; **12** : 68, 143, 172; **13** : 34; **15** : 116; **17** : 34, 38, 67, 71, 135; **19** : 47, 61; **20** : 19, (64).
— *enontekiensis* **18** : 94—95.
— ericetorum **11** : 197; **12** : 168, 179; **13** : 32; **15** : 117; **17** : 38, 124; **19** : 47, 104, 127, 189; **20** : 20, 67.
— evoluta **7** : 3.
— extensa **4** : 89, 201; **6** : 103—107 (fig.); **10** : 281, 408, 432; **11** : 5; **12** : 171; **15** : 217; **18** : 84—87.
— — × Oederi **6** : 103.
— filiformis **1** : 60; **3** : 24; **7** : 94, 100; **8** : 205, 261; **10** : 258; **13** : 104, 106; **20** : 5, 124.
— flava **2** : 62; **4** : 202; **5** : 12, 16; **7** : 80 (mp.), 82, 257; **8** : 261; **10** : 405, 408, 412, 431; **12** : 34, 38, 65, 68; **13** : 32, 36, 126, 128, 129; **14** : 121; **15** : 31, 116 (mp.), 117; **16** : 83; **17** : 34, 39, 124, 126, 132, 135, 138, 139; **19** : 62, 89, 90, 98, 145; **20** : 20, 67, 112, 116, 118—121, 134.
— — v. gaspensis **19** : 90.
— *flava* × *Bergrothii* **19** : 90.
— — × Hornschuchiana **3** : 34; **4** : 202.

Carex flava × Hornschuchiana v. fulva **13** : 126.
— *flava* × *Kotilaineni* **19** : 90.
— — × lepidocarpa **3** : 34; **10** : 405.
— — × Oederi **3** : 34; **4** : 202; **7** : 257; **12** : 38, 136; **13** : 127.
— — × — ssp. oedocarpa **15** : 117; **17** : 124.
— — × viridula **17** : 39; **19** : 90.
— — × C. sp. **15** : 117; **17** : 124; **19** : 89.
— fuliginosa **12** : 64.
— fusca **20** : 20.
— germanica **17** : 193, 194.
— glareosa **4** : 84, 100; **7** : 37, 270, 275; **10** : 240, 408; **11** : 5; **12** : 143, 145, 164; **19** : 47, 60, 195; **20** : 35, 39, 43.
— glauca **4** : 87; **10** : 405, 408, 432.
— globularis **3** : 24; **7** : 83, 100; **8** : 195, 205; **9** : 21; **12** : 113; **13** : 7; **14** : 50; **15** : 104, 117; **19** : 61, 93, 99; **20** : 67.
— Goodenowii (Goodenoughii) **1** : 33, 48; **2** : 50, 51, 54; **3** : 24; **4** : 69 . . . 85, 201; **5** : 41; **6** : 4, 26, 109; **7** : 100; **8** : 21, 22, 25, 205; **9** : 179, 180; **10** : 156, 167, 230, 258, 403, 406, 413; **11** : 32 . . . 39; **12** : 34, 38, 110, 112; **13** : 10, 31, 36; **14** : 50; **15** : 5, 92, 104, 108, 109, 117, 216; **16** : 8; **17** : 124, 126, 135, 162, 233; **18** : 123; **19** : 99; **20** : 3, 20, 55, 57, 62, 67, 105, 118, 119.
— — v., ssp. juncella **3** : 24; **4** : 75, 76; **7** : 100; **8** : 205.
— — ssp. juncea **10** : 230; **11** : 24, 32, 33; **13** : 9, 10; **14** : 50; **17** : 162.
— — × rigida **17** : 164.
— — × salina **6** : 54.
— — ssp. juncella × salina **6** : 54.
— *gotlandica* **6** : 104, 107.
— gracilis **3** : 33; **4** : 201, 228 (mp.); **10** : 230; **12** : 38; **15** : 117; **17** : 71, 135, 162; **18** : 123, 124; **20** : 67.
— gynocrates **19** : 195.
— Halleri **12** : 135; **13** : 95; **14** : 50, 115; **17** : (24), 219, 222; **19** : 47, 137.
— Hartmani **11** : 230; **12** : 159, 169, 172.
— heleonastes **1** : 46; **9** : 143; **10** : 277; **12** : 134; **14** : 114; **17** : 135; **19** : 60, 203.
— hirta **4** : 202; **9** : 22; **10** : 59, 275, 408, 429, 431; **11** : 150; **15** : 118; **16** : 10, 13; **17** : 233.
— holostoma **17** : 24.
— Hornschuchiana **4** : 202; **6** : 103; **10** : 46, 173, 281, 405, 408, 412—413, 432; **12** : 34, 38, 169, 178, 180.
— — × Oederi **3** : 34; **4** : 202; **12** : 178.
— imandrensis **15** : 175.
— incurva **4** : 100; **10** : 370; **13** : 171; **19** : 195.[1]
— inflata **4** : 202; **5** : 41; **12** : 34; **14** : 50; **18** : 123, 124.
— — × riparia **4** : 202.
Carex inflata × vesicaria **5** : 78.
— irrigua **3** : 24; **8** : 205, 261; **11** : 172; **13** : 36, 129; **15** : 104. 117; **19** : 195; **20** : 25, 37, 41, 44.
— *jemtlandica* **13** : 126—128, 129; **14** : 110; **19** : 89, 90.
— juncea **6** : 26; **15** : 13.
— juncella **17** : 38.
— *Kotilaineni* **19** : 89, 90.
— Lachenalii **14** : 50, 171; **19** : 195; **20** : 31, 33, 40.
— laevirostris **2** : 41; **6** : 232; **7** : 271; **10** : 474; **12** : 65, 68, 135; **14** : 115; **15** : 31, 117; **17** : 135; **19** : 145; **30** : 67, 134.
— laevirostris × vesicaria **3** : 7, 129, 135; **15** : 117.
— lagopina **8** : 262.
— Langeana **19** : 195; **20** : 39.
— lapponica **13** : 171; **15** : 85—87; **18** : 112, 270; **19** : 61, 328.
— lasiocarpa **2** : 52, 54; **4** : 202; **7** : 3; **8** : 261; **10** : 406; **11** : 121; **12** : 38, 133, 135, 140; **13** : 34, 129; **14** : 50, 111 . . . 122; **15** : 104, 118; **17** : 39, 135; **18** : 94, 123, 124; **19** : 62, 63, 99; **20** : 67.
— lasiocarpa × riparia **7** : 3, 321; **18** : 123, 124.
— *lasiocarpa* × *rotundata* **18** : 94—95.
— laxa **11** : 122; **12** : 135; **14** : 115; **19** : 203.
— Leersii **2** : 54; **6** : 26; **7** : 127.
— lepidocarpa **4** : 202; **10** : 280, 405; **12** : 34; **13** : 126, 127; **19** : 89, 90.
— — v. turgida **10** : 404; **13** : 127.
— — ssp. *jemtlandica* **11** : 121; **12** : 174; **13** : 126.
— — ssp. septentrionalis f. jemtlandica **13** : 126.
— — ssp. — v. turgida **13** : 127, 128.
— leporina **2** : 14, 54; **3** : 24, 53, 84; **4** : 10, 86, 201; **5** : 12, 16, 41; **6** : 26; **7** : 101; **8** : 205; **10** : 230, 413; **11** : 35, 36, 39; **12** : 110, 112; **15** : 32, 108, 116; **17** : 25; **18** : 121; **19** : (97), 98; **20** : 3, 19, 67, 119, 128.
— — v. argyroglochin **3** : 24.
— leptalea **19** : 195; **20** : 39.
— limosa **3** : 24; **7** : 83, 95, 100; **8** : 205, 261, 276; **12** : 133—135; **13** : 36, 129; **15** : 104, 117, 175; **17** : 135; **19** : 82, 93, 99, 195; **20** : 20, 39, 67, 119, 124.
— — f. angustisquama **19** : 82.
— — × livida **15** : 175.
— limosa × rariflora **15** : 175.
— livida **7** : 100, 270, 275; **8** : 262; **10** : 280; **12** : 68, 135; **14** : 115; **15** : 175, 274; **19** : 47, 59, 61.
— loliacea **1** : 90; **6** : 26, 144; **7** : 270; **8** : 99, 200, 205, 262; **11** : 163; **12** : 56, 58, 68, 134, 172; **14** : 50, 114; **15** : 116; **17** : 34 38, 59, 66, 67, 135, 138; **19** : 47, 61; **20** 67, 84, 123, 133.

[1] Per errorem inerva; vide **20** : 29.

Carex ludibunda **17** : 193.
— macilenta **1** : 90, 91.
— Maclowiana **12** : 62, 254; **19** : 80—81, 195; **20** : 84, 88.
— magellanica **2** : 54; **7** : 95, 100; **8** : 261; **14** : 50; **19** : 62, 82, 93, 99; **20** : 67, 119.
— — v. planitiei **19** : 81—82.
— — ssp. irrigua **15** : 117; **17** : 135.
— marina **19** : 195; **20** : 37.
— maritima **6** : 54; **16** : 71; **19** : 61, 195; **20** : 35, 39, 43.
— membranopacta **19** : 195; **20** : 42.
— microstachya **10** : 66.
— misandra **19** : 195; **20** : 42.
— monila **19** : 195; **20** : 43.
— montana **10** : 276, 280; **12** : 168.
— muricata **8** : 277.
— — ssp. contigua **10** : 413; **15** : 115; **19** : 60.
— — ssp. microcarpa **19** : 60.
— — ssp. Pairaei **18** : 119.
— norvegica **4** : 100; **7** : 270, 275; **8** : 262, 276; **10** : 240, 408; **19** : 61, 195;[1] **20** : 29, 42.
— — ssp. inserrulata **20** : 29.
— Oederi **2** : 54; **3** : 24; **4** : 80, 81, 84, 90, 201; **5** : 41; **6** : 103; **7** : 100, 257; **8** : 205; **10** : 413; **12** : 34, 38, 169, 178, 254; **13** : 31, 32, 127, 128; **15** : 31, 111, 117; **16** : 63, 82; **17** : 38; **19** : 38, 62, 89, 99, 145; **20** : 20.
— — forma **11** : 121.
— — v. pulchella **8** : 21, 22; **13** : 36.
— — ssp. oedocarpa **5** : 41; **8** : 25; **10** : 405; **12** : 107; **13** : 19, 36; **15** : 105, 117; **16** : 84; **17** : 67, 124.
— — ssp. oedocarpa × C. sp. **15** : 117; **17** : 124, 135.
— — × flava f. peroederi **19** : 89.
— oligosperma **19** : 195.
— ornithopoda **4** : 201; **6** : 91, 93; **10** : 224, 230, 280; **12** : 33, 168, 172; **15** : 211.
— orthostachys (**20** : 64).
— Pairaei **4** : 23, 201; **5** : 41; **6** : 109, 110, 139; **7** : 32, 37; **10** : 146; **12** : 33, 38.
— pallescens **3** : 24, 53, 84; **4** : 76, 86, 201; **5** : 41, 64; **6** : 26; **7** : 100, 127; **8** : 25, 52, 205; **9** : 15; **10** : 156, 167, 406; **11** : 25, 35, 39; **15** : 8, 32, 108, 117; **17** : 135; **18** : 32, 119; **20** : 20, 53, 55, 59, 67, 101, 112, 116 . . . 119.
— paludosa (**20** : 64).
— palustris **3** : 24.
— panicea **1** : 48; **3** : 24; **4** : 80, 81, 83, 86, 201; **5** : 41; **6** : 91, 93; **8** : 21, 22, 25; **9** : 180; **10** : 156, 162, 167, 230, 280, 405, 413; **11** : 153; **12** : 34, 38; **13** : 129; **15** : 117; **16** : 83; **17** : 54, 124, 126, 132, 135, 232, 233, 237; **18** : 121; **19** : 47; **20** : 20, 118, 133.
— paniculata **4** : 200, 201, 228 (mp.); **11** : 153; **12** : 56—60 (fig., mp.), 254; **13** : 171; **17** : 193, 194; **19** : 126, 133—135.
— — × paradoxa **17** : 194.
— — × remota **17** : 194.
— paradoxa **2** : 28; **3** : 53, 83; **4** : 200; **10** : 281; **12** : 33, 38, 57, 58, 134, 172; **13** : 171; **15** : 213; **17** : 135, 193; **19** : 47, 122, 190; **20** : 5, (64).
— pauciflora **2** : 54; **3** : 24; **8** : 205, 263; **14** : 50; **15** : 115; **16** : 83; **17** : 132, 135, 219; **19** : 93, 99, 195; **20** : 35—37, 44, 67, 124.
— pedata **3** : 6, 7, 135; **8** : 262; **14** : 50; **17** : 219, 222; **19** : 195.
— pediformis **1** : 147; **5** : 212; **11** : 133; **15** : 2, 89, 275; **19** : 127.
— Persoonii **3** : 24; **7** : 100; **8** : 205.
— pilosa **11** : 145.
— pilulifera **4** : 86, 90, 201; **5** : 41; **6** : 26, 144, 145; **7** : 270, 275; **8** : 25, 205, 276; **9** : 15; **10** : 280, 406; **15** : 117; **17** : 54; **19** : 61.
— — f. longibracteata **8** : 276; **19** : 61.
— polygama **8** : 262; **10** : 46; **11** : 230, 268; **17** : 34, 38, 135, 219, 222; **19** : 99; **20** : 20.
— — ssp. alpina **12** : 159; **14** : 50; **19** : 195; **20** : 42.
— — ssp. subulata **12** : 135, 159; **14** : 115; **17** : 61; **19** : 47.
— — ssp. — v. confusa **14** : 115.
— — × rigida **17** : 162.
— praecox **1** : 32, 33, 79; **9** : 13, 238; **11** : 150; **12** : 3, 253; **17** : 54.
— pseudocyperus **3** : 33, 49; **4** : 202; **6** : 94; **8** : 276; **10** : 239, 240; **12** : 254; **13** : 34; **15** : 117, 213; **17** : 43, 181; **19** : 122, 123, 126, 129, 190; **20** : 63, 132, 134.
— pulchella **4** : 202; **5** : 30, 41; **7** : 36; **10** : 156, 230; **12** : 38, 110; **13** : 19.
— pulicaris **4** : 200; **9** : 20; **10** : 276, 404, 405, 408, 432; **12** : 33; **17** : 67.
— rariflora **4** : 100; **8** : 261; **15** : 175, 176; **17** : 162, 163; **19** : 47, 195; **20** : 34, 35, 40, 43.
— remota **4** : 201, 228 (mp.); **10** : 280; **12** : 172; **15** : 211; **17** : 50.
— rhomalea **19** : 195.
— rigida **5** : 6; **8** : 262; **10** : 370; **11** : 168, 171; **12** : 123; **14** : 50; **17** : 162, 163, 214 (fig.), 219; **19** : 47, 195; **20** : 30, 35—35, 37, 40, 44, 45.
— — v. longipes **17** : 163, 164.
— *rigida* × *salina* ssp. *cuspidata* v. *borealis* **17** : 161—164.
— riparia **7** : 3; **10** : 378; **12** : 172; **13** : 9—12, 171; **18** : 124; (**20** : 64).

[1] Recte C. norvegica ssp. inserrulata; vide **20** : 29.

Carex rostrata **2**: 41, 54; **4**: 75, 77; **6**: 26; **7**: 100; **8**: 205, 318; **10**: 406; **12**: 56, 136, 140; **13**: 34, 106, 129, 171; **14**: 5, 114, 116; **15**: 104, 109, 118; **16**: 83; **17**: 124, 132, 135, 177; **19**: 93, 94, 99; **20**: 5, 20, 62, 67, 112, 121.
— — f., v. borealis **8**: 261; **14**: 115; **17**: 177; **19**: 48, (328).
— — v. norlandica **17**: 177.
— — v. utriculata **19**: 195; **20**: 39.
— — ssp. rotundata **8**: 261.
— rostrata × rotundata **17**: 177; **19**: 328.
— — v. norlandica × rotundata **17**: 177.
— — × vesicaria **2**: 40; **19**: 328; **20**: 134.
— rotundata **14**: 50; **15**: 274; **17**: 177; **18**: 94; **19**: 328.
— — v. pallida **17**: 177.
— rupestris **8**: 262; **9**: 142; **19**: 195; **20**: 42.
— salina **4**: 100; **6**: 54; **13**: 171; **16**: 71; **17**: 162, 163, 343.
— — ssp. cuspidata v. borealis **17**: 162.
— — ssp. — v. kattegatensis **19**: 61.
— — ssp. — v. — f. haematolepis **17**: 162.
— — ssp. mutica v. flavicans **17**: 162.
— saltaensis **19**: 195; **20**: 39.
— saxatilis **14**: 47, 50; **19**: 195.
— Schreberi **5**: 101; **11**: 119, 147, 150; **15**: 110, 116 (mp.); **20**: 65.
— scirpoidea **19**: 195.
— silesiaca **17**: 193, 194 (fig.).
— silvatica **8**: 233, 375; **12**: 172.
— sparsiflora **3**: 24; **5**: 6; **7**: 100; **8**: 200, 205, 262; **14**: 15; **20**: 105.
— stellulata **4**: 201; **5**: 41; **7**: 100; **8**: 25, 205; **12**: 135; **14**: 114; **15**: 6, 104, 109, 116; **16**: 83; **17**: 66, 124, 132, 135; **18**: 123; **19**: 47, 61, 99; **20**: 55, 62, 67, 116, 118, 119, 128.
— stricta **3**: 24; **5**: 115; **10**: 208, 258, 406; **13**: 105, 106; **17**: 71; (**20**: 64).
— stylosa **19**: 195.
— subspathacea **4**: 100; **19**: 195; **20**: 35.
— tenella **1**: 146; **3**: 24; **7**: 101, 270; **8**: 200, 205; **12**: 58, 67, 68, 71, 134, 172; **13**: 32; **14**: 50, 114; **15**: 31, 116; **17**: 34, 38, 59, 135, 138; **19**: 61; **20**: 67, 112.
— tenuiflora **12**: 134; **14**: 50, 114; **19**: 47, 94, 99, 203; **20**: (64), 84.
— — v. macilenta **1**: 90, 91.
— teretiuscula **2**: 41; **3**: 24; **10**: 239, 240; **12**: 57, 58; **17**: 139, 193.
— tomentosa **12**: 169.
— trisperma **19**: 195; **20**: 36, 40, 43.
— Urbanii **12**: 107.
— vaginata **4**: 90; **8**: 262; **10**: 405; **11**: 163, 171; **12**: 56, 68, 112, 143; **13**: 12; **14**: 50, 117; **15**: 117, 233; **17**: 34, 38, 135, 219; **19**: 93, 99; **20**: 20, 112, 123, 133, 134.
Carex verna **4**: 201; **10**: 32, 230, 274, 276; **11**: 6; **12**: 33, 168; **17**: 9.
— vesicaria **3**: 24; **4**: 87, 202; **5**: 41; **6**: 144; **7**: 100, 270, 271, 275, 276; **8**: 25, 205; **9**: 180; **10**: 406; **12**: 34, 38, 68; **15**: 104, 118; **17**: 124, 135; **18**: 123; **19**: 98; **20**: 20, 67.
— — f. alpigena **14**: 50.
— viridula **15**: 175; **17**: 35, 39; **19**: 89, 90; **20**: 63, 134.
— vitilis **1**: 46.
— vulpina **11**: 122.
— sp. **3**: 41, 43; **4**: 74, 76; **6**: 164; **7**: 195 . . . 226, 254; **9**: 108, 109, 185; **10**: 256—258, 473; **11**: 268; **12**: 132 . . . 141; **13**: 37; **14**: 124; **15**: 111, 115, 117, 206; **16**: 8; **17**: 80, 81, 124, 132, 343; **19**: 26; **20**: 6, 10, 44, 60.
Carlina intermedia **3**: 36.
— vulgaris **4**: 87; **10**: 238, 275—277, 409; **19**: 188; **20**: 76.
— — ssp. longifolia **15**: 136.
Carpinus betulus **6**: 90, 124, 125, 127, 128; **9**: 26; **11**: 138, 145, 148.
Carum carvi **3**: 28; **4**: 216; **5**: 54; **6**: 27, 88; **7**: 112; **8**: 216; **10**: 236; **12**: 35, 42, 113, 168; **15**: 130; **17**: 41; **18**: 121; **19**: 40, (97); **20**: 22, 87.
— — f. atrorubens **8**: 270; **19**: 71.
— — f. roseum **8**: 216.
Cassandra calyculata **19**: 145, 189; **20**: 30.
Cassiope hypnoides **9**: 143; **14**: 52; **17**: 220, 225; **19**: 195.
— tetragona **19**: 195; **20**: 42.
Castanea [**8**: 298, 300].
Castilleja pallida v. septentrionalis **19**: 195; **20**: 33, 39.
Catabrosa aquatica **1**: 93, 156; **4**: 100, 198, 221, 228 (mp.); **8**: 99; **9**: 22; **10**: 172, 173; **17**: 71, 234.
Cattleya Mossiae **15**: 186.
Caucalis **7**: 141.
— daucoides **3**: 129; **7**: 141—142, 320; **9**: 238.
— latifolia **7**: 140—141, 320.
Cenolophium Fischeri **11**: 150.
Centaurea cyanus **3**: 30; **4**: 226; **5**: 61; **7**: 117; **8**: 219; **12**: 35, 44; **13**: 100; **15**: 137; **18**: 121, 122; **19**: 39, 40, 91, 96, 103, 138; **20**: 23, 51, 62, 76, 91, 127—129.
— — f. albiflora **19**: 77.
— decipiens **10**: 65.
— jacea **1**: 37 (cecid.); **2**: 27, 28; **3**: 30, 80, 84; **4**: 226; **5**: 61; **6**: 27; **10**: 164, 168, 238; **12**: 35, 45, 113; **13**: 91, 100; **15**: 137; **17**: 35, 43, 137, 138; **18**: 27, 28, 120, 178, 179, 180; **19**: 27, 40, 103, 112; **20**: 76, 118, 127.
— — var. **8**: 375.
— — ssp. (eu)jacea **20**: 23, 141.

Centaurea jacea × nigra **10** : 65.
— nigra **16** : 12, 13.
— pannonica **11** : 147.
— phrygia **1** : 37 (cecid.); **3** : 30; **4** : 176; **5** : 14, 27; **10** : 277; **15** : 108, 109, 111, 137; **17** : 9, 35, 43, 137, 138; **19** : 77, 145; **20** : 51, 55 . . . 59, 62, 72, 102, 111, 114 . . . 120, 127, 128.
— — ssp. austriaca **20** : 23, 141.
— pratensis **8** : 374.
— scabiosa **4** : 62, 226; **10** : 275; **11** : 151; **12** : 35, 45, 111; **13** : 100; **15** : 111, 137; **18** : 26, 28; **19** : 112, 145; **20** : 23, 76, 114, 127, 128.
— — flor. alb. **18** : 270.
— — ssp. scabiosa **20** : 141.
Centaurium erythraea **2** : 52, 56; **4** : 218—219; **5** : 56; **8** : 21; **10** : 158, 280; **12** : 110; **13** : 14; **15** : 195, 218; **16** : 63; **18** : 27, 28.
— — f. *ammophila* **4** : 219.
— pulchellum **2** : 48 . . . 55; **3** : 39, 135; **4** : 219; **5** : 30, 56; **8** : 21; **10** : 158, 237, 280; **12** : 110; **15** : 218.
— umbellatum **10** : 177.
— vulgare **17** : 199; **19** : 73.
Centaurodendron **7** : 251.
Centunculus minimus **1** : 15; **2** : 24; **3** : 84; **4** : 97; **10** : 50, 158, 172, 279; **11** : 7; **13** : 8; **17** : 54.

Cephalanthera longifolia **5** : 66; **10** : 281, 408, 431; **11** : 52; **12** : 25; **15** : 214, 215.
— rubra **1** : 34; **10** : 277; **19** : 20.
Cerastium alpinum **4** : 100, 107; **6** : 138; **7** : 87, 88; **8** : 240, 266; **10** : 370; **12** : 164; **14** : 51; **17** : 219, 221, 277; **19** : 50, 51, 196, 204; **20** : 31—33, 39, 40, 85.
— — v. glabrum **11** : 166, 168; **17** : 223; **19** : 196; **20** : 31.
— — v. lanatum **17** : 223.
— arvense **2** : 40; **7** : 105, 272; **8** : 200, 211, 278; **9** : 24, 165; **12** : 70; **13** : 33; **15** : 123; **16** : 10, 13; **17** : 27; **18** : 52; **19** : 39, 66, 106, 108, 113.
— caespitosum **2** : 55; **3** : 56—57, 84; **4** : 10, 23, 207; **5** : 45; **6** : 27, 29, 30, 42, 48; **9** : 16; **10** : 157, 162, 167, 232, 413; **11** : 33, 35, 39, 55, 56; **12** : 34, 39, 110, 112; **14** : 51; **15** : 32, 123; **16** : 5; **17** : 124, 136, 219, 221; **18** : 119; **19** : 38, 96, 100, 149; **20** : 21, 39, 51, 63, 70, 85, 117, 118, 136.
— — f. glandulosum **4** : 21; **12** : 145; **20** : 85.
— — v. viscidum **10** : 25.
— — ssp. alpestre **6** : 138; **8** : 266; **14** : 51, 118; **19** : 50, 328; **20** : 21, 85, 136.
— — ssp. triviale **19** : 50, (328).
— — ssp. — f. glandulosum **19** : 66.
— fontanum ssp. scandicum **20** : 21, 85.
— glutinosum **3** : 57, 84; **4** : 21, 22; **5** : 7; **8** : 278; **10** : 32, 274, 276, 281, 408, 427, 429, 431; **11** : 6; **12** : 25; **13** : 7.

Cerastium holosteoides **20** : 21.
— lapponicum **14** : 51; **17** : 219, 223; **19** : 196; **20** : 40.
— Regelii **17** : 277.
— semidecandrum **2** : 16, 28; **3** : 84; **4** : 23, 207; **5** : 45; **7** : 36; **8** : 41; **9** : 16, 22; **10**: 25, 34, 146, 147, 163, 172, 223, 232, 234, 274, 280, 342 . . . 354, 426, 427, 429; **11** : 55—57; **12** : 34, 39, 112, 145, 168; **13** : 7; **17** : 9, 27, 196; **19** : 66.
— tomentosum **1** : 17.
— trigynum **10** : 370.
— triviale **7** : 105; **8** : 211; **11** : 164; **17** : 81.
— vulgare (vulgatum) **1** : 48; **4** : 73; **6** : 148 (cecid.); **10** : 58, 413; **12** : 168; **18** : 66.
— — ssp. triviale **3** : 25.
— sp. **10** : 17.
Ceratophyllum demersum **3** : 26; **4** : 291; **8** : 243; **10** : 289, 474; **12** : 164; **13** : 96, 171; **14** : 109; **15** : 45, 48, 107, 124, 196; **17** : 47; **19** : 104, 123; **20** : 6, 9, 136.
Chaerefolium silvestre **2** : 24; **3** : 72, 84; **4** : 216; **5** : 13, 23, 54; **7** : 47; **10** : 145, 157, 236; **12** : 35, 42, 113; **15** : 217; **18** : 121; **19** : 150; **20** : 3.
Chaerophyllum aureum **3** : 28; **9** : 67—68.
— bulbosum **14** : 171; **15** : 111, 130; **17** : 343.
— — ssp. eu-bulbosum **19** : 71.
— — ssp. Prescottii **19** : 96, 97, 102.
— Prescottii **1** : 25; **11** : 165; **20** : 88.
— silvestre **9** : 24; **10** : 232.
— temulum **9** : 67.
— sp. **11** : 164, 165.
Chamaedaphne calyculata **13** : 36; **15** : 104, 131; **19** : 72, 93, 102, 196; **20** : 22, 25, 36, 37, 44, 50, 60, 62, 73, 123, 124.
Chamaenerium (-rion) angustifolium **3** : 72, 84; **4** : 215; **5** : 13, 23, 54; **6** : 27 . . . 43, 138; **7** : 47, 121 . . . 136; **10** : 236; **11** : 164, 165; **12** : 35, 42, 113; **14** : 52, 115; **15** : 129; **17** : 4, 5, 80, 81, 137, 220—222; **18** : 98, 119, 173, 180, 181; **19** : 30 . . . 34, 39, 40, 93, 102, 138, 150, 196; **20** : 22, 31—33, 57, 63, 72, 128, 129, 146.
— — f. albiflorum (album) **8** : 92; **11** : 160; **12** : 72; **20** : 72.
— — f. rubescens **19** : 71.
— latifolium **19** : 196; **20** : 33, 39.
Chamaepericlymenum canadense **19** : 196.
— suecicum **19** : 196.
Chelidonium majus **2** : 18, 55; **3** : 61, 84; **4** : 87, 209; **5** : 47; **6** : 27; **9** : 165; **10** : 233; **12** : 34, 40, 167; **15** : 124, 233; **17** : 197; **18** : 33, 66; **19** : 67, 105, 108, 113.
Chenopodium album **2** : 55; **3** : 25; **4** : 67, 206; **5** : 45; **6** : 27; **7** : 105; **8** : 17, 210; **10** : 143; **11** : 33, 39, 164, 165; **12** : 34, 39, 112; **15** : 59, 109, 122; **16** : 14; **17** : 81; **18** : 66, 121, 122, 145, 180; **19** : 30, 38—40, 91, 96, 100, 149, 196; **20** : 20, 62, 69, 85, 125, 129.

Chenopodium album v. viride **7** : 105.
— ambrosioides **15** : 62, 66, 274.
— bonus Henricus **2** : 4, 49, 55; **11** : 33; **12** : 34.
— capitatum **12** : 14, 20.
— ficifolium **8** : 17, 375.
— glaucum **2** : 49, 55; **7** : 94, 105; **8** : 78; **9** : 164, 165; **15** : 110, 122; **19** : 65; **20** : 20, 126, 135.
— hircinum **15** : 61.
— hybridum **4** : 174, 206; **5** : 212; **9** : 165; **10** : 142; **12** : 34; **20** : 131, 135.
— leptophyllum **2** : 36, 111, 115; **5** : 212; **6** : 232; **7** : 320; **11** : 116; **15** : 110, 122.
— polyspermum **3** : 25, 56, 84; **9** : 165; **15** : 122; **17** : 9, 81; **18** : 121; **19** : 40, 65, 138; **20** : 69, 125, 132, 135.
— — v. acutifolium **3** : 25; **19** : 65.
— rubrum **4** : 206, 228 (mp.); **14** : 171; **15** : 110, 122; **19** : 65; **20** : 63, 125, 132, 135.
— Sanctae Clarae **7** : 252.
— serotinum **8** : 17, 375.
— striatum **20** : 69.
— urbicum **2** : 4, 49, 55; **19** : 31, (97).
— sp. **9** : 18.
Chillania **9** : 172.
— pusilla **9** : 172.
Chilotrichum diffusum **6** : 63.
Chimaphila umbellata **4** : 175; **11** : 152; **12** : 179; **14** : 171; **17** : 199; **19** : 72.
Chorispora tenella **2** : 36, 115; **4** : 291; **6** : 231; **9** : 164, 165; **19** : 105, 109.
Chrysanthemum corymbosum **19** : 182, 188.
— leucanthemum **2** : 28; **3** : 30, 78, 84; **4** : 87, 225; **5** : 14, 26, 28, 60; **6** : 28, 139, 141; **7** : 118; **8** : 220; **9** : 24; **10** : 164, 168, 238; **11** : 39; **12** : 35, 44, 113; **13** : 16, 33; **15** : 108, 109, 136; **17** : 220; **18** : 120; **19** : 40, 103; **20** : 23, 51, 55, 58, 62, 76, 90, 129.
— parthenium **4** : 225; **13** : 99.
— segetum **15** : 136.
— vulgare **15** : 136; **17** : 48, 81; **18** : 97; **19** : 91, 96, 103, 105, 112, 113; **20** : 23, 76.
— sp. **9** : 19.
Chrysosplenium alternifolium **3** : 27; **4** : 91, 175; **7** : 273; **11** : 159; **12** : 13, 15, 56, 58, 71; **15** : 29, 32, 94, 103, 126; **17** : 59; **18** : 33, 36, 44; **19** : 68, 123, 145; **20** : 54, 71, 105, 106, 111, 113.
— — ssp. octandrum **20** : 137.
— tetrandrum **11** : 159, 169; **14** : 48, 51; **16** : 89; **17** : 220, 224.
Chusquea fernandeziana **7** : 250.
Cichorium intybus **3** : 30; **4** : 226; **9** : 164; **12** : 35; **115** : [109], 111, 137; **19** : (97), 107, 112; **20** : 76, 127, 129, 141.
Cicuta virosa **2** : 41; **3** : 28, 43; **5** : 13, 23, 28; **7** : 112; **8** : 216; **11** : 33, 160; **15** : 130; **17** : 81; **18** : 123; **19** : 102; **20** : 22, 61, 72, 87.
Cicuta virosa v. tenuifolia **20** : 87.
Cinna latifolia **12** : 254; **17** : 50—66 (mp.); **19** : 104.
— pendula **6** : 88; **17** : 51, 181.
Circaea alpina **2** : 63, 115; **3** : 28; **4** : 175, 216, 228 (mp.); **7** : 274; **8** : 280; **10** : 236, 431; **12** : 72, 146; **13** : 171; **14** : 121; **15** : 7, 8, 33, 103, 129; **17** : 34, 66, 198; **19** : 71; **20** : 63, 113, 139.
Cirsium acaule **4** : 225; **12** : 44, 167, 168.
— arvense **1** : 36 (cecid.), 78; **2** : 51, 56; **4** : 10, 87, 89, 225; **5** : 14, 27, 61; **6** : 27; **7** : 133; **8** : 219; **10** : 145, 238, 404, 412; **11** : 34, 39, 117; **12** : 35, 44, 113; **13** : 13; **15** : 109, 137; **17** : 80, 81; **18** : 26, 28, 36, 66, 121, 174; **19** : 39, (97), 103, 150; **20** : 23, 62, 76, 91.
— — v. commune **3** : 30; **7** : 117.
— — v. — f. albiflorum **7** : 117.
— — v. horridum **4** : 69, 226; **5** : 70; **7** : 47, 117; **12** : 44; **15** : 137; **16** : 12, 13, 15.
— — v. — f. albiflorum **7** : 117.
— heterophyllum **1** : 36 (cecid.), 63; **2** : 42; **3** : 30; **4** : 88, 225; **5** : 14, 27, 61; **6** : 27; **7** : 117; **8** : 219; **10** : 409, 425; **11** : 8, 163; **12** : 35; **13** : 10; **14** : 53, 117; **15** : 89, 108, 137, 228; **17** : 81, 132, 137; **18** : 99, 120; **19** : 77, 94, 103; **20** : 23, 55 . . . 58, 63, 76, 111 . . . 121.
— — f., v. albiflorum (album) **8** : 92, 219; **18** : 122.
— — f. integrifolium **19** : 77; **20** : 76.
— — f. pinnatifidum **20** : 76.
— — v. laciniosum **3** : 30; **7** : 117.
— — × palustre **7** : 117; **8** : 219.
— — v. laciniosum × palustre **7** : 117.
— lanceolatum **1** : 17, 37 (cecid.); **2** : 56; **3** : 30; **4** : 10, 87, 89, 225; **5** : 61; **6** : 27; **7** : 47, 117; **8** : 219; **10** : 58, 145, 155, 164, 168, 238, 404, 412; **11** : 34, 39; **12** : 35, 44, 113; **13** : 13, 100; **15** : 137; **16** : 14; **17** : 43, 81; **18** : 26, 27, 28, 121; **19** : 39; **20** : 3, 23, 76.
— oleraceum **6** : 93; **12** : 35, 58, 111; **17** : 71; **19** : 188; **20** : 48, 76, 111, 114, 120, 141.
— palustre **3** : 30; **4** : 87, 225; **5** : 14, 27, 61; **6** : 27, 144; **7** : 117, 130; **8** : 219; **9** : 180; **10** : 238, 406; **11** : 17, 34 . . . 39; **12** : 35; **13** : 12 . . . 16; **15** : 8, 108, 137; **17** : 123, 125, 132, 137, 199; **18** : 98, 120; **19** : 56, 103; **20** : 23, 56, 63, 76, 90, 111 . . . 118.
— — f. album **7** : 117; **19** : 77.
— rivulare **11** : 147.
— vulgare **20** : 23.
— sp. **17** : 222.
Cistus hirsutus **8** : 302, 303.
— — × salviifolius **8** : 302—303.
— obtusifolius **8** : 302.

Cistus salviifolius **8** : 302, 303.
Citrus sp. **15** : 61, 65.
Cladium mariscus **4** : 200; **6** : 90; **11** : 139; **12** : 170, 193; **17** : 145.
— scirpoideum **7** : 250.
Clarkia pulchella **3** : 28.
Claytonia perfoliata **15** : 4.
— sibirica **15** : 4, 5, 122.
Clerodendron Thomsoni **15** : 186.
Clinopodium vulgare **4** : 89; **10** : 58; **12** : 168; **17** : 9; **19** : 189.
Clintonia borealis **19** : 196; **20** : 30, 43.
Cnidium dubium **13** : 87, 88; **15** : 111, 130; **19** : 121, 182, 188.[1]
— venosum **4** : 217.
Cochlearia arctica **19** : 196; **20** : 37.
— armoracia **3** : 26; **7** : 272; **8** : 212.
— danica **2** : 18, 28; **3** : 84, 86; **4** : 23, 174; **7** : 37; **8** : 279; **10** : 163, 241, 280, 281, 429; **12** : 177; **15** : 226; **17** : 197.
— groenlandica **19** : 196; **20** : 32, 33, 39.
— officinalis **7** : 165; **8** : 267; **20** : 31.
— sp. **20** : 31.
Coeloglossum viride **2** : 42; **3** : 24, 34; **4** : 22, 23, 204, 228 (mp.); **7** : 102; **8** : 206, 264; **10** : 275, 408, 431; **12** : 69, 137; **14** : 50, 116; **19** : 48, 63, 146; **20** : 68.
— — f. subalpinum **8** : 264.
Coelogyne Massangeana **15** : 186.
Coleanthus subtilis **10** : 50.
Collinsia bicolor **12** : 254.
Collomia linearis **4** : 290; **7** : 320; **8** : 375; **9** : 164, 165.
Comandra livida **19** : 196; **20** : 33 . . . 41.
Comarum palustre **2** : 41; **3** : 27; **4** : 74—76, 80, 87, 211; **5** : 50; **6** : 27; **7** : 109; **8** : 25, 30, 213, 318; **9** : 180; **10** : 234, 258; **12** : 34, 41, 112, 136; **13** : 31, 32, 34; **14** : 51, 67; **15** : 92, 104, 109, 127; **17** : 123, 125, 132, 137, 220; **18** : 123, 124; **19** : 93, 101, 196; **20** : 22, 56, 62, 71, 118 . . . 124.
Commelina communis **7** : 26, 321; **14** : 171; **19** : 59.
Conioselinum chinense **19** : 196.
— Fischeri **17** : 57.
— tataricum **1** : 25.
Conium maculatum **8** : 280; **12** : 35; **15** : 111, 130; **17** : 9; **19** : 71; **20** : 72, 126, 131, 139.
Conringia orientalis **9** : 165; **20** : 21.
Convallaria majalis **2** : 41, 42, 54, 63; **3** : 24; **4** : 89, 203; **5** : 43, 64; **6** : 4, 26, 88, 111, 139; **7** : 102; **8** : 206, 277; **9** : 24; **10** : 231; **11** : 17, 22—27, 38, 39; **12** : 34, 39, 112, 168; **13** : 9, 10; **14** : 6, 31, 113; **15** : 8, 31, 32, 102, 108, 114; **17** : 183, 184; **18** : 34, 119, [132]; **20** : 19, 50, 54 . . . 59, 63, 66, 98, 102, 106, 112.
— multiflora **2** : 63.
Convallaria polygonatum **2** : 63.
Convolvulus arvensis **4** : 90, 219; **6** : 231; **7** : 274; **9** : 164; **11** : 116; **12** : 3, 35; **15** : 132; **16** : 11, 13; **17** : 71; **18** : 66, 67, 178; **19** : 39—41, (97), 110; **20** : 73.
— sepium **1** : 15; **3** : 29, 35, 38, 135; **4** : 21, 23, 219, 228 (mp.); **5** : 30, 56; **7** : 113; **8** : 196, 217; **9** : 22, 164; **10** : 279; **11** : 147; **12** : 18, 25; **15** : 132; **16** : 14; **17** : 54; **19** : 73, 106, 107, 110.
Coprosma sp. **7** : 249, 252.
Coptis trifolia **19** : 196; **20** : 30 . . . 35, 38, 44.
Corall(i)orrhiza innata **3** : 24; **6** : 26; **7** : 102, 271; **8** : 207, 264; **19** : 146; **20** : 54.
— neottia **4** : 88, 90.
— trifida **4** : 173, 204; **6** : 144; **11** : 157; **12** : 69; **14** : 50; **15** : 120; **16** : 8; **17** : 34, 39; **19** : 63; **20** : 68, 102.
Coriandrum sativum **15** : 111, 130; (**19** : 97).
Corispermum intermedium **8** : 234.
Cornus alba **3** : 28; **6** : 96—99 (fig.); **12** : 254; **15** : 109.
— canadensis **20** : 33—35, 38—40, 43, 44.
— candidissima **6** : 98, 99.
— glabrata **6** : 96, 99.
— sanguinea **4** : 217; **11** : 118, 146, 150; **12** : 168, 169.
— suecica **2** : 48, 55; **4** : 51, 89, 107, 217; **5** : 6, 55; **6** : 27; **7** : 83 (mp.), 112, 196, 274, 275; **8** : 25, 216; **10** : 278, 280; **11** : 163; **12** : 72, 110, 113; **14** : 52; **15** : 130; **17** : 41, 220; **19** : 71, 94, 102; **20** : 30 . . . 35, 38.
— sp. **7** : 258; **9** : 26.
Coronopus didymus **16** : 11, 13.
Correma album **8** : 299.
Corydalis bulbosa **4** : 23, 174; **5** : 47, 65; **6** : 109; **10** : 274.
— cava **8** : 233.
— intermedia **4** : 290; **5**: 212; **10** : 172, 280, 281; **14** : 171; **15** : 274.
— laxa **10** : 428, 429.
— nobilis **3** : 26.
— solida **4** : 86; **7** : 76 (mp.), 80; **8** : 277, 282; **10** : 233, 274, 428, 429; **15** : 125; **17** : 197; **18** : 165; **20** : 65.
— — f. albiflora **19** : 67.
— sp. **11** : 4.
Corylus avellana **1** : 13, 16—20, 37 (cecid.); **2** : [44, 62], 115; **4** : [86, 87], 91, 173, 205; **5** : 43, 64, 65; **6** : 89, 94, [111, 164]; **7** : [28, 32, 38], 271, 276; **8** : [36], 37, 52, 53, [66], 68, 69, 229, 277, [279]; **9** : 26; **10** : [32], 223, 231, 232, 233, 236, [407], 408, [410, 415, 475]; **11** : 7, 16—19, 137, [142], 146 . . . 150; **12** : 6, 34, [38], 39, 112, [144], 168, 172, 173, 187, 188, 192, 193; **13** : 4, 20; **14** : 31, 133; **15** : 32, 120, 214, 230; **17** : 9, 11, 54, 84, 196; **18** : [3], 7, [28, 30], 32 . . . 44, 110, 118,

[1] Per errorem dubiosum.

120, [132], 135 . . . 182; **19** : 127; **20** : 103.
Corylus avellana f. laciniata **1** : 146.
Corynephorus canescens **11** : 147, 150; **12** : 153, 164.
Cotoneaster integerrima **4** : 90, 211; **5** : 50; **7** : 37, 38; **10** : 235, 274, 275, 408, 429; **12** : 34, 41, 168, 169, 187, 188; **15** : 214, 233; **18** : 167, 175, 176, 182; **19** : 70.
— melanocarpa **2** : 51, 55; **10** : 177; **20** : 113, 137.
— nigra **2** : 4, 111; **6** : 139, 142.
— sp. **15** : 109.
Crambe maritima **2** : 18; **3** : 34, 38, 135; **4** : 61, 127, 177, 209, 228 (mp.); **5** : 13, 20, 30, 48; **7** : 41—51 (fig., mp.); **9** : 19, 143—144; **10** : 172, 173, 279, 408; **11** : 53; **12** : 114, 174, 177; **13** : 8; **15** : 51, 83, 84; **18** : 141.
Crataegus calycina **18** : 132.
— coccinea **3** : 27; **7** : 110; **19** : 70.
— curvisepala **3** : 35; **4** : 23, 211; **5** : 29, 50, 65; **7** : 37, 38; **10** : 274—276, 281, 408, 429; **12** : 168, 169, 172; **15** : 214; **18** : 20.
— — f. laciniata **5** : 50.
— monogyna **4** : 21; **5** : 29, 30, 50; **7** : 32, 35; **8** : 77; **10** : 274—276, 281, 408, 431; **15** : 214.
— sanguinea **3** : 27.
— sp. [**2** : 62]; **4** : 21, [86]; **11** : 150; **18** : [127], 152, 162.
Crepis biennis **8** : 19; **15** : 137; **20** : 128, 141.
— mollis **6** : 91.
— multicaulis **12** : 62.
— paludosa **3** : 30; **8** : 221; **10** : 406, 409; **12** : 74, 172; **14** : 113; **15** : 103, 105, 108, 137; **16** : 83; **17** : 34, 59, 123, 126, 132, 137; **19** : 77, 123; **20** : 55 . . . 58, 63, 76, 98, 102, 111, 114, 118 . . . 121, 141.
— praemorsa **1** : 25; **10** : 281, 409; **12** : 169.
— sibirica **1** : 25; **19** : 182, 188.
— taraxacifolia **8** : 19.
— tectorum **2** : 56; **3** : 30; **4** : 26, 85, 226; **6** : 28; **7** : 118; **8** : 221; **10** : 25, 147, 164; **11** : 55, 56; **12** : 3, 35, 45; **15** : 137; **16** : 14, 15; **17** : 220; **19** : 40, 103, 150; **20** : 23, 76, 91, 128.
— — v. segetalis **3** : 30.
Cucubalus baccifer **11** : 118.
Cucumis melo **3** : 30.
— sativus **3** : 30; [**15** : 109].
Cucurbita pepo **3** : 30, 77, 84.
Cuminia sp. **7** : 251.
Cuscuta epilinum **4** : 15; **6** : 231.
— europaea **3** : 72, 84, 128, 129; **4** : 14—16, 219; **8** : 281; **10** : 241; **20** : 73, 139.
— halophyta **4** : 14—16, 23, 24, 177, 290; **9** : 126—127; **10** : 279; **13** : 14.
— sp. **4** : 16.
Cycas circinalis **15** : 186.
Cyclamen sp. **18** : 146.
Cynanchum vincetoxicum **2** : 63; **4** : 16, 23, 62, 87, 89, 143, 144; **5** : 56; **7** : 32, 37; **9** : 14; **10** : 29, 164, 172, 278, 280; **11** : 55, 150; **12** : 18, 21, 164, 165; **13** : 14; **15** : 214; **17** : 199; **18** : 133, 153, 154, 170.
Cynodon dactylon **9** : 238.
Cynoglossum officinale **4** : 219; **10** : 58; **12** : 35; **15** : 223; **18** : 66, 67; **20** : 88.
Cynosurus cristatus **3** : 23; **5** : 212; **6** : 26; **8** : 78; **12** : 13; **19** : 108; **20** : 83.
— echinatus **9** : 238.
Cypripedium calceolus **3** : 34; **10** : 281; **11** : 157; **12** : 134, 137; **13** : 31, 95; **14** : 112, 117; **19** : 47, 49, 55.
— Curtisi **15** : 186.
Cytisus ruthenicus **11** : 145, 150.
— sagittalis **16** : 14.
Dactylis glomerata **2** : 54; **3** : 23; **4** : 86, 198; **5** : 39; **6** : 26, 140; **7** : 99; **8** : 277; **9** : 24; **10** : 58, 162, 167, 229, 413; **11** : 150; **12** : 33, 38, 112; **13** : 98, 100; **15** : 8, 32, 109, 119; **18** : 121, 122; **19** : 31, 100, 105, 149; **20** : 53, 67, 125, 128, 129.
Dahlia coccinea **3** : 30.
— variabilis **3** : 30.
Danthonia collina **7** : 251.
— spicata **19** : 196; **20** : 41.
Daphne mezereum **1** : 13, 44, 153, 156; **3** : 28; **4** : 62, 91, 215; **5** : 54, 64; **6** : 144; **7** : 32, 78, 273, 276; **8** : 36, 200, 216; **9** : 24; **10** : 405, 422—423, 431; **11** : 16, 17, 137, 148, 160; **12** : 17, 22, 71, 139, 146; **14** : 113, 120; **15** : 28, 31, 101, 129, 224; **17** : 34, 41, 181; **18** : 44; **19** : 53, 70, 123, 146; **20** : 22, 72, 99, 107, 111, 113, 138.
Datura metel **12** : 157, 158.
— stramonium **9** : 164; **12** : 157, 158; **19** : 105, 111.
— tatula **12** : 157.
Daucopsis **7** : 141.
Daucus carota **3** : 28; [**15** : 109]; **18** : 26, 27, 28; **19** : 107, 110.
Delphinium ajacis **3** : 26.
— consolida **9** : 165; **12** : 34; **15** : 109, 124; **18** : 67; **19** : 66; **20** : 126, 136.
— elatum **3** : 26.
— formosum **3** : 26.
Dendroseris **7** : 251, 253.
— gigantea **7** : 253.
— litoralis **7** : 252.
— micrantha **7** : 251.
— pruinata **7** : 252.
Dentaria bulbifera **1** : 13; **2** : 62, 115; **3** : 34; **4** : 23, 210, 228 (mp.); **5** : 30, 32, 48, 65; **6** : 109; (**7** : 32); **8** : 195, 233, 277, 279; **10** : 63, 241, 409; **12** : 15, 20, 144, 169, 172; **15** : 7—11 (mp.), 125, (233); **17** : 54; **18** : 119, 120.
— enneaphylla **10** : 63.
— pentaphylla **10** : 63.
— polyphylla **10** : 63.

Deschampsia atropurpurea **12** : 62.
— bottnica **5** : 38; **10** : 181.
— — × caespitosa **17** : 75; **19** : 62.
— caespitosa **4** : 198; **5** : 12, 15, 38; **6** : 26 . . . 42, 48; **7** : 130; **9** : 180; **10** : 167, 229; **11** : 14, 24, 25, 32 . . . 39, 163—165; **12** : 33, 37, 110, 112; **13** : 9 . . . 16; **14** : 49; **15** : 5, 31, 32, 102, 108, 119; **16** : 5; **17** : 71, 124, 135; **18** : 119; **19** : 93, 96, 99, 196; **20** : 20, 53, 55, 67, 111, 112, 117, 119.
— — f. pallida **5** : 38; **19** : 62.
— flexuosa **4** : 198; **5** : 12, 15, 27, 39; **6** : 26, 29, 30, 42, 48; **7** : 125; **9** : 14; **10** : 162; **11** : 22, 26, 27, 144, 148, 152, 163, 164; **12** : (37), 110, 112; **14** : 49; **15** : 14, 31, 32, 100 . . . 108, 119, 205; **17** : 124; **18** : 122; **19** : 96, 99, 196; **20** : 34, 39, 53, 57, 59, 62, 67, 128, 129.
— — f. pallida **17** : 75.
— — v. Legei **19** : 81.
Descurania sophia **12** : 3, 70; **13** : 98; **15** : 125; **19** : 31, 39, 40, 91, 101, 106, 109; **20** : 21, 70, 126, 128.
Dianthus arenarius **6** : 138, 142; **7** : 257, 272; **10** : 233, 277; **11** : 133; **12** : 34; **15** : 275; **19** : 126.
— barbatus **3** : 25.
— carthusianorum **12** : 253.
— caryophyllus **3** : 25.
— deltoides **2** : 51, 55; **3** : 25; **4** : 86, 88, 208; **5** : 13, 19, 46; **7** : 105; **8** : 210; **12** : 34, 112; **15** : 123; **18** : 26, 28; **19** : 144; **20** : 20, 59, 63, 69, 85.
— — f. albiflorus **20** : 69.
— — v. glaucus (**20** : 69).
— polymorphus f. diutinus **13** : 87, 88; **15** : 110, 123.
— superbus **8** : 239, 266; **10** : 370; **12** : 34, 111, 138; **13** : 88; **14** : 118; **17** : 75; **20** : 63, 80, 85, 118, 126, 136.
— — f. pallidus **17** : 75.
Diapensia lapponica **8** : 271; **11** : 168; **14** : 52; **15** : 202; **17** : 220, 225; **19** : 196; **20** : 30 . . . 37, 42, 44, 45.
Dielytra spectabilis **3** : 26.
Digitalis purpurea **16** : 4.
Digraphis arundinacea **19** : 189.
Dioscorea **7** : 189.
Diplotaxis muralis **7** : 272; **16** : 11, 12.
— tenuifolia **4** : 61; **15** : 125.
Draba arabisans **19** : 196; **20** : 42.
— arctica **17** : 25.
— aurea **19** : 196; **20** : 42.
— cinerea **6** : 138; **7** : 86; **10** : 202; **17** : 25.
— crassifolia **19** : 196; **20** : 42.
— dovrensis **17** : 24—25.
— fladnizensis **12** : 64.
— hirta **14** : 32; **17** : 25, 219, 221, 224; **19** : 196; **20** : 42.
— incana **4** : 23, 210; **5** : 49; **7** : 107, 272; **8** : 267; **10** : 146, 172, 196, 234, 278, 280, 409, 417, 431; **11** : 159; **12** : 34, 40, 112; **14** : 51; **16** : 91; **17** : 219, 221, 222, 224; **19** : 51, 67, 196; **20** : 32, 33, 37.
Draba incana f. hebecarpa **19** : 51.
— — f. leiocarpa **19** : 51.
— — v. confusa **19** : 196; **20** : 32.
— — v. gracilis **20** : 86.
— incano-hirta **17** : 25.
— magellanica **17** : 24, 25.
— — ssp. borea **17** : 25; **19** : 51.
— muralis **1** : 14; **2** : 19—20, 28, 62, 116; **3** : 84; **4** : 21, 22, 23, 89, 210; **5** : 13, 20, 30, 49; **6** : 109; **7** : (32), 33, 35, 39; **9** : 22, 23; **10** : 163, 274, 276, 281, 342 . . . 354, 409, 428; **12** : 40, 144, 145, 175; **15** : 214.
— nemorosa **10** : 234, 237; **12** : 33.
— — f. hebecarpa **7** : 320; **19** : 67.
— nivalis **12** : 64; **19** : 196; **20** : 42.
— rupestris **7** : 321; **11** : 159; **14** : 51; **19** : 51.
— verna **3** : 62, 84; **4** : 174, 210; **5** : 13, 20, 27, 49; **7** : 36, 47; **8** : 41, 47, 51; **10** : 17, 25, 26, 34, 147, 163, 234, 274, 426, 427, 429; **12** : 40; **15** : 125; **17** : 28; **18** : 123.
— Wahlenbergii **12** : 64.
— sp. **6** : 232; **20** : 40.
Dracocephalum nutans **6** : 181 (fig.); **8** : 374; **9** : 238.
— parviflorum **4** : 290, 291; **6** : 181—182 (fig.), 231; **9** : 165; **15** : 274.
— Ruyschiana(-num) **6** : 138; **20** : 139.
— thymiflorum **6** : 181; **9** : 164; **12** : 3; **13** : 99, 100; **15** : 111, 133; **19** : 102, 106, 138; **20** : 74, 126, 128, 140.
Drimys Winteri **6** : 64; **7** : 249, 250, 252, 253.
Drosera anglica **4** : 211; **7** : 256; **12** : 113; **13** : 31, 32, 129; **14** : 51; **15** : 126; **17** : 39, 124, 136; **20** : 21.
— — × rotundifolia **7** : 256; **13** : 8; **19** : 68.
— intermedia **2** : 55; **4** : 81, 211; **8** : 42, 276, 279; **10** : 241, 258; **12** : 164.
— longifolia **1** : 60; **3** : 27; **7** : 107; **8** : 212; **10** : 258; **19** : 93, 101, 196; **20** : 5.
— — × rotundifolia **17** : 343.
— rotundifolia **2** : 52, 55; **3** : 27, 62, 84; **4** : 76, 210; **5** : 49; **6** : 27; **7** : 107, 256; **8** : 212, 276; **10** : 241, 258; **12** : 113; **13** : 31; **14** : 51; **15** : 92, 126; **17** : 124, 136, 197; **19** : 3, 93, 101, 196; **20** : 5, 21, 30, 36, 37, 44, 56, 71, 73, 121, 124.
— — f. pallens **8** : 92.
— sp. **7** : 126; **10** : 258; **12** : 174.
Dryas integrifolia **19** : 196; **20** : 32, 33, 42.
— octopetala **1** : 65; **3** : 15, 59, (fig.), 65, 84, 134; **6** : 90; **8** : 268; **9** : 142; **10** : 370; **11** : 166—168; **14** : 52, 65, 66; **15** : 203, 209; **19** : 127, 128.
— — v. lanata **3** : 50, 65.
Dysopsis * hirsuta **7** : 250.
Echinops sphaerocephalus **3** : 36.
Echinospermum deflexum **4** : 107.

Echinospermum lappula **9** : 165.
Echium vulgare **4** : 220; **9** : 164; **12** : 35; **15** : 132; **18** : 66; **19** : 39, 41, 73; **20** : 22, 73, 128, 132, 139.
Elaeagnus argentea **15** : 109.
Elatine alsinastrum **2** : 4; **10** : 277; **19** : 68.
— hydropiper **3** : 28; **7** : 273; **12** : 113; **15** : 107, 126; **18** : 103, 123; **19** : 68, 146; **20** : 61, 71, 137.
— triandra **3** : 28; **7** : 273; **11** : 15; **13** : 96; **15** : 13, 107, 126; **18** : 123; **19** : 67, 146; **20** : 21, 61, 71.
Eleocharis vide Heleocharis.
Elephantella groenlandica **19** : 196; **20** : 38, 40.
Eleusine indica **11** : 115.
— oligostachya **11** : 115.
— tristachya **11** : 115, 116, 268.
Elodea canadensis **5** : 79, 80; **9** : 165; **13** : 35, 171; **13** : 45, 106, 107, 113, 275; **16** : 3; **20** : 61, 66, 133.
Elymus arenarius **1** : 86, 89; **2** : 4, 50 . . . 54; **3** : 8—12, 16, 33, 36; **4** : 68—70, 85, 100, 120, 127, 199; **5** : 40, 78; **7** : 47, 99, 165, 269; **9** : 132, 143, 144; **10** : 403; **11** : 152; **12** : 33, 110, 112, 120—130 (fig., mp.), 153, 154, 173; **13** : 14; **14** : 49; **15** : 14, 83, 110, 120, 195; **16** : 92; **17** : 216, 219, 222; **18** : 97; **19** : 38, 41, 63, 74, 196, 202; **20** : 31, 33 . . . 39, 43, 63.
— — f. ramosus **15** : 52, 274.
— — v. villosus **19** : 196.
— canadensis **12** : 254, 255.
Elyna Bellardii **19** : 196; **20** : 39, 42.
Embothrium coccineum **6** : 64.
Empetrum hermaphroditum **14** : 46, 52, 64, 65, 67, 68, 70; **16** : 74—77; **17** : 213, 214 (fig.), 220, 228; **19** : 196; **20** : 22.
— nigrum **1** : 59, 65, 66, 98; **2** : 50—52, 55; **3** : 9, 11, 12, 28; **4** : 69 . . . 85 (fig.), 100, 121, 217, 220; **5** : 5, 55, 71; **6** : 27, 48; **7** : 40, 111, 125, 195, 210, 211, 214; **8** : 25, 47, 215; **9** : 108, 114, 117, 142; **10** : 158, 371, 406; **11** : 144, 151, 153, 163, 173; **12** : 113, 123, 153, 179, 254; **13** : 129; **14** : 14, 15, 40, 44, 52, 117, 124; **15** : 99, 101, 131, 191, 225; **16** : 74—77; **19** : 49, 50, 93, 102; **20** : 22, 50, 57, 73.
— rubrum **7** : 255.
— sp. **16** : 95; **20** : 31 . . . 45, 105.
Epilobium adenocaulon **1** : 14, 42, 156; **4** : 10—11; **9** : 16; **12** : 65, 72, 254; **15** : 105, 106, 110, 111, 116, (mp.), 129; **17** : 66—68, 123, 124, 125, 137; **19** : 28—36, 43—44, 138; **20** : 73, 113, 120, 126 . . . 132, 138, 145—147.
— — ssp. rubescens **15** : 105, 116 (mp.), 129; **17** : 66—68, 123, 125.
— — × palustre **19** : 31.
— alpinum v. albineum **13** : 130.
Epilobium alsinifolium **7** : 320; **11** : 157; **12** : 140.
— anagallidifolium **8** : 270; **14** : 52; **15** : 86; **17** : 220, 225; **19** : 196; **20** : 32.
— angustifolium **2** : 42, 51, 55; **3** : 28; **4** : 26, 127; **7** : 47, 111; **8** : 216; **9** : 238; **11** : 24, 26, 33; **13** : 12, 15—17; **14** : 6, 7; **17** : 183, 184; **20** : 87.
— — f. albiflorum **7** : 112, 320; **8** : 216, 270; **19** : 146.
— — f. roseum **8** : 216.
— collinum **4** : 10; **5** : 13, 23, 28, 30, 54; **6** : 138; **7** : 36, 37; **9** : 23; **10** : 280, 426—428; **12** : 42; **13** : 33; **15** : 111, 129; **17** : 10, 41, 67, 81; **19** : 31, 40; **20** : 72, 87, 113, 128, 146.
— — v. albiflos (albiflorum) **10** : 34; **13** : 109.
— — v. *lactiflos* **9** : 22, 23.
— davuricum (dahuricum) **2** : 111; **12** : 140; **14** : 52, 117, 120.
— hirsutum **1** : 15; **3** : 128; **4** : 291; **6** : 93; **12** : 35, 254; **15** : 129; **17** : 124, 125.
— Hornemannii **11** : 159; **12** : 140; **13** : 130; **14** : 52, 118, 120; **19** : 53, 196; **20** : 40, 45.
— — × lactiflorum **3** : 15, 134.
— — × palustre **12** : 140; **14** : 120; **19** : 53.
— hypericifolium **7** : 2.
— lactiflorum **11** : 169; **13** : 129, 130; **19** : 196.
— Lamyi **1** : 15; **3** : 129; **4** : 97; **19** : 36—37.
— montanum **2** : 55; **3** : 28; **4** : 215; **5** : 54; **6** : 27; **7** : 2, 37, 128, 132; **8** : 194; **10** : 274, 409, 428, 429, 431; **12** : 35, 42, 71, 72, 113; **13** : 91; **15** : 129; **16** : 5; **17** : 67, 81, 125; **18** : 33, 119; **19** : 30, 43, (97), 150; **20** : 22, 63, 72, 87, 111, 113, 128.
— — v. collinum **3** : 28.
— — × palustre **5** : 76, 212; **10** : 474.
— montanum × parviflorum **8** : 194, 374.
— — × rubescens **19** : 43.
— obscurum **10** : 277; **15** : 129.
— origanifolium v. Hornemanni **8** : 270.
— palustre **2** : 28, 41, 55; **3** : 28; **4** : 10, 96, 97, 215; **5** : 13, 23, 28, 54; **6** : 27; **7** : 112, 121, 128, 130, 133, 136; **8** : 216, 270; **11** : 15, 35, 37, 39, 164; **12** : 42, 110, 113; **13** : 129; **14** : 52; **15** : 129; **17** : 80, 81, 123, 125, 137, 220; **18** : 123; **19** : 31, 32, 40, 102, 138, 196; **20** : 22, 32, 39, 56, 63, 72, 113, 120, 121.
— — f. albiflorum **12** : 140; **19** : 146.
— — f. angustum **14** : 120; **20** : 72.
— — v. lapponicum **20** : 72.
— parviflorum **1** : 15; **8** : 194; **12** : 172.
— roseum **3** : 35; **4** : 215; **15** : 105, 129; **17** : 123, 125; **19** : 32, 71.
— rubescens **1** : 15, 41—42, 147, 156; **4** : 11; **5** : 212; **15** : 274; **16** : 10; **19** : 28—36, 40, 43—44; **20** : 87, 131, 138, 145—147.

Epilobium sp. **11** : 169.
Epipactis atrorubens **1** : 25.
— latifolia **3** : 24.
— palustris **1** : 32, 33, 79; **10** : 404, 406, 408; **19** : 188; **20** : 20.
— rubiginosa **11** : 153; **12** : 179.
Epipogium (-gon) aphyllum (-us) **3** : 24; **10** : 277; **13** : 31.
Eragrostis minor **13** : 87, 88; **15** : 110, 118.
Erica arborea **8** : 299.
— tetralix **11** : 139, 143; **16** : 84.
— sp. **8** : 299.
Erigeron acris (acer) **2** : 56; **7** : 117; **8** : 219; **10** : 238; **12** : 168; **14** : 126; **15** : 135; **19** : 55, 98, 103, 144; **20** : 75, 76, 89, 90.
— — ssp. elongatus **12** : 141; **19** : 55.
— — ssp. typicus **20** : 23.
— annuus **14** : 172; **15** : 274.
— *brachycephalus* **14** : 127; **15** : 135; **20** : 75.
— canadensis **15** : 111, 135; **19** : 39, 41, 76.
— *decoloratus* **14** : 127.
— droebachiensis **14** : 126.
— eriocephalus **17** : 192.
— fruticosus **7** : 251.
— politus **20** : 88, 89.
— rupicola **7** : 252.
— unalaschkensis **17** : 192; **19** : 196; **20** : 42.
— uniflorus **17** : 192.
— sp. **7** : 253.
Eriocaulon septangulare **19** : 196; **20** : 43.
Eriophorum alpinum **3** : 24; **7** : 99; **8** : 261; **10** : 258.
— angustifolium **4** : 80—82; **19** : 196; **20** : 19, 41, 44.
— Chamissonis **8** : 261; **19** : 197; **20** : 30, 35, 40, 41.
— gracile **7** : 269; **11** : 156; **12** : 67; **15** : 115; **17** : 35, 38, 135; **19** : 60, 99; (**20** : 64).
— intercedens **8** : 261; **10** : 61; **11** : 156; **12** : 133; **20** : 16.
— — f. medium **12** : 133.
— — f. rufescens **12** : 133; **19** : 46.
— latifolium **4** : 200; **10** : 406; **11** : 156; **12** : 58; **13** : 129; **15** : 31, 115; **16** : 83; **17** : 34, 38, 132, 135, 138, 139; **20** : 55, 57, 67, 68, 116 . . . 122, 133.
— medium **8** : 261; **10** : 61; **11** : 156; **20** : 16.
— — f. candidum **20** : 16.
— opacum **13** : 95; **14** : 114; **19** : 46.
— polystachyum **2** : 52, 54; **3** : 24; **4** : 199; **5** : 40; **6** : 26; **7** : 99, 127, 134; **8** : 25, 204; **9** : 180; **10** : 230, 406; **11** : 172; **12** : 33, 38, 112; **14** : 49; **15** : 115; **16** : 63; **17** : 124, 135; **18** : 121; **19** : 99, 197; **20** : 67.
— rufescens **10** : 61.
— russeolum **8** : 261; **12** : 133; **14** : 49, 114; **20** : 16.
— — × Scheuchzeri **10** : 61; **11** : 156.
— Scheuchzeri **8** : 261; **11** : 156; **12** : 133; **14** : 114; **19** : 46, 99, 197; **20** : 16, 34, 35, 37.
Eriophorum spissum **19** : 197; **20** : 38.
— trichophorum **15** : 31.
— vaginatum **1** : 59; **3** : 24; **4** : 200; **5** : 40; **7** : 64, 99; **8** : 204; **11** : 142, 163, 164; **12** : 112; **14** : 14, 49; **15** : 92, 104, 115; **17** : 124, 135; **19** : 3, 93, 99, 189; **20** : 19, 44, 45, 60, 67.
— sp. **7** : 195, 208, 225, 226; **9** : 108, 109; **10** : 257, 258; **20** : 25, 43.
Erodium cicutarium **2** : 28; **9** : 165; **11** : 54; **12** : 113; **15** : 131; **19** : 40, 41, 72, 91, 102, 110; **20** : 22, 73, 126, 139.
— — f. maculatum **20** : 73.
Erophila verna **3** : 26; **11** : 56; **17** : 27; **20** : 21.
Erucastrum Pollichii **4** : 290, 291; **6** : 232; **9** : 164, 165; **15** : 59; **19** : 104.
Ervum lens **19** : 146.
— tetraspermum **12** : 175.
Eryngium **7** : 251.
— maritimum **3** : 35; **4** : 216, 228 (mp.); **11** : 152; **12** : 153, 164; **15** : 84.
— planum **11** : 268; **19** : 305.
— sarcophyllum **7** : 252.
Erysimum cheiranthoides **2** : 40; **3** : 26; **4** : 210; **5** : 13, 21, 49; **6** : 27; **7** : 107; **8** : 212; **11** : 34, 164, 165; **12** : 34, 112; **15** : 109, 110, 126; **17** : 81; **18** : 27, 28, 66, 121; **19** : 31, 91, 96, 101, 149; **20** : 21, 62, 71, 86, 126, 129.
— hieraciifolium **2** : 20, 63; **3** : 84; **4** : 23, 61, 107, 210; **5** : 49; **7** : 272; **8** : 267; **10** : 234, 409; **11** : 164, 165; **12** : 34, 40, 174, 175; **15** : 110, 126; **17** : 75, 219, 221; **18** : 66; **19** : 31, 67.
— sp. **11** : 165.
Erythraea litoralis **2** : 63; **4** : 27, 81, 87; **7** : 274, 275; **15** : 195.
— pulchella **2** : 62, 63; **4** : 87, 89; **8** : 280.
Escallonia Callcottiae **7** : 251.
— serrata **6** : 63.
Eschscholtzia californica **19** : 67.
Eu-Caucalis **7** : 141.
Eupatorium cannabinum **4** : 23, 24; **5** : 212; **9** : 177; **10** : 409; **12** : 35.
Euphorbia cyparissias **3** : 28; **7** : 111; **8** : 201, 215; **19** : 71.
— esula **1** : 147; **3** : 35; **7** : 273; **9** : 179; **12** : 65, 72; **13** : 99; **15** : 111, 130; **18** : 66, 67; **19** : 71.
— helioscopia **4** : 175; **7** : 82, 273; **9** : 164; **12** : 16, 20, 21, 35; **15** : 130; **18** : 27, 28.
— humifusa v. glabra **11** : 116.
— palustris **10** : 177; **12** : 16, 20, 22, 42; **17** : 54.
— paralias **12** : 154.
— peplus **8** : 280; **16** : 11, 13; **19** : 39, 104.
— virgata **9** : 24; **12** : 35; **15** : 109, 111, 130; **17** : 41.
— sp. **9** : 139.

Euphrasia arctica **19** : 197; **20** : 32.
— borealis **18** : 113.
— — v. pubescens **18** : 113.
— bottnica **5** : 78; **7** : 125.
— brevipila **2** : 56; **3** : 29; **4** : 221; **6** : 27; **7** : 115; **8** : 218; **12** : 35, 43; **15** : 134; **19** : 54; **20** : 74, 89.
— — ssp. eu-brevipila **20** : 23.
— — ssp. tenuis **4** : 221; **5** : 31, 58; **8** : 218; **19** : 54.
— curta **3** : 29; **5** : 31, 58; **10** : 164; **12** : 35, 113; **13** : 91; **15** : 134; **17** : 75.
— — f. glabrescens **15** : 134; **20** : 74.
— — f. imbricata **3** : 29.
— formosissima **7** : 253.
— frigida **19** : 114, 115; **20** : 88, 89.
— — f. eglandulosa **19** : 114.
— — v. palustris **19** : 115.
— — v. *purpurea* **19** : 114—115.
— gracilis **10** : 281; **19** : 74.
— hebecalyx **17** : 76.
— hirtella **20** : 74.
— — f., v. fennica **3** : 29; **19** : 74.
— lapponica **10** : 382.
— latifolia **8** : 272; **10** : 279; **12** : 140; **14** : 53, 121; **18** : 113; **19** : 74.
— minima **12** : 140; **14** : 47, 53; **19** : 114, 115.
— Oakesii **19** : 197; **20** : 31.
— officinalis **7** : 115; **18** : 118, 120; **19** : 102.
— Rostkowiana **18** : 113.
— salisburgensis **10** : 382.
— stricta **18** : 113.
— tenuis **7** : 36, 37; **8** : 281; **10** : 158, (237), 274, 426—428; **20** : 89.
— sp. **5** : 30; **6** : 84; **10** : 138, 237; **11** : 268; **20** : 120.
Evonymus europaea **8** : 234; **11** : 118, 146, 150.
— verrucosa **8** : 235; **11** : 146, 148; **12** : 165.
Fagara externa **7** : 252.
— mayu **7** : 250.
Fagopyrum esculentum [**15** : 109].
— sagittatum **15** : 122; **19** : (97), 107, 108.
— tataricum **12** : 114; **19** : 105, 108.
Fagus silvatica **11** : [48], 137, 138, [183 . . . 187].
— sp. **6** : 127, 128.
Festuca arenaria **4** : 74, 80, 81, 84.
— arundinacea **4** : 87, 199; **5** : 40; **9** : 178; **10** : 156, 180; **12** : 33, 38; **15** : 217; **19** : 63; **20** : 3.
— brachyphylla **19** : 197; **20** : 34, 41.
— elatior **3** : 23; **7** : 94, 99; **8** : 204; **15** : 109; **19** : 33; **20** : 83.
— — f. pseudololiacea **3** : 23; **19** : 146.
— gigantea **5** : 97—103, 212; **11** : 119; **12** : 33, 38; **15** : 33; **17** : 50.
— — f. triflora **5** : 99.
— ovina **1** : 17; **3** : 12, 23; **4** : 199; **5** : 12, 16, 40; **6** : 26 . . . 42, 93, 109, 139, 147; **7** : 40, 99; **8** : 25, 204; **9** : 126, 177; **10** : 25, 34, 146, 162, 167, 229; **11** : 55, 56, 163, 164, 171, 231; **12** : 33, 38, 112, 168, 173, 179; **13** : 17; **14** : 15, 49; **15** : 5, 119; **17** : 25, 162; **18** : 42, 119; **19** : 141, 144. (150); **20** : 53, 59, 68, 88, 117—119.
Festuca polesica **3** : 33; **4** : 199; **7** : 34, 40—41; **9** : 20, 22; **10** : 172, 173, 177, 279; **11** : 147, 151, 153; **12** : 110, 173; **15** : 119.
— pratensis **2** : 54; **3** : 52, 83; **4** : 199; **5** : 40; **6** : 26; **10** : 142; **11** : 117, 150; **12** : 33, 38; **15** : 119; **17** : 196; **18** : 121; **19** : 38—40, 138, 149; **20** : 68, 125, 129.
— rubra **1** : 33, 48; **2** : 50, 54; **3** : 10—12, 23; **4** : 27, 70, 71, 100, 127, 199; **5** : 40; **6** : 26, 48; **7** : 99, 121, 130; **8** : 21, 22, 45, 204; **10** : 25, 58, 146, 156, 162, 167, 223, 413; **11** : 21, 22, 25, 33 . . . 39, 150, 164; **12** : 33, 38, 112; **13** : 4, 10, 13, 14; **14** : 121; **15** : 5, 14, 31, 32, 108, 119, 191, 217, 226; **16** : 8, 58, 63; **17** : 82, 124, 136, 217, 219, 222; **18** : 97, 119; **19** : 38, 100, 197; **20** : 3, 20, 31, 33, 37, 39, 55, 68, 118, 119, 122, 128.
— — f. megastachys **4** : 199.
— — f., v., ssp. arenaria **2** : 50, 52, 54; **3** : 8—10; **4** : 100, 199; **7** : 99; **10** : 403; **12** : 153, 173, 175; **15** : 119; **17** : 196; **19** : 63.
— — f. vivipara **11** : 268; **13** : 171; **19** : 63.
— — v. fallax **8** : 201, 204.
— — ssp. oelandica **19** : 141.
— sabulosa **1** : 12, 35, 89, 149; **2** : 48, 52, 54; **3** : 8, 9 (cecid.), 11; **4** : 69, 85; **17** : 4.
— silvatica **12** : 33.
— vivipara **19** : 197; **20** : 30, 31, 40.
— sp. **4** : 121, 127; **10** : 26; **14** : 124; **18** : 133, 135.
Ficaria verna **12** : 167.
Ficus carica **14** : 126.
Filago arvensis **12** : 65, 73; **15** : 135; **19** : 39—41, 76, 106, 111; **20** : 128, 140.
— montana **4** : 224; **5** : 60; **8** : 282; **12** : 19, 20; **16** : 14, 15; **20** : 75.
Filipendula hexapetala **2** : 28; **3** : 65—66, 84; **4** : 23, 86, 212; **5** : 51; **6** : 4, 109, 110; **7** : 32, 33; **8** : 279; **10** : 34, 146, 163, 167, 235; **11** : 150; **12** : 34, 41, 167, 168, 254; **15** : 214; **17** : 10, 73, 198, 200; **18** : 26, 27, 28, 133, 135; **19** : 69.
— ulmaria **1** : 33, 48; **2** : 43; **4** : 86, 212; **5** : 13, 22, 28, 51; **6** : 4, 27, 145; **7** : 121, 133, 134, 136; **8** : 22, 30; **9** : 176, 177; **10** : 58, 98, 157, 167, 232, 235, 236, 406, 413; **12** : 34, 41, 112, 136; **14** : 52, 115; **15** : 29, 32, 103, 105, 108, 128, 217; **17** : 51, 59, 71, 123, 125, 126, 132, 137, 220; **18** : 26, 28, 98, 119; **19** : 47, 49, 93, 101, 123; **20** : 3, 22, 54 . . . 57, 63, 72, 111, 113, 118 . . . 122.
— — f. denudata **14** : 120.
Fluminia arundinacea **3** : 23; (**20** : 64).

Fragaria chiloënsis × virginiana **10** : 66.
— grandiflora **10** : 66.
— moschata **3** : 27; **7** : 258; **15** : [109], 110, 127; [**19** : 27].
— vesca **1** : 17; **2** : 41, 42, 51, 55, 116; **3** : 27; **4** : 86, 176, 211; **5** : 50; **6** : 4, 27 . . . 43, 48, 112, 138; **7** : 109; **8** : 29, 213; **10** : 58, 163, 234, 406; **11** : 17, 22, 23, 25, 33, 39, 157; **12** : 34, 41, 112, 156, 168; **13** : 17; **14** : 119; **15** : 8, 31, 32, 92, 102 . . . 108, 127; **17** : 80, 82, 125; **18** : 27, 28, 33, 42, 43, 99, 119, 175; **19** : 52; **20** : 3, 22, 50, 54, 57, 59, 71, 86, 101, 107, 113.
— — f. leucocarpa **19** : 146.
— — f. rosea **8** : 93.
— — × viridis **12** : 41, 114; **15** : 230.
— viridis **2** : 62, 116; **4** : 21, 22, 211; **6** : 109; **7** : 33; **9** : 22; **10** : 34, 199, 234, 275, 276, 281, 409; **12** : 16, 20, 21, 34, 41, 111, 112, 167, 168; **13** : 6.
— sp. **12** : 179.
Fraxinus excelsior **1** : 146; **2** : [62], 63; **3** : 38, 135; **4** : 21, 23, 61, 86, 218; **5** : 56, [95], 129, 131 (cecid.); **6** : 124—128; **7** : [32], 37, 39, 321; **8** : 36, 46, 53, 69, 71, 73, 75, 280; **9** : 23; **10** : 161, 223, 237, 284, 387, 406; **11** : 102, 103, 137, [142], 146, 150, 192—194; **12** : [8, 10], 35, 43, 144, 167, 172, 186, [188—190]; **14** : 31; **15** : [109], 131, 214, 216, 222, 230; **17** : 54, 59, 63, 86, 181, [195], 199; **18** : [44, 78, 80, 81], 109, 110, 111, [130, 132], 135, 140, [164, 167, 171], 175, 180, 181; **20** : 159—161, 165—167.
Fritillaria meleagris **1** : 34, 79—81, 156; **4** : 89; **10** : 280, 408; **15** : 229.
Fuchsia magellanica **6** : 62, 63.
Fumaria officinalis **3** : 26; **4** : 209; **7** : 107; **8** : 211; **12** : 40, 112; **15** : 124; **18** : 27, 28, 121; **19** : 95, 98, 101, 146; **20** : 21, 70, 86, 126.
— Vaillantii **4** : 291; **12** : 30.
Funckia sp. **15** : 110.
Gagea lutea **7** : 257; **8** : 276; **10** : 231, 275; **12** : 13; **15** : 114; **17** : 54; **18** : 120, 122; **19** : 59.
— minima **3** : 24; **4** : 90; **6** : 139; **10** : 231, 275; **12** : 244; **15** : 114; **19** : 146; **20** : 19, 65, 106.
— silvatica **8** : 233.
— sp. **11** : 4.
Galeobdolon luteum **4** : 31; **6** : 94; **8** : 233; **11** : 144, 146; **17** : 59.
Galeopsis bifida **1** : 33; **2** : 28, 56; **3** : 29; **4** : 220, 228 (mp.); **5** : 13, 24, 57; **6** : 27 . . . 43; **7** : 47, 114, 122, 133, 135—137; **8** : 218; **10** :404; **11** : 21, 24, 26, 31, 34, 37, 39, 164, 165; **12** : 43, 113; **13** : 13, 15, 16; **14** : 7; **15** : 109, 133; **18** : 33, 121; **19** : 39, 96, 102, (150); **20** : 74, 88.
Galeopsis ladanum **8** : 195; **9** : 165; **12** : 43; **15** : 111, 133; **17** : 71; **19** : 40, 41, 74, 91, 102, 106, 111, 138; **20** : 23, 128, 129, 139.
— pubescens **10** : 37, 38, 65.
— speciosa **3** : 29; **5** : 13, 24, 57; **6** : 27; **7** : 114, 130; **8** : 218; **10** : 37, 65; **11** : 39; **12** : 35, 43; **15** : 109, 133; **18** : 121; **19** : 31, 39, 91, 96, 102, (150); **20** : 23, 63, 74, 88, 126, 129.
— — f. alba **7** : 114.
— — f. monstrosa **12** : 254.
— — v. sulphurea **17** : 10.
— tetrahit **4** : 220; **6** : 36, 43; **7** : 137; **10** : 37, 38, 65; **12** : 35, 43, 113; **13** : 6; **15** : 109, 133; **17** : 10; **18** : 27, 28, 34, 66; **19** : 74, 146, 197; **20** : 23, 63, 88, 129.
— — × bifida **19** : 74.
Galinsoga parviflora **5** : 212; **12** : 254; **17** : 343.
Galium aparine **3** : 76, 84; **4** : 222; **5** : 59; **7** : 32; **8** : 375; **10** : 58, 276, 280; **12** : 35, 44, 175; **19** : 75, 104, 105.
— boreale **1** : 48; **2** : 56; **3** : 29; **4** : 87, 222; **5** : 59, 129 (cecid.); **6** : 4, 93, 138; **7** : 115; **8** : 218; **10** : 34, 168, 238; **11** : 150; **12** : 35, 44, 73, 113, 168; **13** : 10, 11; **15** : 33, 89, 102, 134; **16** : 8; **17** : 137; **18** : 33, 34, 120; **19** : 127; **20** : 23, 75, 89, 99, 114, 117, 118.
— labradoricum **19** : 197.
— mollugo **3** : 76—77 (fig.), 84; **4** : 91, 222; **5** : 14, 26; **6** : 138; **8** : 218; **9** : 24; **10** : 142, 238; **11** : 117; **12** : 35, 44; 65, 73, 167; **13** : 99, 100; **15** : 8, 135; **17** : 199; **18** : 66, 67, 121; **19** : 39, 40, 75, 95, 98, 103, 105, 111, 113, 146, (150); **20** : 23, 75, 89, 99, 111 . . . 117, 140.
— — v. elatum **3** : 29.[1]
— — v., ssp. erectum **3** : 29;[1] **19** : 75.
— — ssp. mollugo **19** : 75.
— — × verum **4** : 222; **12** : 35, 44; **15** : 135.
— palustre **1** : 17; **2** : 51, 56; **3** : 29, 86—87; **4** : 10, 67, 69, 76, 85, 87, 127, 222; **5** : 14, 26, 59, 115; **6** : 27, 145; **7** : 115, 122, 133, 134, 136; **8** : 21, 22, 25, 30, 218; **9** : 180; **10** : 158, 238, 404; **12** : 35, 44, 110, 113, 172; **13** : 12, 13, 31; **15** : 105, 109, 134; **16** : 58, 63; **17** : 81, 123, 125, 126, 137; **18** : 26, 28, 120; **19** : 98; **20** : 3, 28, 55, 63, 75, 114, 118, 120, 121.
— saxatile **10** : 277; **11** : 119, 268; **15** : 5—7, 134; **16** : 84; **17** : 145.
— spurium **7** : 320; **19** : 31, 39—41, 96, 103; **20** : 75, 127—129.
— — v. echinospermum **15** : 134; **20** : 140.
— trifidum **3** : 29; **8** : 218; **9** : 180; **11** : 8, 30 . . . 34; **12** : 73, 141; **15** : 134; **17** : 42, 76, 81, 125; **19** : 75, 197; **20** : 23, 31, 75, 89.

[1] Per errorem molle.

Galium triflorum **3**:128; **4**:176; **8**:200, 218; **10**: 97, 98, 277; **11**: 157, 161; **12**: 73, 141; **13**: 32; **14**: 122; **17**: 34, 42, 57, 63, 66, 181.
— uliginosum **1**: 36 (cecid.), 48; **3**: 29; **4**: 222; **5**: 14, 26, 59; **7**: 116; **8**: 218; **9**: 180; **10**: 158; **11**: 35, 37—39, 163, 164; **12**: 35, 44; **13**: 16, 33; **14**: 53; **15**: 7, 134; **17**: 66, 125, 137; **18**: 120; **19**: 103; **20**: 3, 23, 56, 75, 114.
— Vaillantii **3**: 29; **4**: 222; **5**: 59; **6**: 27; **8**: 218; **12**: 44, 113; **16**: 12, 13; **17**: 10; **18**: 66, 121, 122; **20**: 89.
— verum **2**: 52, 53, 56; **3**: 29; **4**: 16, 87, 222; **5**: 59; **6**: 4, 138; **7**: 47, 116; **9**: 126; **10**: 25, 34, 158, 164, 168, 238; **11**: 117, 150; **12**: 35, 44, 113, 168, 175; **13**: 4, 14; **15**: 135; **17**: 42; **18**: 26, 28, 42, 121, 135; **19**: 39, 106, 111; **20**: 3, 75.
— — f. albidum **15**: 135.
— sp. **5**: 130 (cecid.); **9**: 19.

Garrya elliptica **6**: 98—99 (fig.).
Genista tinctoria **11**: 139.
— (Genistella) sagittalis **7**: 321; **10**: 474; **16**: 14.

Gentiana amarella **19**: 189; **20**: 22, (64).
— — ssp. lingulata **10**: 237; **20**: 88, 139.
— axillaris **1**: 147.
— campestris **4**: 91.
— — v., ssp. germanica **3**: 29, 129; **8**: 217; **17**: 10; **19**: 72.
— — ssp. suecica **3**: 29; **19**: 72.
— — ssp. — × lingulata **1**: 147.
— centaurium **16**: 68.
— cruciata **12**: 168.
— germanica **10**: 277.
— lingulata **4**: 219; **5**: 31, 56; **7**: 37.
— nivalis **8**: 271; **14**: 121; **19**: 197; **20**: 42, 88.
— pneumonanthe **14**: 171.
— serrata **5**: 212; **8**: 271; **10**: 370; **12**: 254.
— suecica **10**: 179, 274, 275, 409, 423—424, 431; **12**: 18, 20.
— tenella **20**: 88.
— uliginosa **5**: 30, 56; **8**: 97, 374; **10**: 274, 275, 409.

Geranium bohemicum **3**: 28, 39, 135; **7**: 137; **9**: 165; **12**: 146; **18**: 98—101; **19**: 146; **20**: (64), 126, 139.
— columbinum **3**: 129; **10**: 281; **11**: 147.
— dissectum **10**: 179, 281, 409; **18**: 25, 26; **19**: 72.
— divaricatum **7**: 321.
— lucidum **4**: 21, 22, 23, 89; **5**: 30, 52; **6**: 109; **7**: 32, 36, 37, 39; **8**: 44; **10**: 163, 274, 276, 278, 281, 409, 426—428, 431; **11**: 6, 55, 102; **12**: 145, 164, 175; **15**: 93, 214, 215; **19**: 72.
— molle **7**: 87; **10**: 154, 275, 276, 281, 409.
— palustre **1**: 55; **12**: 35; **15**: 130; **17**: 137, 138; **20**: 73.
Geranium pratense **1**: 52—56, 61, 156; **4**: 61, 91; **5**: 66; **10**: 279; **11**: 150; **15**: 131; **12**: 112; **17**: 54; **19**: 72, 96, 102, 146, 197; **20**: 22, 43, 139.
— pusillum **4**: 86, 87, 214; **5**: 30, 52; **10**: 163; **12**: 146; **15**: 131; **18**: 25, 26; **20**: 63.
— pyrenaicum **19**: 72.
— Robertianum **2**: 55; **3**: 28, 71, 84; **4**: 10, 86, 214; **5**: 8, 52, 65; **6**: 27 . . . 43; **10**: 58, 403; **12**: 16, 22, 35, 42, 65, 72, 146, 175; **15**: 33; **17**: 10, 198; **18**: 26, 27, 28, 33, 42, 116, 123; **19**: 72, 104, 146.
— rotundifolium **17**: 343.
— sanguineum **2**: 62, 63; **3**: 39; **4**: 21, 62, 87, 89, 214; **5**: 52; **6**: 88; **7**: 32, 33; **8**: 258; **10**: 278, 280; **12**: 16, 21, 42, 146, 167—169, 179; **15**: 214; **18**: 27, 133, 135, 150, 155.
— silvaticum **1**: 53; **2**: 23, 41, 42; **3**: 28, 71, 84; **4**: 86, 214; **5**: 13, 22, 52, 65, 114, 116; **6**: 4; **7**: (32), 33, 111, 196, 226, 227, 231; **8**: 87, 215, 258 (cecid.); **9**: 24, 110, 111; **10**: 58, 168, 406; **11**: 17, 19, 121, 163, 164; **12**: 35, 112, 146; **13**: 11, 33; **14**: 7, 52, 64, 67, 112; **15**: 32, 89, 102, 108, 130, 203; **17**: 137, 220; **18**: 27, 28, 34, 98, 119; **19**: 49, 57, 102, 123; **20**: 3, 22, 50, 53, 54, 63, 73, 99, 100, 102, 107, 113, 116, 117, 122.
— — f. albiflorum (album) **8**: 92, 93; **12**: 140; **14**: 121; **17**: 76.
— — f. lilacinum **14**: 121.
— — f. parviflorum **3**: 28; **7**: 111; **8**: 215; **19**: 72.
— sp. **11**: 156; **18**: 142.

Geum aleppicum **13**: 99, 100; **15**: 127; **19**: 95, 98, 101, 105, 109; **20**: 71, 126, 137, 139.
— intermedium **10**: 66.
— rivale **1**: 48; **3**: 27; **4**: 212; **5**: 13, 22, 50; **6**: 4, 27, 145; **7**: 109; **8**: 25, 213; **9**: 24; **10**: 157, 167, 234, 406, 413; **11**: 33 . . . 39, 164, 165; **12**: 34, 41; **13**: 9, 10; **15**: 32, 127; **16**: 5; **17**: 82, 125, 132, 136; **18**: 119; **19**: 101, 123; **20**: 21, 57, 71, 106, 113, 117, 118.
— — f. monstr. **13**: 171.
— —f. — hybridum **3**: 27; **14**: 119; **19**: 69.
— — f. pallens (pallidum) **8**: 92; **15**: 127.
— — × urbanum **5**: 50; **10**: 66; **19**: 69.
— urbanum **2**: 28; **3**: 64—65, 84; **4**: 212; **5**: 50; **6**: 138; **10**: 58, 234; **11**: 117, 148; **12**: 34, 41; **15**: 32, 127; **17**: 10, 125, 198; **18**: 33; **19**: 39; **20**: 21, 71, 113.

Gladiolus imbricatus **1**: 33; **5**: 101; **11**: 119.
Glaucium corniculatum **7**: 321.
Glaux maritima **1**: 33, 50; **2**: 49, 50; **4**: 79, 80, 84, 218; **5**: 56; **7**: 113; **8**: 21, 22; **10**: 158, 280, 403; **12**: 43, 110, 113, 174; **15**: 195, 217; **16**: 58, 62, 67; **18**: 97.

Glechoma hederacea (-ceum) **1** : 25; **4** : 86, 175; **5** : 57; **8** : 257 (cecid.); **9** : 164, 186; **10** : 58, 237, 409, 430; **11** : 117; **12** : 19; **15** : 133; **17** : 27, 41, 125, 137, 138; **19** : (97, 150); **20** : 74.
Globularia vulgaris **17** : 238.
Glyceria aquatica **1** : 25; **6** : 91, 93; **10** : 240; **17** : 57.
— borealis **19** : 197; **20** : 43.
— distans v. pulvinata **3** : 13.
— fluitans **2** : 54; **3** : 23; **4** : 83, 87, 199; **5** : 12, 16, 39; **7** : 99; **8** : 25, 204; **10** : 229, 406; **12** : 38, 112; **15** : 13, 30, 106, 119; **17** : 39, 124, 136; **20** : 61, 68.
— — f. loliacea **3** : 23.
— lithuanica **13** : 30; **17** : 56, 57, 181; **20** : 112, 134.
— maxima **11** : 149; **13** : 34; **14** : 5, 6; **15** : 119; **19** : 104; **20** : 61, 68.
— nervata **19** : 197.
— plicata **11** : 149; **15** : 119; **17** : 136, 234; **20** : 132, 134.
— remota (**20** : 64).
— spectabilis **19** : 189; **20** : 9, (64).
Gnaphalium norvegicum **12** : 141; **14** : 53; **19** : 55.
— silvaticum **3** : 30; **5** : 14, 26, 28, 60; **6** : 27; **7** : 117, 128; **8** : 219; **11** : 34, 39; **13** : 33; **15** : 135; **16** : 14, 15; **17** : 80, 82; **18** : 34, 121; **19** : 55, 103; **20** : 63, 75, 90.
— — ssp. norvegicum **8** : 273.
— supinum **8** : 274; **14** : 53; **17** : 220, 226; **19** : 197; **20** : 32, 33, 40, 90.
— uliginosum **2** : 56; **3** : 30; **4** : 78, 224, **5** : 30, 60; **6** : 27; **7** : 117; **8** : 219; **10** : 50; **11** : 31, 34, 36; **15** : 135; **16** : 66; **17** : 42, 80, 81, 125; **18** : 97, 121; **19** : 31, 40; **20** : 63, 75.
— — ssp. pilulare **20** : 90.
Godetia sp. **15** : 111, 129.
Goodyera repens **2** : 54; **3** : 24; **6** : 26, 29, 42; **7** : 83, 102, 127, 128, 268, 271; **8** : 200, 207, 264; **10** : 406, 431; **11** : 154, 157, 161; **12** : 69; **14** : 116; **15** : 120; **17** : 35, 196; **19** : 48, 63, 146.
Graphephorum arundinaceum **19** : 146.
Gratiola officinalis **8** : 235.
Grindelia squarrosa **7** : 320.
Gunnera bracteata **7** : 251.
— Masafuerae **7** : 252, 253.
— peltata **7** : 250, 252.
Gymnadenia albida **1** : 25; **9** : 142.
— conop(s)ea **3** : 24; **4** : 61, 90, 204; **7** : 36, 268, 271; **10** : 152, 408, 416, 431; **12** : 34, 111, 168; **13** : 129; **17** : 136, 138; **19** : 48, 146; **20** : 20, 63, 68.
— — f. albiflora **3** : 24.
— — f. lapponica **8** : 264.
— — v. densiflora **20** : 20.
Gypsophila elegans **3** : 25.
Gypsophila fastigiata **4** : 143; **12** : 165; **19** : 126, 134.182.
— muralis **7** : 105; **10** : 50; **15** : 123; **19** : 65, (97); **20** : 69.
— paniculata **11** : 153; **19** : 146.
Habenaria dilatata **19** : 197; **20** : 30, 39.
— obtusata **19** : 197; **20** : 33, 34, 43.
— — v. collectanea **19** : 197; **20** : 32.
Halenia deflexa **19** : 197; **20** : 31.
Halianthus peploides **12** : 153, 154.
Halorrhagis masatierrana **7** : 251.
— sp. **7** : 252.
Haloscias scoticum **8** : 270.
Hedera **6** : 99.
— helix **4** : 216; **8** : 240; **11** : 139, 146; **12** : 164, 174.
Heleocharis (Eleocharis) acicularis **1** : 43, 44.
— maculosa **7** : 250.
— triangularis **1** : 43—44, 62, 154, 155.
Helianthemum canum **4** : 143.
— chamaecistus **4** : 86; **10** : 409.
— italicum ssp. rupifragum **17** : 238.
— oelandicum **4** : 143.
— vulgare **4** : 62, 215; **5** : 212; **10** : 236, 275; **11** : 150; **12** : 35, 168, 255; **15** : 211, 214; **18** : 26, 28, 133; **20** : 11.
Helianthus annuus **3** : 30; **15** : 111, 136; (**19** : 97); **20** : 75.
Helichrysum arenarium **11** : 118, 147, 152; **12** : 165; **15** : 135.
Helleborine atropurpurea **4** : 204, 208, 228, 229 (mp.); **10** : 177.
— latifolia **4** : 90, 204; **10** : 275; **12** : 14, 20; **13** : 7; **17** : 34, 136; **19** : 63; **20** : 50, 68, 112, 135.
— palustris **4** : 204; **5** : 66; **7** : 88; **10** : 281; **12** : 34; **17** : 54; **19** : 122 (fig.), 128, 190; **20** : 68.
Hemerocallis flava **3** : 24.
— fulva **3** : 24.
Hepatica triloba **3** : 16, 26; **4** : 291; **7** : 78, 106; **11** : 137; **12** : 168, 172; **15** : 33; **17** : 181, 197; **18** : 44; **19** : 66, 127.
— — f. alba **19** : 66.
— — f. fl. pl. **14** : 172.
Heracleum giganteum **3** : 28.
— lanatum **19** : 197; **20** : 43.
— sibiricum **4** : 86, 88, 217; **5** : 55; **7** : 28, (32), 39, 112; **8** : 216; **10** : 148, 168, 236; **11** : 150; **12** : 35, 42, 113; **13** : 99, 100; **15** : 228; **17** : 10, 41; **18** : 66, 67, 178; **19** : 102, 146; **20** : 88.
— — v. angustifolium **5** : 55.
— sphondylium ssp. sibiricum **3** : 28; **12** : 72; **15** : 130; **19** : 106, 110, 113; **20** : 22, 72.
— — ssp. — f. angustissimum **19** : 71.
Heritiera litoralis **3** : 48.
Herminium monorchis **4** : 204, 228 (mp.); **10** : 46, 281, 408. 474; **11** : 122; **12** : 13, 14, 20.

Herniaria glabra **4** : 208; **10** : 232; **12** : 34; **19** : 126, 182.
— sp. **9** : 18.
Hesperis matronalis **3** : 26; **7** : 107; **9** : 165; **12** : 15, 20; **19** : 107, 109.
Hibiscus trionum **7** : 142, 143, 320.
— — v. ternatus **7** : 142.
Hieracium adunans **3** : 31.
— albicans **3** : 31.
— alpinum **8** : 274; **12** : 123; **14** : 53; **17** : 220; **20** : 105.
— amplectens **3** : 31.
— apricans **3** : 31.
— arctophilum v. chloromelanum **10** : 474.
— assimilatum **3** : 31.
— atrobulbosum **3** : 31.
— auricula **3** : 31; **5** : 62; **8** : 221; **20** : 91.
— auriginans (?) **3** : 31.
— basifolium **8** : 222; **12** : 254.
— binatum **3** : 31.
— brachycephalum **3** : 31; **8** : 221.
— caesiiflorum **3** : 31; **8** : 222; **14** : 53.
— caesiomurorum **3** : 31.
— caesitium **3** : 31.
— caesium **2** : 56; **13** : 17; **20** : 76.
— chlorellum **3** : 31.
— chrysocephalum **3** : 31.
— coalescens **3** : 31.
— cochleatum **3** : 31; **8** : 221.
— conflectens **3** : 31.
— coniops **8** : 222.
— contractum **3** : 31.
— cornigerum **8** : 222.
— cruentiferum **8** : 222.
— cuneolus **3** : 31.
— curvescens **3** : 31.
— cymosum **3** : 31; **5** : 62.
— denticuliferum **3** : 31.
— detonsum **3** : 31; **8** : 221.
— dimorphoides **8** : 221.
— discoloratum forma **8** : 221.
— dispansiforme **3** : 31.
— distantilingua **3** : 31.
— distractum **3** : 31.
— extenuatum **3** : 31; **8** : 222.
— fennicum **3** : 31; **8** : 221.
— fenno-orbicans **3** : 31.
— firmicaule **3** : 31.
— fulvoluteum **3** : 31.
— galactinum **3** : 31.
— galbanum **3** : 31; **8** : 222.
— glossophyllum **3** : 31.
— griseum **3** : 31.
— — ssp. griseicaule **3** : 31.
— — ssp. oppletiforme **3** : 31.
— — ssp. oppletum **3** : 31.
— Hjeltii **3** : 31.
— hololoma **3** : 31.
— hypoptellum **13** : 92.
Hieracium immigratum **3** : 31.
— incrassatiforme **8** : 221.
— incrassatum **8** : 221.
— incurrens **3** : 31; **8** : 222.
— irrubescens **8** : 221.
— juncicaule **3** : 31.
— lateriflorum **3** : 31.
— lepistoides **3** : 31.
— litoreum **19** : 20.
— lucens **3** : 31.
— luteoglandulosum **3** : 31.
— lyratum **8** : 222.
— macrolepideum **13** : 92.
— maurum **3** : 31.
— melanolepis **8** : 200, 222; **10** : 406.
— neglectum **3** : 31; **8** : 221.
— nigellum **3** : 31.
— nigrans (?) **3** : 31.
— pendulum **14** : 53.
— pilipes **8** : 221.
— pilosella **2** : 56; **4** : 226; **5** : 62; **6** : 4, 28, 109, 139; **7** : 118; **8** : 221; **10** : 165; **12** : 36, 45, 113; **13** : 17; **15** : 6, 33, 92; **17** : 125; **18** : 27, 28, 42, 120, 135, 142; **20** : 23, 51, 59, 63, 76, 105.
— prasinatum **3** : 31.
— pratense **3** : 31; **20** : 58, 76.
— prenanthoides **1** : 25.
— prolixiforme **8** : 222.
— protuberans (?) **3** : 31.
— pseudo-Blyttii **3** : 31; **8** : 221.
— pubescens **3** : 31.
— rigidum **3** : 31; **4** : 226; **5** : 62; **8** : 222.
— Saelani **3** : 31; **7** : 118; **8** : 221.
— sagittatum **3** : 31; **16** : 153.
— — ssp. olivascens **3** : 31.
— saxifragum **9** : 9.
— septentrionale **3** : 31; **8** : 221.
— silvaticum **6** : 28—30, 44; **7** : 128.
— sordidescens **3** : 31; **8** : 222.
— spathophyllum **7** : 118.
— sphacelatum **3** : 31.
— spectabile **3** : 31.
— stabile **3** : 31.
— subcurvescens **3** : 31.
— — ssp. congestum **3** : 31.
— subfloribundum **3** : 31; **8** : 221.
— subpellucidum **3** : 31; **8** : 200, 222.
— subpratense **3** : 31.
— subsuomense **3** : 31.
— suecicum **3** : 31; **5** : 62; **6** : 28; **7** : 118; **8** : 221; **10** : 159, 168.
— — v. glabriceps **3** : 31.
— suomense **8** : 222.
— — f. angustifolium **3** : 31.
— tenebrosum **3** : 31; **8** : 222.
— tenuilingua **3** : 31.
— tortile **3** : 31.
— triviale **3** : 31, 50, 82—83, 85; **5** : 10, 62; **7** : 118, 122, 136; **10** : 165; **15** : 31, 33.
— tubulascens **3** : 31; **13** : 92.

Hieracium tubulascens v. emaciatum **3** : 31.
— — v. pseudosuecicum **3** : 31.
— umbellatum **1** : 146; **2** : 50, 52, 56; **3** : 31; **4** : 68, 69; **5** : 62; **6** : 28, 139; **7** : 119, 122, 136; **8** : 222; **11** : 21, 22, 25, 152; **12** : 36, 45, 113, 179; **13** : 14, 17, 33; **15** : 14; **17** : 81; **18** : 121, 135, 172; **19** : 93, 103, 150; **20** : 23, 51, 55, 62, 76, 102.
— — v. dunense **3** : 8; **4** : 208, 227.
— — v. lineare **7** : 119; **8** : 222.
— viridilivens **8** : 221.
— vulgatiforme **3** : 31; **8** : 222.
— vulgatum **6** : 28, 139.
— sp. **4** : 26; **5** : 125, 212; **6** : 84; **8** : 374; **9** : 3, 6, 7, 183, 188; **10** : 65, 67, 138, 238; **11** : 55, 229; **12** : 123, 254; **14** : 66, 113; **15** : 6, 31, 108, 275; **16** : 96; **17** : 80, 137; **18** : 27, 28, 34, 42; **19** : 20, 39, 103, 197; **20** : 111, 114, 116, 118.
Hierochloa (Hierochloë) alpina **19** : 197; **20** : 31, 34, 40, 41, 44.
— australis **3** : 23; **6** : 144, 145; **10** : 277; **12** : 179, 180; **15** : 89; **17** : 54; **19** : 62.
— borealis **20** : 33, 37.
— odorata **3** : 23; **4** : 90, 197; **5** : 37; **7** : 97; **8** : 30, 203; **10** : 229; **11** : 33, 39; **13** : 9—11; **14** : 49; **15** : 118; **17** : 39, 135; **18** : 123; **19** : 197; **20** : 20, 67, 106.
— — f. firma **13** : 13.
— sp. **12** : 158.
Hippophaë(s) rhamnoides **1** : 40, 51; **2** : 62, 63; **4** : 86; **5** : 54, 70, 71; **6** : 90; **7** : 111, 274; **8** : 20, 227; **10** : 32, 42, 56, 57, 157, 161, 408, 417, 432; **11** : 8; **15** : 214, 217, 220, 228.
Hippuris tetraphylla **5** : 146; **7** : 35; **12** : 145; **19** : 71.
— vulgaris **2** : 55; **3** : 28; **4** : 75—77, 83, 216; **5** : 54; **7** : 112; **8** : 216; **10** : 236, 289; **12** : 113; **14** : 52, 55; **15** : 13, 46, 47, 92, 106, 130; **17** : 41; **19** : 102, 197; **20** : 41, 45, 61, 72.
— — mf. fluviatilis **15** : 130.
— — f. litoralis **5** : 54.
— — ssp. maritima **8** : 270.
— sp. **9** : 19.
Holcus lanatus **6** : 26; **8** : 197; **17** : 71.
— mollis **4** : 291; **10** : 474.
Honckenya peploides **4** : 174, 207; **7** : 40, 47; **10** : 241, 280; **12** : 112; **15** : 83, 84, 123.
Hordeum jubatum **1** : 94, 156; **6** : 231; **15** : 120; **19** : 43, 197.
— murinum **15** : 110, 120.
— sativum **19** : 38, 40, 91, 100, 107, 108; **20** : 129.
— — ssp. polystachium **13** : 89.
— violaceum **19** : 42, 43.
— vulgare [**6** : 115]; [**9** : 135]; [**15** : 109]; **16** : 10, 13; [**17** : 206—208].
— — ssp. distichum **3** : 24.
Hordeum vulgare ssp. polystichum v. hexastichum **3** : 24.
Humulus lupulus **3** : 25; **5** : 30, 44; **7** : 32, 34, 39, 104; **8** : 210, 281; **9** : 22; **10** : 232, 279; **11** : 53, 146, 150; **14** : 6—8; **15** : 31, 121; [**18** : 170]; **19** : 64, 104; **20** : 73.
Hutchinsia petraea **2** : 19, 28; **3** : 61—62, 84; **4** : 210; **10** : 232, 233, 237; **12** : 34, 40, 164, 174.
Hyacinthus orientalis **12** : 198, 199, 203.
Hydrocharis morsus ranae **3** : 4, 23, 135; **4** : 110, 173; **7** : 79, 97, 269; **9** : 181; **13** : 34, 35; **15** : 113; **19** : 58, 122, 190; **20** : 61, 66, 133.
Hydrocotyle vulgaris **4** : 216; **12** : 164.
Hyoscyamus niger **2** : 25, 49—51, 56; **3** : 74, 84; **4** : 175, 220; **6** : 27; **7** : 274; **8** : 281; **9** : 165; **13** : 99; **15** : 133; **17** : 35, 41; **18** : 66; **19** : 74, 95, 98, 102, 111; **20** : 140.
Hypericum hirsutum **1** : 14; **2** : 64; **4** : 23, 89; **5** : 30, 53; **6** : 109; **7** : 32, 33, 35, 37, 39; **8** : 77; **9** : 22, 23; **10** : 29, 33—34, 146, 172, 274, 276, 278, 280, 281, 402, 409, 419—422, 431; **11** : 7, 9, 97—114 (mp.); **12** : 17, 20, 21, 25, 35, 144, 172; **13** : 8; **14** : 171; **15** : 93; **19** : 20.
— humifusum **10** : 50.
— maculatum **2** : 28, 55; **3** : 71, 84; **4** : 214; **5** : 13, 22, 28, 53; **6** : 4, 27; **9** : 24; **10** : 168; **11** : 112; **12** : (42), 113; **15** : 6, 32, 126; **17** : 82; **18** : 119; **20** : 21, 63, 71, 117.
— montanum **1** : 34; **10** : 277; **11** : 119; **17** : 145; **19** : 20.
— perforatum **1** : 36; **2** : 55; **4** : 26, 214; **5** : 53; **6** : 27, 138; **10** : 163, 278; **11** : 17, 35 . . . 39; **12** : 35, 42; **13** : 17; **15** : 126; **17** : 10; **18** : 26, 28, 42, 123, 135; **20** : (64[1]), 117, 137.
— quadrangulum **1** : 36, 150[2]; **3** : 28; **7** : 95, 111; **8** : 216; **10** : 58, 237; **18** : 135; **20** : 54, 57, 59.
— sp. **18** : 133, 180.
Hypochoeris maculata **3** : 30; **4** : 176, 226; **9** : 24; **10** : 238, 275, 409, 425; **12** : 45, 111, 168; **15** : 111, 137; **17** : 35; **18** : 34; **19** : 77, (97), 146; **20** : 23, 55, 58, 76.
— — f. concolor **19** : 77.
Hyssopus officinalis **3** : 29.
Ilex **7** : 189.
Impatiens balsamina **18** : 146.
— noli tangere **3** : 4, 135; **4** : 91, 175; **7** : 258; **9** : 165; **10** : 277; **11** : 147; **15** : 29, 32, 93, 94, 103, 131; **17** : 51, 59, 63, 124; **18** : 33, 44; **19** : 72, 133, 134, 136; **20** : 49, 73, 139.
— parviflora **2** : 23; **3** : 4, 84, 128, 135; **12** : 17; **15** : 111, 131; **18** : 65, 66, 67.

[1] Per errorem perfoliatum.
[2] Per errorem perforatum.

Inula britannica **1** : 94, 156; **15** : 135; **19** : 2, 121, 141, 142; **20** : 64.
— helenium **3** : 30; **4** : 224; **15** : 135; **19** : 111; (**20** : 64).
— salicina **1** : 25, 61; **2** : 63; **4** : 88, 224; **5** : 30, 60; **9** : 22; **10** : 231, 238, 409, 432; **11** : 21, 22, 150; **12** : 35, 44, 111, 168; **17** : 10; **19** : 146; **20** : 140.
— — v. subhirta **4** : 224.
Ipomaea pes-caprae **3** : 48.
Iris germanica **3** : 24.
— pseudacorus **3** : 24; **4** : 203; **5** : 43; **7** : 37; **8** : 206, 277; **10** : 406; **13** : 34; **15** : 110, 114; **18** : 62, 117, 123; **19** : 146; **20** : 66, 133.
— setosa v. canadensis **19** : 197; **20** : 33, 36, 37.
— sibirica **17** : 71.
Isatis tinctoria **1** : 147; **2** : 53, 55; **3** : 35; **4** : 61, 89, 96, 127, 209, 228, 229 (mp.); **5** : 13, 18, 20, 48; **7** : 47, 163, 165; **8** : 279; **9** : 144; **10** : 27, 241, 280, 408, 429; **11** : 55; **12** : 164, 175; **17** : 197; **19** : 39, 41.
Jasione montana **3** : 33; **4** : 223; **7** : 258; **11** : 147, 152; **12** : 179; **13** : 21; **15** : 135; **17** : 25; **18** : 43.
Juania australis **7** : 249.
Juglans regia **12** : 174.
Juncus albescens **19** : 197; **20** : 39.
— alpinus **1** : 50; **2** : 54; **3** : 24; **6** : 26; **7** : 101; **8** : 21, 25, 42, 206; **9** : 157; **10** : 428, 429; **16** : 63.
— — v. rariflorus **8** : 263.
— — ssp. nodulosus **2** : 43.
— arcticus (**20** : 84).
— — × filiformis **20** : 84.
— balticus **1** : 30—33, 47—48, 79, 156; **3** : 10, 11, 13; **4** : 13, 127, 202; **5** : 66, 101, 115, 116; **7** : 40, 271; **10** : 59, 280, 413; **11** : 119, 151; **15** : 114; **17** : 54, 62, 76; **18** : 96—98; **19** : 197; **20** : 63.
— — v. europaeus **1** : 31.
— — × filiformis **3** : 34; **4** : 203.
— biglumis **8** : 263; **14** : 50; **17** : 219, 222; **19** : 197; **20** : 42, 84.
— bufonius **2** : 50, 54; **3** : 8, 24, 86; **4** : 10—13, 73, 79, 97, 203; **5** : 13, 17, 27, 42, 61, 71; **7** : 101; **8** : 22, 206; **9** : 16; **10** : 145, 245—248 (fig., mp.); **11** : 30—33; **12** : 34, 39, 112, 143; **13** : 12, 19; **15** : 106, 115; **16** : 66, 69; **17** : 80; **19** : 30, 32, 38, 39, 96, 99; **20** : 19, 62, 66, 84, 128.
— — f. hybridus **3** : 24.
— — v. genuinus **4** : 12.
— — v. halophilus **4** : 12; **10** : 248.
— bulbosus **9** : 159, 160.
— capitatus **1** : 34; **14** : 171.
— castaneus **19** : 197; **20** : 41.
— coarctatus **19** : 197; **20** : 39.
— compressus **4** : 203; **5** : 30, 42, 61; **10** : 231; **11** : 30, 31; **12** : 34, 38, 112; **15** : 115; **16** : 69; **19** : 59; **20** : 133.
Juncus conglomeratus **2** : 14, 28; **3** : 24, 53—54, 84; **4** : 202; **5** : 12, 16, 28, 41; **6** : 26; **7** : 101; **8** : 25, 205; **10** : 403; **12** : 67, 110; **15** : 114; **17** : 124; **20** : 19, 66.
— effusus **3** : 24; **4** : 202; **5** : 30, 41; **6** : 26; **7** : 101; **8** : 30, 205; **10**: 403, 406; **12** : 67; **15** : 114; **18** : 121; **19** : 38; **20** : 66.
— filiformis **2** : 43, 54; **3** : 24; **4** : 13, 203; **5** : 13, 17, 27, 41, 71; **6** : 26; **7** : 101; **8** : 25, 206; **10** : 258; **11** : 163, 164; **12** : 110, 112; **13** : 31; **14** : 50; **15** : 108, 114; **17** : 124, 134; **18** : 123; **19** : 94, 99, 197; **20** : 62, 66, 119, 128.
— — v. pusillus **19** : 197.
— fuscoater **7** : 34, 38; **10** : 33, 157; **12** : 34; **13** : 31; **15** : 115; **19** : 59; **20** : 66.
— Gerardi **1** : 33, 50; **2** : 48 . . . 54; **4** : 27, 79 . . . 85, 203; **5** : 42, 61; **6** : 103; **7** : 101; **8** : 20—22, 263; **9** : 19; **10** : 157, 231; **12** : 39, 110, 112, 174; **15** : 106, 115, 195, 216, 217; **16** : 58, 62, 69; **17** : 200; **19** : 141.
— Kochii **9** : 156—160.
— lamp(r)ocarpus **2** : 54; **3** : 24; **4** : 73, 76; **8** : 42; **10** : 33; **12** : 38, 56; **13** : 106; **15** : 114; **17** : 124; **18** : 123; **20** : 66.
— nodulosus **4** : 203; **5** : 30, 42; **7** : 36; **8** : 42; **12** : 34, 38; **13** : 31, 129; **15** : 114; **18** : 123; **19** : 94, 99, 197; **20** : 62, 66.
— — v. rariflorus **14** : 50.
— ranarius **3** : 34; **4** : 11—14, 18, 21, 22—24, 97, 203, 290; **5** : 30, 42, 61; **9** : 16, 21; **10** : 245—248 (fig., mp.), 280; **12** : 39, 110, 112, 143; **13** : 12, 19; **16** : 69; **19** : 197; **20** : 31.
— squarrosus **12** : 113, 164; **16** : 82—85; **17** : 132, 134.
— stygius **3** : 24; **7** : 271; **12** : 67, 133; **13** : 31, 89, 129; **14** : 50, 113; **17** : 134; **19** : 59, 99.
— subnodulosus **12** : 164, 174, 180.
— subtilis **19** : 197; **20** : 31.
— supinus **2** : 48, 50, 54; **4** : 203; **7** : 271; **8** : 25, 206; **9** : 156—160; **10** : 258, 406; **12** : 67, 164; **13** : 37; **15** : 92, 115; **17** : 37; **18** : 123.
— — mf. fluitans **4** : 75; **6** : 232; **9** : 159; **15** : 46.
— — v. eusupinus **9** : 158.
— — v. uliginosus **9** : 159.
— trifidus **6** : 146, 147; **8** : 263; **12** : 123; **14** : 44, 50; **16** : 22; **17** : 214 (fig.), 215, 219; **19** : 46, 197; **20** : 31 . . . 34, 44, 45.
— triglumis **8** : 263; **14** : 114, 117; **19** : 197.
— Welwitschii **9** : 156—160.
— sp. **10** : 257; **19** : 2.
Juniperus communis **1** : 16, 98; **2** : 42, 51, 54; **3** : 22; **4** : 196; **5** : 37, 64, 71; **6** : 26, 88, 124—128, 139; **7** : [37], 96; **8** : 24,

37, [52], 71, 76, [187, 196], 202; **9** : [14, 15], 19, [23], 25, 187; **10** : 34, 58, 146, 156, 166, 223—226, 229, 231 (fig.), 233, 235, 237, 406, 413, 420; **11** : 5, 7, 16, 22 . . . 27, [37], 39, [57, 101 . . . 105, 112, 142], 163; **12** : 11, 32, 33, 37, 39, 41, [42, 43], 111, 167—169, 174, 177 (fig.), 179, [185], 186—189, 191, 192; **13** : 15, [17], 129; **14** : 48; **15** : 7, 31, 32, [92, 99], 100, 101, 113, 191, 194, 214, 224, 233; **16** : 23; **17** : 10, 72, 73, 84, 196, [218, 226]; **18** : 7, 20, 32, [37], 42, 118, 122, [135, 171], 172; **19** : 32, 93, 98, [144], 197; **20** : 19, 30, 62, 66, 112, 121, 122, 145, 159—161, 166.

Juniperus communis f. ramulis pendulis **12** : 255.
— — f. suecica **7** : 96; **8** : 202; **19** : 58.
— — v. nana **8** : 260.
— sp. **20** : 34, 38, 40.
Kalmia angustifolia **19** : 197; **20** : 43.
— polifolia **19** : 197; **20** : 25, 30 . . . 39, 42.
Kickxia spuria **15** : 275.
Knautia arvensis **3** : 77, 84; **4** : 90, 223; **5** : 14, 26; **6** : 27, 138; **8** : 200, 219; **9** : 24; **10** : 58, 238, 275, 409, 425, 429, 431; **11** : 150; **12** : 35, 44, 113; **15** : 8, 33, 135; **18** : 26, 28, 66, 121; **19** : 75, 106, 111; **20** : 23, 51, 55 . . . 59, 63, 75, 117, 120.
— — f. albescens **15** : 135.
— — f. monstr. **13** : 171.
Kobresia caricina **13** : 92, 171.
— scirpina **19** : 196.
Koeleria glauca **3** : 86; **4** : 198, 208, 219, 228 (mp.); **8** : 233; **11** : 147; **12** : 165, 173.
— — f. *pallida* **3** : 33; **4** : 198.
— grandis **11** : 147.
Laburnum sp. **19** : 39.
Lactoris fernandeziana **7** : 250.
Lactuca muralis **2** : 56; **4** : 88, 266; **6** : 28, 94; **8** : 282; **10** : 58, 238, 406; **11** : 148, 149; **12** : 36; **13** : 14; **15** : 7, 8, 137, 223; **17** : 54, 63, 67, 199, 343; **18** : 26, 28, 34, 35.
— pulchella **12** : 107.
— sativa **3** : 30; [**15** : 109]; **19** : 91.
— sibirica **20** : 23.
— tatarica **12** : 107; **15** : 111, 137; **19** : 141, 142.
Lagenophora Harioti **7** : 253.
Lamium album **2** : 56; **4** : 220; [**7** : 2]; **9** : 165; **11** : 117; **12** : 35, 43, 167; **15** : 59, 133; **18** : 28, 66, 67; **19** : 73, 110, 150; **20** : 12, 74.
— — v. integrifolium **7** : 2, 321.
— amplexicaule **6** : 27; **8** : 79—97, 281; **12** : 35, 43; **13** : 91, 130; **19** : 106, 110; **20** : 88.
— — × purpureum **10** : 64.
— dissectum **18** : 66, 67; **19** : 146.
— galeobdolon **11** : 137; **15** : 26—34 (mp.), 133; **17** : 59, 122; **19** : 129, 183.
Lamium hybridum **4** : 220; **5** : 30, 57; **7** : 81 (mp.), 83; **10** : 64; **12** : 35, (43), 113; **15** : 133; **17** : 27; **20** : 12, 74.
— incisum **7** : 114; **8** : 218.
— intermedium **6** : 27; **8** : 281; **10** : 64.
— maculatum **15** : 133.
— parietariaefolium **7** : 2.
— purpureum **3** : 29; **4** : 220; **5** : 57; **6** : 27; **7** : 81 (mp.), 83; **8** : 79—97, 281; **10** : 237; **12** : 43, 73; **13** : 91; **15** : 110, 133; **18** : 27, 28, 121, 122; **19** : 146, 150; **20** : 12, 23, 63, 74, 88, 126.
— — f. albiflorum **19** : 73.
— — ssp. incisum **3** : 29.
— sp. **7** : 82.
La(m)psana communis **3** : 30; **4** : 226; **5** : 14, 27, 61; **6** : 28; **12** : 35, 45; **15** : 137; **16** : 4; **17** : 43, 80, 81; **18** : 27, 28, 34, 66, 121, 122; **19** : 31, 39, 150; **20** : 23, 62, 76, 91.
Lappa minor **3** : 30; **7** : 116; **20** : 90.
— tomentosa **3** : 30; **7** : 116; **8** : 219; **13** : 100; **17** : 81.
— sp. **7** : 82.
Lappula deflexa **6** : 142; **7** : 86; **17** : 220, 221, 225.
— echinata **12** : 3; **13** : 99; **15** : 132; **16** : 14; **19** : 39—41, 73, 102, 110, 197; **20** : 129, 139.
Larix europaea **9** : 191.
— laricina **19** : 172; **20** : 26.
— sp. [**5** : 113]; **8** : 227; **9** : 26, 178, [179]; [**10** : 20]; [**15** : 109]; [**19** : 8, 9, 172]; **20** : 34 . . . 41, 44, 159—161, 165.
Laserpitium latifolium **4** : 87, 88; **10** : 153, 276, 281, 409; **12** : 13, 17, 20, 168; **15** : 214, (233).
— ruthenicum **11** : 145.[1]
Lathraea squamaria **3** : 128; **4** : 175—176; **10** : 201; **12** : 172; **15** : 33, 216; **17** : 54.
Lathyrus aphaca **20** : 63.
— maritimus **2** : 48 . . . 55; **3** : 38, 67—70 (fig.), 84, 135; **4** : 68, 69, 175; **7** : 40, 47; **8** : 269; **10** : 241; **11** : 152; **13** : 4; **15** : 128; **19** : 2, 39, 70, 197; **20** : 31, 39, 63.
— — f. glaber **12** : 153.
— — f. pubescens **12** : 153.
— montanus **4** : 91, 175; **5** : 52; **8** : 280; **10** : 53, 274, 275, 409, 418, 429; **17** : 60, 61, 73; **18** : 119, 120; **19** : 70.
— — f. obtusifolius **19** : 70.
— — f. tenuifolius **19** : 70.
— niger **10** : 281, 406, 409, 474; **12** : 168.
— odoratus **3** : 27.
— palustris (paluster) **5** : 52; **7** : 110, 266; **8** : 269; **10** : 274, 409, 428; **11** : 160; **12** : 35, 42, 71, 139; **14** : 120; **15** : 128; **17** : 76, 137, 138; **19** : 70; **20** : 22, 65, 118, 137.
— pratensis **1** : 38 (cecid.), 48; **3** : 27; **4** : 214;

[1] Per errorem pruthenicum.

5 : 13, 22, 52; **6** : 27, 110, 138; **7** : 110; **8** : 214; **9** : 24; **10** : 34, 168, 235, 413; **11** : 33 . . . 39; **12** : 35, 42, 112, 168; **13** : 9—11, 16; **15** : 89, 102, 128; **17** : 125, 137; **18** : 98, 119; **20** : 22, 54, 72, 87, 102, 113.

Lathyrus silvestris (silvester) **3** : 17, 69, 84; **6** : 138; **8** : 20, 23—24; **10** : 53, 275, 409, 431; **13** : 99; **15** : 128; **17** : 54; **18** : 118, 119, 120, 124; **19** : 70; **20** : 54, 72, 114, 137.

— vernus **3** : 27, 70—71, 84; **4** : 214; **5** : 7, 52, 65; **7** : 110; **8** : 214; **9** : 24; **10** : 223, 406, 409; **11** : 137; **12** : 35, 71, 168; **15** : 8, 31, 32, 89, 103, 128; **17** : 10, 181, 198, 200; **18** : 34, 119, 120; **20** : 22, 54, 72, 99, 101, 102, 107, 111, 113, 137.

— — f. albiflorus **19** : 70.

— — f. roseus **13** : 171.

— sp. **20** : 33, 36, 37.

Lavatera trimestris **3** : 28.

— thuringiaca **19** : 71.

Ledum decumbens **19** : 197; **20** : 32, 34—38, 44.

— groenlandicum **19** : 197; **20** : 34, 35, 44.

— palustre **1** : 59; **3** : 28; **4** : 217; **5** : 55; **6** : 27; **7** : 112, 126, 196, 229; **8** : 217, 271; **9** : 107[1], 108; **10** : 405; **11** : 142, 163; **12** : 35, 113; **14** : 52, 63; **15** : 100, 104, 131; **16** : 76; **18** : 83; **19** : 49, 93, 102; **20** : 22, 32, 62, 73, 123, 124.

— — f. dilatatum **7** : 112; **8** : 217, 271; **19** : 72.

— sp. **20** : 36.

Leersia oryzoides **9** : 176; **15** : 106, 107, 118, 119; **17** : 54; **20** : 63.

Lemna gibba **4** : 22—24; **7** : 43; **8** : 196, 197, 375; **10** : 13—16, 33, 172, 276, 279, 473; **11** : 52; **12** : 24.

— minor **3** : 24; **4** : 170—171, 202; **5** : 41; **7** : 101; **8** : 196, 205; **10** : 16, 33, 229; **11** : 52; **12** : 24, 67, 112, 113; **13** : 34, 36; **15** : 46, 106, 114; **18** : 117, 123, 124; **20** : 7, 19, 61, 66.

— polyrrhiza **10** : 14.

— trisulca **4** : 107, 173, 202, 228 (mp.); **7** : 101, 266; **8** : 275; **10** : 289; **13** : 34, 96; **15** : 45, 47, 114, 196; **17** : 47, 78; **20** : 19, (64), 133.

Leontodon autumnalis **1** : 33, 50; **2** : 28, 56; **3** : 30, 80, 85; **4** : 27, 68, 71, 78, 127, 226; **5** : 61; **6** : 28; **7** : 118, 122, 133, 136; **8** : 21, 22, 220; **9** : 24, 180; **10** : 158, 164, 168, 238, 404; **11** : 21, 34; **12** : 35, 45, 110, 113; **13** : 12; **15** : 6, 108, 137, 217; **16** : 58, 62; **17** : 80, 81, 220; **18** : 26, 28, 97, 121; **19** : 31, 39, 40, 91, 96, 103, 150; **20** : 12, 23, 51, 62, 76, 116, 127, 129.

— — f. pallens **8** : 93.

Leontodon hispidus **7** : 275; **9** : 24; **12** : 19; **13** : 33; **15** : 93, 111, 137; **17** : 82, 138; (**19** : 97); **20** : 51, 55 . . . 59, 63, 76, 118.

— — v. vulgaris **20** : 141.

Leon(t)urus cardiaca **8** : 281; **15** : 111, 133; **16** : 14; **17** : 10; **19** : 73; **20** : 74, 126, 132, 139.

— — v. villosa **6** : 101—103 (mp.).

— — v. vulgaris **6** : 101—103 (mp.)

Lepidium apetalum **15** : 110.

— bonariense **15** : 59, 63, 66, 274.

— campestre **1** : 82—83, 156; **5** : 13, 17, 19, 30, 47, 48; **9** : 22; **10** : 143.

— densiflorum **7** : 94, 107; **8** : 18, 200, 212; **9** : 165, 237; **12** : 3, 70, 254; **13** : 98, 100; **15** : 59, 63, 110, 125; **16** : 14, 15; **17** : 197; **19** : 39, 43, 67, 104, 109, 113; **20** : 126, 131, 132, 136.

— draba **5** : 212; **12** : 254; **17** : 343.

— latifolium **1** : 147; **3** : 35; **4** : 142, 177; **9** : 26—28; **10** : 172, 276, 279, 473.

— neglectum f. microcarpum **15** : 125.

— perfoliatum **5** : 212; **9** : 165.

— ramosissimum **8** : 18, 200, 212, 375; **13** : 90.

— ruderale **1** : 83; **2** : 49, 51, 55; **3** : 26; **4** : 209; **5** : 30, 48; **7** : 82, 94, 107; **8** : 18, 200, 212; **9** : 165, 237; **10** : 241; **11** : 151; **12** : 34; **15** : 59, 63, 125; **17** : 27; **18** : 66; **19** : 39, 91, (97); **20** : 70, 86.

— sativum **8** : 201, 212.

Levisticum officinale **3** : 28; **4** : 89; **7** : 112, 274; **8** : 216; **9** : 164; **17** : 198; **19** : 71, 146.

— paludapifolium **5** : 30, 55; **10** : 236; **12** : 33.

Libanotis montana **8** : 195; **11** : 150; **15** : 213; **18** : 135.

— sp. **6** : 91.

Libocedrus tetragona **6** : 64.

Ligularia sibirica **19** : 122, 123, 190, 191; **20** : (64), 110, 120, 141.

— sp. **6** : 91.

Ligusticum scoticum **19** : 197; **20** : 31, 33, 34, 39.

Lilium croceum **7** : 321.

— martagon **19** : 76.

— sp. **17** : 343.

Limnanthemum nymphaeoides **11** : 153.

Limosella aquatica **3** : 29, 36; **4** : 221; **7** : 274; **8** : 281; **11** : 31; **12** : 113; **15** : 106, 133; **18** : 103; **19** : 197; **20** : 31, 61, 74.

— — f. tenuifolia **3** : 29.

Linaria bipartita **3** : 29.

— cymbalaria **3** : 29.

— odora **3** : 33; **4** : 220, 221, 226; **11** : 152.

— repens **8** : 97, 98, 374; **13** : 91.

— repens × vulgaris **8** : 97—98, 374.

— striata **8** : 97.

— vulgaris **2** : 49 . . . 56; **3** : 29; **4** : 26, 220; **5** : 30, 58; **6** : 27, 138; **7** : 115; **8** : 97, 200,

[1] Per errorem Sedum p.

218; **10** : 18, 19, 146, 237, 409; **12** : 19, 22, 35, 43, 113, 175, 254; **15** : 133; **16** : 14, 15; **17** : 42, 76; **18** : 66; **19** : 39, 41, (97), 102, 150, 189; **20** : 23, 63, 74, 89, 126.
Linaria vulgaris f. monstrosa **9** : 238.
— — f. hemipeloria **19** : 74.
— — f. peloria **17** : 76.
— sp. **9** : 19.
Linnaea americana **19** : 197; **20** : 33, 34, 39, 40.
— borealis **2** : 42, 56; **3** : 30; **4** : 223; **5** : 59; **6** : 27 . . . 43, 48; **7** : 83, 116, 130, 179; **8** : 219; **10** : 58, 406, 423; **11** : 16, 17, 48—51 (fig.), 144, 147; **12** : 254; **14** : 53, 113; **15** : 100, 105, 135; **17** : 220; **18** : 122; **19** : 103; **20** : 23, 75, 123.
Linum catharticum **2** : 22; **3** : 71, 84; **4** : 81, 86, 214; **5** : 53; **7** : 111, 273; **8** : 21, 44, 280; **10** : 157, 163, 168, 235, 413; **12** : 35, 42, 111, 168; **15** : 131; **17** : 10, 54, 132, 137, 138; **18** : 48; **20** : 3, 22, 73, 117, 118, 120, 139.
— usitatissimum **3** : 28; **9** : 164; **13** : 91, 99; **15** : 131; **19** : (97), 107, 110; **20** : 73.
— — f. leucanthum **20** : 73.
Listera cordata **2** : 54; **3** : 24; **4** : 204, 228 (mp.); **5** : 43; **6** : 26; **7** : 83, 102; **8** : 25, 200, 206, 264; **10** : 406; **14** : 50; **15** : 120; **17** : 10, 35, 196; **19** : 197; **20** : 33, (64, 68).
— ovata **2** : 40, 42, 111, 116; **3** : 24, 38, 135; **4** : 86, 91, 204; **5** : 43; **6** : 4, 110; **7** : 36, 37, 78; **8** : 38, 277; **9** : 24; **10** : 148, 231, 406, 408; **11** : 156, 157; **12** : 34, 39, 69, 111, 137, 168; **14** : 116; **15** : 120, 214, (233); **17** : 34, 132, 136, 138; **18** : 2, 119, 120; **19** : 63, 146; **20** : 20, 56, 68, 135.
— — f. monophylla **11** : 156.
Lithospermum arvense **3** : 29, 74, 84; **4** : 87, 220; **5** : 56; **7** : 114; **8** : 217; **10** : 237; **11** : 117; **12** : 35; **15** : 132; **17** : 35, 199; **19** : 39, 91, (97); **20** : 22, 63.
— officinale **11** : 117—120, 268.
Litorella juncea **1** : 106.
— lacustris **17** : 81.
— uniflora **1** : 105—106, 156; **10** : 281; **12** : 164, 178, 192; **13** : 171; **15** : 275; **18** : 123; **20** : 132, 140.
— — mf. isoëtoides **9** : 177; **18** : 123, 124.
— sp. **1** : 74; **14** : 172.
Lobelia anceps **7** : 249.
— Dortmann(i)a **1** : 74; **3** : 30; **4** : 176; **6** : 159; **7** : 83, 275; **8** : 219; **10** : 16, 256, 258; **13** : 34, 171; **15** : 135; **17** : 42; **18** : 123, 124; **19** : 76, 94, 103, 197; **20** : 43, (64).
— — f. decolor **19** : 76.
— erinus **3** : 30.
— splendens **3** : 30.
Loiseleuria procumbens **8** : 270; **11** : 231; **14** : 52, 65, 66; **15** : 202; **16** : 95; **17** : 214 (fig.), 220, 225; **19** : 53, 197; **20** : 30 . . . 36, 41, 44, 45.
— — f. albiflora **19** : 53.
Lolium linicolum **3** : 23; **8** : 204; **9** : 164.
— multiflorum **15** : 52; **17** : 196; **19** : 38, 95, 98, 100, 104, 108, 138, 149; **20** : 63, 131, 134.
— perenne **3** : 24; **12** : 33, 69; **13** : 130; **15** : 120; **17** : 196; **19** : 63; **20** : 68.
— — v. tenue **3** : 24.
— remotum **19** : 108; **20** : 84.
Lonicera caprifolium **3** : 29.
— coerulea **6** : 88; **19** : 52, 55, 98, 188, 197; **20** : 23, 35, (64, 75), 111, 114, 122, 140.
— nigra **15** : 135.
— xylosteum **3** : 6, 29, 38, 135; **4** : 86, 215, 223; **5** : 59, 64; **6** : 139. 142; **7** : 32, 78, 116, 274, 276; **8** : 36, 200, 219, 282; **9** : 24, 177; **11** : 16, 102, 137, 146; **12** : 35, 44, 65, 73, 168, 173; **15** : 31, 89, 101, 135, 214, 233; **17** : 10, 34, 42, 181; **18** : 32 . . . 39, 43, 44, 78, 118, 120, 179, 181; **19** : 75, 123, 127, 146; **20** : 48, 75, 99, 107, 111, 114, 122.
— sp. **12** : 60; **15** : 109.
Lophosoria quadripinnata **7** : 253.
Lotus corniculatus **1** : 33; **2** : 51, 55; **3** : 67, 84; **4** : 213; **5** : 52; **6** : 27; **7** : 121, 135, 136, 258, 273; **8** : 21, 279; **9** : 177; **10** : 163, 235, 274, 275, 409, 429; **11** : 57, 150, 152; **12** : 35, 42, 112, 167, 175; **15** : 14, 111, 128; **16** : 11, 13, 15, 92; **17** : 198; **18** : 97; **19** : 32, (97).
Lunaria rediviva **6** : 88.
Lupinus angustifolius **15** : 109, 129; **17** : 343; **20** : 128, 138.
— hirsutus **3** : 27.
— luteus **3** : 27.
— polyphyllus **3** : 27.
Luzula arcuata **8** : 263; **10** : 370; **11** : 168; **17** : 219, 222.
— — ssp. confusa **8** : 263.
— — ssp. hyperborea **8** : 263.
— campestris **4** : 61, 203; **5** : 30, 42; **6** : 110; **7** : 36; **8** : 275; **10** : 34, 156, 162, 167, 231, 274, 426, 427; **11** : 164; **12** : 34, 39; **17** : 27, 196; **19** : 59, 198.
— — ssp. multiflora **3** : 24.
— — ssp. pallescens **3** : 24.
— — × multiflora **4** : 61.
— confusa **10** : 370; **19** : 197; **20** : 40.
— frigida **8** : 263; **14** : 50; **19** : 197; **20** : 84.
— — ssp. pallescens **8** : 263.
— multiflora **2** : 14, 28, 54; **3** : 54, 84; **4** : 70, 71, 203; **5** : 13, 17, 42; **6** : 26 . . . 42; **7** : 101; **8** : 206; **9** : 24, 180; **10** : 231; **11** : 35, 38, 39; **12** : 34, 39, 110, 112, 168, 179; **13** : 10, 11, 33; **14** : 50; **15** : 6, 8, 32, 108, 115; **17** : 124, 134, 138; **18** : 119;

19 : 96, 99; **20** : 3, 54 . . . 57, 63, 66, 84, 118, 119.
Luzula multiflora f. pallescens **8** : 206.
— — ssp. frigida **12** : 133.
— — ssp. occidentalis **20** : 19.
— nemorosa **6** : 231; **12** : 254; **15** : 115; **19** : 59.
— pallescens **5** : 13, 17, 42, 64; **6** : 140; **7** : 32, 36, 37, 101; **8** : 206; **9** : 14; **10** : 157, 280, 426, 427; **14** : 50; **15** : 81, 115; **17** : 219, 222; **18** : 121; **19** : 38, 59, (97); **20** : 19, 66, 84.
— pallescens × sudetica **15** : 81.
— parviflora **8** : 263; **14** : 50; **16** : 43; **17** : 219; **19** : 46, 198; **20** : 36, 39, 40.
— — ssp. Wahlenbergii **8** : 263.
— pilosa **2** : 42, 54; **3** : 24; **4** : 203; **5** : 42; **6** : 26 . . . 42, 48, 110; **7** : 101, 121, 128, 136; **8** : 36, 206; **10** : 58, 231, 405, 423; **11** : 17; **12** : 112, 179; **13** : 13, 17, 18; **14** : 50; **15** : 31, 89, 101, 115; **16** : 5, 8; **17** : 124, 135; **18** : 34, 98, 119; **19** : 31, 93, 99; **20** : 19, 31, 53, 57, 63, 66, 98, 99, 102, 106.
— spicata **3** : 129; **8** : 264; **11** : 168; **14** : 50; **17** : 219; **19** : 197; **20** : 31, 34, 36, 37, 44.
— sudetica **7** : 101; **11** : 164; **12** : 133; **14** : 50, 114; **15** : 81; **17** : 37, 219, 221; **19** : 46, 99, 203.
— Wahlenbergii **19** : 46.
— sp. **17** : 82.
Lycaste cruenta **15** : 186.
Lychnis alba **9** : 165.
— alpina **1** : 146; **8** : 266.
— dioeca **2** : 55; **11** : 24—27, 33, 35, 39; **13** : 9, 10, 13.
— diurna **11** : 27.
— flos cuculi **3** : 25; **4** : 208; **5** : 13, 18, 28, 46; **7** : 105; **8** : 30, 210; **11** : 33, 150; **12** : 34; **13** : 9—11; **15** : 122; **16** : 83; **17** : 124, 132, 136; **18** : 121; **19** : 100; **20** : 20, 69, 85, 117, 118, 120.
— — forma **5** : 79; **8** : 20.
— — f. albiflora (alba) **3** : 25; **8** : 92; **15** : 122.
— rubra **7** : 105; **8** : 210; **9** : 164.
— — f. albiflora **7** : 105.
— — ssp. lapponica **8** : 266.
— viscaria **3** : 25; **7** : 105; **18** : 133, 135, 170, 172, 180; **20** : 59.
Lycopersicum esculentum [**15** : 109].
Lycopsis arvensis **4** : 175, 219; **12** : 35, 113; **15** : 132; **18** : 66; **19** : 73; **20** : 63.
Lycopus europaeus **4** : 175, 220; **5** : 57; **7** : 274, 275; **10** : 404; **11** : 34, 149; **15** : 92, 132; **17** : 43, 51, 59, 80, 81, 125, 199; **18** : 123; **19** : 122, 123, 190; **20** : 23, 62, 74.
Lysimachia nummularia **9** : 164, 165; **10** : 142; **11** : 147, 150; (**20** : 64).
— thyrsiflora **2** : 41; **3** : 29; **4** : 75, 76; **7** : 113; **8** : 30, 217; **14** : 5; **15** : 131; **17** : 125, 137; **19** : 94, 102; **20** : 22, 62, 73.
Lysimachia vulgaris **1** : 33; **3** : 29; **4** : 83, 87—89, 218; **5** : 55; **6** : 27; **7** : 113, 122, 134, 136; **8** : 25, 217; **10** : 158, 406; **11** : 21, 24, 25, 33 . . . 39; **12** : 35, 43; **13** : 10[1], 11, 13, 16; **15** : 33, 131; **16** : 5, 7; **17** : 66, 67, 82, 123, 125, 137; **18** : 97, 120, 145; **20** : 22, 62, 73.
— — v. oppositifolia **3** : 29.
Lythrum salicaria **1** : 33; **2** : 48, 51, 55; **3** : 28; **4** : 27, 80, 88, 215; **5** : 54, 115; **6** : 48, 54; **7** : 111, 121, 134, 136; **8** : 216; **10** : 58, 157, 236, 258, 403; **11** : 21, 24, 30—33, 39; **12** : 35, 42, 113, 254; **13** : 9 . . . 13, 106; **14** : 120; **15** : 13, 92, 129, 217; **16** : 63; **17** : 41, 71, 82; **18** : 97, 123, 145; **19** : 37, 39; **20** : 3, 22, 62, 72.
Majanthemum bifolium **1** : 17; **2** : 41, 42, 54; **3** : 24; **4** : 203; **5** : 42, 114; **6** : 4, 26, 29, 30, 42, 48, 111; **7** : 102, 126, 128, 129; **8** : 25, 206; **10** : 167, 231, 406; **11** : 17, 24—27, 38, 39, 148; **12** : 34, 39, 112, 136; **13** : 17, 31; **14** : 6, 7, 113; **15** : 8, 31, 32, 89, 100 . . . 105, 114, 233; **16** : 5; **18** : 33, 119; **19** : 93, 99; **20** : 19, 54, 56, 57, 62, 66, 98, 99, 102, 106, 112.
— canadense **19** : 198; **20** : 30, 31, 35.
Malachium aquaticum **10** : 277; **17** : 54, 81.
Malaxis monophyllos **15** : 213.
— paludosa **2** : 54; **3** : 25; **4** : 173; **7** : 102, 271; **8** : 277; **10** : 240; **12** : 69, 137; **14** : 117; **15** : 213; **19** : 63; **20** : 135.
Malope trifida **3** : 28.
Malva moschata **3** : 39; **15** : 110, 130.
— neglecta **17** : 91.
— pusilla **5** : 30, 53; **15** : 111, 130; **18** : 66, 67; **19** : 40, 41, 71, 102; **20** : 22, 73, 126, 139.
— rotundifolia **9** : 165.
— verticillata v. crispa **13** : 91.
— sp. **18** : 171.
Margyricarpus * digynus **7** : 251.
Matricaria chamomilla **3** : 30; **4** : 224; **5** : 60; **15** : 136; **18** : 66, 67, 121; **19** : 39, 40, 112, 150; **20** : 64, (76), 90, 129, 132, 140.
— discoidea **3** : 30; **7** : 118; **8** : 220; **14** : 122; **15** : 59, 61, 65, 136; **18** : 66, 67, 121; **19** : 31, 39, 40, 91, 96, 103, 198; **20** : 63, 76, 127, 129, 140.
— inodora **2** : 56; **3** : 30; **4** : 224; **5** : 60, 61; **6** : 28; **7** : 118; **8** : 220; **11** : 34; **12** : 3, 35, 44, 113; **13** : 12; **15** : 59, 136; **16** : 69; **17** : 81, 221, 222; **18** : 26, 27, 28, 66, 121; **19** : 31, 39, 40, 91, 96, 103, 150; **20** : 23, 51, 62, 76, 90, 127.
— — v. borealis **20** : 90.
— — v., sp. maritima **1** : 33; **4** : 67, 68, 224; **7** : 125; **15** : 191, 192 (fig.).
— maritima **4** : 100, 127; **5** : 31, 48, 60, 62; **7** : 42, 47; **10** : 280; **16** : 69.

[1] Per errorem L. palustris.

Matricaria maritima v. inodora **20** : 23.
— matricarioides **20** : 23.
— suaveolens **2** : 56; **4** : 225; **5** : 47, 60; **6** : 28; **10** : 37, 143, 144; **11** : 34; **12** : 35, 44; (**17** : 221); **19** : 150; **20** : 90.
— sp. **6** : 93.
Matthiola annua **3** : 26.
Maytenus magellanica **6** : 64.
Medicago falcata **4** : 213; **7** : 273; **11** : 117; **12** : 34, 165; **15** : 111, 129; **16** : 11, 12; **17** : 71; **20** : 126, 132, 138.
— — × sativa **3** : 35; **4** : 213; **10** : 66.
— lupulina **9** : 165; **10** : 142, 235, 281; **11** : 150; **12** : 35, 41, 112; **15** : 129; **16** : 11, 12; **19** : 40, 41, 102, 104; **20** : 63, 87, 126, 131, 138.
— sativa **4** : 213; **11** : 116; **15** : 111, 129; **19** : 70; **20** : 63, 87, 126, 132, 138.
— varia **10** : 66.
— sp. **9** : 19.
Melampyrum arvense **8** : 281; **10** : 241; **19** : 74.
— cristatum **2** : 64; **4** : 62; **5** : 58; **7** : 32; **9** : 22; **10** : 148, 278, 280, 409, 424, 432; **12** : 169; **19** : 74.
— — f., v. pallens **7** : 33, 36; **8** : 92; **20** : 118, 140.
— nemorosum **2** : 62, 64; **3** : 39, 135; **4** : 87; **5** : 13, 25; **10** : 275, 409, 432; **11** : 6; **12** : 35, 168; **14** : 31; **15** : 31, 102, 108, 134, 214; **17** : 34; **20** : 11, 51, 54, 57, 63, 74, 101, 114, 120, 140.
— — f. pallens **8** : 92.
— — f. roseum **8** : 93.
— — f. virens **20** : 74.
— pallens **1** : 25.
— pratense **2** : 52, 55; **3** : 29; **4** : 221; **5** : 58; **6** : 27, 29, 31, 43; **7** : 115; **8** : 25, 218; **10** : 58, 406, 423; **11** : 17, 148, 152; **12** : 113, 179; **13** : 4, 31; **14** : 53; **15** : 6, 31, 33, 99 . . . 108, 134; **16** : 5; **17** : 220; **18** : 120; **19** : 98; **20** : 23, 54, 56, 63, 74.
— — f. aureum **19** : 146; **20** : 74.
— — ad f. purpurea **8** : 272.
— silvaticum **2** : 42, 56; **3** : 29; **4** : 87, 221; **5** : 58, 65; **6** : 27, 29, 31, 43; **7** : 115, 122, 134, 136; **8** : 36, 218; **10** : 237, 406; **11** : 17; **12** : 43; **13** : 10, 13, 18; **14** : 112; **15** : 14, 102, 108, 134; **16** : 5; **18** : 120; **20** : 23, 55, 56, 62, 74, 101, 114.
— sp. **18** : 170.
Melandrium (-dryum) affine **10** : 202.
— album **4** : 208; **7** : 255; **9** : 179; **12** : 34, 40, 167; **13** : 98; **15** : 122; **16** : 10, 12, **17** : 40, 76; **18** : 66; **19** : 38, 65, 100, 108, 138, 147; **20** : 20, 51, 63, 69, 126, 129, 135.
— — × dioecum **7** : 255; **12** : 253; **18** : 66, 67; **19** : 38.
— dioicum (dioecum) **1** : 17; **4** : 174, 208; **5** : 46, 65; **6** : 27; **7** : 255; **10** : 233; **12** : 34, 70, 112; **13** : 9, 10, 13; **14** : 51; **15** : 8, 32, 122; **17** : 124; **18** : 119, 120; **19** : 38, 108.
Melandrium dioicum f. album **8** : 92, 93.
— rubrum **11** : 164, 165; **20** : 65, 85.
— — f. albiflorum **17** : 76.
— — v. lapponicum **20** : 85.
— silvestre **4** : 86, 89; **10** : 408.
— viscosum **11** : 55.
Melica ciliata **4** : 25—29, 142, 290; **7** : 43; **10** : 277; **17** : 145.
— nutans **1** : 98; **2** : 41, 42; **3** : 23; **4** : 86, 198; **5** : 39, 64, 114; **6** : 26, 112, 139; **7** : 32, 99, 121, 134, 136; **8** : 204, 260, 277; **10** : 229, 405; **11** : 16, 17, 22—24, 35, 163; **12** : 37, 65, 69, 168; **13** : 32; **14** : 6, 31, 49, 112; **15** : 8, 31, 32, 89, 102, 103, 119; **17** : 34, 39, 200; **18** : 32, 42, 98, 119, 120; **19** : 93, 99; **20** : 20, 51, 53, 63, 67, 101, 112, 117.
— uniflora **15** : 2, 274.
Melilotus albus **4** : 213; **8** : 201, 214; **9** : 165; **12** : 35, 41, 112, 118, 254; **15** : 111, 129; **16** : 11, 13; **17** : 343; **19** : 39, 70, (97), 110; **20** : 72, 126.
— altissimus **12** : 35; **15** : 129.
— arvensis **17** : 10.
— indicus **7** : 321; **11** : 116.
— officinalis **3** : 27; **4** : 213; **9** : 165; **15** : 111, 129; **16** : 11, 13; **19** : 97, 101, 110; **20** : 72, 126, 132, 138.
Mentha aquatica **3** : 35; **4** : 220, 221, 228 (mp.); **11** : 149.
— arvensis **2** : 56; **4** : 220; **5** : 57; **6** : 27; **7** : 114; **8** : 217; **9** : 180; **10** : 64, 158, 168; **12** : 35, 43, 113; **13** : 31; **15** : 132; **17** : 41, 81, 125, 233; **18** : 121; **19** : 102; **20** : 23, 62.
— — f., v. austriaca **3** : 29; **20** : 73.
— — f., v. vulgaris **3** : 29; **20** : 73.
— gentilis **5** : 30, 57; **10** : 64.
— gothica? **17** : 41.
— litoralis **10** : 181, 281.
— palustris **19** : 147.
— rotundifolia **3** : 128.
— sp. **10** : 65.
Menyanthes trifoliata **2** : 41, 52, 56; **3** : 29; **4** : 75, 76, 87, 102, 219; **5** : 56; **6** : 88, 164; **7** : 113; **8** : 25, 217; **9** : 108; **10** : 237, 406; **12** : 35, 43, 56, 140; **13** : 129; **14** : 52; **15** : 104, 109, 131; **16** : 8; **17** : 125, 137; **19** : 3, 93, 102, 198; **20** : 5, 11, 22, 34, 35, 40, 56, 62, 73, 120—124.
Mercurialis annua **19** : 71.
— perennis **4** : 91, 175, 214, 228 (mp.); **6** : 94; **8** : 233; **10** : 281, 409; **11** : 137; **12** : 35, 122; **15** : 28, 130; **17** : 54, 59; **18** : 34, 119, 120.
Mertensia maritima **4** : 100; **7** : 165; **8** : 272; **19** : 198; **20** : 31, 35, 45.
Mesembryanthemum sp. **6** : 86.

Mespilus calycina **18** : 136, 148, 181.
Microstylis monophyllos **2** : 40, 116.
Milium effusum **2** : 41, 63; **3** : 23; **4** : 197; **5** : 38, 64, 114; **6** : 4, 109, 112, 145; **7** : 32, 37, 39, 78, 98; **8** : 203, 260, 277; **10** : 98, 406; **11** : 137, 163; **12** : 33, 68; **13** : 13; **14** : 31, 49; **15** : 8, 28, 118; **17** : 34, 39, 196; **18** : 119, 120; **19** : 123; **20** : 53, 57, 67, 98, 106, 111, 112, 117.
Miltonia gattonensis **15** : 186.
Mimosa **3** : 19.
Mimulus luteus **15** : 133.
Minuartia biflora **19** : 198; **20** : 42.
— rubella **19** : 198; **20** : 40, 42.
Moehringia lateriflora **12** : 60; **17** : 76; **19** : 198; **20** : 43, 65.
— trinervis (-via) **1** : 17; **4** : 207; **5** : 45, 65; **6** : 27; **7** : 121, 130, 134, 136; **10** : 58, 232, 342—354; **11** : 148; **12** : 34, 40, 66, 68, 70, 71, 112; **15** : 8, 32, 123; **17** : 81, 124; **18** : 33, 44, 116, 119; **19** : 66; **20** : 21, 54, 70, 102, 106, 113.
Molinia coerulea **3** : 23; **4** : 71, 80, 81, 83, 198; **6** : 26; **7** : 99; **8** : 38, 204; **9** : 126; **10** : 275, 405, 408; **12** : 33, 37, 69, 110, 112, 132 . . . 141; **13** : 31, 129; **14** : 49, 111—115, 121, 122; **15** : 119; **16** : 63; **17** : 136; **19** : 93, 94, 100; **20** : 55, 62, 67.
— — f. arundinacea **3** : 23.
Moneses uniflora **20** : 22.
Monotropa hypophegea **10** : 281.
— hypopitys **2** : 55; **3** : 28; **7** : 112; **10** : 431; **12** : 179; **15** : 100, 131; **17** : 199; **19** : 72.
Montia fontana **8** : 22; **19** : 198; **20** : 33, 38.
— — ssp. lamprosperma **8** : 265.
— lamprosperma **2** : 16, 28; **3** : 25, 34, 56, 84; **4** : 207, 228 (mp.); **5** : 45; **7** : 105; **8** : 210; **10** : 157, 167, 172, 232; **11** : 157; **17** : 39, 42.
— — f. boreo-rivularis **7** : 320.
— rivularis **15** : 122; **17** : 123, 124, 136; **20** : 63, 105, 106.
— — ssp. lamprosperma **20** : 135.
Muehlenbergia pendula **17** : 55.
Mulgedium alpinum **2** : 41, 42; **8** : 274; **11** : 161; **12** : 141, 142; **14** : 118, 119, 122; **19** : 56.
— — f. albiflorum **13** : 171.
— sibiricum **8** : 274, 375; **12** : 142; **14** : 122; **15** : 137; **20** : 23, 64, 91.
— — f. runcinatum **14** : 122.
Musa paradisiaca **15** : 186.
Muscari botryoides **3** : 24; **12** : 14.
Myagrum perfoliatum **8** : 254—256.
Myosotis arenaria **3** : 29; **12** : 168.
— arvensis **2** : 24—25, 28; **3** : 73, 84; **4** : 219; **5** : 13, 24, 56; **6** : 27, 36; **7** : 48; **9** : 24; **10** : 164, 237, 413; **11** : 34, 39, 117; **12** : 35, 43, 175; **15** : 132; **17** : 81; **18** : 66, 121; **19** : 96, 102, 150, 189; **20** : 22, 63, 73, 88.
Myosotis baltica **4** : 4; **10** : 94, 96.
— — f. *caespitosiiflora* **4** : 4—5, 21.
— caespitosa **3** : 29; **4** : 4, 10, 219; **5** : 56; **7** : 114; **8** : 21; **9** : 180; **10** : 95, 96; **11** : 32, 34; **12** : 43, 73; **15** : 8, 33, 132; **17** : 81; **20** : 62, 73.
— collina **4** : 23, 175, 219; **5** : 56; **7** : 32; **9** : 14; **10** : 26, 34, 146, 147, 164, 172, 237, 280; **11** : 56; **12** : 33, 43, 145; **19** : 31, 32, 39, 41, 73; **20** : 146.
— hispida **8** : 374; **12** : 175.
— intermedia **2** : 56; **3** : 29; **7** : 114; **8** : 217; **18** : 34.
— laxa **1** : 15, 153—154; **4** : 4; **8** : 195; **10** : 94—96, 280, 428, 429; **17** : 199.
— — f. *caespitosiiflora* **1** : 15, 16, 153, 155.
— — ssp. caespitosa **20** : 22.
— micrantha **3** : 73—74 (fig.), 84; **4** : 220; **5** : 56; **10** : 25, 34, 146, 147, 164; **12** : 43, 113; **15** : 132; **17** : 27; **20** : 22, 73, 107.
— palustris **3** : 29; **7** : 114; **10** : 95.
— — ssp. eu-palustris **20** : 22.
— scorpioides **5** : 30, 56; **10** : 95; **11** : 30, 31, 34; **12** : 35, 73, 113; **13** : 11; **15** : 132; **17** : 125; **19** : 53, 96, 102; **20** : 22, 73.
— silvatica **3** : 29; **4** : 219; **8** : 272; **11** : 161; **14** : 53; **15** : 132; **19** : 46, 53, 73; **20** : (64), 88.
— — f. lactea **3** : 29.
— — f. parviflora **8** : 272.
— sparsiflora **4** : 290; **15** : 106, 111, 132; **19** : 37, 39, 98, 102.
— stricta **10** : 237; **19** : 189; **20** : 22.
— suaveolens **8** : 272.
— sp. **10** : 138, 370.
Myosurus minimus **3** : 26, 86; **4** : 91, 97; **5** : 46; **7** : 36, 37, 106; **8** : 41, 211; **10** : 17, 147, 163, 233, 274, 426, 427, 429; **15** : 124; **17** : 197; **20** : 21, 70, 106, 126, 136.
Myrceugenia fernandeziana **7** : 249.
— Schulzei **7** : 252.
Myrica gale **2** : 49, 54; **3** : 13, 129; **4** : 71 . . . 83, 173, 205; **5** : 212; **7** : 266, 271; **10** : 40, 258, 406; **11** : 139, [142]; **12** : 143, 164, 170, 180; **15** : 120; **17** : 76; **19** : 25, 198; **20** : 30, 34, 35, 37, 44.
Myriophyllum alternifiorum **3** : 28; **6** : 90; **8** : 216; **10** : 16; **14** : 52, 55; **15** : 106, 107, 129;[1] **17** : 80, 81; **18** : 102; **19** : 18; **20** : 61, 72.
— spicatum **2** : 41, 53, 55; **4** : 51, 53, 107, 216; **5** : 54; **7** : 274; **8** : 243; **10** : 289; **13** : 96; **14** : 109; **15** : 45, 194, 196; **17** : 44, 77, 78; **18** : 58; **19** : 42, 71; **20** : 139.
— verticillatum **3** : 28; **4** : 216, 221, 228 (mp.); **7** : 79, 274, 320; **8** : 280; **14** : 172; **15** : 45, 130, 196, 275; **17** : 34, 41; **20** : 6.
— sp. **5** : 69.

[1] Per errorem alternifolium.

Myrrhis odorata **3** : 35; **5** : 30, 54; **6** : 99; **8** : 280; **9** : 164.
Myrteola nummularia **7** : 253.
Myrtillus nigra **3** : 18; **5** : 6; **6** : 146; **7** : 126, 129; **11** : 163, 172; **14** : 44, 46; **18** : 37.
— uliginosa **5** : 6; **7** : 126, 129; **9** : 107, 108.
— sp. **18** : 34.
Myzodendron punctulatum **6** : 64.
— sp. **6** : 64.
Najas flexilis **6** : 90; **11** : 139; **17** : 43; **18** : 58.
— marina **5** : 115, 116; **7** : 165, 255, 269; **8** : 275, 374; (**10** : 289); **11** : 192; **13** : 96; **15** : 45, 93; **17** : 43—50 (mp.), 78, 191.
— tenuissima **10** : 277, 473, 474; **11** : 268; **12** : 254; **13** : 96; **14** : 171.
Narcissus poëticus **12** : 14.
Nardus stricta **3** : 23; **4** : 86, 199; **5** : 12, 16, 40; **6** : 26; **7** : 98; **8** : 203; **9** : 24; **10** : 156, 162, 167, 230, 406; **11** : 170, 171; **12** : 33, 110, 112; **14** : 49; **15** : 5, 108, 120; **16** : 8, 84; **17** : 136; **18** : 123; **19** : 100; **20** : 3, 20, 59, 68, 88, 105.
Narthecium ossifragum **9** : 157; **16** : 84.
Nasturtium amphibium **6** : 187; **7** : 272.
— anceps **8** : 374; **10** : 474.
— armoracia [**15** : 109].
— brachycarpum **19** : 137, 138; **20** : 124.
— officinale **17** : 234.
— palustre **3** : 26; **7** : 107; **8** : 212; **19** : 138.
— prostratum v. anceps **6** : 185—187 (fig.).
— silvestre **6** : 187.
— pyrenaicum **19** : 138.
Naumburgia thyrsiflora **4** : 218; **5** : 13, 24, 56; **9** : 180; **10** : 237; **11** : 154, 157, 160, 161; **18** : 123.
Nemophila insignis **3** : 29.
Neottia nidus avis **2** : 62, 116; **3** : 24; **4** : 204, 228 (mp.); **5** : 30, 43; **8** : 277; **9** : 237; **10** : 274, 275, 408; **11** : 146, 148; **12** : 14, 20; **15** : 214, 216.
Nepenthes sp. **15** : 186.
Nepeta cataria **15** : 133.
— glechoma **3** : 29; **7** : 114; **9** : 164.
Nertera depressa **7** : 253.
Nicotiana alata **3** : 29.
— rustica **3** : 29.
— tabacum **3** : 29.
Nigella damascena **3** : 26.
Nonnea pulla **9** : 179; **15** : 132; **20** : 22.
Nothofagus antarctica **6** : 63.
— betuloides **6** : 63, 64.
— pumilio **6** : 64.
Nuphar intermedium **10** : 63; **11** : 159.
— luteum **3** : 25; **7** : 106; **8** : 211; **9** : 237; **13** : 34, 96; **15** : 45, 106, 124, 274; **16** : 3; **17** : 78; **18** : 123, 124; **19** : 94, 101; **20** : 5, 9, 21, 61, 70.
— — f. tenellum **19** : 51.
— — × pumilum **10** : 63; **11** : 159.
Nuphar pumilum **4** : 174; **10** : 63, 281; **12**: 139; **17** : 40.
— sp. **6** : 79, [80]; **10** : 256, 258; **14** : 51.
Nymphaea adoena **19** : 198; **20** : 43.
— alba (**1** : 16); **3** : 25; **4** : 19, (208); **6** : 91; **10** : 63; **17** : 35, 40; **19** : 66.
— — f. rosea [**8** : 93].
— — ssp. candida **20** : 21. ,
— — × candida **4** : 19, 208; **10** : 63; **19** : 67.
— borealis **10** : 63.
— candida **1** : 16; **3** : 25, 26; **4** : 20, 83, 208; **5** : 46; **6** : 91; **7** : 106; **8** : 211; **10** : 16; **13** : 34; **15** : 45, 92, 106, 124, 196; **16** : 3; **17** : 40, 78; **19** : 94, 101; **20** : 5, 60, 61, 70.
— — × tetragona **19** : 67.
— fennica **8** : 211.
— tetragona **3** : 26; **9** : 238; **10** : 277; **17** : 40, 343.
— — f. colorata **3** : 26.
— — f. pusilla **3** : 26.
— sp. **4** : 110; **6** : 79, [80, 164]; **10** : 258, 259; **11** : 153; **18** : 154; **20** : 11.
Obione pedunculata **12** : 164.
Ochagavia elegans **7** : 251.
Odontites litoralis **7** : 37; **8** : 281; **10** : 158, 280; **12** : 25, 110; **15** : 217; **16** : 59 . . . 63; **19** : 74.
— rubra **3** : 29; **7** : 115; **9** : 164; **15** : 134; **16** : 59, 61; **17** : 81; **19** : 111; **20** : 129.
— — ssp. baltica **16** : 61.
— — ssp. verna **20** : 140.
— serotina **16** : 59—61; **20** : 62, 74.
— simplex **7** : 115; **10** : 409, 432.
— verna **5** : 58; **8** : 281; **12** : 43; **16** : 59—63, 66.
— — ssp. *baltica* **12** : 25, 110.
Oenanthe aquatica **7** : 274.
— phellandrium **15** : 211; (**20** : 64).
Oenothera biennis **8** : 201, 216; **15** : 111, 129; **16** : 15; **20** : 72.
— sp. **5** : 107.
Omphalodes linifolia **3** : 29.
Ononis arvensis **1** : 32, 79; **5** : 66, 101; **11** : 119; **17** : 54.
— hircina **12** : 165.
— repens **7** : 273; **9** : 165.
Ophrys muscifera **4** : 204; **10** : 281, 406; **12** : 168.
— myodes **2** : 62, 116.
— sp. **19** : 122.
Orchis cruentus **20** : 20.
— incarnatus **3** : 24; **4** : 204, 291; **8** : 38; **10** : 275, 408; **11** : 5, 121, 156; **12** : 25, 34, 69, 137, 173; **13** : 129; **14** : 116; **17** : 136; **18** : 2; **19** : 3, 4, 63; **20** : 20, (64), 135.
— — v. ochroleucus **12** : 34.
— — ssp. cruentus **10** : 408.
— latifolius **17** : 71.
— maculatus **3** : 24, 62; **4** : 83, 90, 204; **5** : 43; **6** : 26; **7** : 102, 126; **8** : 25, 206, 264;

10 : 231, 406, 416; **11** : 156; **12** : 34; **13** : 33; **14** : 50; **15** : 120; **16** : 83; **17** : 132, 136, 219, 223; **18** : 122; **19** : 3, 100; **20** : 20, 56, 63, 68, 105, 118, 119.
Orchis maculatus f. albiflorus **3** : 24.
— — f. angustifolius **8** : 264.
— — f. candidissimus **20** : 68.
— — f. concolor **3** : 24; **8** : 264; **19** : 63; **20** : 68.
— — f., v. sudeticus **14** : 50, 116; **19** : 48,
— — × Traunsteineri **10** : 416.
— masculus **5** : 66; **6** : 4, 145; **10** : 281, 408, 415—416, 431, 432; **12** : 111, 169, 173; **15** : 214.
— militaris **8** : 234; **10** : 231; **12** : 33, 167, 169.
— morio **12** : 169.
— palustris **17** : 71.
— sambucinus **1** : 13; **2** : 63; **4** : 87; **5** : 30, 32, 43, 64; **6** : 4, 110; **7** : 36, 37; **10** : 148, 408, 421, 422; **15** : 214.
— — f. albus **8** : 92.
— — f. purpureus **4** : 86.
— — f. ruber **1** : 13.
— Spitzelii **17** : 238, 239.
— strictifolius **20** : 20.
— Traunsteineri **10** : 281, 406, 416; **12** : 136; **14** : 116; **17** : 136; **20** : 68, 118, 122, 135.
— ustulatus **12** : 167—169.
Oreobolus obtusangulus **7** : 253.
Origanum vulgare **2** : 63; **4** : 23, 89; **5** : 57, 79; **6** : 110, 138; **7** : 32, 33; **10** : 29, 278, 280; **12** : 19, 21, 43, 168; **15** : 214; **17** : 54; **18** : 30, 133, 155, 178; **19** : 73; **20** : 49, 74.
— — f., flor. roseis **5** : 79.
— — f. pallescens **8** : 92; **20** : 74.
Ornithopus sativus **6** : 232; **8** : 201, 214; **13** : 33.
Orobus vernus **3** : 17; **4** : 291; **17** : 59; **18** : 132; **19** : 147.
— — f. albiflorus **19** : 147.
Oryza clandestina **1** : 34; **8** : 375.
Ostericum palustre **12** : 171.
Ouvirandra fenestralis **15** : 186.
Oxalis acetosella **1** : 17; **2** : 42, 55; **3** : 28; **4** : 88, 176, 214; **5** : 53, 65; **6** : 27 . . . 42, 48, 50, 51, 94; **7** : 68, 70, 78 (mp.), 81, 111, 130, 179; **8** : 215; **10** : 58, 235, 406, 409; **11** : 17, 144, 148, 152; **12** : 35; **13** : 13, 31; **14** : 6, 121; **15** : 8, 29, 31, 32, 101 . . . 105, 131, 233; **16** : 5; **17** : 34, 41, 59, 124; **18** : 33, 34, 44, 99, 119; **19** : 123; **20** : 22, 53, 54, 63, 73, 98, 100, 102, 107, 113.
— — [f. coerulea] **8** : 93.
— — [f. rosea] **8** : 93.
— — v. lilacina **12** : 72.
Oxycoccus microcarpus **3** : 35; **4** : 218; **13** : 36; **15** : 131; **17** : 41; **19** : 189, 198; **20** : 35, 73.
Oxycoccus microcarpus f. leucocarpus **12** : 17.
— — × quadripetalus **4** : 23.
— palustris **18** : 154; **19** : 3, 189.
— quadripetalus **2** : 52, 55; **4** : 218; **5** : 55; **12** : 17, 113; **13** : 36; **14** : 52; **15** : 6, 104, 131; **17** : 137; **19** : 93, 102, 198; **20** : 32, 36, 37, 62, 73, 124.
— — f. albus **8** : 92.
— sp. **4** : 19.
Oxyria digyna **8** : 265; **11** : 168; **14** : 51; **17** : 219, 233; **19** : 198; **20** : 40, 42.
Oxytropis campestris **9** : 142; **10** : 370, 473; **19** : 47, 204; **20** : 31—33, 42.
— — v. coerulea **19** : 198.
— — v. sordida **19** : 127.
— — ssp. — f. coerulescens **8** : 269.
— deflexa **12** : 63.
— pilosa **12** : 165.
— sp. **19** : 127.
Paeonia officinalis **12** : 194, 198, 199.
— — ssp. festiva **3** : 26.
— — ssp. peregrina **3** : 26.
Pandanus sp. **3** : 48.
Panicum crus-galli **15** : 59, 110, 118; **19** : 104, 107; **20** : 63, 125, 132, 134.
— miliaceum **15** : 59, 110, 118; (**19** : 97); **20** : 63.
— sanguinale **14** : 172.
— sp. **6** : 167—173 (fig.); **15** : 65.
Papaver dubium **3** : 26; **12** : 30; **16** : 11, 13.
— nudicaule **3** : 26; **5** : 13, 19, 28; **7** : 107; **20** : 86.
— orientale **3** : 26.
— radicatum **19** : 198; **20** : 42, 86.
— rhoeas **19** : 107, 108.
— somniferum **3** : 26; **7** : 107; **13** : 90; **18** : 66, 67; **19** : 107, 108.
— sp. [**9** : 190]; **12** : 63.
Paris polyphylla **17** : 166.
— quadrifolia **2** : 42; **3** : 24; **4** : 86, 203; **5** : 43, 64, 114; **6** : 4; **7** : 37, 102; **8** : 206; **10** : 98, 167, 231, 406; **11** : 17, 148, 156; **12** : 34, 39; **13** : 31, 32; **14** : 50; **15** : 32, 114; **17** : 34, 37, 219, 221; **18** : 33, 98, 119, 120; **19** : 49, 123; **20** : 19, 57, 66, 106, 112, 122.
Parnassia Kotzebuei **19** : 198; **20** : 32, 42.
— multiseta **19** : 198; **20** : 37.
— palustris **3** : 27; **4** : 175, 211; **5** : 30, 49; **6** : 93; **7** : 108; **8** : 212, 267; **10** : 370, 409; **12** : 34, 40, 111; **13** : 129; **14** : 51, 112, 121; **17** : 136, 138, 220; **19** : 68, 101; **20** : 21, 56, 65, 71, 113, 116—118, 120, 122, 137.
— — v. tenuis **8** : 21, 22.
Parthenocissus quinquefolia **15** : 110, 131.
Pastinaca sativa **5** : 13, 23; **12** : 35; **15** : [109], 111, 130; **19** : 110.
Patrinia rupestris **6** : 99.
Pedicularis euphrasioides **19** : 198; **20** : 31, 36, 40, 41, 44.

Pedicularis flammea **19** : 198; **20** : 42.
— groenlandica **19** : 196, 198.
— lapponica **8** : 272; **14** : 53; **17** : 220; **19** : 198; **20** : 42.
— opsiantha? **17** : 42.
— palustris **3** : 29, 76, 84; **4** : 80, 222; **5** : 13, 25, 59; **7** : 115; **8** : 218, 272; **9** : 108; **10** : 406; **12** : 43; **13** : 129; **15** : 134; **17** : 42, 137; **19** : 98; **20** : 40, 75, 120.
— — f. ochroleuca **3** : 29; **12** : 141; **13** : 129; **14** : 121; **19** : 147; **20** : 75.
— — ssp. eu-palustris **20** : 23.
— sceptrum carolinum **7** : 115, 274; **8** : 218, 272; **10** : 277; **11** : 161; **12** : 73; **14** : 53, 122; **17** : 220; **19** : 54, 74, 102, 204; **20** : 64, 140.
Peperomia sp. **7** : 254.
Peplis portula **2** : 55; **3** : 28; **4** : 175; **5** : 30, 54; **7** : 274; **19** : 70; **20** : 72, 138.
— sp. **9** : 18.
Pernettya mucronata **6** : 63.
— rigida **7** : 251, 253.
Petasites frigidus **3** : 78—79 (fig.), 84; **4** : 107; **8** : 273; **11** : 161; **12** : 136, 141; **14** : 53, 122; **17** : 129, 137; **19** : 55—56, 203; **20** : 76, 120, 122, 141.
— hybridus **15** : 136.
— niveus **8** : 234.
— officinalis **3** : 30.
— ovatus **12** : 19.
— spurius **15** : 51.
— tomentosus **11** : 147, 152.
Petroselinum sativum **3** : 28; [**15** : 109].
Peucedanum oreoselinum **8** : 235; **11** : 145, 147, 149.
— palustre **2** : 55; **3** : 28; **4** : 81, 87, 217; **5** : 55; **6** : 27; **7** : 112; **8** : 25, 216; **9** : 180; **10** : 236, 257; **11** : 32, 33, 39, 160; **12** : 42, 140; **13** : 13; **14** : 121; **15** : 130; **17** : 51, 76, 82, 125, 137; **18** : 123; **19** : 3, 102; **20** : 22, 62, 72.
Phaca frigida **8** : 269.
Phacelia tanacetifolia **2** : 14, 24, 28; **3** : 29, 84; **20** : 22.
Phalaris angusta **11** : 116.
— arundinacea **1** : 21, 33; **4** : 87; **9** : 144; **13** : 89; **15** : 118; **17** : 39, 135; **18** : 97; **19** : 47, 99; **20** : 67, 112.
— canariensis **15** : 110, 118; **19** : 108.
— caroliniana **11** : 116.
— intermedia **11** : 116.
Phaseolus multiflorus **3** : 27.
— vulgaris **3** : 27.
— — v. nanus **3** : 27.
Philadelphus coronarius **3** : 27; **15** : 109.
Philesia magellanica **6** : 65.
Phippsia algida **15** : 203, 205.
Phleum alpinum **8** : 260; **11** : 164; **12** : 136; **13** : 129; **14** : 49, 115; **17** : 219; **19** : 48, 99, 198, 203; **20** : 43, 83.
— — f. pallidum **17** : 76.
Phleum Boehmeri **4** : 197; **10** : 280, 281; **11** : 147, 150; **12** : 33, 37, 111, 165, 168; **15** : 213.
— nodosum **3** : 33; **4** : 197, 228 (mp.); **8** : 98, 374; **12** : 33, 111; **19** : 141.
— pratense **2** : 51, 54; **3** : 23, 52, 83; **4** : 197; **5** : 38; **6** : 26; **7** : 97; **8** : 98, 203, 308—311; [**9** : 184]; **11** : 164; **12** : 33, 37, 112; **15** : [109], 118; **16** : 14; **17** : 80, 82; **18** : 34, 66, 121; **19** : 38, 39, 48, 91, 99, 149, 198; **20** : 20, 63, 67, 83, 129.
— — f. nodosum **3** : 23; **15** : 118.
— — f. pseudonodosum **8** : 98.
Phlox subulata **1** : 44, 153.
Phoenix dactylifera **7** : 320.
— sp. **15** : 61, 65.
Phragmites communis **2** : [9], 41; **3** : 23, 41, 43; **4** : 53, 58, 198; **5** : 12, 15, 27, 39, 69, 137; **6** : 79, 91, [159]; **7** : [69, 70], 98, 235, 268, 269; **8** : 198, 204; **9** : [135], 180, 186; **10** : [12], 16, 51, 229, 258, 289, 294, 295; **11** : [20], 21, 22, 30—33, [142], 149, 217; **12** : 37, 112, 132 . . . 138; **13** : 34, 39, 96, 106, 129; **14** : 5; **15** : 45, 110, 119, 195, 196, 216, 229; **16** : 7, 62; **17** : 77, 78, 80, 81, 135; **18** : 123, 124, 154, 171; **19** : 3, 25, 68, 75, 93, 99; **20** : 5—7, 20, 62, 67, 112, 121—123.
— — v. flavescens **4** : 99.
— vulgaris **2** : 48, 52, 54; **7** : 127, 129.
Phyllodoce coerulea **6** : 146; **8** : 270; **11** : 231; **14** : 52, 65, 66, 67; **16** : 95; **17** : 214 (fig.), 215, 220; **19** : 53, 198; **20** : 25, 31, 33—35, 38—41, 44.
Phyteuma orbiculare **8** : 374.
— spicatum **6** : 231; **8** : 234; **11** : 146.
Picea abies **4** : [83, 86, 89], 196; **5** : 37, 64, [74]; **10** : 58; **12** : 33; **14** : 48; **18** : 118, 122; **20** : 19.
— alba **19** : 171.
— canadensis **20** : 25, 39.
— excelsa **1** : 10—11, 16, 153; **2** : 42, 52, 54; **3** : 22; [**4** : 112]; **6** : 26 . . . 41, 47 . . . 52, 88, [94], 124—128, 140, [148]; **7** : [5], 64, [68 . . . 73], 96, [167, 168, 178, 179, 196 . . . 231, 321]; **8** : [36, 63, 193, 194], 202, 229; [**9** : 19, 72 . . . 87, 106, 133, 186, 190, 191]; **10** : [20, 57, 97, 223, 224], 229, 343, [405, 407, 475]; **11** : 7, 16—19, 23—25, 34 . . . 39, [48, 50], 137, [141, 142, 146, 148, 155, 157, 158, 163], 164, [210]; **12** : 7, 53—56, 111, [[134 . . . 142, 174], 179, [185, 186], 187, 189; **13** : 13, 18, [31]; **15** : 5, 31, 32, [92 . . . 105], 113, 194, 214, 216, 224, 275; [**16** : 37 . . . 40, 94]; **17** : 59, 82, 83, 181, [190, 195]; [**18** : 32, 35, 36, 78, 80, 81, 116, 127]; **19** : [8], 93, 98, [145, 169, 171]; **20** : 25, [48], 53, 56, 59, [60], 62, 66, [105], 112, 116, 159—161, 165, 166.
— — 1. brevifolia **8** : 202.

Picea excelsa f. cubans **13** : 89.
— — l. glomerulans **13** : 17, 18 (fig.), 89.
— — f. medioxima l. viminalis **1** : 107 (fig.); 156.
— — f. tabuliformis **12** : 67.
— — f. virgata **8** : 202; **12** : 67; **13** : 16—17.
— — v. stolonifera **7** : 93.
— mariana **19** : 171; **20** : 25, 30, 36, 39, 44.
— sp. **9** : 26; **20** : 33 . . . 41, 44.
Picris hieracioides **15** : 111, 137; **16** : 12, 13; **17** : 35, 43, 71; **18** : 121, 122; **19** : 106, 112, 147; **20** : 55, 76, 111, 114 . . . 119, 128.
— — ssp. eu-hieracioides **20** : 141.
Pilularia globulifera f. natans **10** : 16—17, 473.
Pimpinella magna f. rosea **3** : 28.
— major **20** : 63, 107.
— saxifraga **2** : 52, 55; **3** : 28; **4** : 86, 216; **5** : 54; **6** : 27, 138; **7** : 95, 112; **8** : 216; **9** : 15, 24; **10** : 164, 236; **11** : 150; **12** : 35, 42, 113, 175; **15** : 102, 108, 130; **18** : 27, 28, 42, 66, 121, 178; **20** : 3, 22, 51, 57, 62, 72, 87.
— — f., v. dissecta **3** : 28; **7** : 112; **8** : 280; **19** : 71.
— — v. hircina **4** : 216; **5** : 54; **9** : 15; **10** : 164.
— sp. **9** : 188.
Pinguicula alpina **3** : 6; **6** : 90; **8** : 235, 273; **12** : 164, 165, 174, 180; **16** : 89, 92; **17** : 220, 225; **19** : 46, 54—55, 202.
— villosa **8** : 273; **11** : 161; **12** : 141; **14** : 122; **16** : 89; **17** : 220, 225; **19** : 54, 198; **20** : 33, 41.
— vulgaris **2** : 63; **4** : 222; **8** : 273; **9** : 108; **10** : 237, 281, 370, 404, 406, 409, 428, 429, 431, 432; **11** : 121, 153; **12** : 19, 20, 35, 43, 141; **13** : 129; **14** : 53, 122; **16** : 89; **17** : 137, 138, 220, 225; **19** : 54, 102, 198, 204; **20** : 23, 31, 33, 34, 39, 45, (64).
— sp. **20** : 40, 44.
Pinus laricio **10** : 397.
— montana **11** : 151.
— Murrayana **15** : 223.
— pinaster **8** : 298, 299, 302.
— sibirica **19** : 172.
— silvestris **1** : 16; **2** : [52], 54; **3** : [8, 9, 10, 12, 13], 22; **4** : 26, 68, [74, 83, 86, 89, 109, 1 2], 183, 196; **5** : 37, 64; **6** : 26 . . . 41, 47 . . . 52, [89, 94], 124—126, 140, 141; **7** : 64, [68—70], 96, 121 . . . 128, 136, [166—168, 196 . . . 229]; **8** : 40, [41, 187, 188, 193], 202, 226, 229, [233, 235]; **9** : [12, 15], 19, 26, [28, 72 . . . 85, 104 . . . 109, 178]; **10** : [20, 22], 167, [223], 229, 343, 397, [398], 406; **11** : [16, 17], 21, 22, [23], 33 . . . 39, [142, 145, 149 . . . 153, 210]; **12** : 33, 53, [54], 111, [123, 132, 166, 167, 174], 179, [185 . . . 192]; **13** : 9, [17], 18, [129]; **14** : 49, [64 . . . 70, 133]; **15** : 31, 32, [99 . . . 105], 106, 113, 193 (fig.), 214; [**16** : 8, 26, 37—40, 76, 77, 94]; **17** : [3—5], 80, 82, 84, 124, [183, 184, 200 . . . 209, 211, 215, 217—218 (fig.), 227—229]; **18** : [32, 35, 36, 43, 44, 116], 118, 122, [132, 154, 176]; **19** : [2], 3, [8], 93, 98, [168 . . . 179]; **20** : 3, 19, 53, 57 . . . 62, 66, [105], 106, [110], 124, 145, 159—161, 165—167.
Pinus silvestris f. gibberosa **13** : 112—116.
— — f. »monstrosa» **13** : 89.
— — f. rubra **20** : 106.
— — f. viminalis **1** : 9, 153.
— — f. virgata **1** : 9.
— — ssp. lapponica **14** : 113.
— strobus **6** : 127, 128.
Piptochaetium **7** : 251, 252.
Pirola vide Pyrola.
Pirus vide Pyrus.
Pisum sativum **3** : 27; **6** : 115 . . . 120; **13** : 99; [**15** : 109]; **19** : 107, 110, 149, 209.
— — ssp. arvense **3** : 28; **19** : 101.
Plantago aristata **6** : 182—183 (fig.).
— fernandezia **7** : 251.
— intermedia **16** : 63—67, 70.
— lanceolata **2** : 56; **4** : 87, 222; **5** : 59; **6** : 4, 27; **8** : 281; **9** : 164, 179; **10** : 58, 164, 168, 238, 413; **12** : 35, 43, 113; **13** : 99; **15** : 33, 134; **16** : 11, 13; **17** : 125; **18** : 26, 28, 121, 122, 135, 142; **19** : 40, 91, 102, 111; **20** : 3, 75, 89, 117, 127, 129.
— major **1** : 33; **2** : 26, 28, 56; **3** : 29, 84; **4** : 27, 127, 222; **5** : 13, 25, 28, 59; **6** : 27, 93; **7** : 115, 122, 133—137; **8** : 21, 218; **10** : 164, 237, 404; **11** : 15, 21, 31, 32, 34, 39; **12** : 35, 43, 113; **13** : 12, 13; **15** : 110, 134; **16** : 63—67, 70; **17** : 80, 81; **18** : 66, 97, 121, 122, 147; **19** : 40, 91, 96, 102, 150; **20** : 23, 62, 75, 89, 127, 129.
— — f. monstrosa **9** : 238.
— — v. agrestis **7** : 115.
— — v. asiatica **20** : 89.
— — v. intermedia **5** : 59; **10** : 158; **16** : 64.
— — v. — f. scopulorum **17** : 199.
— — v. scopulorum **7** : 115.
— maritima **1** : 33, 49—51; **2** : 49, 52, 56; **4** : 81, 84, 126, 222; **5** : 59, 115; **7** : 115, 122, 133, 135, 136, 163; **8** : 20, 21, 22, 46; **9** : 18; **10** : 158, 474; **12** : 44, 110; **13** : 14; **15** : 195, 217; **16** : 62, 67; **19** : 198; **20** : 31, 37.
— — v. glauca **19** : 198; **20** : 33.
— media **4** : 87, 222; **9** : 179; **10** : 238, 274, 409, 428; **11** : 150; **12** : 19, 20, 35, 43, 111, 167; **15** : 134, 213; **19** : 31, 40, 102; **20** : 23, 75, 117, 127, 129.
— psyllium **9** : 164, 165.
— Purshii **6** : 183—184 (fig.).
— ramosa **15** : 111, 134.
— scopulorum **16** : 64.

Plantago tenuiflora **4** : 143.[1]
— sp. **20** : 33, 37.
Platanthera bifolia **3** : 24, 63; **4** : 86, 204; **5** : 43; **6** : 145; **7** : 271; **8** : 206; **11** : 156; **12** : 69; **15** : 120, 214; **17** : 39, 200; **18** : 119; **20** : 68.
— chlorantha **1** : 5, 157; **3** : 129; **4** : 61, 86, 204; **5** : 43, 65; **7** : 33; **10** : 231, 241; **15** : 120; **19** : 63.
— montana **10** : 408.
Pleurogyne rotata **19** : 198; **20** : 31, 33.
Poa alpigena **14** : 49; **19** : 198; **20** : 83.
— — v. domestica **19** : 198.
— alpina **3** : 33; **4** : 100; **8** : 260; **11** : 167; **12** : 164; **14** : 49, 116; **16** : 93; **19** : 48, 198; **20** : 20, 32, 83, 134.
— — l. vivipara **3** : 23.
— alpina × arctica **9** : 143.
— angustifolia **4** : 199; **5** : 30, 39; **7** : 36, 37; **10** : 162; **15** : 213; **17** : 34, 39.
— annua **1** : 33; **2** : 54; **3** : 23; **4** : 199; **5** : 39; **6** : 26; **7** : 98, 121, 130, 131, 137; **8** : 204; **10** : 34, 144, 162, 229; **12** : 33, 38, 112, 176; **15** : 59, 110, 119; **17** : 67, 81, 124; **18** : 27, 28, 66, 97, 121, 122; **19** : 30, 39, 96, 100, 149, 198; **20** : 12, 62, 68, 125, 128, 129.
— arctica **19** : 198; **20** : 42.
— caesia **6** : 139; **7** : 88; **17** : 219, 222.
— Chaixii **10** : 474; **15** : 2; **19** : 62.
— compressa **2** : 54; **4** : 90, 149; **5** : 30, 39; **6** : 139; **7** : 37, 38; **8** : 43; **10** : 147, 229, 240, 274, 408, 428, 429; **11** : 57; **12** : 13, 20, 33, 38, 111, 112; **15** : 110, 119; **16** : 15; **17** : 10; **18** : 45—56, 66, 67; **19** : 38—41, 100, 108.
— eminens **19** : 198; **20** : 31, 33, 35, 39, 43.
— glauca **14** : 116; **19** : 48, 198, 200—206 (mp.); **20** : 40.
— irrigata **1** : 33, 48; **3** : 33; **4** : 199; **5** : 30, 39; **7** : 36, 37; **8** : 21, 22; **9** : 14; **10** : 156, 403, 428, 429; **12** : 33, 38, 171; **15** : 119; **17** : 10.
— nemoralis **3** : 23; **4** : 199; **5** : 39, 64; **6** : 26, 29, 30, 42, 48, 111; **7** : 121, 136; **8** : 204, 277; **11** : 21 . . . 26, 35, 39; **12** : 33, 38, 112; **13** : 13; **14** : 6, 7, 49; **15** : 8, 31, 32, 102, 119, 217; **16** : 5; **17** : 34, 39; **18** : 32, 119; **19** : 96, 100; **20** : 53, 67, 101, 106.
— — f. micrantha **7** : 99; **8** : 204.
— palustris **10** : 98; **12** : 33, 38; **14** : 49; **15** : 119; **17** : 39, 81, 124; **18** : 121; **19** : 98, 100; **20** : 63.
— pratensis **3** : 10, 23, 52, 83; **4** : 74, 85, 199; **5** : 39; **6** : 26, 139; **7** : 99, 121, 125, 134, 136; **8** : 204; **10** : 34, 58, 156, 162, 167, 229; **11** : 21 . . . 26, 33, 39, 150, 163, 164; **12** : 33, 38, 110, 112; **13** : 4, 13, 15, 16; **15** : 32, 119; **17** : 124, 136, 219, 222; **18** : 66, 119; **19** : 38, 39, 96, 100, 149; **20** : 3, 32, 57, 59, 63, 67, 83, 119, 125, 129.
Poa pratensis ssp. alpigena **12** : 136; **14** : 116; **19** : 48; **20** : 118, 121.
— — ssp. angustifolia **15** : 119.
— — ssp. irrigata **19** : 63.
— — ssp. subcoerulea **19** : 62.
— remota **2** : 41, 116; **12** : 65, 69; **14** : 116; **17** : 56, 59.
— rigens **6** : 232.
— serotina **3** : 23; **4** : 26; **6** : 139; **7** : 94, 99; **8** : 204; **18** : 42, 52; (**20** : 64).
— subcoerulea **12** : 38.
— sudetica (**20** : 64).
— trivialis **2** : 54; **3** : 23; **4** : 10, 198; **5** : 39; **6** : 26, 110; **7** : 94, 98; **8** : 24, 204; **10** : 167, 229; **12** : 33, 38, 110, 112; **15** : 32, 119; **17** : 123, 124, 136; **18** : 121; **19** : 39, 96, 100; **20** : 67.
— sp. **4** : 127; **15** : 274; **16** : 96; **20** : 32.
Polemonium boreale **20** : 22.
—campanulatum **11** : 164, 165; **12** : 140; **14** : 52, 121; **16** : 91; **17** : 211, 220; **20** : 88.
— coeruleum **3** : 29, 73(fig.), 84; **5** : 9, 13, 24; **7** : 113; **8** : 217; **9** : 24; **15** : 110, 132; **19** : 73, 102, 107, 110, 147; **20** : 22, 63, 139.
— — f. lacteum **19** : 73.
— — ssp. campanulatum **8** : 271.
— lanatum **20** : 22.
Polygala amara **6** : 93; **12** : 169; **19** : 189; **20** : 22, 65, 117, 118, 120.
— — ssp. amarella **20** : 139.
— amarella **4** : 86, 91, 214; **5** : 30, 53; **6** : 110; **8** : 38, 39, 65; **9** : 21, 24; **10** : 152, 157, 179, 235, 274, 275, 406, 409, 418 — 419, 429, 431, 432; **11** : 153; **12** : 16, 20, 21, 33, 42, 167, 168, 179; **17** : 54; **20** : 22, (64).
— comosa **4** : 3, 291; **10** : 281; (**20** : 64).
— vulgaris **2** : 23; **3** : 71, 84; **4** : 86; **5** : 30, 53; **8** : 195; **10** : 235, 241, 274, 275, 409; **11** : 150; **12** : 145; **15** : 131, 211; **17** : 132, 132, 137, 138.
— — f. albida **19** : 72.
— sp. **18** : 170.
— — formae **8** : 94.
Polygonatum mixtum **8** : 320.
— multiflorum **4** : 23, 86, 88; **5** : 30, 42; **6** : 110, 181; **7** : 32, 33, 37; **8** : 223, 321; **10** : 148, 408, 414 — 415, 431, 432; **11** : 146; **12** : 14, 22; **15** : 114, 214, (233); **17** : 54; **18** : 118, 119, 120.
— — × officinale **6** : 180 — 181; **8** : 320 — 321; **9** : 21, 176.
— — × — f. permultiflorum **9** : 21.
— odoratum **6** : 4; **20** : 19.
— officinale **3** : 24; **4** : 26; **5** : 42, 114; **6** : 139, 181; **7** : 101; **8** : 321; **11** : 27; **12** : 34, 39, 67; **15** : 110, 114; **17** : 11; **18** : 33, 42, 117 . . . 122; **19** : 126, 127, 147; **20** : 133.

[1] Per errorem tenuis.

Polygonum aequale **10** : 162; **20** : 85.
— alpinum **3** : 129.
— amphibium **2** : 54; **3** : 25; **5** : 13, 18; **10** : 232, 256, 258; **12** : 144; **13** : 11, 34, 90, 105; **14** : 51; **15** : 12, 45, 121; **17** : 39, 82; **18** : 123, 124; **19** : 18; **20** : 9, 11, 20, 60, 61, 69.
— — mf. aquaticum **20** : 69.
— — f. maculatum **19** : 50.
— — mf., f. terrestre **3** : 25; **4** : 73, 174; **12** : 39, 69; **15** : 110, 121; **16** : 14; **20** : 20, 69.
— aviculare **1** : 33; **2** : 55; **3** : 25; **4** : 68; **7** : 105; **8** : 21, 22, 210; **9** : 143; **11** : 30, 31, 33, 164, 165; **13** : 12; **14** : 51; **15** : 109, 110; **17** : 81, 163, 219, 222; **18** : 66, 121, 122; **19** : 30, 91, 96, 100, 198; **20** : 20, 62, 69, 125, 129.
— — f. litorale **2** : 50, 55; **15** : 121.
— — ssp. heterophyllum **15** : 121.
— bistorta **6** : 91; **12** : 14, 22, 23; **15** : 121; **17** : 136, 138; **19** : 76, 122, 189, 190; **20** : 20, (64), 112, 117 . . . 121, 135.
— calcatum **17** : 11.
— convolvulus **3** : 25; **4** : 206; **5** : 13, 18, 45; **6** : 27; **7** : 104, 121, 130, 133, 136, 137; **8** : 210; **9** : 164; **12** : 34, 39; **15** : 109, 121; **16** : 14; **18** : 34, 66, 121; **19** : 30, 38, 40, 91, 96, 100, 149, 198; **20** : 20, 62, 69, 85, 125, 129.
— dumetorum **4** : 23, 26, 174; **5** : 45; **7** : 33, 37; **8** : 210; **10** : 172, 431; **11** : 5, 24, 26, 27, 33, 37, 39; **12** : 114; **15** : 8, 121; **17** : 11, 196; **18** : 33; **19** : 32, 40, 65,
— fagopyrum **3** : 25; **9** : 164.
— foliosum **3** : 25; **5** : 115, 116, 212; **7** : 255; **9** : 238; **11** : 14—16; **17** : 61, 76.
— heterophyllum **4** : 10, 206; **5** : 44; **6** : 27; **10** : 18 (fig.), 232; **12** : 34, 39, 112; **19** : 149.
— — v. boreale **20** : 85.
— — v. litorale **4** : 206; **5** : 44; **12** : 39, 110, 112.
— hydropiper **2** : 54; **3** : 25; **4** : 206; **5** : 44, 115; **6** : 27; **7** : 105, 130; **8** : 210; **11** : 15, 31—33; **12** : 112; **15** : 13, 121; **17** : 39, 81, 124; **18** : 123; **20** : 69.
— lapathifolium **3** : 8, 25; **4** : 291; **7** : 104; **8** : 210; **17** : 81; **19** : 30, 40, 100; **20** : 69, 85, 125, 129.
— — f., v. incanescens **4** : 68, 74.
— — f. incanum **7** : 104.
— — ssp. pallidum **20** : 20.
— — ssp. tomentosum **20** : 20, 69.
— minus **2** : 55; **3** : 25; **4** : 206; **5** : 30, 44; **6** : 27; **7** : 104; **11** : 15, 31—33; **15** : 110, 121; **18** : 123; (**19** : 97); **20** : 69.
— nodosum **5** : 13, 18; **7** : 35; **12** : 34, 112; **13** : 19, 21; **15** : 121.
Polygonum oxyspermum **10** : 279; **11** : 5; **12** : 144; **13** : 7, 20; **15** : 121.
— persicaria **1** : 82; 157; **7** : 38; **10** : 142; **12** : 112; **16** : 14; **19** : 148, 149.
— Raji **2** : 16; **3** : 38, 84, 135; **4** : 21, 22, 61, 206; **7** : 35, 40, 256; **9** : 22, 177, 222; **11** : 5; **12** : 144.
— tomentosum **2** : 28, 50, 54; **4** : 10, 206; **5** : 44; **6** : 27; **7** : 35, 47; **9** : 143; **10** : 18 (fig.), 19, 145; **11** : 33; **12** : 34, 112; **13** : 12; **15** : 121; **16** : 14; **17** : 80; **18** : 121.
— — f. incanum **15** : 121.
— viviparum **3** : 6, 25; **4** : 100, 206; **5** : 30, 44; **7** : 104; **8** : 37, 210; **10** : 232, 370, 406, 408; **11** : 64; **12** : 165, 166; **14** : 51, 117, 121; **15** : 108, 121; **17** : 136, 138, 219, 221—224; **18** : 119; **19** : 93, 96, 100, 198; **20** : 20, 31—34, 40, 69, 116—119, 122.
— sp. **6** : 93; **9** : 188.
Populus alba **3** : 25.
— balsamifera (balsamea) **12** : 22; **20** : 159—161, 164—168.
— tremula [**1** : 35] (cecid.); **2** : 52, 54; **3** : 25; **4** : [87], 204; **5** : 43, 64; **6** : 26, 47, [94], 124—126, 140, 231; **7** : [32], 102, 126, 127, 134; **8** : [29], 37, 52, 69, 71, [193—195], 207; **9** : 25, [133], 186; **10** : [98], 231, 236, [387]; **11** : [16], 17, 21—23, 33 ... 39, [142]; **12** : [7, 8], 9, [11], 34, 39, 112, 168, 187, 193; **13** : 9, [31]; **14** : 6, 50; **15** : 31, 32, [99], 100, 101, 121, 214, 216; **17** : 80, 82, [183, 195, 217]; **18** : 29, [32, 35], 110, [116], 118, [126, 132 . . . 179], 181; **19** : 93, 100, [145]; **20** : 20, [50], 54, 59, 62, 69, 99, [102, 105], 106, 109, 112, [145[, 159—161, 166—168.
— — f. pubescens **4** : 99.
— — f. sericea **7** : 102; **8** : 207.
— — f. villosa **4** : 98—99; **19** : 64.
— sp. **6** : 127, 128; **7** : 126; [**9** : 84]; **15** : 109; [**17** : 26].
Posidonia **4** : 183.
Potamogeton alpinus **3** : 22; **4** : 197; **5** : 146; **7** : 97; **8** : 203; **9** : 20; **13** : 32; **14** : 49; **15** : 30, 106, 114; **17** : 37; **20** : 63, 133.
— — × natans **1** : 74.
— compressus **2** : 41, 116; **4** : 291; **6** : 231; **20** : 9.
— crispus **15** : 211; **19** : 18—20, 305.
— filiformis **4** : 53, 60, 197; **5** : 37; **10** : 229; **12** : 112; **15** : 93, 194.
— — × pectinatus **9** : 177.
— gramineus **1** : 16, 73, 74; **4** : 197; **5** : 30, 37; **10** : 229; **12** : 33, 37, 254; **14** : 49; **15** : 106, 107, 114; **17** : 37, 80, 81; **18** : 123, 124; **19** : 94, 98, 198; **20** : 9, 19, 45, 61, 66, 133.
— — f. Wolfgangii **17** : 76.
— — × lucens **10** : 66; **14** : 113; **20** : 133.
— — × natans **1** : 71; **10** : 66.

Potamogeton gramineus × perfoliatus **17** : 76.
— lucens **13** : 96; **17** : 34, 36; **20** : (64), 133.
— marinus **4** : 82.
— mucronatus **10** : 280.
— natans **1** : 71, 73; **2** : 50, 54; **3** : 22; **4** : 20, 75, 76, 83, 197; **6** : 79; **7** : 96; **8** : 203; **10** : 239, 256, 258; **12** : 164; **13** : 34, 105; **15** : 46, 47, 106, 114; **17** : 37; **18** : 123, 124; **19** : 94, 99; **20** : 5, 63, 133.
— Oakesianus **19** : 198; **20** : 43.
— obtusifolius **6** : 2; **7** : 79; **15** : 114; **19** : 123, 190; **20** : 9.
— panormitanus **3** : 32; **4** : 173; **10** : 239; **13** : 96; **14** : 171; **15** : 47; **17** : 44, 47, 77; **18** : 58, 102, 103.
— — v. minor **15** : 107, 114.
— pectinatus **4** : 51, 72, 82, 196; **5** : 37; **7** : 97; **10** : 229; **11** : 192; **12** : 37; **15** : 45, 107, 114, 194; **17** : 78; **18** : 57, 60.
— perfoliatus **3** : 22; **4** : 53, 56, 197; **5** : 12, 14, 37; **6** : 91; **7** : 79 (mp.), 82, 97; **10** : 204, 205, 210, 289; **11** : 30; **12** : 164; **13** : 34, 96; **14** : 49; **15** : 30, 45, 106, 107, 114, 194; **17** : 36, 44, 77, 78; **18** : 102, 103, 123; **19** : 18, 94, 98; **20** : 9, 19, 61 66, 133.
— polygonifolius **1** : 71—75, 157; **7** : 179, 182, 192; **10** : 280.
— praelongus (**1** : 16); **10** : 239; **12** : 132; **14** : 113; **19** : 59; **20** : 63.
— pusillus **4** : 20, 173; **7** : 79, 97; **8** : 203, 275; **12** : 67, 112, 254; **13** : 34; **15** : 45, 46, 106, 114; **17** : 34, 37, 44; **20** : (64), 133.
— rutilus **8** : 375; **11** : 268; **12** : 254; **14** : 171; **20** : 133.
— sparganiifolius **10** : 66.
— vaginatus **5** : 78; **18** : 56—57, 61; **19** : 59.
— — v. canadensis **18** : 57.
— Zizii **10** : 66.
— zosterifolius **6** : 1—3; **20** : (64), 133.
— sp. **4** : 110; **6** : 79, 80; **9** : 19; **11** : 217; **17** : 129.

Potentilla anserina **1** : 33; **2** : 51, 55; **3** : 27; **4** :17, 18, 20, 66 . . . 84, 212; **5** : 50, 70, 115; **6** : 27; **7** : 35, 82, 109; **8** : 20—22, 213; **10** : 145, 157, 234, 403, 412; **11** : 15, 33, 39; **12** : 34, 41, 112; **15** : 110, 127, 195, 217; **16** : 57—59; **17** : 82; **18** : 97; **19** : (97), 147, 198; **20** : 21, 31, 37, 43, 62, 71.
— — f. groenlandica **4** : 17.
— — f. paucijuga **4** : 17.
— — f. sericea **4** : 213; **20** : 21.
— — ssp. Egedi **4** : 290; **8** : 268; **17** : 198.
— — × Egedi **4** : 18, 19.
— arenaria **11** : 147.
— argentata **9** : 6.
— argentea **1** : 35 (cecid.); **2** : 55; **3** : 27, 64, 84; **4** : 26, 212; **5** : 13, 21, 28, 50; **6** : 27, 138; **7** : 109; **8** : 213; **9** : 2—13, 238; **10** : 58, 147, 163; **11** : 7, 55, 56; **12** : 34, 41, 112, 114, 145; **13** : 10, 11; **15** : 88, 127; **16** : 14, 54—57; **17** : 28, 29, 41, 82; **18** : 25, 26, 28, 42, 66, 123, 270; **19** : 31, 39, 95, 149, 305; **20** : 3, 22, 71. 126, 146.
Potentilla argentea f. subincanescens **9** : 2.
— — v. incanescens **9** : 2, 3, 6.
— — v. perdivisa **9** : 6.
— — v. perincisa **9** : 6.
— — v. tenerrima **9** : 8.
— — ssp. impolita **19** : 95, 101.
— Besseana **9** : 10.
— bifurca **2** : 36, 116; **3** : 128; **4** : 290; **8** : 375.
— calabra **9** : 8.
— canescens **20** : 22.
— cinerea **9** : 3.
— *collina* **15** : 274.
— Crantzii **4** : 175, 212; **5** : 50; **9** : 14, 15; **10** : 147, 163, 234; **12** : 41, 111, 112, 167, 168; **15** : 127; **16** : 14; **17** : 215, 220, 221, 224; **19** : 109, 198.
— — v. ternata **11** : 167, 169; **14** : 51.
— *decora* **16** : 54—57 (fig.).
— Egedii **4** : 11, 17—20, 23, 24, 100; **7** : 35; **10** : 279; **11** : 6; **12** : 145; **16** : 57—59.
— erecta **2** : 51, 55; **4** : 212; **5** : 50; **6** : 27, 93; **8** : 25; **9** : 24, 180; **10** : 58, 157, 167, 234, 406, 413; **11** : 36, 37, 39; **12** : 34, 41, 69, 110, 112, 168; **13** : 4, 17; **15** : 5, 6, 32, 89, 108, 127; **16** : 8, 63; **17** : 125, 126, 132, 137; **18** : 20, 119; **19** : 93, 95, 101, 150; **20** : 2—4, 21, 51, 54 . . . 59, 62, 71, 113, 117, 118, 120, 128.
— erecta × procumbens **20** : 2—4.
— — × reptans **4** : 18; **13** : 5, 6.
— fruticosa **3** : 27; **4** : 143; **12** : 180, 185 . . . 189.
— Goldbachii **7** : 85, 258; **9** : 179; **18** : 52.
— grandiceps **9** : 10.
— impolita **9** : 2—13, 238; **11** : 7; **12** : (41), 112, 114, 145; **13** : 14; **15** ; 88, 127; **16** : 54, 56; **17** : 41; **18** : 42; **19** : 31, 39, 69; **20** : 71.
— — ssp. *acutifida* **16** : 54, 56—57 (fig.).
— intermedia **8** : 213; **10** : 50; **11** : 117; **13** : 99; **15** : 110, 127; **16** : 15; **19** : 39, 43, 101, 106, 109, 189; **20** : 71.
— — v. Heidenreichii **19** : 69.
— minor **12** : 167, 168.
— multifida ssp. lapponica **20** : 86.
— nivea **8** : 268; **10** : 202; **17** : 220, 225; **19** : 52, 198; **20** : 40.
— norvegica **3** : 27, 63—64, 84; **4** : 10; **5** : 13, 21, 28; **6** : 27; **7** : 109, 130; **8** : 213; **10** : 46—51, 142; **11** : 164, 165; **12** : 145; **13** : 99, 100; **15** : 127; **16** : 14, 15; **17** : 81, 220, 224; **18** : 121; **19** : 39, 52, 69, 91, 101, 147, 150; **20** : 22, 40, 71, 86, 126, 129.
— — v. labradorica **19** : 198.

Potentilla palustris **13** : 9—11; **20** : 22.
— procumbens **13** : 4—6; **20** : 2—4.
— — × reptans **4** : 18.
— pulchella **4** : 49—50 (fig.), 290.
— recta **15** : 127.
— — v. pilosa **8** : 18, 374.
— reptans **4** : 86, 87, 212; **10** : 58, 275—277, 406, 409; **12** : 34, 41, 112; **13** : 6; **19** : 69.
— sericea **1** : 34; **7** : 86; **20** : 253.
— sibirica **6** : 138, 141, 142.
— supina **7** : 321; **10** : 49, 50.
— — v. cicutariifolia **19** : 42, 43.
— Tabernaemontani **3** : 33; **4** : 212; **10** : 33, 34, 199, 223, 234, 275, 281; **12** : 41; **13** : 6.
— tenuiloba **9** : 10.
— tephrodes **9** : 6.
— thuringiaca **15** : 111; **16** : 99; **19** : 109.
— — v. elongata **15** : 127.
— — ssp. Goldbachii **7** : 158.
— tormentilla **3** : 27; **4** : 76, 81, 83; **7** : 95, 109; **8** : 213, 269; **11** : 121; **13** : 129.
— verna **3** : 27; **7** : 109; **8** : 213; **19** : 147.
— — v. sabauda **8** : 268.
— sp. **4** : 127; **10** : 64.

Primula auricula **3** : 29.
— egaliksensis **19** : 198; **20** : 32, 34, 42.
— farinosa **2** : 61; **4** : 86, 218; **5** : 55; **6** : 91, 93; **8** : 21; **10** : 149, 152, 179, 180, 223, 229, 231, 235, 236, 276, 277, 404, 406, 409; **11** : 153; **12** : 13, 17, 20, 21, 35, 42, 110, 111, 167, 171; **15** : 215, 216; **18** : 27, 28, 132, 179.
— floribunda × verticillata **10** : 37.
— Laurentiana **19** : 198; **20** : 31, 33, 39, 40.
— officinalis **3** : 29; **9** : 164.
— sibirica **5** : 78; **11** : 229; **16** : 71.
— sinensis **8** : 86—88; **12** : 199.
— stricta **17** : 220, 221; **19** : 198; **20** : 42.
— veris **3** : 39, 135; **4** : 23, 86, 218; **5** : 55, 65; **6** : 4, 111; **7** : 33; **8** : 277; **10** : 148, 168, 223, 229, 231, 236; **12** : 35, 42, 167, 168; **15** : 60, 112, 131, 215; **17** : 11, 54, 198; **19** : 189; **20** : 65.
— sp. **6** : 93; **20** : 40.

Prionotus myrsinites **6** : 65.
Prunella (Brunella) grandiflora **8** : 235.
— vulgaris **2** : 25, 28, 56; **3** : 29, 84; **4** : 220; **5** : 13, 24, 57; **6** : 27; **7** : 114; **8** : 218; **10** : 58, 158, 164, 168, 237, 406; **11** : 34, 39; **12** : 35, 43, 110; **13** : 10, 33; **15** : 6, 108, 133; **17** : 81, 125; **18** : 26, 28, 120; **19** : 40, (97); **20** : 3, 23, 54 . . . 62, 74, 89, 111, 114, 116—118, 128, 129.
— — f. alba **8** : 92.
— — f. leucantha **19** : 74; **20** : 74.
— — v. parviflora **3** : 29; **4** : 175.

Prunus cerasus **18** : [27], 177, 181.
— padus **3** : [10, 12], 27; **4** : [86], 213; **5** : 51, 64; **6** : 27, 136, 140; **7** : [32], 78 (mp.), 81, [93], 102, 110; **8** : 200, 214, 269; **9** : 24, 133, 177; **10** : 2, [97], 235; **11** : 19, 24—27, 96—97, 150, 155, 156, 158, 174—188; **12** : 8, 9, 34; **14** : 52, [64]; **15** : 29, 32, [100, 101], 128, 214; **17** : 34, 82, 181, [195, 217], 220, [228]; **18** : 29, [32 . . 44], 110, 111, 118, 120, 136, 148, [149, 172], 177, 181; **19** : 98, [147], 150; **20** : 8, 22, 52, 63, 72, 102, 106, 113, 114, 117, 118.
Prunus padus f. rosea **19** : 70.
— silvestris **11** : 176.
spinosa **2** : 62; **4** : 87; **10** : 235, 276, 408; **11** : 7; **12** : 16, 20; **18** : 132, 136, 148, 152, 165, 166, 171, [172], 176, 181.
— sp. **15** : 109.
Psamma arenaria **2** : 4, 111, 116; **3** : 9, 16; **12** : 126, 153, 173; **17** : 54.
Pseudotsuga Douglasii **15** : 223.
Puccinellia distans **5** : 39; **15** : 110, 119; **17** : 11; **20** : 125, 134.
— maritima **6** : 103; **12** : 171.
— phryganodes **4** : 100; **5** : 77—78, 212; **6** : 232; **8** : 260; **14** : 172; **18** : 57, 58; **19** : 199; **20** : 33.
— retroflexa **2** : 49, 54; **4** : 199, 228 (mp.); **5** : 30, 40; **7** : 38; **8** : 260; **9** : 126; **12** : 110; **15** : 191; **17** : 196.
— sp. **4** : 100; **19** : 198; **20** : 39.

Pulmonaria officinalis **4** : 91, 176; **7** : 258; **8** : 195; **10** : 277; **11** : 6, 137, 148; **12** : 14, 18, 22, 23, 172; **15** : 7, 8, 132, 233; **17** : 11, 181; **18** : 44, 120; **19** : 73; **20** : 48 . . . 54, 73, 100, 102, 103.

Pulsatilla patens **1** : 25; **8** : 233; **11** : 147; **19** : 126, 127, 189.
— — × pratensis **14** : 171.
— — × vernalis **6** : 232.
— pratensis **3** : 59—60, 84; **4** : 208, 219, 228 (mp.); **8** : 233; **10** : 177; **11** : 147; **12** : 111, 179; **18** : 143.
— — × vernalis **11** : 268.
— vernalis **6** : 232; **9** : 238; **12** : 254; **15** : 112, 124; **19** : 66, 127.
— — f. rubella **12** : 254.
— — sp. **19** : 120, 126 182.

Pyrola (Pirola) chlorantha **2** : 50, 55; **3** : 28; **4** : 217; **6** : 27; **7** : 274; **8** : 217; **10** : 406; **11** : 152, 153; **12** : 68, 69, 72, 179; **14** : 121; **17** : 35, 198; **19** : 147; (**20** : 64).
— grandiflora **19** : 199; **20** : 42.
— media **1** : 58—61, 157; **3** : 28; **4** : 91; **6** : 27; **7** : 35, 112; **8** : 216; **10** : 406, 423; **15** : 131; **17** : 41, 198; **18** : 122; **19** : 72, 147; (**20** : 64).
— minor **2** : 42; **3** : 28; **4** : 217; **5** : 55; **6** : 27; **7** : 112; **8** : 216; **10** : 236; **12** : 35, 68; **13** : 31; **14** : 52; **15** : 131; **17** : 137, 199, 220; **18** : 119; **19** : 94, 102, 199; **20** : 34, 39, 54, 73.
— rotundifolia **2** : 42; **3** : 28; **4** : 217; **6** : 4, 27; **7** : 112; **8** : 217; **10** : 406; **12** : 72; **14** : 52, 113; **15** : 131; **17** : 137; **18** : 119; **19** : 98; **20** : 22, 56, 57, 63, 73, 113.

Pyrola rotundifolia f. monstr. **13** : 169.
— secunda **2** : 42, 55; **3** : 28; **4** : 217; **5** : 55; **6** : 27, 29, 30, 43, 48; **7** : 112, 130, 179; **8** : 217; **10** : 58, 406; **11** : 17; **13** : 17, 31; **14** : 52, 113; **15** : 101, 105, 131; **17** : 137, 220; **18** : 119; **19** : 94, 102, 199; **20** : 39, 73, 111, 113.
— — v. obtusata **19** : 199.
— umbellata **2** : 42, 50, 55; **3** : 28; **4** : 217; **5** : 55; **6** : 27, 29, 30, 43, 48; **7** : 112, 130, 179; **8** : 217; **10** : 58, 406; **11** : 17; **13** : 17, 31; **14** : 52, 113; **15** : 101, 105, 131; **17** : 199.
— uniflora **2** : 55, 61; **3** : 28; **4** : 88, 217; **5** : 55; **7** : 112; **8** : 216; **10** : 58, 406; **11** : 152, 153, 155; **14** : 52; **15** : 131; **18** : 122; **19** : 98, 199; **20** : 22, 35, 39—41.
— sp. **11** : 149; **18** : 34.
Pyrus (Pirus) aucuparia **3** : 27.
— communis **1** : 36; **11** : 150; **12** : 169.
— — v. achras **8** : 235.
— malus [**2** : 62]; **3** : 27; **4** : 21, 61, [86]; **5** : 50; **6** : 128; [**7** : 3, 4]; **10** : 167, 241, 408, [475]; **11** : 150; **12** : 168, 187, 188; **13** : 110—112; **14** : 135—138; **17** : 86, [277—279 (fig.)]; [**18** : 164 . . . 182]; **19** : (97), 107, 109, 150; **20** : 165.
— — ssp. silvestris **12** : 169; **15** : 214.
— paradisiaca f. pumila **8** : 214.
— prunifolia **3** : 27.
— sp. **20** : 159—161, 167.
Quercus pedunculata **1** : 35, 149; [**2** : 5—8, 10, 11, 34]; **5** : [94], 128; **6** : [89], 124, 127, 128, [232]; [**7** : 35]; **8** : 36, 52, 69, 70, 75; [**9** : 92, 133, 185 . . . 191]; **12** : 168, 186—189, 190, 191, 193; **14** : 133; **15** : 214, 216; **17** : 7, 11; **18** : 110.
— robur **3** : 25; **4** : 91, 174 (206); **5** : 44; **8** : 277; **10** : [21, 24], 408; **11** : 118, [142], 146, [148—150]; **12** : [6—11], 39, 112, [145, 146], 169, 172; **15** : [109], 120; **17** : 54, 85, [195], 196; **18** : [3, 28, 79, 126 . . . 182], 183.
— sp. **8** : 229, [233, 234]; **9** : 25, 26; **20** : 103, 159—161, 165—167.
Radicula palustris **4** : 10, 210; **5** : 13, 20, 28; **6** : 27; **11** : 32, 34; **14** : 51; **18** : 123; **19** : 199; **20** : 86.
— silvestris **12** : 34.
Radiola linoides **12** : 164.
Ramischia secunda **12** : 179.
Ranunculus acris (acer) **1** : 48; **2** : 17—18, 28, 55; **3** : 26, 59 (fig.), 60, 84; **4** : 209; **5** : 13, 19, 47; **6** : 4, 27; **7** : 107; **8** : 211; **10** : 138, 157, 163, 167, 233, 406; **11** : 33 . . . 39, 164, 169; **12** : 34, 40, 110, 112; **13** : 10, 16, 33; **14** : 51, 121; **15** : 6, 32, 108, 109, 124, 203, 209; **16** : 8, 45; **17** : 124, 136, 220, 221; **18** : 26, 27, 28, 98, 119; **19** : 40, 96, 101, 199; **20** : 3, 21, 50, 51, 54 . . . 59, 63, 70, 99, 128, 129.
Ranunculus acris f. micranthus **14** : 118.
— — f. pleniflorus **13** : 171; **19** : 66.
— — velutinus **20** : 21.
— — ssp. Boraeanus **20** : 21.
— — ssp. propinquus **8** : 267; **14** : 51; **17** : 136.
— — ssp. Stevenii **20** : 21.
— Allenii **19** : 199; **20** : 42.
— *altior* **16** : 47, 48, 51—53 (fig.).
— aquatilis **12** : 40.
— arvensis **6** : 231; **9** : 165.
— auricomus **1** : 48; **3** : 26; **4** : 209; **5** : 46; **6** : 4, 27, 110; **7** : 107; **8** : 211; **9** : 24; **10** : 63, 138, 157, 163, 167, 233, 406; **11** :33, 39, 164, 165; **12** : 34, 40, 112, 167, 222, 238; **13** : 9, 10, 15, 16; **14** : 7; **15** : 32, 124; **16** : 45—49 (fig.); **17** : 40, 124, 136, **18** : 33, 99, 119, 270; **19** : 39, 101, 305; **20** : 3, 21, 54, 57, 63, 70, 105, 106, 117, 118, 146.
— — forma **4** : 290.
— — f., v. incisifolius **16** : 47, 48.
— — v. fallax **7** : 107; **10** : 63; **15** : 124; **16** : 46, 47.
— — × cassubicus **3** : 34; **10** : 63; **16** : 48.
— Baudotii **4** : 21; **10** : 233; **19** : 66.
— — ssp. fluitans **2** : 55.
— — ssp. marinus **5** : 47; **7** : 29; **10** : 181.
— borealis **17** : 136; **19** : 50.
— — v. glabriusculus **19** : 50.
— bulbosus **3** : 60, 84; **4** : 209; **5** : 47; **6** : 110; **8** : 278; **10** : 138, 163, 233, 241, 408; **12** : 34, 40, 167, 168.
— cassubicus **10** : 63, 233, 275, 408, 416—417; **12** : 15, 20, 172; **13** : 13; **15** : 124, 215; **16** : 45 . . . 48, 52; **17** : 11, 54.
— circinatus **10** : 281; **12** : 254; **13** : 8, 96; **15** : 48, 196; **17** : 47.
— confervoides **15** : 106, 124; **17** : 44, 343; **18** : 103.
— cymbalaria **15** : 23; **18** : 57; **19** : 199; **20** : 31—33, 37.
— fallax **16** : 46, 52, 53 (fig.); **19** : 305; **20** : 65, 70, 106.
— ficaria **4** : 86, 91; **5** : 47, 65; **7** : 258; **8** : 78, 278; **10** : 233, 408, 417; **11** : 4; **12** : 15, 167; **13** : 13, 14; **15** : 124, 274; **17** : 54, 197; **19** : 66.
— flammula **2** : 55; **3** : 26; **4** : 208; **5** : 46; **7** : 106; **8** : 25, 211; **10** : 138, 233, 406; **12** : 40, 70; **15** : 123; **17** : 124; **18** : 26, 28; **19** : 40; **20** : 70.
— — f. gracilis **7** : 106.
— — v. radicans **4** : 208; **11** : 6.
— — ssp. reptans **2** : 55; **3** : 26; **20** : 21.
— Hegetschweileri **16** : 53.
— hyperboreus **8** : 267; **11** : 158; **12** : 139; **14** : 118; **16** : 89; **19** : 50, 98, 199.
— lanuginosus **11** : 145, 146; **15** : 33.
— lapponicus **8** : 267; **11** : 158; **12** : 138; **14** : 51, 118; **16** : 89; **19** : 199; **20** : 43.

Ranunculus lingua **3** : 26; **4** : 174; **9** : 180; **17** : 40; **19** : 147; **20** : 61, 70, 136.
— marinus **15** : 194.
— megacarpus **16** : 53.
— nivalis **8** : 267; **11** : 168.
— *obtusulus* **16** : 48—51 (fig.).
— ophioglossifolius **4** : 143; **17** : 232—239.
— paucistamineus **3** : 59 (fig.), 60—61, 84; **4** : 209; **10** : 230, 233, 235 (fig.); **12** : 33, 169; **20** : 63.
— peltatus **10** : 16; **14** : 55; **17** : 40, 80, 81; **19** : 98; **20** : 21.
— — v. septentrionalis **11** : 158; **14** : 51; **20** : 61, 70.
— polyanthemus (-mos) **3** : 26; **4** : 209; **5** : 47; **8** : 211; **10** : 233; **12** : 34, 40; **13** : 90; **15** : 124; **17** : 40; **18** : 119, 120; **19** : 147; **20** : 70.
— — f. subalbida **1** : 147.
— — v. glaber **3** : 26.
— — ssp. eu-polyanthemus **20** : 21.
— propinquus **14** : 118; **17** : 136.
— pygmaeus **8** : 267; **11** : 168, 169; **17** : 220, 223; **19** : 199; **20** : 40.
— repens **2** : 55; **3** : 26; **4** : 209; **5** : 13, 19, 47; **6** : 27; **7** : 107, 130; **8** : 211; **10** : 138, 157, 233; **11** : 15, 31, 33, 39, 164, 165; **12** : 34, 40, 112; **13** : 10, 13, 15, 16; **15** : 32, 105, 124; **16** : 5; **17** : 82, 124, 136, 233; **18** : 26, 28, 98, 123; **19** : 40, 96, 101, 149; **20** : 21, 51, 62, 70, 86, 128.
— — f. hirsutus **2** : 49, 55.
— reptans **3** : 34; **4** : 10, 78; **5** : 13, 19, 27; **7** : 106; **8** : 211; **10** : 16; **11** : 6; **14** : 51; **15** : 123; **17** : 80, 81, 220, 224; **18** : 123; **19** : 94, 100, 199; **20** : 32, 63, 70.
— salsuginosus **15** : 23; **18** : 57—58; **19** : 142.
— sceleratus **2** : 17, 55; **3** : 26; **4** : 174, 209, 228 (mp.); **7** : 106; **10** : 233; **11** : 30—33, 97; **12** : 70; **15** : 11—13, 123; **20** : 21, 70.
— — f. natans **15** : 12 (fig.).
— sibiricus **16** : 45, 48.
— typicus **16** : 47, 49.
— sp. **10** : 138; **17** : 132.
Raphanobrassica **10** : 37.
Raphanus raphanistrum **2** : 51, 55; **3** : 27; **5** : 13, 20, 48; **6** : 27; **7** : 107; **8** : 212; **12** : 27—30, 40, 111, 112; **13** : 98; **15** : 109, 125; **18** : 28, 121; **19** : 40, 101; **20** : 51, 70, 86, 126.
— — f. album **8** : 92.
— sativus **6** : 115; **9** : 164; [**15** : 109]; **19** : 107, 109; **20** : 86.
— — f. radiola **3** : 27.
Reseda lutea **7** : 273; **15** : 126; **16** : 11, 13.
— luteola **7** : 273; **12** : 167.
— odorata **3** : 27.
Rhamnus cathartica **1** : 14; **2** : 63; **4** : 23, 62, 86, 214; **5** : 53; **6** : 93, 124, 126—128; **7** : 32, 37, 39; **8** : 75; **9** : 25; **10** : 58, 225, 226, 236, 276, 277, 280; **11** : 118, 150; **12** : 17, 20, 35, 42, 168, 172, 187—189; **15** : 214, 224; **17** : 11, 86; **18** : 132 . . . 181.
Rhamnus frangula **1** : 92; **2** : 48, 55; **3** : 28; **4** : 214; **5** : 53; **6** : 27, 29, 30, 42, 93; **7** : 111; **8** : 24, 215; **10** : 236, 405; **11** : 16, 17, 22 . . . 26; **12** : 35, 42, 72, 113, 140; **13** : 17; **14** : 6, 121; **15** : 100, 101, 103, 131, 233; **17** : 82; **18** : 35, 37, 39, 116, 118, 119; **19** : 3, 102; **20** : 22, 54, 62, 73, 113, 121.
Rhaphithamnus venustus **7** : 249, 252.
Rhetinodendron **7** : 251.
Rheum rhaponticum **3** : 25; [**15** : 109].
— sp. **19** : 107, 108.
Rhinanthus groenlandicus **20** : 16, 17, 89.
— major **2** : 56; **3** : 29, 75; **4** : 221; **5** : 13, 25, 58; **7** : 115; **8** : 218; **10** : 158; **11** : 150; **12** : 35, 43, 113; **13** : 33; **15** : 108, 109, 134; **19** : 102; **20** : 23, 55, 56, 59, 63, 74, 89, 129.
— — v., ssp. montanus **7** : 115; **20** : 74.
— minor **2** : 26; **3** : 29, 75—76, 84; **4** : 221; **15** : 13, 25, 58; **6** : 27; **7** : 115; **8** : 218, 272; **10** : 34, 158, 164, 168, 237; **11** : 164, 165; **12** : 35, 43, 110, 113; **13** : 33; **14** : 53; **15** : 108, 109, 134; **17** : 220, 222; **18** : 120; **19** : 199; **20** : 16, 17, 74, 89, 117, 118.
— — f. vittulatus **20** : 16.
— — v. *lapponicus* **20** : 16—17.
— — v. septentrionalis **20** : 17.
— — ssp. groenlandicus **19** : 199.
— — ssp. typicus **20** : 23.
— rumelicus ssp. osiliensis **12** : 180.
— serotinus ssp. vernalis **20** : 23.
— sp. **20** : 32.
Rhizophora mucronata **3** : 48.
Rhodiola rosea **1** : 70—71; **4** : 100; **8** : 267; **19** : 199; **20** : 31—35, 42, 44.
Rhododendron Baeticum **4** : 63.
— lapponicum **12** : 62, 64; **19** : 199; **20** : 33, 41, 42.
Rhoeo discolor **4** : 171—172.
Rhynchospora alba **1** : 60; **2** : 54; **4** : 200; **7** : 100; **8** : 204, 276; **10** : 240, 241, 258; **12** : 67, 133, 143; **13** : 32, 36; **14** : 114; **15** : 104, 115; **17** : 38; **19** : 3, 60, 98; **20** : 67, 124, 133.
— fusca **2** : 4, 54, 111; **3** : 34; **4** : 200; **6** : 231; **12** : 164, 254; **15** : 274; **20** : 5.
Ribes alpinum **2** : 55; **3** : 27; **4** : 86, 211, 215; **5** : 50, 64, 114; **6** : 27 . . . 43; **7** : 32, 102, 108, 258; **8** : 37, 200, 213; **10** : 58, 234; **11** : 16, 23 . . . 27, 137; **12** : 34, 41, 65, 71, 112, 168, 173—176, 188, 189; **13** : 17; **14** : 6; **15** : 101, 103, 126, 214, 217, 233; **17** : 11, 181, 198; **18** : 32, 35, 44, 117, 118, 120, 136, 148, 172, 173; **19** : 68; **20** : 3.
— glandulosum **19** : 199.
— grossularia **3** : 27; **5** : 49; **6** : 124, 127,

128: **7** : 108; **8** : 213; **11** : 37, 39; **16** : 14; **17** : 82; **18** : 37, 172; **19** : 40, 107, 109.
Ribes nigrum **2** : 21; **3** : 27; **4** : 91, 211; **5** : 49; **6** : 27; **7** : 32, 108; **8** : 200, 213; **9** : 177; **10** : 58, 172, 234, 278, 280; **12** : 34, 41, 71, 139; **14** : 119; **15** : 101, 103, 126, 233; **17** : 34, 40, 76, 82, 85, 181, 197; **19** : 51, 68, 107, 109, 147; **20** : 71, 111, 113, 137.
— — forma **14** : 171.
— pubescens **7** : 121, 134, 136; **11** : 24—27, 35, 39; **14** : 6.
— rubrum **1** : 92; **2** : 42; **3** : 27; **7** : 102, 108; **8** : 200, 213; **11** : 155, 159, 164; **15** : 31, 32, 103, 126; **17** : 76, 197, 220, 221; **19** : [51], 123; **20** : 71, 111, 113.
— — f. glabratum **10** : 98.
— — f. pubescens **11** : 159.
— — ssp. Schlechtendalii **12** : 71, 172; **15** : 126; **17** : 85, 197; **19** : 51; **20** : 21, 137.
— — ssp. — v. glabellum **14** : 119; **19** : 52.
— — ssp. — v. scandicum **12** : 139; **14** : 119; **19** : 52.
— Schlechtendalii **3** : 34; **4** : 211; **14** : 51; **18** : 44.
— spicatum ssp. pubescens **20** : 21.
— sp. **1** : 45; **7** : 93; **20** : 41.
Robinsonia **7** : 251, 253.
— evenia **7** : 250.
— Gayana **7** : 251.
— gracilis **7** : 251.
Roripa amphibia **15** : 110, 125; **17** : 70—72; **20** : 70, 137.
— — × silvestris **10** : 63.
— anceps **17** : 70.
— austriaca **17** : 70—72.
— brachycarpa **19** : 138; **20** : 124, 131, 137.
— palustris **15** : 125; **17** : 40, 80, 81, 124; **19** : 31, 51, 101; **20** : 70, 126.
— prostrata **10** : 63; **13** : 98; **15** : 125; **17** : 70.
— silvestris **19** : 67.
Rosa acicularis **10** : 437, 474; **15** : 126; **17** : 34, 40; **20** : 21, 71, 99, 111 . . . 117, 122.
— — ssp. fennica **20** : 137.
— canina **3** : 27; **4** : 23, 26, 61, 213; **5** : 31, 51; **6** : 27; **8** : 279; **10** : 58, 274, 428, 429, 437; **12** : 34, 41, 169; **15** : 93; **17** : 86.
— — forma **10** : 235.
— caniniformis **10** : 437.
— cinnamomea **3** : 27; **5** : 31, 51; **6** : 139, 142; **7** : 109; **8** : 200, 214, 279; **10** : 172, 437; **12** : 34; **15** : 101, 127. **17** : 34, 40, 60, 61, 86; **18** : 152; **19** : 147; **20** : 21, 71.
— coriifolia **2** : 55; **4** : 212; **5** : 31, 51, 64; **8** : 277, 279; **9** : 14; **10** : 58; **12** : 34, 41, 169; **17** : 86; **19** : 68; **20** : 3.
— dumetorum **10** : 281, 437.
— gallica **3** : 27.
— glauca **2** : 55; **4** : 212; **5** : 31, 51; **9** : 14; **10** : 58; **11** : 25; **12** : 41, 169; **17** : 86; **18** : 150, 152.
Rosa *Lindbergiana* **10** : 436—437.
— majalis **20** : 21.
— mollis **8** : 279; **12** : 169.
— — f. alba **8** : 92.
— pimpinellifolia **3** : 27; **8** : 214; **18** : 162.
— rubiginosa **3** : 35.
— rubrifolia **10** : 474; **19** : 68.
— rugosa **3** : 27; **18** : 151; **19** : 68, 107, 109.
— tomentosa **3** : 27; **10** : 57, 58, 281, 408.
— villosa **4** : 69, 212; **5** : 30, 31, 51; **7** : 32, 37; **12** : 16, 22; **17** : 86; **19** : 68.
— sp. **1** : 13; **4** : 86; **9** : 188, 191; **10** : 64, 437—438; **12** : 158; **14** : 171; **15** : 109, 127, 214, 233.
Rubus arcticus **3** : 27; **6** : 27; **7** : 109; **8** : 24—30, 213, 279; **11** : 160, 163; **12** : 16, 22, 23, 130—131, 136, 159, 164; **14** : 51; **15** : 110, 128; **16** : 8—9; **17** : 197, 200; **18** : 121, 122; **19** : 69, 93, 96, 101, 199; **20** : 22, 34, 40, 56, 63, 72, 113.
— — f. albus (flor. alb.) **8** : 92; **18** : 270.
— — f. pleniflorus **11** : 160.
— — f. schizopetalus **11** : 160; **12** : 139.
— — f. subquinquelobus **7** : 109; **20** : 137.
— — v. leuciticus **19** : 52.
— — × saxatilis **7** : 109; **8** : 213, 268; **10** : 66; **11** : 160; **12** : 139; **14** : 119; **19** : 52, 69.
— caesius **2** : 63; **4** : 86, 87, 211; **9** : 22; **10** : 58, 149, (234), 274, 281, 408, 429; **11** : 57, 150; **12** : 34, 41, 172; **15** : 106, 128, 214; **18** : 167.
— — × idaeus **10** : 234; **12** : 34.
— castoreus **10** : 66; **11** : 160.
— chamaemorus **3** : 27; **4** : 102, 211; **5** : 50; **6** : 27; **7** : 109, 125; **8** : 213; **9** : 107, 108; **11** : 163, 164, 172; **12** : 112, 136; **13** : 129; **14** : 14, 44, 51; **15** : 104, 105, 128; **17** : 137, 198, 220; **19** : 93, 101, 199; **20** : 22, 25, 31, 32, 35—37, 40, 44, 60, 72, 123.
— Fioniae **10** : 178.
— geoides **7** : 253.
— horridus **10** : 178.
— humulifolius **3** : 18—19, 129, 135; **14** : 171; **19** : 104; (**20** : 64).
— idaeus **1** : 17; **2** : 55; **3** : 10, 27; **4** : 26, 29, [74], 76, 211; **5** : 50; **6** : 27 . . . 43, 48, 51, 88, 139; **7** : 47, 109, 121, 134, 136; **8** : 213, 281; [**9** : 72, 73, 87]; **10** : 58, 234; **11** : 16, 17, 21 . . . 27, 34, 37, 39, 157; **12** : 34, 112, 145; **13** : 17, 32; **14** : 6; **15** : 8, 31, 32, 101, 103, 127, 214, 217; **16** : 5, 7; **17** : 82, [183, 184]; **18** : 32, 33, [36], 42, 44, 98, 99, 118, 175; **19** : [28], 101, 122, 150, 199; **20** : 22, 35, 40, 62, 71, 86, 98, 102, 111, 113.
— — f., v. anomalus **15** : 127; **17** : 343; **19** : 69.
— — f. chlorocarpus **3** : 27; **19** : 69.
— — f. monstr. phyllanthus **12** : 254.
— — f. simplicior **6** : 144, 145; **19** : 69.

Rubus idaeus × saxatilis **10** : 33; **11** : 6.
— nemorosus **8** : 20, 22, 23; **10** : 178.
— odoratus **3** : 27.
— plicatus **10** : 178; **15** : 127.
— pruinosus **8** : 20, 22, 23; **10** : 172, 178, 179, 279.
— saxatilis **2** : 41, 42, 55; **3** : 27; **4** : 211; **5** : 50; **6** : 27, 29, 30, 43; **7** : 109, 121, 134, 136; **8** : 25, 213; **10** : 98, 157, 167, 234, 406, 423; **11** : 17, 21, 22, 37, 39; **12** : 34, 41, 168; **13** : 17, 31, 33; **14** : 6, 51, 113; **15** : 32, 89, 102, 105, 128; **17** : 220; **18** : 34, 119; **19** : 93, 101; **20** : 22, 54, 57, 59, 63, 72, 98, 101, 111, 113.
— — f. multilobus **19** : 69.
— suberectus **10** : 178; **15** : 32, 110, 116 (mp.), 127; **20** : 63.
— sulcatus **10** : 178.
— thyrsanthus **10** : 178.
— triflorus **19** : 199; **20** : 37, 38, 40, 43, (64).
— Wahlbergii **10** : 178.
— sp. **9** : 188, 189; **10** : 64, 178; **15** : 109.
Rudbeckia laciniata **19** : 107, 111.
Rumex acetosa **1** : 21, 24; **2** : 54; **3** : 25; **4** : 10, 206; **5** : 44; **6** : 27, 140; **7** : 104; **8** : 210; **9** : 15, 180; **10** : 162, 167, 232, 413; **11** : 24—27, 33 . . . 39, 164; **12** : 34, 39, 110, 112, 175; **13** : 15, 16; **15** : 32, 122; **17** : 80, 82, 124, 132, 136, 222; **18** : 119, 133, 179; **19** : 33, 38, 40, 91, 96, 100, 149, 199; **20** : 3, 20, 51, 54, 59, 63, 69, 85, 99, 118, 120, 121, 129.
— — ssp. fontano-paludosus **20** : 51, 56, 69.
— — ssp. pratensis **20** : 20.
— — ssp. thyrsiflorus **20** : 69.
— acetosella **2** : 51, 54; **3** : 11, 25; **4** : 71, 206; **5** : 44; **6** : 27, 29, 30, 42, 138; **7** : 104, 121, 125, 134, 136, 218, 253; **8** : 210; **10** : 162, 232; **11** : 24, 25, 164; **12** : 110, 112; **14** : 51; **15** : 32, 122; **16** : 14; **17** : 81, 124, 219; **18** : 26, 28, 66, 99, 122; **19** : 30, 31, 38, 40, 91, 96, 100, 149, 199; **20** : 20, 59, 62, 69, 85, 128, 129, 146.
— — f. integrifolius **7** : 104.
— — f. multifidus **7** : 104; **8** : 210.
— aquaticus **3** : 25, 38; **7** : 256; **12** : 65, 69, 112; **14** : 118; **15** : 107, 122; **19** : 50, 65, 105, 108; **20** : 69, 117, 121, 135.
— — × crispus **7** : 256.
— — × domesticus **10** : 66; **20** : 84.
— — × hydrolapathum **10** : 66.
— arifolius **8** : 265.
— auriculatus **1** : 21, 22, 23, 24; **10** : 140, 146, 172, 177, 279; **11** : 5; **12** : 25, 34, 39, 111, 143, 144; **13** : 20; **15** : 110, 122; **19** : 38, 41; **20** : 125, 129, 135.
— confertus **2** : 14—15, 28; **3** : 38, 39, 50, 55, 84, 135; **4** : 61; **11** : 117; **13** : 20, 171; **15** : 122; **19** : 38, 41; **20** : 69, 125, 128, 131, 132, 135.
Rumex crispus **2** : 49 . . . 54; **3** : 25; **4** : 66 . . . 77, 206; **5** : 44; **6** : 27; **7** : 47, 256; **10** : 403; **12** : 34, 112; **13** : 12; **15** : 13, 14, 122; **16** : 58; **18** : 66; **19** : 38, 105, 108, 149; **20** : 69.
— domesticus **2** : 54; **3** : 25, 55 (fig.), 84; **4** : 206; **5** : 13, 17, 28, 44; **6** : 27; **7** : 104; **8** : 210; **10** : 143; **11** : 26, 31, 33, 164; **12** : 34, 39, 112; **15** : 122; **16** : 14; **17** : 82; **18** : 66, 121; **19** : 30, 38, 65, 96, 97, 100, 149; **20** : 20, 62, 69, 84, 129.
— — × obtusifolius **7** : 320; **15** : 60.
— fennicus **1** : 25; **5** : 78, 212; **7** : 104; **18** : 46, 52; **19** : 65, 100.
— fontano-paludosus **17** : 136.
— haematinus **1** : 23, 24, 26.
— haplorhizus **1** : 23; **11** : 150.
— hippolapathum (**20** : 64)[1]
— hydrolapathum **4** : 290; **7** : 256; **10** :281; **13** : 34; **15** : 122, 213; (**20** : 64).[2]
— — × aquaticus **2** : 4.
— maritimus **1** : 61; **4** : 206; **5** : 66; **10** : 177; **13** : 19—21; **15** : 106, 122; **17** : 54; **19** : 40, 141, 142; **20** : 63, 125, 135.
— — ssp. rossicus **19** : 97, 100.
— maximus **2** : 4, 49 (fig.), 111, 115; **2** : 49, 54; **5** : 66; **10** : 66.
— mexicanus **1** : 147; **2** : 36, 111, 115; **3** : 128; **4** : 290, 291; **5** : 212; **6** : 232; **9** : 237; **13** : 98.
— obovatus **6** : 184—186 (fig.); **7** : 320.
— obtusifolius **4** : 206; **11** : 147, 149; **12** : 34; **15** : 32, 110, 122; **16** : 10, 13; **17** : 123, 124; **19** : 38, 40, 41, 106, 108; **20** : 63.
— occidentalis **19** : 199; **20** : 36, 43.
— pulcher **6** : 185, 186.
— rossicus **18** : 271.
— salicifolius **2** : 36; **19** : 199; **20** : 36, 43.
— thyrsiflorus **1** : 14, 20—26, 157; **4** : 206; **9** : 21; **10** : 33, 232; **11** : 5; **15** : 13—15; **17** : 54; **18** : 66, 67.
— sp. **4** : 127; **5** : 107; **9** : 111; **15** : 274; **18** : 106, 173.
Ruppia brachypus **4** : 60; **5** : 78; **7** : 29—31; **8** : 275; **15** : 93.
— intermedia **7** : 31.
— maritima **7** : 30, 31; **19** : 199; **20** : 38, 43.
— rostellata **7** : 29—31; **8** : 275; **15** : 93; **17** : 43, 44, 77.
— spiralis **1** : 100—102, 157; **5** : 78; **7** : 29, 30, 268; **8** : 275; **15** : 194.
Ruscus aculeatus **7** : 34.
Sagina caespitosa **19** : 199; **20** : 42.
— intermedia **19** : 199; **20** : 33, 39, 40.
— Linnaei **8** : 266; **11** : 168, 169; **17** : 219, 223.
— maritima **2** : 16—17,28; **3** : 34, 84, 86; **4** : 11, 13, 18, 21, 22, 203, 207, 228 (mp.);

[1] Per errorem hippolapathifolium.
[2] Per errorem hydrolapathifolium.

7 : 28, 35; **10** : 33, 172, 276, 280, 281; **11** : 6; **12** : 25; **13** : 8; **15** : 93.
Sagina nodosa **1** : 50; **2** : 50, 55; **4** : 66, 80, 81, 107, 207; **5** : 30, 45; **7** : 106; **8** : 20, 21, 45, 240; **10** : 157, 403; **12** : 34, 39, 112; **15** : 93, 123; **16** : 63; **18** : 26, 28; **19** : 66; **20** : 21, 63.
— procumbens **1** : 17; **2** : 50, 55; **4** : 10, 11, 67 . . . 85, 207; **5** : 45; **6** : 27; **7** : 106; **8** : 21, 22, 211; **10** : 157, 167; **11** : 30—33; **12** : 34, 40, 110, 112; **13** : 12; **15** : 123; **17** : 124; **18** : 97, 123; **19** : 31, (97), 149, 199; **20** : 31, 63, 70, 85.
— sp. **9** : 18.
Sagittaria natans **7** : 97, 269; **12** : 132; **14** : 171; **18** : 58.
— sagittifolia **2** : 50, 54; **3** : 22, 33, 85—86; **4** : 110, 173, 197; **6** : 91; **7** : 97; **8** : 197—198; **10** : 16, 277, 474; **12** : 67, 255; **13** : 96; **15** : 107, 113; **18** : 102; **19** : 58, 94, 98; **20** : 9, 19, 61, 66.
— — f. vallisneriifolia **7** : 97.
Salicornia europaea **10** : 408, 429.
— herbacea **1** : 49, 50, 51; **4** : 22, 143; **6** : 103; **7** : 38, 165; **8** : 20—22; **10** : 280.
— peruviana **7** : 249, 252.
— ramosissima **3** : 50.
Salix acutangula **5** : 132.
— acutifolia **8** : 187; **15** : 106, 121; **19** : 2; **20** : 63, 106.
— — × daphnoides **10** : 62.
— alba **3** : 25; **8** : 234; **18** : 116; **20** : 159—161, 166, 167.
— arctica **19** : 199.
— arctophila **19** : 199; **20** : 31, 33.
— arenaria **8** : 207.
— — × repens **10** : 62.
— aurita **2** : 48, 52, 54; **3** : 25; **4** : 205; **5** : 43, 64; **6** : 26, 48, 51; **7** : 102, 128, 130; **8** : 24, 207; **9** : 24; **10** : 231, 406; **12** : 34, 112; **13** : 9, 11; **15** : 100, 101, 103, 121, 194, 214; **17** : 124; **18** : 118, 177; **19** : 100; **20** : 62, 69.
— — × caprea **7** : 103; **8** : 207.
— — × — f. percaprea **8** : 207.
— — × — × cinerea **8** : 207.
— — × cinerea **7** : 103; **8** : 207; **12** : 34, 112; **13** : 123.
— — × — × nigricans **8** : 207.
— — × — × phylicifolia **8** : 207.
— — × depressa **7** : 103.
— — × lapponum **19** : 64.
— — × — × myrtilloides **8** : 208; **12** : 138; **19** : 64.
— — × livida **8** : 208.
— — × — × repens **8** : 208.
— — × myrtilloides **7** : 103; **8** : 208; **12** : 69, 138; **19** : 49, 64.
— — × nigricans **8** : 208.
— — × — × phylicifolia **8** : 208.
— — × phylicifolia **7** : 103; **8** : 208; **19** : 64.
Salix aurita × repens **7** : 103; **8** : 208; **12** : 69.
— — × — × rosmarinifolia **8** : 208.
— — × rosmarinifolia **7** : 103; **8** : 208.
— bicolor **7** : 233; **9** : 112.
— borealis **20** : 20.
— — × nigricans **20** : 20.
— calcicarpa **19** : 199.
— caprea **2** : 54; **3** : 13, 25; **4** : [86, 87], 205; **5** : 43, 64; **6** : 26, 140; **7** : 103, 130, [321]; **8** : 53, 69, 75, 207; **9** : 24, 146; **10** : 232; **11** : 37, 39, 137; **12** : 34, 39, 54, 112, 136, 187, 188; **15** : 106, 121, 214; **16** : 5, 6; **17** : 124; **18** : 8, 29, [32, 36], 118, 132; **19** : 93, 100; **20** : 20, 53, 63, 69, 112, 116, 117, 145, 159—161, 165—168.
— — ssp. sericea **14** : 50.
— — × cinerea **8** : 208.
— — × coaetanea **10** : 62.
— — × phylicifolia **14** : 50.
— — × repens **8** : 208.
— cinerascens **8** : 207; **14** : 50.
— cinerea **3** : 25; **4** : 205; **5** : 43; **6** : 26; **7** : 103; **8** : 207; **10** : 232; **12** : 34, 39, 112; **15** : 100, 101, 121; **18** : 123, 166, 177, 178, 183; **20** : 20, 63.
— — × nigricans **8** : 208.
— — × — × phylicifolia **7** : 103; **8** : 208.
— — × phylicifolia **8** : 208.
— coaetanea **20** : 20.
— daphnoides **8** : 235.
— dasyclados **8** : 235.
— depressa **2** : 54; **3** : 25; **7** : 103.
— fragilis **4** : 93; **7** : 102; **8** : 234; **11** : 146; **17** : 26; **19** : 147; (**20** : 64).
— glandulifera **5** : 132.
— — × hastata **10** : 62.
— — × — × herbacea × lanata **5** : 132.
— — × — × lanata **5** : 132.
— — × lanata **5** : 132; **10** : 62.
— glauca **1** : 66; **5** : 133; **9** : 112; **11** : 172; **14** : 50, 117; **19** : 49, 199; **20** : 31, 33, 37.
— — v. stipulata **5** : 133.
— — × myrsinites **5** : 133; **12** : 138.
— — × — × nigricans **5** : 133; **12** : 138.
— — × phylicifolia **12** : 138.
— — × — × reptans **10** : 62.
— — × stipulifera **10** : 62.
— hastata **1** : 39; **7** : 88; **8** : 265; **9** : 112; **10** : 370; **12** : 138; **14** : 51, 117; **19** : 122.
— — × herbacea × lanata **5** : 134.
— — × lanata **10** : 62.
— herbacea **1** : 63; **5** : 134; **8** : 237, 265; **10** : 370; **11** : 231; **14** : 50, 66, 171; **17** : 219, 223; **19** : 199; **20** : 31—34, 38, 40, 44.
— — × polaris **6** : 232; **8** : 265; **10** : 62; **11** : 167.
— — × rotundifolia **10** : 62.
— kaninensis **5** : 132.
— lanata **5** : 134; **6** : 231; **8** : 264; **10** : 370; **14** : 51, 171; **17** : 219, 223, 228; **20** : 84.

Salix lapponum **3** : 25; **5** : 134; **6** : 91; **7** : 83, 102, 233; **8** : 207; **9** : 112; **11** : 172; **12** : 136, 138; **13** : 129; **14** : 50; **15** : 121; **19** : 64, 93, 100; **20** : 63, 119.
— — × myrtilloides **7** : 103; **8** : 208; **10** : 378; **19** : 49.
— — × rosmarinifolia **7** : 103.[1]
— livida **8** : 207; **12** : 34, 112; **15** : 121; **19** : 64, 100; **20** : 20, 63, 69.
— — × myrtilloides **8** : 208.
— — × xerophila **10** : 62; **14** : 117.
— myrsinites **5** : 133; **7** : 88; **8** : 265; **10** : 370; **12** : 138; **13** : 129; **14** : 50, 117; **17** : 226; **19** : 49, 122.
— — × nigricans **12** : 138; **14** : 51, 118.
— — × — × phylicifolia × stipulifera **5** : 133.
— myrtilloides **3** : 25; **7** : 103; **8** : 207, 265; **12** : 69, 138; **14** : 50; **15** : 31, 121; **17** : 129, 139; **19** : 3, 64, 93, 100; **20** : 63.
— — × rosmarinifolia **7** : 103; **8** : 209; **10** : 378.
— — × — × repens **8** : 209.
— nigricans **3** : 24; **4** : 205; **5** : 13, 17, 133; **6** : 26; **7** : 102; **8** : 207; **9** : 24, 112; **10** : 62—63, 232, 275, 370, 406, 408, 429; **12** : 34, 39; **14** : 50; **15** : 106, 121; **18** : 123; **20** : 20, 69.
— — × phylicifolia **7** : 103; **8** : 209; **10** : 62—63, 67; **12** : 34; **14** : 118; **19** : 49; **20** : 20.
— pentandra **2** : 54; **3** : 13; **4** : 91, 205; **5** : 13, 17, 43; **6** : 26; **7** : 99, 102, 127, 134; **8** : 207; **10** : 232, 406, 408; **12** : 39; **15** : 106, 121, 214; **16** : 5, 6; **17** : 39, 80, 124, 196; **18** : 123, 167; **20** : 69, 119.
— phylicifolia **2** : 48, 52, 54; **3** : 13, 25; **4** : 73, 205; **5** : 43; **6** : 26, 48, 51; **7** : 102, 121, 128, 134, 136; **8** : 207; **9** : 24; **10** : 62—63, 232; **11** : 34; **12** : 34, 39, 112; **12** : 136; **13** : 11; **14** : 50; **15** : 106, 121; **18** : 123; **19** : 93, 100; **20** : 69, 111, 112, 117, 119, 121.
— — f. irrigua **5** : 132, 133.
— — f. monstr. **13** : 171.
— polaris **1** : 63; **8** : 265; **11** : 166—168.
— purpurea **1** : 36?; **8** : 234, 235; **11** : 146, 149.
— pyrolifolia **3** : 4, 135; **13** : 93.
— repens (**4** : 205); **7** : 37, 103; **8** : 207; **9** : 188; **10** : 231, 406; **11** : 151, 153; **16** : 8; **19** : 64, 95, 100.
— — v. arenaria **3** : 10, 11, 13.
— — ssp. rosmarinifolia **1** : 51—52, 157; **10** : 416; **19** : 38, 64; **20** : 69.
— — × rosmarinifolia **8** : 209; **10** : 62; **20** : 20.
— reptans **10** : 62.

[1] Deleatur; vide **7** : 332.

Salix reticulata **8** : 265; **10** : 370; **13** : 95; **14** : 112, 117, 120.
— rosmarinifolia **4** : 204; **5** : 43; **6** : 93; **7** : 103; **8** : 207; **11** : 5; **12** : 34, 39, 112; **17** : 73; **20** : 20, 119, 120.
— Starkeana **20** : 20.
— stipulifera **5** : 133.
— triandra **1** : 36; **12** : 112; **13** : 49; **15** : 121, 274.
— uva-ursi **19** : 199; **20** : 35, 37, 42, 44, 45.
— vagans **9** : 24.
— vestita **19** : 199; **20** : 32, 44.
— viminalis **8** : 234; **11** : 149; **19** : 188.
— sp. **1** : 65, 92; [**4** : 112]; **6** : [89], 127, 128; **7** : 126, 167, [168], 171, 172, [195], 196, [197], 208, [209 . . . 217], 223, [227—229], 233; **8** : [37, 40], 229; **9** : 26; 76, [108 . . . 115, 133, 179], 187, 188; **10** : 62; **11** : [16, 17, 142, 150], 163, [171], 172; **12** : 73, [134, 140], 169, 254; **13** : 10; **14** : 63, 70; **15** : 30; **16** : 96; **17** : 80, 82; **18** : [80], 116, [154], 171, 173, [177]; **20** : 32, 39, 44, 168.
Salsola kali **2** : 4, 50, 55; **3** : 5, 8, 133; **4** : 61, 69, 142—144, 207; **7** : 35, 40, 47, 165; **9** : 18, 165; **12** : 153, 154; **13** : 21; **15** : 83, 84, 122, 195.
— ruthenica **15** : 110, 122; **19** : 40; **20** : 128, 132, 135.
Salvia nemorosa **6** : 184—185 (fig.), 231.
— pratensis **1** : 147; **3** : 38, 135; **4** : 61; **9** : 179; **11** : 150.
— verticillata **15** : 111, 132.
— (viridis v.) horminum **8** : 18, 374.
Sambucus racemosa **3** : 29; **6** : 27 . . . 44; **12** : 187; **13** : 91; **15** : 60; **16** : 14, 15; **18** : 37; **19** : 75, 106, 107, 111, 150; **20** : 159—161, 167, 168.
— — f. laciniata **18** : 270.
— sp. [**15** : 109].
Samolus Valerandi **3** : 128; **10** : 281, 409; **17** : 54.
Sanguisorba canadensis **19** : 199.
— minor **19** : 68.
— sp. **20** : 34.
Sanicula europaea **2** : 62; **4** : 86, 216, 228 (mp.); **5** : 66, 101; **6** : 88, 232; **10** : 149, 281, 406, 409; **11** : 118, 119, 137, 146; **12** : 253; **15** : 33, 215, (233).
Saponaria officinalis **11** : 150; **19** : 65, 147.
— vaccaria **19** : 147.
Satureja acinos **4** : 220; **5** : 30, 57; **6** : 110, 138; **12** : 19, 20, 21, 35, 43; **8** : 42, 44; **10** : 237, 274; **15** : 8, 132; **17** : 54; **18** : 26, 28; **20** : 23, 74.
— hortensis f. alba **8** : 92.
— vulgaris **5** : 57; **6** : 110, 138; **7** : 32, 33; **10** : 58, 278, 280; **12** : 19, 21, 43; **15** : 102, 132; **19** : 73; **20** : 23, 51, 63, 74, 114, 139.

Satureja vulgaris f. albiflora **13** : 109.
Saururus **7** : 189.
Saussurea alpina **4** : 107; **8** : 273; **9** : 142; **11** : 159; **12** : 141, 164; **13** : 129; **14** : 53, 117, 122; **16** : 89; **17** : 129, 137, 138, 220; **19** : 56; **20** : (64), 111, 114, 120, 141.
— — f. albiflora **19** : 56.
— amara (**19** : 142).
— glomerata **19** : 137, 142; **20** : 124, 131, 141.
Saxifraga adscendens **3** : 39, 136; **10** : 277; **12** : 145.
— aizoides **8** : 268; **10** : 202. 370; **17** : 220, 224.
— — f. aurantia **8** : 268.
— aizoon **19** : 199; **20** : 40, 42.
— caespitosa **4** : 107; **6** : 140; **7** : 87, 88, 288; **8** : 268; **11** : 169; **20** : 30, 32, 33, 40.
— cernua **8** : 268; **11** : 161, 166, 169; **14** : 46, 48, 51; **17** : 220, 221; **19** : 51, 199; **20** : 40, 42.
— granulata **1** : 48; **4** : 61, 86; **5** : 30, 49; **10** : 274, 275, 409; **15** : 215; **18** : 178.
— groenlandica **3** : 14, 15, 134; **11** : 169, 170; **17** : 220, 221, 224; **19** : 199.
— hirculus **4** : 107; **6** : 93; **11** : 159; **12** : 139; **14** : 119; **15** : 112, 126; **17** : 136, 138; **19** : 51, 122, 126 . . . 132, 135, 188, 189, 190; **20** : 48, 53, 56, 66 . . . 72, 76, 121, 122, 137.
— nivalis **4** : 107; **6** : 140, 142; **7** : 87, 88; **8** : 268; **11** : 133, 159; **14** : 51, 119; **17** : 220, 221, 224; **19** : 51, 199, 204; **20** : 21, 39, 40.
— — f. tenuior **8** : 268.
— — ssp. eu-nivalis **20** : 137.
— oppositifolia **7** : 288; **19** : 199; **20** : 30, 32, 33, 40.
— rivularis **8** : 268; **11** : 169, 170; **17** : 220, 224; **19** : 199; **20** : 30—34, 39, 40.
— stellaris **8** : 268; **11** : 170; **17** : 220, 224; **19** : 199; **20** : 30, 40.
— — v. comosa **19** : 199; **20** : 32, 42.
— tenuis **3** : 14, 15, 134; **11** : 167, 170.
— tridactylites **3** : 39, 63, 84, 136; **4** : 23, 89, 211; **5** : 30, 32, 49; **7** : 32, 36, 38; **8** : 42, 44, 45, 48, 51, 374; **9** : 22; **10** : 25—27, 30, 32, 163, 172, 223, 232, 234, 274, 280, 342 . . . 354, 402, 409, 426, 427, 429, 431; **11** : 9, 54—56; **12** : 21, 34, 40, 144—146, 164; **13** : 8; **19** : 68.
Scabiosa columbaria **4** : 223, 228 (mp.); **10** : 238.
Scandix pecten veneris **6** : 232.
Scheuchzeria palustris **3** : 22; **7** : 97; **13** : 36, 89; **14** : 122; **15** : 104, 113; **19** : 58, 60, 93, 98; **20** : 19, 66.
Schoenus ferrugineus **1** : 6, 157; **4** : 200; **10** : 177; **11** : 97, 121, 269; **12** : 33, 169, 170, 174, 191, 192, 254, 255; **13** : 128, 129.
— — × nigricans **12** : 174, 180.
Schoenus nigricans **17** : 71.
Scirpus acicularis **2** : 50, 54; **3** : 24; **4** : 73; **7** : 99; **8** : 204, 276, 281; **10** : 16; **11** : 5; **12** : 112, 164; **13** : 12; **15** : 106, 115; **17** : 38, 44, 80, 81, 219, 222; **18** : 103, 123; **19** : 94, 99, 199; **20** : 45, 67.
— alpinus **11** : 121.
— atrocinctus **19** : 199; **20** : 43.
— austriacus **4** : 200; **12** : 143; **14** : 49; **19** : 57; **20** : 31, 34, 37, 44, 45.
— caespitosus **1** : 60; **7** : 99; **8** : 204, 261; **11** : 121, 142; **12** : 132 . . . 141; **13** : 128, 129; **14** : 111 . . . 116; **16** : 84; **17** : 135; **19** : 3, 99, 199.
— — ssp. austriacus **12** : 67; **19** : 59—60.
— cernuus **7** : 250.
— compressus **4** : 200; **10** : 230, 281, 403, 408; **12** : 33.
— eupaluster **7** : 100; **8** : 204; **17** : 80.
— Hudsonianus **20** : 19.
— lacustris (lacuster) **2** : 54; **3** : 24; **6** : 79; **7** : 99; **8** : 204, 318;[1] **10** : 16, 256, 258; **12** : 254; **13** : 34, 96, 104, 105; **15** : 106, 115; **16** : 3; **17** : 37, 78; **18** : 123, 124; **19** : 18, 94, 99; **20** : 5, 19, 63.
— mamillatus **2** : 14, 43, 116; **3** : 33, 83; **4** : 76, 83; **7** : 100, 269; **8** : 204; **9** : 178; **10** : 257, 258, 280; **15** : 115; **17** : 35, 38, 76; **18** : 123.
— maritimus **2** : 48, 54; **3** : 49; **7** : 269; **9** : 132; **10** : 289, 408; **11** : 33, 149; **14** : 5; **15** : 13, 217; **16** : 7; **17** : 77, 78; **19** : 59.
— nodosus **7** : 251, 252.
— ovatus **19** : 2, 121, 189, 305; **20** : 63.
— palustris (paluster) **2** : 43, 48, 49, 54; **4** : 73, 84, 200; **5** : 40; **10** : 230, 256—258, 406; **11** : 30, 31, 33; **12** : 38; **13** : 106; **14** : 5; **15** : 13, 106, 115; **17** : 76, 124, 135; **18** : 123; **20** : 5, 19.
— — ssp. eupaluster **3** : 24; **20** : 61, 67.
— — ssp. mamillatus **3** : 24; **12** : 67; **20** : 67.
— parvulus **4** : 200; **8** : 275, 281; **11** : 5; **17** : 78.
— pauciflorus **4** : 200; **5** : 30, 40; **6** : 110; **7** : 36, 269, 272, 275; **8** : 22, 43; **10** : 156, 230, 274, 426, 427; **12** : 38, 133; **14** : 47, 49; **15** : 115; **17** : 124, 135, 138; **20** : (64), 133.
— pumilus **12** : 63.
— radicans **10** : 177; **15** : 115, 119; **18** : 270; **20** : 63.
— rufus **4** : 21, 82—84, 173, 200; **10** : 239, 280, 281, 408, 432; **12** : 112; **16** : 63.
— silvaticus **3** : 24; **5** : 12, 16, 28, 40; **6** : 26, 93; **7** : 99; **8** : 204; **12** : 67, 133; **14** : 114; **15** : 30, 109, 115; **17** : 34, 37, 51, 124, 132, 135; **18** : 123; **20** : 67, 105, 112, 119.

[1] Per errorem fluviatilis; vide **9** : 252.

Scirpus Tabernaemontani **4**: 78, 82, 83, 200; **5**: 40; **6**: 79; **7**: 99, 269; **8**: 21, 22; **9**: 132; **10**: 257; **11**: 31, 149, 192; **12**: 112; **14**: 5; **15**: 45, 115, 196, 216, 229; **16**: 7; **17**: 77, 78; **19**: 59; **20**: 5, 6.
— trichophorum **11**: 157, 159; **13**: 129; **14**: 49; **15**: 115; **17**: 124, 126, 135, 219, 222; **19**: 3, 93, 99, 199; **20**: 19, 39, 133.
— uniglumis **1**: 33, 50; **4**: 27, 72 . . . 84, 187, 191; **7**: 100; **8**: 22; **10**: 230, 240, 257, 403; **11**: 149; **15**: 106, 115, 195, 216, 217; **16**: 58; **17**: 76, 200; **19**: 199; **20**: 43.
— — v., ssp. fennicus **4**: 200; **5**: 40; **10**: 156; **12**: 38, 110, 112; **20**: 19.
— sp. **3**: 42, 43, 44; **4**: 110; [**6**: 159]; **11**: [20, 29], 30.
Scleranthus annuus **1**: 78; **3**: 25; **4**: 208; **5**: 13, 18, 46; **7**: 106; **8**: 211; **10**: 163, 429; **15**: 109, 123; **16**: 15; **17**: 40; **18**: 28, 121; (**19**: 97); **20**: 21, 70, 86.
— perennis **11**: 147; **13**: 98, 100.
Scleropoa rigida **7**: 320.
Scolochloa festucacea **3**: 52, 83; **5**: 12, 16; **6**: 91; **10**: 277; **17**: 61; **20**: (64), 134.
Scorzonera hispanica **3**: 30; [**15**: 109].
— humilis **4**: 176, 226, 228 (mp.); **5**: 66; **10**: 223, 238, 277; **11**: 150; **12**: 45, 111, 167—169; **15**: 31, 108, 137; **17**: 54.
— sp. **9**: 188.
Scrophularia alata **11**: 147.
— nodosa **3**: 29; **4**: 87, 90, 221; **5**: 13, 24, 28, 65; **6**: 27; **7**: 115, 122, 133, 134, 136; **9**: 15, 164; **10**: 237; **11**: 19, 24, 26, 27, 34, 37, 39; **12**: 43, 65, 73; **13**: 13, 16; **15**: 133; **17**: 11, 81, 199; **18**: 99, 120; **19**: 147; **20**: 23, 74.
— vulgaris **5**: 58.
Scutellaria galericulata **2**: 56; **3**: 29; **4**: 74, 87, 220; **5**: 13, 24, 57; **6**: 27; **7**: 114; **8**: 217; **9**: 180; **10**: 158, 404; **11**: 34 . . . 39; **12**: 43; **13**: 11, 13; **15**: 133; **17**: 81, 137; **18**: 123; **19**: 94, 102; **20**: 23, 74, 120.
— hastifolia **2**: 63, 64; **5**: 30, 57; **4**: 21, 23, 89, 175; **7**: 32, 36, 37; **8**: 281; **9**: 22; **10**: 146, 172, 278, 280, 409, 426, 427; **11**: 7; **12**: 145; **13**: 15, 16; **20**: 3.
Secale cereale **3**: 23; **4**: 10; [**7**: 17]; **13**: 89, 98; **15**: 52, [109]; **16**: 10, 13; **17**: [206—208], 343; **19**: 38, 40, 91, 100, 107, 108, 149; **20**: 129.
— — × Tritium vulgare **10**: 37.
Sedum acre **2**: 20—21, 28, 55; **3**: 17, 27, 63, 84; **4**: 70, 71, 175, 211; **5**: 13, 21, 27, 49; **6**: 27, 138; **7**: 47, 108, 121, 125, 125, 133, 134, 136; **8**: 41, 45; **10**: 25, 26, 34, 147, 157, 163, 234; **11**: 55, 56, 133; **12**: 34, 40, 71, 112, 175, 177; **13**: 14; **15**: 32, 126; **17**: 28, 29, 40, 76; **18**: 42, 145; **19**: 31, 189; **20**: 3, 21, 71, 106, 146.
Sedum album **3**: 27, 34; **4**: 86, 210, 211; **5**: 30, 49, 71; **6**: 111, 232; **8**: 42, 195; **10**: 163, 275, 342 . . . 354, 409, 429; **11**: 56; **15**: 211; **19**: 68.
— annuum **3**: 27, 63, 84; **4**: 86, 174; **5**: 30, 49; **10**: 274, 342 . . . 354, 409, 418; **19**: 68, 122.
— glaucopruinosum **5**: 49; **12**: 112.
— fabaria **20**: 71.
— maximum **4**: 5, 7; **7**: 93, 108; **11**: 55, 56; **19**: 147.
— oppositifolium **14**: 171.
— pseudotelephium **5**: 49.
— purpureum **20**: 86.
— rupestre **2**: 63, 116; **3**: 27; **10**: 33, 281, 342 . . . 354, 409, 418; **12**: 15.
— sexangulare **10**: 154, 179, 234, 281, 409, 431; **12**: 15, 33.
— spurium ssp. oppositifolium **15**: 126.
— telephium **2**: 55; **3**: 34, 63, 84; **4**: 5—7, 26, 86, 127, 211; **5**: 49; **6**: 27, 29, 30. 43, 138; **7**: 47, 121, 125, 134, 136; **8**: 240; **9**: 177; **12**: 114; **15**: 14; **17**: 28, 29, 40, 81; **18**: 42, 123, 176, 181; **19**: 31, 68.
— — f. *glaucopruinosum* **4**: 7; **10**: 157; **12**: 114.
— — f. *pseudotelephium* **4**: 7; **10**: 163; **12**: 145.
— — ssp. fabaria **15**: 110, 126.
— — ssp. maximum **15**: 14, 126.
— villosum **3**: 14—16, 129, 134, 135; **11**: 170.
— — f. *pusillum* **3**: 15, 134.
— sp. **19**: 37.
Selinum carvifolium **1**: 146; **4**: 88, 217; **10**: 409, 432; **11**: 21, 22, 31, 33, 36, 39; **13**: 11; **15**: 218; **17**: 11; **19**: 71.
— parviflorum (**20**: 64).
Selkirkia **7**: 251.
Sempervivum Funckii **8**: 89.
— soboliferum **11**: 147; **12**: 165; **19**: 121, 189.
Senecio discoideus **19**: 199; **20**: 42.
— integrifolius **10**: 238; **12**: 33, 111, 165, 254; **14**: 172.
— jacobaea **3**: 30; **7**: 275; **9**: 164, 165, 178; **12**: 35; **19**: 138; **20**: 127, 131, 132, 141.
— nemorensis **3**: 129.
— paludosus **11**: 147.
— palustris (paluster) **18**: 271; **19**: (97), 199; **20**: 32, 33.
— pseudo-Arnica **19**: 199; **20**: 30, 31, 34, 38.
— rupestris **8**: 19, 374.
— silvaticus **2**: 50, 56; **3**: 36; **4**: 88, 225, 228, 229 (mp.); **5**: 48, 61; **6**: 27; **7**: 48, 122, 135, 136; **10**: 280; **15**: 136; **17**: 11, 199; **18**: 26, 28, 121, 122; **19**: 30, 31, 33, 39, 40, 76; **20**: 76, 146.

Senecio vernalis **2** : 110; **8** : 201, 219; **11** : 147; **15** : 136; **20** : 64.
— viscosus **3** : 36; **7** : 275; **9** : 165; **10** : 142; **12** : 65, 74, 113; **13** : 99, 100; **15** : 111, 136; **16** : 12, 13, 15; **17** : 71, 81; **18** : 66, 67, 122; **19** : 39, 76, 104, 148, 150; **20** : 12, 76, 128, 131, 141.
— vulgaris **3** : 30, 79—80, 84; **4** : 225; **5** : 48, 61; **6** : 27; **7** : 48, 82, 117; **8** : 219; **10** : 143; **12** : 3, 35, 44, 113; **15** : 59, 61, 65, 136; **17** : 81; **18** : 27, 28, 66, 97, 121, 122; **19** : 32, 33, 39, 40, (97), 150, 199; **20** : 12, 23, 62, 76, 90, 127.
Seseli libanotis **4** : 217; **8** : 20, 23; **10** : 153, 236, 276, 277, 431; **12** : 13, 17, 20, 21, 35, 42, 165.
Sesleria coerulea **1** : 48; **4** : 86, 198; **6** : 91, 92, 93; **8** : 21, 37, 38, 65, 71, 73, 76; **9** : 21; **10** : 32, 149, 152, 173, 179, 180, 223, 227, 229, 233, 235, 236, 274 . . . 286 (mp.), 404, 405, 408, 429; **11** : 153; **12** : 13, 22, 23, 33, 37, 110, 167, 168, 171, 191—193; **15** : 214, 216; **17** : 233, 237; **18** : 27.
Setaria glauca **6** : 232; **15** : 110, 118; **19** : 39, 40.
— viridis **6** : 232; **11** : 116; **12** : 143; **15** : 110, 111, 118; **18** : 66, 67; **19** : 39, 40, 43, 107, 138; **20** : 131, 134.
Sherardia arvensis **9** : 237; **15** : 135; **19** : 105, 111.
Sibbaldia procumbens **8** : 269; **14** : 51; **17** : 220, 224; **19** : 199; **20** : 31, 33, 40, 87.
Sibbaldiopsis tridentata **19** : 199; **20** : 31 . . . 37, 41, 44.
Sideritis montana **2** : 36, 110, 115; **15** : 111, 133.
Sieglingia decumbens **2** : 54; **4** : 198; **5** : 39; **10** : 146, 162, 280; **12** : 33, 37, 112; **13** : 4; **15** : 119; **17** : 54, 196; **19** : 62; **20** : 3.
Silene acaulis **8** : 266; **10** : 370, 371; (**14** : 66); **16** : 92; **17** : 219, 223; **19** : 199; **20** : 30—34, 40.
— armeria **3** : 25.
— chlorantha **12** : 165.
— cucubalus **20** : 20.
— dichotoma **3** : 25; **10** : 142; **12** : 144; **13** : 98; **20** : 69, 131, 135.
— inflata **3** : 25; **7** : 95, 105; **8** : 210; **11** : 150; **15** : 122; **17** : 221; **18** : 66; **19** : 38, 96, 97, 100, 199; **20** : 20, 69, 126, 129.
— — f. litoralis **7** : 105.
— — ssp. maritima **18** : 145.
— latifolia v. litoralis **2** : 48, 55.
— litoralis **7** : 121, 136.
— maritima **3** : 11; **5** : 78; **9** : 143.
— noctiflora **10** : 142; **16** : 10, 13; **19** : 65, (97), 108.
— nutans **2** : 51, 55; **3** : 59 (fig.), 84; **4** : 174, 208; **5** : 46; (**7** : 32); **8** : 278; **10** : 233; **11** : 57, 147; **12** : 34, 40, 112, 175; **15** : 8, 122; **17** : 11, 196; **18** : 42, 135, 165 . . 170, 180; **20** : 85.
Silene nutans f., v. glabra(ta) **4** : 26; **17** : 11; **19** : 65.
— otites **11** : 147.
— pendula **3** : 25.
— rupestris **3** : 25, 47, 58, 84; **4** : 174; **7** : 258; **8** : 78—79 (mp.), 195; **12** : 12, 15, 20; **17** : 11; **18** : 42; **19** : 65, 147.
— tatarica **6** : 231; **11** : 147; **12** : 165; **19** : 2; **20** : 63.
— venosa f. litoralis **8** : 278.
— viscosa **2** : 63, 116; **4** : 21, 23, 61, 142, 174; **5** : 103; **7** : 48; **9** : 144; **10** : 172, 280; **12** : 144.
— vulgaris **4** : 208; **5** : 46; **7** : 37, 47; **10** : 142, 280; **12** : 34, 40; **13** : 13, 14; **15** : 14; **16** : 10, 13; **18** : 26, 28, 121; **20** : 85.
— — v. litoralis **1** : 21.
— sp. **18** : 166.
Silybum marianum **3** : 36; **4** : 226; **20** : 64.
Sinapis alba **12** : 15, 20; **20** : 63.
— arvensis **3** : 26; **4** : 209; **9** : 165; **12** : 27—30, 34, 40, 111; **13** : 90; **15** : 110, 125, 211; **16** : 11, 12; **19** : 40, 91, 101, 109; **20** : 70, 86.
Sisymbrium altissimum **12** : 3; **13** : 98; **15** : 59, 110, 125; **19** : 39—41, 43, 95, 98, 101, 109; **20** : 63, 86, 136.
— Hartwegianum **9** : 164, 165; **19** : 199; **20** : 43.
— Loeselii **13** : 98; **15** : 110, 125; **19** : 39, 41, 101; **20** : 126, 128, 132, 136.
— officinale **2** : 49, 55; **4** : 209; **8** : 201, 212; **12** : 34, 40; **15** : 110, 125; **16** : 11, 13; **18** : 66; **19** : 31, 39—41, 95, 98, 101, 147, 149; **20** : 131, 136.
— orientale **2** : 36, 116; **19** : 43.
— sinapistrum **7** : 272; **8** : 201, 212; **9** : 165; **13** : 100, 101.
— sophia **4** : 209; **6** : 27; **8** : 200, 212; **9** : 165; **12** : 34, 40; **16** : 11, 13, 14; **19** : 147; **20** : 86.
— volgense **4** : 290.
Sisyrinchium angustifolium **7** : 321.
Sium angustifolium **17** : 233.
— erectum **3** : 35; **4** : 216, 228 (mp.).
— latifolium **1** : 25; **6** : 91, 93; **7** : 79; **10** : 177; **15** : 130; **20** : (64), 139.
— sp. **11** : 149.
Smilacina trifolia **19** : 199.
— sp. **20** : 35, 43.
Sobralia macrantha **15** : 186.
Solanum dulcamara **3** : 29; **4** : 91, 220, 228 (mp.); **5** : 30, 58; **7** : 114; **12** : 35, 172; **15** : 133; **17** : 80, 82, 199; **18** : 123; **19** : 31, 39—41, 74, 106, 111, 117; **20** : 23, 63.
— — f. alba **8** : 92.
— — f. assimile **19** : 147.
— lycopersicum **3** : 29; **15** : 59, 64; **19** : 40, 107, 111.

Solanum nigrum **3** : 8; **4** : 175; **7** : 47, 274; **8** : 281; **9** : 164; **10** : 18 (fig.), 19, 143; **13** : 20; **15** : 133; **18** : 66; **20** : 131, 140.
— tuberosum [**1** : 43]; **3** : 29; [**10** : 1, 475]; **19** : 102, 107, 111.
— sp. **9** : 238; **10** : 473.
Soldanella sp. **17** : 209.
Solidago macrophylla **19** : 200; **20** : 31, 33, 39—41, 44.
— — v. thyrsoidea **19** : 200.
— multiradiata **19** : 200; **20** : 39.
— virgaurea **2** : 42, 56; **3** : 30; **4** : 127, 223; **5** : 14, 26, 28; **6** : 27, 138, 145; **7** : 117, 122, 133—136; **8** : 219; **9** : 24; **10** : 274, 275, 406, 409, 425, 429, 432; **11** : 17, 163; **12** : 19, 35, 44, 113, 136, 168; **13** : 21, 129; **14** : 6, 7, 53, 113; **15** : 99—102, 108, 135, 191; **16** : 5; **17** : 137, 220; **18** : 34, 120; **19** : 55, 103, 150; **20** : 23, 62, 75, 99, 111, 114, 117.
— — forma **12** : 123.
— — f. litoralis **9** : 126.
Sonchus arvensis **2** : 56; **3** : 30; **4** : 81, 226; **5** : 61; **6** : 28; **7** : 118; **8** : 21, 200, 220; **9** : 144; **10** : 158, 404; **12** : 36, 45, 113; **13** : 91; **15** : 14, 109, 110, 137, 217; **16** : 67—72; **17** : 11, 43, 81; **18** : 121, 122; **19** : 31, 39, 40, 97, 103, 150; **20** : 23, 62, 76, 127, 128.
— — f., v. laevipes **3** : 30; **7** : 118; **16** : 71; **19** : 77.
— — f., v. maritimus **1** : 33; **4** : 67, 68, 85; **7** : 118, 125; **16** : 68; **19** : 77.
— — v. litoralis **16** : 68.
— asper **3** : 30; **4** : 226; **5** : 62; **12** : 45, 113; **13** : 92; **15** : 111, 137; **17** : 81; **18** : 27, 28, 66, 67; **19** : 31, 33, 39—41, 112, 150; **20** : 76, 127, 128, 141.
— maritimus **2** : 7 (cecid.); **4** : 127; **7** : 122, 133, 135, 136; **16** : 67—72.
— oleraceus **2** : 51, 56; **3** : 30, 78 (fig.), 81, 85; **4** : 226; **5** : 9; **6** : 28; **12** : 45; **15** : 111, 137; **16** : 67; **19** : 31, 33, 39—41, 112, 150; **20** : 23, 91, 127, 128, 141.
Sophora fernandeziana **7** : 249.
— masafuerana **7** : 253.
Sorbaria sorbifolia **3** : 27; **8** : 213; **19** : 107, 109.
Sorbus aria **10** : 64.
— — × aucuparia **10** : 42, 64.
— aucuparia **2** : 42, 52, 55; **4** : 26, [74, 83], 86, 211; **5** : 13, 21, 50, 64; **6** : 27 . . . 43, 124, 126—128, 140; **7** : 32, [93], 102, 110, 121, 128, 129, 134, 136; **8** : 24, 53, 69, 75, 214; **9** : 24—26, 190; **10** : 231, 234, 406; **11** : [16], 17, 21—27; **12** : 34, 41, [56], 112, 168, 187 . . . 192; **13** : 17, [31]; **14** : 6, 51; **15** : 31, 32, [100, 101], 128; 192, 194, 214, 222, 224, 225; **17** : 80, 82, 86, [183, 195], 220; **18** : 20, 28, [32 . . . 44], 109 . . . 120, [130, 165, 172], 177, [179], 181, 182; **19** : 93, 101, 150; **20** : 22, 51, 54, 57, 59, 63, 72, 99, 107, 113, 159—161, 165—170.
Sorbus aria f. laciniata **15** : 274.
— — × fennica **10** : 41, 42.
— — × suecica **10** : 41.
— fennica **4** : 31, 86; **5** : 50; **8** : 279; **10** : 41, 42, 58, 64, 172, 276, 277, 408, 430; **12** : 15, 22; **13** : 6; **15** : [109], 214, 224; **17** : 86, 198; **18** : 28, 110, [172], 177, 181; **19** : 69.
— — × suecica **10** : 41—42.
— *fennosuecica* **10** : 41—42.
— scopulina **19** : 200; **20** : 30.
— suecica **3** : 34, 38, 136; **4** : 23, 211; **10** : 41, 42, 64, 234, 275, 276, 281, 408, 432; **11** : 192—194; **12** : 16, 22, 33, 41; **15** : [109], 214; **17** : 86; **18** : 114, 115.
— sp. **20** : 58.
Spargania affine **1** : 147; **2** : 54; **4** : 173; **7** : 34; **10** : 257, 280; **12** : 132; **13** : 32, 34; **14** : 49, 55; **15** : 47, 114; **17** : 35, 37.
— — × Friesii **10** : 66; **18** : 94.
— affine × minimum **18** : 94.
— Friesii **7** : 34; **10** : 16, 239; **13** : 34; **15** : 114; **17** : 37; **18** : 94; **19** : 94, 99.
— — × simplex **10** : 66; **18** : 94.
— glomeratum **3** : 22; **4** : 173; **7** : 34; **8** : 203; **13** : 32, 34; **15** : 114; **17** : 37; **20** : 133.
— hyperboreum **12** : 132; **14** : 49, 113; **18** : 94; **19** : 203; **20** : 40, 41, 45.
— minimum **3** : 22; **5** : 37; **7** : 96; **8** : 203; **12** : 37; **13** : 32; **15** : 92, 114, 196; **17** : 37, 124; **18** : 63, 94, 123, 124; **19** : 94, 99; **20** : 5, 19, 61, 66, 83.
— — mf. septentrionalis **3** : 22.
— natans **3** : 22; **4** : 75 . . . 83; **8** : 203; **13** : 32.
— ramosum **3** : 49; **4** : 173; **7** : 96, 268; **13** : 34; **18** : 123; **19** : 122, 190; **20** : 61, 66.
— — v., ssp. microcarpum **3** : 33; **4** : 173, 196; **5** : 30, 37; **15** : 114; **19** : 59; **20** : 19, 133.
— simplex **3** : 22, 85; **4** : 196?; **7** : 96; **8** : 202; **12** : 111; **13** : 32; **15** : 13, 114; **17** : 37, 80; **18** : 94; **20** : 61, 66.
— speirocephalum **10** : 66.
— sp. **10** : 289; **20** : 10.
Spergula arvensis **2** : 28, 51, 55; **3** : 57, 84; **4** : 10, 67, 207; **5** : 13, 18, 45; **6** : 27; **7** : 106, 114; **8** : 211; **10** : 143; **12** : 70, 112; **13** : 12; **15** : 123; **16** : 14; **18** : 66, 121, 122; **19** : 31, 40, 91, 96, 100; **20** : 61, 62, 70, 86, 128.
— — v. vulgaris **3** : 25.
— rubra **20** : 21.
— vernalis **5** : 46; **7** : 93, 106; **10** : 342 . . . 354, 403; **11** : 33, 39, 147; **13** : 90; **15** : 123; **17** : 27, 197; **19** : 66, 147; **20** : 146.
Spergularia campestris **2** : 55; **7** : 106.
— canina **7** : 106.

Spergularia rubra **4** : 208; **5** : 46; **10** : 18 (fig.), 19; **12** : 70; **13** : 98; **15** : 123; **17** : 197; **18** : 66; **19** : (97), 100; **20** : 70.
— salina **1** : 49, 50, 51; **2** : 50, 55; **3** : 86; **4** : 208; **5** : 46; **7** : 38, 272; **8** : 20, 21, 22; **11** : 31, 33; **12** : 112; **13** : 12, 21; **15** : 93, 123; **17** : 197.
— — v. leiosperma **19** : 66.
Spinacia oleracea **9** : 164; [**15** : 109].
— — f. inermis **3** : 25.
— — f. spinosa **3** : 25.
Spiraea salicifolia **3** : 27; **8** : 213; **19** : 147.
— ulmaria **2** : 55; **11** : 21, 24, 31—39; **13** : 9 . . . 16; **16** : 5; **19** : 31.
— sp. [**1** : 45]; **15** : 109.
Spiranthes cernua **19** : 200; **20** : 45.
Spirodela polyrrhiza **4** : 22, 23, 61, 173; **11** : 52; **12** : 24, 143; **13** : 34; **15** : 106, 114; **19** : 122, 123, 190; **20** : 132, 133.
Stachys ambigua **5** : 57; **6** : 111.
— annuus **9** : 165; **13** : 99, 100; **15** : 111, 132.
— officinalis **15** : 132; **20** : 63.
— palustris (paluster) **2** : 56; **3** : 29; **4** : 23; **5** : 13, 24, 57; **8** : 281; **10** : 58, 429, 431, 432; **11** : 34; **13** : 13; **15** : 132; **17** : 41, 81; **18** : 121; **19** : 106, 110, 147; **20** : 23, 62, 74.
— — f. agrestis **3** : 29.
— — × silvaticus **5** : 57; **6** : 111.
— silvaticus **3** : 29; **4** : 87; **5** : 13, 24, 30, 57; **6** : 111; **8** : 281; **9** : 164; **10** : 58, 274, 409, 424, 429; **11** : 7; **12** : 18, 22; **15** : 8, 103, 132; **17** : 181; **18** : 34, 44; **19** : 73, 123, 147, 189; **20** : 74, 114, 139.
Stanhopea superba **15** : 186.
— tigrina **15** : 186.
Stapelia sp. **6** : 86.
Statice armeria **16** : 68; **19** : 72.
— labradorica **20** : 33.
Stellaria alpestris **8** : 266.
— aquatica **3** : 25.
— borealis **8** : 266; **20** : 40.
— calycantha **12** : 62, 138; **14** : 51, 118; **16** : 89; **17** : 219; **19** : 46, 50; **20** : 85.
— — × longifolia **12** : 138; **14** : 118; **17** : 74; **20** : 85.
— crassifolia **4** : 100; **8** : 99, 266, 374; **9** : 22; **10** : 172, 173, 279; **11** : 158, 169; **12** : 70, 138; **14** : 118; **17** : 136, 138; **19** : 37—38, 66, 122, 124 (fig.), 129, 132, 189, 190, 200; **20** : 48, 56, 69, 121, 122, 136.
— — v. brevifolia **4** : 207, 228 (mp.); **8** : 99; **15** : 123.
— — v. paludosa **8** : 99.
— graminea **1** : 17; **2** : 51, 55; **3** : 25; **4** : 26, 70, 71, 81, 86, 127, 207; **5** : 13, 18, 45; **6** : 27, 138; **7** : 105, 121, 125, 133, 136; **8** : 211, 266; **9** : 24; **10** : 34, 162, 167; **11** : 24, 26, 33, 35, 39, 55, 56, 152; **12** : 34, 39, 110, 112, 175; **13** : 15, 16, 33; **14** : 51; **15** : 32, 108, 123; **17** : 74, 82, 124; **18** : 26, 27, 28, 33, 119; **19** : 31, 40, 96, 100, 149; **20** : 20, 51, 62, 69, 117 . . . 120, 128, 129.
Stellaria graminea f. parviflora **19** : 65.
— — v. *ciliata* **17** : 74.
— graminea × longifolia **17** : 74.
— holostea **3** : 25; **4** : 22, 207, 228 (mp.); **5** : 30, 32, 45, 129, 131 (cecid); **6** : 143—145; **7** : 105, 258; **8** : 78, 195, 278; **9** : 24; **10** : 274, 275; **11** : 148; **12** : 34, 112; **13** : 13, 98; **15** : 8, 29, 31, 32, 102, 103, 123; **17** : 124; **20** : 63 99, 106.
— humifusa **8** : 266; **20** : 31.
— longifolia **3** : 25; **6** : 27; **8** : 211; **10** : 98; **11** : 158; **12** : 70; **14** : 118; **15** : 94, 123; **16** : 5; **17** : 11, 66, 74, 196; **18** : 98; **19** : 65; **20** : 113, 136.
— longipes **20** : 33.
— media **1** : 17; **2** : 55; **3** : 25; **4** : 207; **5** : 45; **6** : 27; **7** : 105, 121, 136; **8** : 210; **10** : 145, 403; **11** : 24, 33, 164, 165; **12** : 34, 39, 112, 176; **14** : 6, 51; **15** : 8, 59, 60, 65, 110, 123; **17** . 81, 124, 219, 221; **18** : 27, 28, 66, 121, 122; **19** : 30, 40, 96, 100, 149, 200; **20** : 20, 62, 69, 85, 126.
— nemorum **2** : 41; **3** : 56, 84; **5** : 8; **6** : 27; **7** : 121, 136, 137; **10** : 281; **11** : 157, 158; **12** : 14, 15, 22, 23, 56, 58, 70; **15** : 8, 29, 32, 103, 123, 233; **19** : 50, 123, 148; **20** : 69, 98, 112, 136.
— palustris **3** : 25; **7** : 105; **8** : 211; **9** : 180; **11** : 164, 165; **15** : 123; **17** : 124, 136, 221; **20** : 20, 69, 85.
— — f. glauca **4** : 207.
— — f. typica **19** : 65; **20** : 69.
— — f. virens **17** : 76; **19** : 65.
— — v. fennica **20** : 69.
— uliginosa **4** : 10; **5** : 13, 18; **7** : 272; **8** : 266; **12** : 56; **15** : 123; **17** : 123, 124, 136; **20** : 21, 56, 69, 136.
— sp. **20** : 32.
Stenophragma thalianum **3** : 26; **4** : 26; **11** : 55. 56; **18** : 42.
Stipa fernandeziana **7** : 251.
Stratiotes aloides **3** : 4, 136; **6** : 91; **9** : 181; **11** : 145; **18** : 58; (**20** : 64).
Streptopus amplexicaule (amplexifolius) **19** : 200; **20** : 30, 31. 33, 35, 38—40, 44, 45.
Suaeda maritima **1** : 49—51, 54, 88, 157; **3** : 50; **4** : 143, 177; **6** : 103; **7** : 38; **8** : 19—22; **10** : 172, 173, 276, 279, 408, 428, 429; **12** : 169; **19** : 141.
Subularia aquatica **3** : 26; **7** : 107; **8** : 212; **10** : 16; **11** : 159; **15** : 106, 107, 125; **17** : 35, 44, 219, 224; **19** : 200; **20** : 61, 70, 136.
Succisa pratensis **3** : 30; **4** : 223; **5** : 14, 26, 66; **6** : 93; **7** : 116; **9** : 24, 164; **10** : 275, 425; **12** : 3, 35, 44, 73, 111; **15** : 89, 135,

233; **17** : 11, 233; **18** : 99, 120; **20** : 62, 75, 118, 140.
Succisa pratensis f. albiflora **19** : 75; **20** : 75.
Sweertia perennis **6** : 93.
Symphoricarpus racemosus **3** : 29; **15** : 109.
Symphytum asperum **10** : 64.
— officinale **3** : 73, 84; **9** : 165; **10** : 64; **15** : 132; **19** : 73; **20** : 63.
— — f. albiflorum **19** : 73.
— — f. intermedium **19** : 73.
— orientale **9** : 164; **10** : 64.
— peregrinum **10** : 64; **19** : 73.
Syringa chinensis **10** : 63.
— persica × vulgaris **10** : 66.
— vulgaris [**1** : 45]; **3** : 29; [**9** : 84]; **10** : 225; **16** : 78—82; [**18** : 166 . . . 180].
— sp. **15** : 109.
Tagetes erectus **3** : 30.
— patulus **3** : 30.
Tamus **7** : 189.
Tanacetum vulgare **2** : 56; **3** : 30; **4** : 89; **5** : 60; **6** : 28, 88, 139; **7** : 47, 118, 122, 125, 134, 136; **8** : 219; **9** : 24, 187; **10** : 278, 280; **11** : 21, 22, 24, 34, 39, 150; **12** : 3, 13, 19, 20, 21; **13** : 13, 14; **15** : 14, 217; **17** : 76; **18** : 27, 28, 66; **19** : 148; **20** : 3, 90.
— — f. *cervicaria* **11** : 214.
— — f., v. crispum **3** : 30; **7** : 118; **8** : 219.
Taraxacum acutidens **20** : 91.
— aequilobum **8** : 137, 142, 177, 308, 313; **10** : 141, 143, 185, 186, 188; **15** : 137.
— alatum **8** : 137, 143, 177.
— albicollum **8** : 137, 143, 177; **9** : 23; **10** : 149, 185, 187, 188, 221; **13** : 91; **15** : 137; **19** : 56.
— altissimum **8** : 137, 143, 177, 304, 308, 313; **10** : 141—143, 169, 171, 185, 188, 190, 195, 200; **15** : 137.
— *amoenum* **8** : 137, 144, 177—179.
— amplum **15** : 137.
— angustisquameum **8** : 137, 144, 177, 220, 308, 314; **10** : 141, 142, 174, 185, 188, 195, 221; **15** : 137.
— angustissimum **6** : 111; **8** : 304, 308, 313, 314; **10** : 149, 150, 169, 171, 185, 188; **11** : 8; **15** : 137.
— assurgens **15** : 138.
— atrimarginatum **13** : 91.
— atripictum **10** : 221.
— aurosulum **8** : 137, 145, 177, 178, 308, 313, 314; **10** : 141—143, 154, 169, 171, 185, 188, 191.
— balticum **4** : 226; **5** : 62; **6** : 55, 232; **7** : 165; **8** : 22, 39, 46, 304, 307, 313—316; **10** : 138, 149 . . . 161, 169 . . . 185, 186 (mp.), 189, 220, 428, 429; **17** : 27.
— biformatum **8** : 220.
— biforme **8** : 137, 145, 177, 178; **9** : 23; **10** : 144, 147, 182, 185, 188, 189; **13** : 91; **15** : 138.
Taraxacum boreum **20** : 91.
— Borgvallii **10** : 99; **15** : 138.
— brachycranum **10** : 176; **20** : 65.
— brachyglossum **10** : 176, 177.
— *brachylepis* **8** : 137, 145, 177.
— brevisectum **8** : 137, 145, 177, 179.
— caespitans **19** : 56.
— caloschistum **8** : 137, 146, 177, 309, 313; **10** : 141, 143, 185, 188, 189, 221.
— canaliculatum **8** : 137, 146, 177, 220, 304, 309, 313—316; **10** : 141—143, 154, 169, 171, 185, 186 (mp.), 188, 189, 197; **15** : 138; **20** : 65.
— canoviride **8** : 137, 147, 177, 178.
— capnocarpum **9** : 23; **10** : 139.
— caudatulum **8** : 137, 147, 177; **9** : 23; **10** : 141, 185, 189; **13** : 91; **15** : 138.
— chloroleucum **8** : 137, 147, 177, 178; **15** : 138.
— cochleatum **19** : 56; **20** : 91.
— commutatum **10** : 176, 177.
— concolor **8** : 137, 148, 177—179, 304; **9** : 23; **10** : 139.
— conjungens **8** : 304; **9** : 23; **10** : 139, 177.
— *constrictifrons* **10** : 35, 151, 174, 185, 190.
— copidophyllum **8** : 137, 148, 177, 178.
— cordatum **8** : 137, 148, 177; **9** : 23; **10** : 141, 185, 190, 195, 200.
— crassipes **3** : 30; **8** : 137, 149, 154, 177, 220; **9** : 24.
— crebridens **8** : 137, 149, 177, 309, 314; **10** : 141, 185, 188, 190; **13** : 91.
— crispifolium **8** : 137, 149, 177; **10** : 221; **15** : 138.
— croceiflorum **8** : 137, 150, 177; **9** : 23; **10** : 141, 185, 190.
— croceum **8** : 274; **11** : 163; **14** : 53; **19** : 56, 200; **20** : 40, 91.
— Dahlstedtii **3** : 30; **5** : 62; **6** : 29, 30, 44, 111; **8** : 137, 150, 177, 220, 304, 309, 313—316; **10** : 143—145, 154, 165, 169, 171, 185, 187 (mp.), 188, 190, 194; **12** : 45; **15** : 138.
— decipiens **9** : 23, 141, 142; **10** : 34, 149, 150, 174, 185, 188, 190, 199, 220.
— decolorans **10** : 220.
— dilatatum **8** : 137, 151, 177, 179, 309, 313; **10** : 141, 185, 191; **13** : 91; **15** : 138.
— dissimile **10** : 139, 177, 220; **17** : 60, 61.
— distantilobum **8** : 137, 151, 177, 220; **15** : 138.
— duplidens **8** : 137, 152, 177, 309, 313—316; **10** : 141, 185, 191, 221; **15** : 138.
— Ekmanii **10** : 141, 185, 191, 193, 221; **15** : 138.
— *epacroides* **8** : 137, 152, 177, 178.
— euoplocarpum **15** : 138.
— *falciferum* **8** : 137, 152, 163, 177—180.
— *fallax* **10** : 151, 185, 191.
— fasciatum **8** : 137, 153, 177, 310, 313—

316; **10** : 141, 143, 154, 170, 171, 185, 188, 191; **15** : 138.
Taraxacum Florstroemii **8** : 137, 153, 177—179; **9** : 23; **10** : 139; **15** : 138.
— fulvum **3** : 31; **8** : 137, 138, 141, 154, 177, 220, 305, 313—316; **10** : 34, 144—146, 155, 164, 170, 171, 176, 185, 187 (mp.) . . . 191, 194, 196, 199, 220; **15** : 137; **20** : 76.
— Gelertii **8** : 138, 153, 174, 177—179.
— gibberum **8** : 138, 154, 177—180.
— glaucinum **9** : 23; **10** : 176.
— glaucum **10** : 139.
— gotlandicum **10** : 176, 177.
— gracilentum **15** : 138.
— guttulatum **8** : 138, 154, 175, 177, 220; **15** : 138.
— haematopodides **13** : 91.
— haematopus **6** : 111; **8** : 138, 154, 177, 304, 310, 313, 314; **10** : 141, 143, 145, 170, 171, 185, 190, 192, 194, 200, 221.
— Haglundii **15** : 138.
— hamatiforme **8** : 138, 155, 177, 178; **15** : 138.
— hamatum **8** : 138, 155, 177, 178.
— hastigerum **15** : 138.
— hirtellum **20** : 91.
— Hjeltii **20** : 91.
— Huelphersianum **9** : 23; **10** : 139, 194.
— ingens **10** : 221; **15** : 138.
— intricatum **8** : 138, 156, 177, 310, 316; **10** : 192, 221.
— involucratum **8** : 138, 156, 177, 178, 310, 316; **10** : 141, 185, 192.
— isthmicola **8** : 137, 139, 175, 179, 306, 314; **10** : 151, 174, 176, 177, 185, 192; **15** : 137.
— jaervikylense **8** : 138, 156, 177, 310, 314; **9** : 24; **10** : 151, 174, 182, 185, 192; **13** : 91; **15** : 138.
— karelicum **10** : 151, 174, 185, 193, 221; **15** : 138.
— kittilense **20** : 91.
— Kjellmanii **8** : 138, 157, 177, 310, 313, 314, 316; **10** : 141—143, 154, 185, 186 (mp.), 188, 190, 193—195.
— kuusamoënse **19** : 56; **20** : 91.
— laciniosum **15** : 138.
— lacistophyllum **10** : 176, 177.
— laeticolor **8** : 138, 157, 177, 179, 180; **9** : 23; **10** : 141, 185, 193; **15** : 138.
— lactucaceum **13** : 171.
— laetum **3** : 78 (fig.), 81—82, 85; **4** : 23; **5** : 62; **8** : 304, 306, 313—316; **10** : 138, 144, 146, 147, 155, 164 . . . 185, 187 (mp.), 188, 193 . . . 199, 220; **17** : 27.
— — ssp. obscurans **5** : 62; **8** : 137, 139, 174, 177—179, 304, 306, 313—316; **10** : 144, 146, 147, 169 . . . 176, 185, 188, 193 . . . 199, 220; **13** : 91.
— Langeanum **10** : 176.
Taraxacum *latisectiforme* **8** : 310, 314; **10** : 194.
— latisectum **8** : 138, 158, 177; **15** : 138.
— latissimum **8** : 138, 158, 177, 179; **15** : 138.
— Lehbertii **10** : 221.
— *Lindbergii* **8** : 138, 158, 177; **10** : 222.
— linguicuspis **9** : 23; **10** : 141, 185, 194.
— lingulatum **8** : 138, 159, 177, 178, 310, 313, 314; **10** : 141, 143, 170, 171, 185, 188, 194; **15** : 138.
— linocentrum **8** : 157.
— lissocarpum **10** : 221.
— litorale **5** : 62; **8** : 138, 159, 175, 177—179, 304, 311, 313—316; **10** : 34, 138, 143, 148—150, 155, 156, 168, 170, 171, 182, 185, 186 (mp.), 190, 192, 194, 199, 221; **12** : 45.
— livonicum **10** : 222; **15** : 138.
— lobuliferum **10** : 221.
— longisquameum **8** : 138, 159, 177; **10** : 221; **15** : 138.
— lucidum **8** : 138, 160, 177—179; **10** : 222.
— macranthum **15** : 138.
— maculigerum **8** : 304, 308, 315, 316; **10** : 144, 148 . . . 154, 173, 179 . . . 185, 194, 198, 428, 429; **13** : 8.
— — ssp. euryphyllum **10** : 195.
marginatum **5** : 62; **8** : 41, 137, 140, 141, 156, 177, 304, 313—316; **10** : 34, 144, 146, 147, 155, 164, 170, 171, 176, 185, 187 (mp.), 188, 193, 195, 196, 199, 220.
— microcranum **10** : 222.
— *microlobum* **10** : 201.
— mimulum **8** : 138, 160, 177; **10** : 222; **15** : 138.
— Montellii **20** : 91.
— *mucronatiforme* **8** : 138, 160, 177.
— mucronatum **8** : 138, 161, 177, 220, 304, 311, 313—316; **10** : 151, 156, 185, 188, 195; **15** : 138.
— multilobum **8** : 138, 161, 177—179, 311, 316; **10** : 139, 141, 185, 196.
— obliquilobum **8** : 138, 161, 177; **10** : 141, 185, 196; **15** : 138.
— obnubilum **8** : 138, 162, 177—180.
— obtusulum **8** : 138, 162, 177.
— officinale **1** : 33; **2** : 56; **4** : 127; **6** : 4, 28, 44, 139; **7** : 118, 122, 134, 136; **10** : 183; **11** : 117; **18** : 33, 66, 97; **19** : 96, 103.
— oinopolepis **13** : 91.
— pallens **10** : 222.
— pallidulum **8** : 138, 162, 177.
— palustre **10** : 153, 173, 181, 182, 221, 223, 229, 231, 236, 428; **12** : 45.
— pannulatum **10** : 222.
— paradoxum **9** : 23; **10** : 139, 173.
— pargasense **10** : 151, 174, 185, 196, 220; **15** : 138.
— *parvilobum* **8** : 303, 306, 313—316; **10** : 146, 149, 150, 165, 170 . . . 177, 185, 188, 196, 198, 201.

Taraxacum parvuliceps **8** : 138, 163, 177, 179, 304, 311 315; **10** : 151, 174, 185, 197; **13** : 91; **15** : 138.
— patens **8** : 138, 163.
— pectinatiforme **8** : 138, 163, 177, 220; **15** : 138.
— penicilliforme **8** : 138, 164, 177; **9** : 24; **15** : 138; **20** : 65.
— piceatum **8** : 138, 164, 177, 311, 316; **10** : 139, 141, 185, 197.
— plumbeum **10** : 177.
— polyodon **8** : 138, 165, 177—180; **9** : 23; **10** : 141, 185, 197.
— polyschistum **10** : 177.
— *porrigens* **8** : 138, 165, 177—179.
— praecox **8** : 138, 165, 177, 179; **15** : 138.
— praeradians **8** : 138, 165, 177, 178.
— praestans **5** : 62, 65; **8** : 38, 137, 141, 174, 177, 178, 304, 307, 313—316; **10** : 138, 147, 148, 151 . . . 161, 167 . . . 173, 182, 185, 186 (mp.), 190, 197, 406, 428, 429; **13** : 91.
— — f. *pallescens* **10** : 197.
— privum **8** : 138, 166, 177, 179, 180; **10** : 222; **15** : 138.
— proximum **5** : 62; **8** : 137, 140, 141, 177, 304, 305, 313—316; **10** : 144, 146, 147, 164, 170, 171, 176, 185, 187 (mp.), 188, 193 . . . 197, 199, 220.
— pseudofulvum **8** : 137, 141, 177, 307, 314, 315; **10** : 174, 177, 185, 198; **13** : 91; **15** : 138; **20** : 64, 107.
— pulcherrimum **8** : 138, 166, 177.
— *pullum* **8** : 138, 167, 177—179.
— *Puolannei* **8** : 138, 167, 177—179.
— pycnolobum **10** : 141, 185, 198, 222; **15** : 138.
— *reclinans* **8** : 138, 167, 177, 179.
— recurvum **10** : 151, 185, 198; **15** : 138.
— reflexilobum **8** : 138, 167, 177; **10** : 222; **13** : 91; **15** : 138; **20** : 65.
— remotijugum **1** : 21; **8** : 138, 168, 177, 220, 311, 315; **10** : 149, 152, 174, 185, 188, 193, 198; **15** : 138; **19** : 56; **20** : 91.
— remotilobum **9** : 23; **10** : 35, 139.
— retroflexiforme **20** : 91.
— retroflexum **8** : 138, 168, 177, 312, 313; **10** : 141, 143, 185, 188, 198; **13** : 91; **15** : 138.
— revalense **10** : 35, 144, 148, 149, 174, 182, 185, 193, 198; **15** : 138.
— *robustum* **8** : 138, 169, 177—179.
— rubicundum **10** : 153, 154, 173 . . . 179.
— — ssp. monspeliense **10** : 177.
— rubrolineatum **20** : 91.
— sagittifolium **11** : 164; **19** : 57.
— sanguineum **13** : 91.
— savonicum **13** : 91.
— scanicum **10** : 177.
— semiglobosum **8** : 138, 169, 177, 178.
— septentrionale **19** : 57.
Taraxacum simulum **20** : 91.
— speciosum **9** : 23; **10** : 139.
— Steenhoffianum **15** : 138.
— stenoschistum **8** : 138, 169, 177; **9** : 23; **10** : 141, 185, 199.
— *subcanescens* **8** : 138, 170, 177, 179.
— sublaciniosum **8** : 138, 170, 174, 177—179.
— sublaeticolor **8** : 138, 170, 177; **10** : 222; **15** : 138; **20** : 65.
— submaculatum **20** : 65.
— submaculosum **15** : 138.
— subpenicilliforme **8** : 138, 171, 177, 220, 312, 314, 315; **10** : 139, 141, 185, 198, 199.
— Sundbergii **8** : 138, 171, 177.
— tenebricans **3** : 82, 85; **5** : 9, 14, 27, 62; **8** : 138, 170, 171, 177, 220, 304, 312—316; **10** : 138 . . . 145, 154, 157, 165, . . . 175, 185, 187 (mp.) . . . 195, 199, 222; **12** : 45;[1] **15** : 138.
— *tenellisquameum* **10** : 34, 35, 144, 146, 174, 177, 185, 199.
— tenuilobum **10** : 177.
— triangulare **3** : 31; **8** : 138, 172, 177, 304, 312—316; **10** : 144 . . . 150, 170, 171, 185, 186 (mp.), 199; **13** : 91; **15** : 138.
— *tumentilobum* **8** : 138, 172, 177; **15** : 138.
— unguiculosum **8** : 312—314; **10** : 200.
— *vastisectum* **8** : 138, 173, 177—179.
— vulgare **19** : 200.
— vestrogothicum **10** : 221.
— xanthostigma **8** : 138, 173, 177; **9** : 23; **10** : 141, 185, 190, 200.
— xerophilum **10** : 220.
— sp. **4** : 69, 291; **5** : 212; **6** : 84; **7** : 320; **9** : 3, 6, 7, 237, 238; **10** : 65, 137—201, 219—222, 232, 236, 386, 473, 474; **11** : 8, 21, 34, 39, 55, 115, 150, 164, 229, 268; **12** : 36, 113, 158, 254; **13** : 89, 171; **14** : 171, 172; **15** : 6, 8, 59, 108, 109, 274; **16** : 96, 153; **17** : 54, 80, 82, 220, 221, 222, 343; **18** : 28, 78, 121; **19** : 39, 148, 150, 305; **20** : 12.
Taxus baccata **4** : 88, [89], 196; **6** : 88; **10** : 281, 408; **11** : 5, 139; **12** : 164, 174; **15** : 222, 224, 225 (fig.); **17** : 84.
Tetragonia expansa **7** : 252; **15** : 63, 66.
Tetragonolobus siliquosus **12** : 167.
Teucrium scordium **3** : 35.
Thalictrum adianthifolium **3** : 26.
— alpinum **8** : 267; **11** : 166; **14** : 51; **17** : 215, 220, 223.
— angustifolium **11** : 151; **15** : 102, 124; **17** : 138; **20** : 128, 136.
— aquilegifolium **3** : 26; **6** : 93; **11** : 148; **12** : 168; **19** : 107, 108.
— flavum **2** : 49, 55; **3** : 26; **4** : 88, 91, 209; **5** : 47, 114; **7** : 106; **9** : 164; **10** : 233;

[1] Per errorem tenebricus.

11 : 33; **12** : 33, 40, 65, 70, 112, 139; **13** : 10; **15** : 124; **17** : 40, 76, 136; **20** : 59, 70, 113, 117, 118.
Thalictrum kemense **17** : 220.
— majus **5** : 101; **11** : 119.
— minus **4** : 290.
— polygamum **19** : 200; **20** : 43.
— simplex **2** : 40; **11** : 150; **12** : 25, 111; **14** : 51, 64; **15** : 274; **17** : 76; **20** : 21, (64).
Theobroma cacao **15** : 186.
Thlaspi alliaceum **6** : 185, 186 (fig.).
— alpestre **3** : 38, 136; **5** : 13, 19, 30, 48; **7** : 272; **9** : 165; **10** : 142; **13** : 98; **15** : 110, 125; **17** : 40, 68—70, 71; **18** : 34, 35, 52; **19** : 67, 109.
— arvense **3** : 26, 61, 84; **4** : 209; **5** : 48; **6** : 27; **7** : 107; **8** : 212; **12** : 34, 40; **15** : 109, 125; **16** : 14; **17** : 40; **18** : 27, 28, 66; **19** : 91, 96, 101, 149, 200; **20** : 21, 62, 70, 86.
Thuja occidentalis **17** : 279—283.
— sp. **15** : 109.
Thymus chamaedrys **1** : 56—58, 157.
— serpyllum **1** : 37, 86—88, 89, 157; **2** : 50—52, 56; **4** : 175, 220; **6** : 88, 139; **7** : 114; **8** : 195; **9** : 128; **10** : 196, 225—227, 237, 242, 424; **11** : 56—57, 147, 152; **12** : 25, 35, 43, 113, 168, 173, 179; **15** : 132; **17** : 11, 109, 216 (fig.), 217, 220, 225; **18** : 42, 46; **19** : 73, 127, 189; **20** : 22, 74.
— — f. albiflorum (album) **8** : 92; **20** : 74.
— sp. **10** : 474.
Tilia cordata **3** : 28; **4** : 91, 214; [**5** : 94]; **7** : [68, 70], 77 (mp.), 80, 81, 84, 273, 276; **8** : 215, 280; **9** : 24, 177; **10** : 223, 225, 274, 275; **11** : [16], 137, [142], 146; **12** : 35, 65, 72, 113, 172, 173, 187—189; **13** : 9; **15** : 7, [101, 109], 130; **17** : 12, 34, 56, 59, 62, 63, 181; **18** : [44, 78, 81], 99, 110, 111, 118, 120; **19** : 71, 73, 148, 149; **20** : 22, 48, 52, 73, [98], 100, [102, 104], 107, 113—115, 118, 139.
— — f. vitifolia **19** : 72.
— — × platyphylla **10** : 66.
— platyphylla **6** : 89.
— vulgaris **10** : 66.
— sp. **6** : [89], 94, 124—128; **8** : 229, [233]; [**9** : 133]; **17** : 26; **20** : 159—161, 165—168.
Tillaea aquatica **8** : 42; **15** : 13, 126; **17** : 80, 81; **18** : 26, 28, 103.
Tofieldia borealis **8** : 264; **13** : 129; **16** : 89; **19** : 200; **20** : 31, 33, 34, 40, 45.
— calyculata **12** : 34.
— palustris **10** : 370; **11** : 121; **12** : 132; **14** : 17, 50, 113, 117, 171; **17** : 50, 129, 163, 214 (fig.), 215, 219; **19** : 46, 99, 203.
Torilis anthriscus **1** : 39—41, 158; **7** : 43; **8** : 375; **10** : 56—59, 281, 403, 409.
Tradescantia discolor **4** : 170—171.
— virginica **4** : 170—171.
— sp. **5** : 107; **19** : 104, 107.
Tragopogon floccosus **3** : 33; **4** : 120, 221, 226; **8** : 234; **11** : 152.
— pratensis **4** : 226, 228, 229 (mp.); **7** : 295; **9** : 164; **10** : 238; **12** : 35; **13** : 33, 100; **15** : 111, 137; **16** : 12, 13, 15; **17** : 199; **18** : 52; **19** : 39, 77, 104, 112, 113; **20** : 131.
— — ssp. eu-pratensis **20** : 141.
— — ssp. orientalis **11** : 150.
Trapa natans **10** : 475; **17** : 145; **19** : 128.
Trichophorum austriacum **11** : 139.
— caespitosum **12** : 165.
Trientalis americana **19** : 200; **20** : 34, 38 . . . 44.
— europaea **2** : 41, 42, 56; **3** : 29; **4** : 74, 83, 218; **5** : 56; **6** : 4, 27 . . . 43, 48, 51, 52; **7** : 113, 122 . . . 136; **8** : 25, 217; **10** : 58, 98, 237, 406; **11** : 17, 24—27, 38, 39, 163; **12** : 113, 136; **13** : 17; **14** : 6, 14, 52; **15** : 8, 33, 10 . . . 105, 131; **16** : 5, 8; **17** : 125, 137, 220; **18** : 34, 120; **19** : 93, 102; **20** : 22, 53, 54, 57, 73, 88, 98, 102, 113.
— — mf. minor **19** : 53.
— — f. rosea **7** : 113; **8** : 217, 271; **19** : 72.
Trifolium agrarium **3** : 27; **10** : 142; **12** : 71; **15** : 128; **17** : 12; **18** : 121, 122; **19** : 70, 106, 110, 148; **20** : 72, 87, 126, 138.
— alpestre **12** : 168.
— arvense **2** : 63; **4** : 89, 90, 213; **5** : 51; **6** : 110; **9** : 164; **10** : 274, 275, 409; **11** : 152; **12** : 35; **13** : 99; **15** : 111, 128; **16** : 11, 13; **17** : 12, 54; **18** : 27, 28; **19** : 39—41; **20** : 63, 126, 129, 131, 132, 138.
— dubium **20** : 126, 132, 138.
— fragiferum **2** : 22, 28, 62; **3** : 66, 84; **4** : 87, 89, 213, 228 (mp.); **7** : 38; **8** : 21; **10** : 281, 409, 429; **12** : 41.
— hybridum **3** : 27; (**4** : 213); **5** : 51; **6** : 27; **7** : 110; **8** : 214; **10** : 143, 235; **15** : 128; **17** : 81; **18** : 121; **19** : 39, 40, 95, 96, 101, 105, 149; **20** : 72, 87, 126, 129, 132, 138.
— medium **3** : 27; **4** : 86, 213; **5** : 52; **6** : 27, 138; **10** : 163, 413; **12** : 41; **17** : 12, 34, 39, 41; **18** : 34, 121; **19** : 40, 106, 110, 127, 148; **20** : 22, 72.
— — ssp. flexuosum **15** : 128.
— minus **11** : 152.
— montanum **2** : 62; **4** : 21, 213; **5** : 30, 51; **7** : 33, 37, 38; **8** : 195; **10** : 235, 274, 275, 409, 429; **11** : 150; **12** : 145, 168; **13** : 6; **19** : 70.
— pratense **1** : 48; **3** : 27, 66—67, 84; **4** : 80, 213; **5** : 13, 22, 52; **6** : 27, 140; **7** : 110; **8** : 214; **10** : 58, 157, 163, 168, 235; **11** : 33, 39, 150; **12** : 35, 41, 112; **13** : 33; **14** : 121; **15** : 108, [109], 128; **17** : 82; **18** : 26, 28, 34, 119; **19** : 39, 91, 96, 101, 149; **20** : 3, 22, 51, 56, 62, 72, 87, 126.

Trifolium pratense f. albiflorum (album) **3** : 27; **7** : 110; **8** : 92.
— procumbens **3** : 27; **9** : 164; **16** : 11, 13; **20** : 63, 126, 132, 138.
— repens **2** : 51, 55; **3** : 27, 66, 84; **4** : 10, 78, 80, 81, 127, 213; **5** : 13, 22, 27, 51; **6** : 27; **7** : 110; **8** : 21, 22, 214; **9** : 24; **10** : 34, 58, 145, 157, 163, 168, 235, 413; **11** : 33, 35, 39; **12** : 35, 41, 110, 112, 168; **15** : 6, 108, 110, 128; **17** : 80, 82, 125; **18** : 26, 28, 99, 119; **19** : 31, 39, 40, 96, 97, 101, 149, 200; **20** : 3, 22, 54, 57, 62, 72, 87, 128, 129.
— spadiceum **3** : 27; **6** : 27; **7** : 110; **8** : 214; **9** : 24; **10** : 143; **12** : 3, 35; **15** : 128; **17** : 137; **18** : 121, 122; **19** : 53, 95, 101; **20** : 22, 72, 87.
— sp. **9** : 19, [181]; [**10** : 343]; **11** : 145.
Triglochin maritimum **1** : 33, 49; **2** : 48 . . . 52; **3** : 85; **4** : 78 . . . 84, 197; **5** : 37; **7** : 38, 97; **8** : 20—22; **10** : 156, 229; **11** : 31, 33, 149; **12** : 37, 110, 112, 174; **15** : 195, 217; **16** : 58, 62, 68; **17** : 200; **19** : 200; **20** : 35.
— palustre **1** : 50; **2** : 54; **3** : 22, 85; **4** : 73 . . . 84, 197; **5** : 37; **7** : 97; **8** : 21, 22; **10** : 403, 406; **11** : 31, 169; **12** : 33, 37, 112; **14** : 49; **15** : 113; **16** : 83; **17** : 35, 36, 132, 134; **19** : 200; **20** : 19, 66, 121, 133.
Trigonella coerulea **17** : 343.
— hamosa **7** : 321.
Trillium sp. **17** : 166.
Trimorpha acris **3** : 30; **4** : 23, 224; **5** : 60; **6** : 27, 139; **10** : 146, 147; **12** : 35, 44; **18** : 27, 28.
— canadensis **4** : 62; **16** : 15.
— droebachensis **6** : 139.
Triodia decumbens **4** : 86; **17** : 12; **18** : 135.
Trisetum flavescens **1** : 94, 158.
— sibiricum **19** : 188.
— spicatum **20** : 34, 37, 41, 44.
— — v. Maindenii **19** : 200; **20** : 37.
— — v. pilosiglume **19** : 200; **20** : 33.
Triticum caninum **2** : 42; **7** : 99; **10** : 408; **18** : 32; **19** : 148.
— repens **2** - 54; **3** : 23; **7** : 99; **8** : 204; **18** : 66.
— — forma **1** : 86.
— — f. aristatum **3** : 23;[1] **7** : 99.
— — f., v. litorale **2** : 49, 54; **4** : 68; **5** : 70, 71; **9** : 143.[2]
— sativum **6** : 4—6, 114—121; [**11** : 173]; **13** : 89, 98; [**15** : 109]; **16** : 10, 13; **19** : 38, 40, 100, 107, 108, 148, 149; **20** : 129.
— vulgare f. aestivum **3** : 23.
Trollius asiaticus **3** : 26.
— europaeus **2** : 17; **3** : 26, 59, 84; **4** : 208; **7** : 69, 79 (mp.), 82, 196, 226, 231, 258; **8** : 266; **9** : 24, 110, 111; **10** : 224, 233, 236, 277; **11** : 163, 169; **12** : 34, 111; **13** : 14; **14** : 51, 64, 115; **15** : 31, 108, 110, 124, 203; **17** : 40, 132, 136, 138, 220, 221; **18** : 99; **19** : 47, 50, 53 . . . 57, 66, 101, 123; **20** : 21, 50 . . . 59, 63, 70, 100—102, 106, 111, 113, 116 . . . 120.
Tropaeolum majus **3**, 28.
— sp. **18** : 171.
Tulipa sp. [**5** : 140]; [**11** : 189].
Turgenia latifolia 7 : 140, 141, 320; **9** : 238.
Turritis glabra **3** : 26; **4** : 89, 91, 210; **5** : 49; **6** : 142; **7** : 33; **8** : 212; **10** : 147; **11** : 26; **12** : 71, 112; **13** : 8, 126; **17** : 12, 40; **18** : 33; **19** : 31, 39, 148, 189; **20** : 21, 57, 63, 71.
Tussilago farfara **3** : 30; **4** : 225; **5** : 14, 27; **6** : 27, 88; **7** : 117; **8** : 219, 273; **9** : 19; **10** : 406; **12** : 35, 113; **13** : 91; **14** : 18; **15** : 60, 136; **16** : 14; **17** : 80, 82, 125, 126, 137; **18** : 36, 40, 121; **19** : 49, 55, 150, 188; **20** : 23, 76, 107.
Typha angustifolia **3** : 22, 85; **4** : 173, 196; **5** : 37; **6** : 79, 91; **10** : 289; **11** : 30, 31; **12** : 164; **13** : 96; **14** : 5; **15** : 13, 45, 114, 196; **20** : 61, 66.
— latifolia **2** : 41, 116; **4** : 173; **6** : 79; **7** : 96, 127, 129, 268; **8** : 202; **12** : 67, 164; **15** : 46; **17** : 34, 37, 78, 80; **19** : 59, 104?, 105, 107, 121 (fig.), 122, 190; **20** : 61, 66.
— sp. **7** : 79; **8** : 67; **20** : 48.
Typhoides arundinacea **3** : 51 (fig.), 83; **5** : 7, 8, 12, 14, 37; **10** : 156; **12** : 37.
Ugni Selkirkii **7** : 251.
Ulex sp. **8** : 299.
Ulmaria filipendula **3** : 27; **5** : 130; **11** : 157, 158.
— pentapetala **3** : 27; **6** : 93; **7** : 108; **8** : 213; **17** : 71; **18** : 33, 36, 44, 62.
— — f. denudata **3** : 27.
Ulmus campestris **6** : 89.
— effusa **3** : 25; **6** : 89; **11** : 268.
— foliacea **11** : 146.
— glabra **6** : 136, 140, 142; **8** : 69, 75; **10** : 232, 275; **12** : 14, 22; **17** : 59.
— laevis **10** : 277; **19** : 190.
— montana **6** : 89; **10** : 223; **11** : 137; **12** : 167, 186, 187, 189, 191, 192, 254; **15** : 2, 50, [109]; (**20** : 64).
— scabra **3** : 38, 136; **7** : [68, 70], 86; **8** : 278; **10** : 431; **11** : 146; **12** : 172, 173, 254, 255; **18** : 30—45; **19** : 122, 123 (fig.), 190.
— sp. **6** : 89, 94, 128; **7** : 276; **8** : 229; [**10** : 21]; [**11** : 142]; **15** : 223; **17** : 26; [**18** : 28, 29]; **20** : 159—161, 165—168.
Uncinia Douglasii **7** : 251.
— phleoides **7** : 253.
— tenuis **7** : 253.
— sp. **7** : 254.
Urtica dioica (dioeca) **1** : 17; **2** : 54; **3** : 25; **4** : 206, 219; **5** : 44; **6** : 27, 48, 138; **7** : 33,

[1] Per errorem cristatum.
[2] Per errorem T. junceum; vide **9**: 252.

47, 104; **8** : 36, 210, 281; **9** : 76; **10** : 145, 154, 232; **11** : 26, 27, 34, 39, 117, 157, 164, 165; **12** : 34, 39, 112, 175; **13** : 13; **14** : 7, 51; **15** : 32, 121, 217; **16** : 5, 14; **17** : 81, 123; **18** : 33, 44, 66, 121; **19** : 30, 38, 40, 97, 100, 149; **20** : 20, 54, 62, 69, 73, 84, 111, 112, 125, 139.

Urtica dioica f. albomarginata **13** : 90.
— — v. Sondénii **8** : 265; **11** : 157; **13** : 95; **17** : 219, 221; **19** : 50; **20** : 84.
— urens **2** : 54; **3** : 25; **4** : 206; **5** : 44; **6** : 27; **7** : 82, 104; **8** : 210, 277; **10** : 232; **12** : 34, 39; **15** : 110, 121; **17** : 39; **18** : 66; **19** : 40; **20** : 20, 69, 84, 125.
— sp. **9** : 188; **11** 148.

Utricularia biseriata **13** : 26—30 (fig.), 171; **15** : 38, 274.
— intermedia **2** : 50, 56; **4** : 75, 176, 222; **8** : 218; **10** : 237, 258; **12** : 43; **13** : 26 . . . 30, 32, 129; **14** : 53; **15** : 37 (fig.), 38, 42, 46, 134; **17** : 125, 137; **19** : 3, 74; **20** : 61, 62, 75.
— — × minor **10** : 66; **13** : 26, 27; **15** : 38, 42.
— — × vulgaris **13** : 29, 30; **15** : 38, 41, 42.
— macrorrhiza **20** : 44.
— major **15** : 35, 43.
— minor **4** : 176; **5** : 59; **8** : 218, 281; **10** : 241; **12** : 43; **13** : 26; **15** : 37 (fig.), 42, 44, 46, 134; **17** : 35, 42; **18** : 117, 123, 124; **19** : 54, 75, 200.
— neglecta **15** : 34—49 (fig., mp.), 91—92, 93, 274; **17** : 47; **18** : 270.
— ochroleuca **10** : 66; **13** : 26, 27; **15** : 37, 38.
— vulgaris **2** : 34; **3** : 4, 29; **5** : 68—70; **7** : 115; **8** : 218; **10** : 289; **13** : 27—30 (fig.), 34—36; **15** : 34—48 (fig., mp.), 91, 92, 134, 196, 274; **17** : 42; **19** : 200; **20** : 64.
— — f. biseriata **13** : 29.
— — f. tenuis **15** : 34 . . . 48.
— sp. **4** : 110; **13** : 37.

Vaccaria segetalis **9** : 164; **15** : 123; **19** : 100; **20** : 129, 132, 136.

Vaccinium caespitosum **19** : 200; **20** : 34, 35, 39, 40.
— microcarpum **3** : 28; **7** : 113; **8** : 217.
— myrtillus **1** : 17; **2** : 42, 56; **3** : 28; **4** : 100, 176, 218; **5** : 55; **6** : 26, 27, 29, 43, 48, 51, 88, 108, 110, 112; **7** : 68—70, 113, 125, 128, 179, 181, 196, 231; **8** : 25, 217; **10** : 58, 236, 423; **11** : 16, 17, 25, 37—39, 48—51 (fig.), 142, [148], 153; **12** : 42, 113, [141, 142], 174, 193, 254; **13** : 17, 18, 31; **14** : 14, 52, 64, 66, 68; **15** : 4, 6, 33, 89, 99 . . . 108, 131, 233; **16** : 8, 76; **17**, 214 (fig.[, 220; **18** : 120, 122, 170; **19** : 93, 94, 102; **20** : 22, 48, 54, 57, 62, 73: 99, 101, 105, 114, 123.
— — f. album **8** : 92.
— — f. epruinosum **4** : 6; **7** : 113; **19** : 72.
Vaccinium myrtillus f. leucocarpum **8** : 280.
— oxycoccus **1** : 59; **3** . 28; **4** : 76, 102; **6** : 88; **7** : 113; **8** : 217; **10** : 241.
— — ssp. microcarpum **8** : 271; **20** : 22.
— — ssp. vulgare **20** : 22.
— pennsylvanicum **19** : 200; **20** : 25, 33, 35, 36, 43.
— — v. myrtilloides **19** : 200.
— uliginosum **1** : 37 (cecid.); **2** : 52, 55; **3** : 28; **4** : 218; **5** : 55; **6** : 27, 48; **7** : 113, 125, 128, 196, 229; **8** : 25, 217; **9** : 28, 107, 108; **11** : 163, 164; **12** : 35, 113; **13** : 31, 129; **14** : 14, 15, 52, 63, 65, 117; **15** : 100, 104, 131, 225; **16** : 8, 76; **17** : 73, 163, 220; **18** : 7, [172]; **19** : 93, 102, 200; **20** : 22, 31 . . . 39, 42, 44, 45, 62, 73.
— vitis idaea **1** : 98; **2** : 42, 51, 55; **3** : [9], 18, 28; **4** : 218; **5** : 55; **6** : 26 . . . 43, 48, 50, 109, 139; **7** : 113, 126, 128, 179, 181; **8** : 25, 39, 217; **9** : 178; **10** : 34, 58, 406, 423; **11** : 17, 22, 37, 39, 48—51 (fig.), [148], 153, 164, 231; **12** : 35, 42, 113, 136, 254; **13** : 17, 18, 31, 33; **14** : 15, 44, 52, 112, 124; **15** : 5, 14, 33, 99 . . . 108, 131, 194; **16** : 8; **17** : 163, 220; **18** : 120, 122; **19** : 49, 93, 102, 200; **20** : 22, 32 . . . 36, 44, 49, 54, 57, 59, 62, 73, 99, 102, 113, 123.
— — f. album **8** : 92.
— — f. leucocarpum **1** : 34, 158; **6** : 232; **12** : 72; **19** : 148.
— — v. minus **19** : 200.
— sp. **7** : 68, 69, 228, 230; **11** : 152, 154; **14** : 132; **18** : 43, 75, 116; **19** : 127.

Vahlodea atropurpurea **14** : 49; **19** : 200.
— sp. **20** : 33, 40.

Valeriana baltica **10** : 93, 94, 181.
— excelsa **7** : 116; **8** : 78, 219, 318—320; **12** : 44, 73; **14** : 122; **15** : 135; **19** : 55, 75.
— — flor. alb. [**14** : 122].
— officinalis **2** : 48, 56; **3** : 30; **4** : 87, 127, 223; **5** : 59; **6** : 88; **7** : 47, 116, 122, 134—136; **8** : 78, 318, 320, 324, 325; **9** : 144, 164; **10** : 93, 94, 238; **11** : 21, 24, 31, 34, 39, 161, 268; **12** : 35; **13** : 11, 13; **15** : 14, 135; **18** : 123, 172, 175; **19** : 75; **20** : 55, 70, 73, 75.
— — f. integrifolia **10** : 92—94, 473; **11** : 268.
— — f. tenuifolia **8** : 78.
— — v. simplicifolia **10** : 92.
— — ssp. excelsa **3** : 30.
— salina **7** : 47; **8** : 78, 318—320, 321, 325; **10** : 93, 94, 158, 181, 280; **20** : 3.
— sambucifolia **8** : 319; **10** : 93, 94.
— — v. simplicifolia **10** : 94.
— sp. **6** : 99; **17** : 82.

Valerianella olitoria **2** : 26, 28; **3** : 36, 77, 84; **5** : 66; **10** : 281, 342 . . . 354, 409, 429, 431, 432; **15** : 215.

Vanda suavis **15** : 186.
Veratrum lobelianum **9** : 143.
Verbascum lychnitis **3** : 29.
— nigrum **3** : 38, 136; **4** : 23, 220; **10** : 142; **12** : 35; **15** : 111, 133; **18** : 34; **19** : 148, 189; **20** : 74.
— thapsus **3** : 29; **4** : 175, 220; **5** : 58; **6** : 27, 142; **10** : 237; **12** : 35; **15** : 133; **17** : 12, 199; **18** : 34, 42, 121, 122, 179; **19** : 32, 33, 74, 148; **20** : 74, 128, 140.
Veronica agrestis **1** : 94, 158; **12** : 31; **15** : 93, 134; **19** : 74; **20** : 63.
— alpina **8** : 272; **11** : 169; **14** : 53; **17** : 220, 225; **20** : 89.
— anagallis **1** : 25; **17** : 233.
— arvensis **3** : 29; **4** : 221; **5** : 13, 24, 27, 58; **6** : 110; **7** : 114; **9** : 16; **10** : 34, 58, 146, 147, 164, 168, 237, 280; **11** : 56; **12** : 43; **13** : 99; **15** : 134; **17** : 27, 28; **18** : 66, 67; **19** : 111, 148; **20** : 23, 74.
— austriaca **15** : 134.
— beccabunga **4** : 221; **6** : 93; **10** : 237, 281, 406; **11** : 149; **12** : 19, 20; **15** : 134; **17** : 54, 67, 233; **20** : 131, 140.
— borealis **20** : 89.
— chamaedrys **2** : 56; **3** : 29; **4** : 221; **5** : 13, 25, 58; **6** : 27, 110, 138; **7** : 114; **8** : 218, 277; **9** : 24; **10** : 34, 58, 164, 168, 237; **11** : 19, 22, 35, 39, 152; **12** : 35, 43, 113, 168, 175; **13** : 10, 15, 16; **14** : 6, 7; **15** : 8, 33, 102, 108, 134; **16** : 5; **17** : 82, 125; **18** : 33, 98, 120; **19** 2, (150); **20** : 23, 55, 57, 59, 63, 74, 99, 101, 126.
— hederifolia **12** : 30.
— humifusa **11** : 161.
— longifolia **4** : 23, 87, 89, 91; **5** : 58; **6** : 27; **7** : 114; **8** : 200, 218; **9** : 144; **10** : 146, 172; **11** : 21, 22, 24, 34, 39, 147, 150, 164; **12** : 35, 73; **13** : 11, 13; **14** : 53; **15** : 133; **16** : 91; **17** : 42, 220; **18** : 26, 28, 66; **19** : 39, 97, 102, 105?, 111; **20** : 23, 74, 89.
— — v. maritima **2** : 48, 56; **7** : 114; **10** : 278, 280; **11** : 55; **19** : 74.
— — v. — f. albiflora **7** : 114.
— maritima **7** : 122, 134, 136.
— officinalis **1** : 17; **2** : 56; **3** : 29; **4** : 26, 221; **5** : 13, 25, 58, 129 (cecid.); **6** : 27, 48, 138; **7** : 114; **8** : 218; **9** : 15; **10** : 34, 58, 164, 168; **11** : 17, 22, 35, 152; **12** : 43, 113; **13** : 17, 33; **15** : 6, 8, 33, 134; **16** : 5; **17** : 25, 82, 125; **18** : 26, 28, 34, 66, 120; (**19** : 150); **20** : 3, 23, 51, 55, 57, 59, 68, 74, 129.
— opaca **3** : 36, 74—75, 84; **12** : 31; **13** : 33.
— peregrina **11** : 116, 120.
— persica **12** : 35; **15** : 93; **19** : 105, 111.
— scutellata **2** : 56; **3** : 29; **4** : 221; **5** : 58; **7** : 115; **8** : 218; **10** : 237; **12** : 43; **15** : 134; **17** : 42, 81, 125, 137, 220; (**19** : 97); **20** : 23, 74.
Veronica scutellata f., v. villosa **3** : 29; **7** : 115; **12** : 43; **20** : 74.
— serpyllifolia **2** : 25—26, 28; **3** : 29, 74, 84; **4** : 221; **5** : 58; **6** : 27; **7** : 114; **8** : 218; **10** : 164, 168; **11** : 164; **15** : 134; **17** : 81, 125; **18** : 98, 121; **19** : 54, (97), 150; **20** : 23, 74, 89, 128.
— spicata **4** : 86, 221, 291; **7** : 257, 321; **10** : 237, 275, 409, 425, 431, 432; **12** : 35, 43, 111, 145; **13** : 6; **17** : 54; **18** : 28; **19** : 138; **20** : 11, 140.
— teucrium **3** : 128; **11** : 147; **12** : 35.
— Tournefortii **17** : 69.
— verna **3** : 29; **4** : 221; **5** : 58; **8** : 218; **9** : 16; **10** : 147, 429; **15** : 134; **17** : 27, 81; **18** : 66, 67; **19** : 32, 189; **20** : 23, 74, 126.
— Wormskioldii **19** : 200; **20** : 33, 40.
Viburnum opulus **1** : 92; **2** : 62, 63; **3** : 29; **4** : 86, 88, 91, 223; **5** : 59, 64; **6** : 27, 139; **7** : 32, 116, 274, 276; **8** : 36, 218, 281; **11** : 19; **12** : 13, 19, 22, 35, 44, 73, 141, 168; **15** : 31, 32, 101, 103, 135, 214, 233; **17** : 34, 42; **18** : 118, 120, 132, 176; **19** : 75, 148; **20** : 23, 55, 75, 102, 111, 114.
— pauciflorum **19** : 200; **20** : 30.
— sp. **15** : 109; **20** : 34, 38—40, 44, 48.
Vicia angustifolia **4** : 214; **8** : 200, 214; **15** : 128; **19** : 40, 101, 110, 148; **20** : 22, 72, 126, 129, 137.
— — v. Bobartii **7** : 110; **8** : 214.
— — v. segetalis **7** : 110; **8** : 214; **13** : 99.
— cassubica **12** : 165, 174; **17** : 145, 343.
— cracca **1** : 33, 36 (cecid.); **2** : 22, 28, 55; **3** : 27, 68, 84; **4** : 81, 86, 127, 214; **5** : 13, 22, 52; **6** : 27, 93, 138; **7** : 47, 110; **8** : 215; **9** : 144; **10** : 58, 157, 163, 168, 235, 370, 413; **11** : 21, 22, 24, 33, 35—39, 150; **12** : 35, 42, 112, 175; **13** : 10, 11, 13; **15** : 14, 108, 128; **16** : 92; **17** : 125, 137; **18** : 97, 119; **19** : 101, 149, 200; **20** : 3, 22, 54 . . . 59, 63, 72, 87, 117, 118, 120.
— — v. incana **7** : 110.
— faba **9** : 164; [**15** : 109].
— hirsuta **3** : 27; **4** : 86, 213; **5** : 13, 22; **7** : 111; **13** : 90, 99; **15** : 128; **18** : 121, 122; **19** : 39, 40, 70, 91, 101, 148; **20** : 22, 72, 126, 129.
— lathyroides **10** : 281.
— pannonica **8** : 374.
— pisiformis **13** : 101.
— sativa **3** : 27, 68, 84; **4** : 214; **5** : 13, 22, 30, 52; **12** : 42; **19** : 40, 101, 107, 110; **20** : 22, 72, 87.
— — ssp. angustifolia **3** : 27.
— sepium **3** : 27; **4** : 214; **5** : 13, 22, 52, 65; **6** : 27; **7** : 111; **8** : 215; **9** : 24; **10** : 235, 406, 409; **12** : 35, 42, 112, 168; **13** : 9, 16; **15** : 128; **18** : 33, 98, 119, 120; **19** : (97), 149; **20** : 22, 54, 63, 72, 102, 113, 117, 118, 120, 128.

Vicia silvatica **2** : 62; **3** : 27; **4** : 91, 213; **5** : 52; **7** : 273; **8** : 215, 277; **9** : 24; **10** : 235, 409; **12** : 71, 168; **14** : 120; **15** : 7, 8, 128; **17** : 12; **19** : 52, 70, 123, 148; **20** : (64), 113, 114, 138.
— tenuifolia **15** : 128.
— tetrasperma **3** : 35, 67—68 (fig.), 84; **4** : 87, 91, 213; **5** : 8, 52; **8** : 280; **10** : 409, 429; **12** : 42, 175; **15** : 128; **17** : 12, 27, 54; **18** : 119, 120; **19** : 31, 40, 70, 95, 98, 101; **20** : 63.
— villosa **3** : 27, 39; **4** : 214; **9** : 165; **12** : 30; **15** : 111, 128; **19** : 70
— sp. **15** : 128.
Victoria cruziana **15** : 186.
— regia **13** : 52.
Vincetoxicum officinale **8** : 281.
— vincetoxicum **8** : 257.
Vinca minor **20** : 12.
Viola arenaria **11** : 147.
— arteficiosa **12** : 156, 157.
— arvensis **2** : 55; **4** : 215; **5** : 13, 22, 54; **6** : 27; **7** : 111; **8** : 216; **10** : 143, 164, 236; **12** : 42, 156; **15** : 109, 126; **17** : 81; **18** : 27, 28, 121, 122; **20** : 12, 21, 62, 71, 87.
— — ssp. patens **8** : 79—97.
— biflora **8** : 270; **10** : 370; **14** : 52; **16** : 92; **17** : 220, 225; **20** : 87.
— bosniaca **12** : 156.
— canina **2** : 55; **4** : 26, 215; **5** : 53; **6** : 4, 27, 138; **7** : 111; **8** : 89, 216; **9** : 180; **10** : 34, 163, 168, 236, 406; **11** : 34, 36—39; **12** : 113, 168; **13** : 9, 11, 13, 16; **14** : 7; **15** : 32; **17** : 82?; **18** : 119; **20** : 3, 21, 54, 57, 63, 71, 99.
— — f. alba **8** : 92.
— — v. ericetorum **3** : 28.
— — v., ssp. montana **3** : 28; **8** : 270; **15** : 126; **18** : 42; **19** : 101; **20** : 71.
— — ssp. canina **19** : 68.
— — × Riviniana **7** : 36; **10** : 36; **15** : 8, 33, 103; **19** : 68.
— (— vel montana) × Riviniana **5** : 53.
— — ssp. montana × Riviniana **15** : 126.
— — × stagnina **8** : 375; **10** : 236?
— collina **1** : 25; **12** : 35.
— conspersa **19** : 200.
— epipsila **2** : 42; **4** : 215; **8** : 215, 269; **10** : 35—40, 66—68, 277, 370; **11** : 163; **12** : 110, 111, 136; **13** : 32, 129; **14** : 52; **15** : 103, 105, 126; **17** : 34, 40, 136; **18** : 36; **19** : 51, 93, 101; **20** : 21, 71.
— — f. glabrescens **10** : 66.
— — v. suecica **10** : 66.
— — × palustris **10** : 35—40, 67, 236?; **12** : 33, 113; **13** : 6, 10, 13.
— Juressi **10** : 38—40, 67, 68.
— labradorica **19** : 200.
— mirabilis **2** : 23, 40, 62, 116; **3** : 6, 28, 71, 84; **4** : 88, 91, 175; **5** : 30, 32, 53; **6** : 138; **7** : 78, 111; **8** : 89, 200, 215, 277, 280; **9** : 24; **10** : 236, 274, 275, 409, 422, 431, 474; **11** : 7, 133, 137; **12** : 35, 42, 71, 168; **13** : 8; **15** : 7, 8, 126; **17** : 34, 54, 181; **18** : 33, 119, 120; **19** : 68, 123, 127; **20** : 21, (64).
Viola montana (**4** : 215); **5** : 53, 65; **7** : 37; **10** : 236; **20** : 21.
— — × uliginosa **1** : 147.
— odorata **2** : 23; **3** : 71, 84; **4** : 215; **12** : 17, 20, 21.
— pallens **19** : 200; **20** : 36, 38.
— palustris **2** : 55; **3** : 28; **4** : 69, 74, 81, 215; **5** : 53; **6** : 27, 48; **7** : 111; **8** : 25, 215; **9** 180; **10** : 38—40, 66—68, 236; **11** : 32, 34; **12** : 110, 113; **13** : 9, 10, 13; **14** : 52; **15** : 6, 108, 126; **16** : 5, 8; **17** : 124, 136; **18** : 123; **19** : 3; **20** : 21, 56, 57, 63, 71, 105, 106, 113, 118, 120, 122.
— — f. albiflora **15** : 275.
— persicifolia **20** : 132, 137.
— pumila **12** : 165, 167, 169.
— Riviniana **1** : 17; **3** : 28; **4** : 215; **5** : 53, 65; **6** : 27; **7** : 111, 121, 130, 136; **8** : 216; **9** : 15; **10** : 36, 58, 224, 236, 406; **11** : 17; **12** : 35, 42, 71; **13** : 17, 31; **15** : 126; **16** : 5; **17** : 40; **18** : 26, 28, 33, 119; **20** : 3, 21, 54, 71, 98, 102, 106, 113.
— — × rupestris v. arenaria **20** : 21.
— rupestris **6** : 138; **10** : 236, 409; **11** : 133; **12** : 35; **14** : 119; **15** : 126; **18** : 42; **19** : 51, 127; **20** : (64), 137.
— — f. glaberrima **19** : 51.
— — v. arenaria **20** : 21.
— Ruprechtiana **10** : 67, 68.
— Selkirkii **10** : 277; **12** : 139; **13** : 32; **16** : 3—8; **17** : 34, 61; **18** : 34, 44; **19** : 51; **20** : 21.
— silvatica **13** : 15, 16.
— stagnina **5** : 212; **7** : 259; **10** : 224, 236, 281, 409.
— tricolor **2** : 23, 28, 51, 55; **3** : 28, 84; **4** : 23, 215; **5** : 54; **6** : 27, 142; **7** : 47, 111, 121, 136; **8** : 216; **9** : 15; **10** : 163, 236, 278, 280; **11** : 55; **15** : 126; **17** : 200; **18** : 26, 28, 117, 123; **19** : 135; **20** : 51, 59, 63, 71, 87.
— — f. maxima **15** : 60.
— — v. hortensis **17** : 81.
— — v. maritima **11** : 152.
— — ssp. arvensis **3** : 28; **19** : 31, 39, 40, 96, 101.
— — ssp. genuina **20** : 21.
— — ssp. — f. versicolor **8** : 79—97.
— — ssp. vulgaris **19** : 39.
— uliginosa **1** : 54, 84; **2** : 23; **3** : 71, 84; **6** : 144, 145, 232; **8** : 99—100, 374; **17** : 54.
— umbrosa **16** : 3.
— sp. [**9** : 163]; **10** : 66—68; **17** : 82.
— subg. Melanium **12** : 156.
Viscaria alpina **3** : 14; **4** : 174; **6** : 145—148 (mp.); **7** : 259; **10** : 277; **11** : 164, 165;

12 : 65, 70, 123; **13** : 31; **14** : 51; **16** : 93; **17** : 219, 223; **19** : 200, 204; **20** : 31.
Viscaria alpina f. albiflora **11** : 165.
— vulgaris **3** : 57—58, 84; **4** : 26; **5** : 13, 18, 27, 28, 46; **6** : 27, 138; **8** : 94; **10** : 232; **15** : 6, 8, 32, 123; **17** : 12, 40, 200; **18** : 26, 27, 28, 42; **19** : 148; **20** : 69.
— — f. albiflora (alba) **8** : 92, 94; **15** : 123; **19** : 65.
— — f. pallens (pallida) **5** : 46; **17** : 12.
— — f. rosea **5** : 46.
— — v. Perekrestovi **15** : 123.
Viscum album **11** : 139.
Vitis vinifera **7** : 320.
Vitis sp. **15** : 61.
Vogelia paniculata **15** : 110, 125; **17** : 69; **19** : 40, 91, 101, 138; **20** : 131, 137.
Wahlenbergia **7** : 251.
— Masafuerae **7** : 252.
Weingaertneria canescens **12** : 164.
Yunquea **7** : 251.
Zannichellia major **4** : 20, 22, 197; **5** : 78; **7** : 29, 30, 34; **10** : 279.
— palustris **7** : 31; **19** : 59.
— — v. pedicellata **7** : 31.
— — v. repens **15** : 107, 114.
— pedicellata **7** : 268; **8** : 275.
— pedunculata **5** : 78; **7** : 29, (30), 31, 165; **15** : 93; **17** : 77.
— — v. gibberosa **7** : 29.
— polycarpa **7** : 31, 268; **8** : 275; **18** : 58.
— repens **2** : 17; **4** : 60, 197; **5** : 78; **7** : 29—31, 165; **8** : 375; **11** : 192; **15** : 93; **18** : 103.
— sp. **7** : 97; **15** : 194.
Zea mays **9** : 164; **12** : 3; **13** : 98, 100; **15** : 110, 118.
Zerna erecta **3** : 33; **4** : 61.
— inermis **16** : 14.
Zizania aquatica **6** : 231.
Zostera marina **3** : 50; **4** : 51, 59, 196; **7** : 50; **10** : 239; **12** : 143; **13** : 171; **15** : 93, 104; **19** : 200; **20** : 38, 43.

Pars Zoologica.

Index systematicus.

PROTOZOA.

Backlund, H. O., 3.
Kopperi, A. J., 1.
Luther, A., 4.
Tanner, V., 3.

COELENTERATA.

Ehnholm, G., 1.
Luther, A., 7.
Schneider, G., 1.
Wikström, D. A., 1, 2.

TURBELLARIA.

Karling, T. G., 1, 8, 9.
Söderström, S., 1.

NEMATODES.

Backlund, H. O., 3.

NEMERTINI.

Karling, T. G., 6.

POLYCHAETA.

Karling, T. G., 7.
Renfors, L., 1.
Tanner, V., 3.

OLIGOCHAETA.

Palmgren, P., 7.

HIRUDINEA.

Segerstråle, S. G., 1.

TARDIGRADA.

Backlund, H. O., 3.

CRUSTACEA.

Boström, K. J., 1.
Granit, A. W., 1.
Häyrén, E., 60 (p. 63).
Krogerus, R., 15, 16.
Luther, A., 6.
Markewitsch, A. P., 1.
Odenwall, E., 4, 6.
Segerstråle, C., 15.
Segerstråle, S. G., 3, 7.
Tanner, V., 3.
Valle, K. J., 3.
Zandt, F., 1.

ARANEIDA.

Nordman, A. F., 2, 8 (p. 133).
Palmgren, P., 14, 23.

ACARINA.

Backlund, H. O., 2.
Forsius, I., 2.
Nordman, A. F., 9.
Schulze, P., Viets, K. & Willmann, C., 1

MYRIOPODA.

Forsius, R., 18.
Nordman, A. F., 7, 8 (p. 151).

INSECTA.

Frey, R., 7, 9, 12, 19, 21, 24, 27, 37.
Krogerus, R., 3, 17, 22, 23, 25, 26, 27.
—»— & Lemberg, B., 1.

Lindberg, Håk., 14.
Lindroth, C. H., 1.
Nordman, A. F., 4.
Platonoff, S., 1.
Segerstråle, S. G., 2.
Storå, R., 2.

THYSANURA.

Lindberg, Håk., 11.

ORTHOPTERA.

Frey, R., 18.
Klingstedt, H., 17, 18, 19, 20.
Nordman, A. F., 5. 8 (p. 134, 141), 12.

ISOPTERA.

Kemner, N. A., 1.

COPEOGNATHA.

Hellén, W., 8.

THYSANOPTERA.

Nordman, A. F., 11.

MALLOPHAGA.

Backlund, H. O., 1, 2.
Hellén, W., 1, 4, 7.
Tanner, T. R., 1.

PLECOPTERA.

Dahl, A., 1.

ODONATA.

Nordman, A. F., 8 (p. 136).

NEUROPTERA.

Klingstedt, H., 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15.

TRICHOPTERA.

Forsslund, K. H., 1.
Klingstedt, H., 1, 4.

LEPIDOPTERA.

Auterinen, A., 1.
Clayhills, T. H., 1.
Dahl, A., 1.
Federley, H., 8, 9.
Färdig, B. A., 5 (p. 119).
Hellén, W., 6, 12, 16.
Kanerva, N., 1.
Knoll, F., 1.
Krogerus, H., 1.
Luther, A., 3.
Montell, J., 5.
Munck, L., 1.
Nessling, E., 2.
Nordman, A. F., 1, 8.
Puolanne, M., 3.
Storå, R., 1.
Suomalainen, P., 1.
Valle, K. J., 5.

DIPTERA.

Ahlqvist, H., 1.
Forsius, R., 3, 4, 8, 9, 13.
Frey, R., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 23, 24, 27.
Hellén, W., 22.
Järvi, T. H., 2.
Klingstedt, H., 16.
Krogerus, R., 22.
Kuenen, D. J., 1.
Nordman, A. F., 11.

APHANIPTERA.

Nordberg, S., 2.

COLEOPTERA.

Frey, R., 11.
Hellén, W., 3, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29.
Krogerus, R., 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 19.
Kuenen, D. J., 1.
Lindberg, Har., 33, 49, 68.
Lindberg, Håk., 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15.
Nessling, E., 1.
Nordman, A. F., 8, 11.
Reichardt, A., 1.
Stenius, G., 1, 3.
Storå, R., 1.

HYMENOPTERA.

Bäck, R., 1.
Dahl, A., 1.

Forsius, I., 1.
Forsius, R., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13.
Hellén, W., 2, 9, 15, 22, 27.
Krogerus, R., 10, 13, 20, 24.
Nordman, A. F., 2, 8, 10.

HEMIPTERA.

Forsius, R., 8.
Hellén, W., 5, 17, 18.
Krogerus, R., 6, 11.
Kuenen, D. J., 1.
Lindberg, Håk., 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16.
Nordman, A. F., 8 (p. 164).

MOLLUSCA.

Kaleła, O., 2.
Kuenen, D. J., 1.
Lemberg, B., 2 (p. 65).
Lindberg, Har., 60.
Luther, A., 5, 8, 9.
Olsoni, B., 13.
Segerstråle, S. G., 4, 6.
Tanner, V., 3, 4.
Välikangas, I., 19.
Åberg, G., 6.

BRYOZOA.

Häyrén, E., 4.
Luther, A., 1.
Tanner, V., 3.

BRACHIOPODA.

Tanner, V., 3.

ECHINODERMATA.

Tanner, V., 3.

VERTEBRATA.

Ekman, G., 2.
Toivonen, S., 1.

CYCLOSTOMATA, PISCES.

Ekłund, O., 66.
Granit, A. W., 1.
Häyrén, E., 23, 46.
Järvi, T. H., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Kivirikko, K. E., 1.
Lönnfors, F., 1.
Markewitsch, A. P., 1.
Munck, L., 4, 7.
Odenwall, E., 2, 6, 7.
Olsoni, B., 12.
Pipping, Märta, 1.
Rendahl, H., 1, 2.
Segerstråle, C., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Segerstråle, S. G., 5.
Suomalainen, P., 2.
Välikangas I. 8.
Zandt F., 1.

AMPHIBIA.

Ahlqvist, H., 3.
Dahl, A., 1.
Ekłund, O., 6.
Ekman, G., 1.
Olsoni, B., 19.
Suomalainen, E., 1.
Välikangas, I., 3.

REPTILIA.

Hustich, I., 2.
Olsoni, B., 19.
Platonoff, S., 2.

AVES.

Ahlqvist, H., 2.
Alfthan, K., 3.
Backłund, H. O., 2.
Berger, Elna, 1.
Bergman, G., 1.
Branders, K., 1.
Cajander (Kaleła), O., 1.
Carpelan, J., 2, 3.
Dahl, A., 1.
Ekłund, O., 27.
Ekman, T. H. J., 1, 2.
Forsius, I., 3, 4, 5, 6, 7.
Forsius, R., 10, 11, 12.
Haartman, L. von, 1.
Hellén, W., 7.
Herpman, G., 1.
Hildén, I., 1, 2, 3.
Hortling, I., 1, 2.
Hustich, I., 16, 17, 20, 23.

Häyrén, E., 11.
Idman, G., 4.
Jägerskiöld, L. A., 1.
Kiertonen, A., 1.
Krogerus, R., 18.
Levander, K. M., 3.
Lindberg, Har., 25.
Luther, A., 2.
Merikallio, E., 1.
Munck, L., 3.
Nordberg, S., 2.
Nyström, E. W., 1.
Odenwall, E., 3.
Olsoni, B., 5.
Palmgren, P., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21.
Paulsson, G., 1.
Renvall, T., 1.
Reuter, E., 18.
Schoultz, Å. von, 1, 2.
Segerstråle, C., 4.
Snellman, J., 1.
Tanner, T. R., 1.
Valle, K. J., 4.
Välikangas, I., 6, 10, 21.
—»— & Hytönen, O., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
—»— & Siivonen, L., 1.
Wallgren, G., 1.

MAMMALIA.

Eklund, O., 4, 6, 57.
Hiitonen (Hidén), I., 6.
Hustich, I., 7, 16, 17, 20, 23.
Koppari, A. J., 1.
Korvenkontio, V., 1, 2, 3, 5.
Lindberg, Har., 25.
Lindqvist, E., 1, 2.
Munck, L., 2.
Nordberg, S., 2, 3, 4.
Nordman, A. F., 6.
Schulmann, Hj., 1.
Välikangas, I., 3, 11, 17, 21.
Wallgren, G., 1.

Index rerum.

ANIMALIA OBNOXIA.

Nordman, A. F., 8 (Col. p. 138—139; lep. p. 146, 164, 171, 172, 178, 181; hym. p. 151, 172), 12 (Orth.).

BIOCOENOSE.

Backlund, H. O., 3 (Mikrofauna).
Hellén, W., 10 (Col.).
Krogerus, H., 1 (Lep.).
Krogerus, R., 14 (Col.), 23 (Ins.).
—»— & Lemberg, B., 1 (Ins.).
Lindberg, Håk., 4 (Col., hem.), 8 (Hem.), 9 (Col.), 15 (Col., hem.).

BIOLOGIA, OECOLOGIA.

Generalia.

Koehler, O., 1 (0).
Palmgren, P., 17 (0).

Protozoa.

Backlund, H. O., 3 (Thecamoebaea).
Luther, A., 5 (Hymenomonas roseola).

Coelenterata.

Schneider, G., 1 (Protohydra leuckarti).
Wikström, D. A., 1 (Aurelia), 2 (Aurelia).

Turbellaria.

Karling, T. G., 1 (Breslauilla relicta), 8 (Dalyellia nigrifrons), 9 (Promesostoma cochlearis).

Nematodes.

Backlund, H. O., 3.

Nemertini.

Karling, T. G., 6 (Finn. Meerbusen).

Polychaeta.

Karling, T. G., 7 (Haplobranchus balticus).

Hirudinea.

Segerstråle, S. G., 1 (Glossiphonia complanata).

Tardigrada.

Backlund, H. O., 3.

Crustacea.

Boström, K. J., 1 (Bosmina maritima, 0).
Krogerus, R., 16 (Potamobius leptodactylus).
Markewitsch, A. P., 1 (Fischparasiten).
Segerstråle, S. G., 3 (Amphipoda).
Valle, K. J., 3 (Gammaracanthus).
Zandt, F., 1 (Coreogonen-Parasiten).

Araneida.

Palmgren, P., 23 (Fortplantningsbiologi, 0).

Insecta.

Krogerus, R., 17 (Sanddyndjuren, 0), 23 (Mikroklimat), 25 (Ekologiska raser, 0), 26 (Markreaktionen, 0), 27 (Strandinsekter).
—»— & Lemberg, B., 1 (Sanddyner).
Lindberg, Håk., 14 (Hällkaren, 0).
Platonoff, S., 1 (Älvstränder, Lps, 0).

Orthoptera.

Nordman, A. F., 12 (Tettigonia viridissima).

Isoptera.

Kemner, N. A., 1 (Java, Celebes, 0).

Copeognatha.

Hellén, W., 8 (Lepinotus formicarius).

Mallophaga.

Backlund, H. O., 1 (Menopon biseriatum).
Hellén, W., 7 (Tetrao urogallus).

Neuroptera.

Klingstedt, H., 13 (Hemerobius stigma, p. 4).

Lepidoptera.

Clavhills, T. H., 1 (Calymnia trapezina).
Federley, H., 8 (Pygaera, letalfaktor), 9 (Pygaera pigra, semisterilitet).
Kanerva, N., 1 (Hydrilla lepigone, Cacoecia costana).
Krogerus, H., 1 (p. 66).
Nordman, A. F., 1 (Hydrilla lepigone), 8.
Puolanne, M., 3 (Saturnia atlas).

Diptera.

Frey, R., 9 (Plankton förtärande imagines, 0).
Krogerus, R., 22 (Ceratopogoninae, blodsugare).
Kuenen, D. J., 1 (Kleingewässer, Schäreninseln).

Coleoptera.

Hellén, W., 10 (Wasserkäfer, Ik).
Krogerus, R., 14 (Bledius, Dyschirius).
Kuenen, D. J., 1 (Kleingewässer, Schäreninseln).
Lindberg, Håk., 3, 4 (Felsentümpel, Kl), 6 (Deronectes), 7 (Küstenkäfer), 9 (Hochnordische Biotopen), 10 (Wasser- u. Uferkäfer), 15 (Hedmarker, N).
Nordman, A. F., 11 (Amara).

Hymenoptera.

Frey, R., 12 (Camponotus, p. 211).
Hellén, W., 9 (Trichogrammidae), 22 (Callimomidae).
Krogerus, R., 10 (Flygsandarter), 19 (Psammocharidae, Küstendünen), 24 (Tremex fuscicornis).
Nordman, A. F., 2 (Polysphincta, metamorphosis), 10 (Euplectrus bicolor, ectoparasitism).

Hemiptera.

Hellén, W., 5 (Pterochlorus roboris).
Kuenen, D. J., 1 (Kleingewässer, Schäreninseln).
Lindberg, Håk., 2 (Le), 3, 4 (Felsentümpel, Kl), 8 (Lps), 15 (Hedmarker, N).

Mollusca.

Kuenen, D. J., 1 (Kleingewässer, Schäreninseln).
Segerstråle, S. G., 6 (Mytilus edulis).

Bryozoa.

Luther, A., 1 (Victorella pavida).

Pisces.

Järvi, T. H., 3 (Coregonus albula), 5 (Salmo, 0), 8 (Coregonus albula, 0).
Lönnfors, F., 1 (Lampetra).
Munck, L., 4 (Perca).
Pipping, Märta, 1 (Luktsinne, 0).
Segerstråle, C., (Abramis brama), 2 (Chile, 0), 5 (Salmo, 0), 11 (Coregonus lavaretus, Lota), 13 (Esox), 14 (Esox), 20, 21 (0), 22 (Clupea harengus).

Amphibia.

Ahlqvist, H., 3 (Rana ridibunda).
Eklund, O., 6 (Rana, Bufo).
Olsoni, B., 19 (Rana, Bufo).
Suomalainen, E., 1 (Rana ridibunda).
Välikangas, I., 3 (Rana, Bufo).

Reptilia.

Olsoni, B., 19 (Vipera, Tropidonotus).

Aves.

Carpelan, J., 3 (Phylloscopus borealis, 0).
Ekman, T. H. J., 1 (Dryobates major).
Forsius, R., 11 (Sturnus).
Frey, R., 12 (Dryocopus martius, p. 211).
Haartman, L. von, 1 (Muscicapa hypoleuca, 0).
Hildén, I., 1 (Muscicapa parva).
Hustich, I., 20 (Lapponia), 23 (Lapponia).
Idman, G., 4 (Dryobates major).
Lindberg, Har., 25 (Dryob. major).
Nyström, E. W., 1 (Larus minutus).
Palmgren, P., 12 (Emberiza pusilla), 13 (Dagrytmen, 0), 18 (Phylloscopus trochilus acredula, 0).

Mammalia.

Eklund, O., 6 (Erinaceus).
Hiitonen, I., 6 (Vesperilio daubentonii).
Hustich, I., 7 (Lemmus), 16 (Lemmus), 17 (Lemmus), 20 (Lapponia), 23 (Lapponia).
Lindberg, Har., 25 (Sciurus).
Lindqvist, E., 1 (Mus minutus), 2 (Vespertilio daubentonii).
Välikangas, I., 3 (Erinaceus), 4 (Eliomys quercinus).

CECIDIA.

Forsius, I., 2 (Acar.).
Forsius, R., 1 (Hym.), 3 (Hym., dipt.), 4 (Hym., dipt.), 8 (Hym., dipt., hem.), 9 (Hym., dipt.), 13 (Hym., dipt.).
Hellén, W., 22 (Hym., dipt.).
Krogerus, R. & Lemberg, B., 1 (Hym. p. 9).

COLLECTIONES SOCIETATIS. (FAUNA.)

Frey, R. (Ins.), 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 42, 43.
Kalela, O. (Excl. ins.), 3, 5.
Korvenkontio, V. A. (Excl. ins.), 4, 6.
Välikangas, I. (Excl. ins.), 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23.

COPIOSITAS, FREQUENTIA.

Backlund, H. O., 3 (Prot., nemat., tard.)
Järvi, T. H., 2 (Simulium latipes).
Nordman, A. F., 8 (Col. p. 138—139; Lep. p. 140, 145—147, 163), 9 (Dermanyssus gallinae).

CYTOLOGIA.

Elfving, F., 3 (Nucleus).
Federley, H., 5 (Chromos., 0), 9 (Chromos., 0).
Järvi, O., 1 (Lipokondrit, 0).
Klingstedt, H., 1 (Trich.; Kernmembran), 4 (Trich.; heterogametic ♀), 13 (Neur.; heteromorphe Chromosomenpaare), 16 (Drosophila; gland. saliv. Chromos. 0), 17 (Orth.; tetraploid Spermatocytes), 18 (Orth.; inekvala bivalenter, 0), 19 (Orth.; negative Heterochromacy), 20 (Orth.; negat. Heterochr.).
Meurman, O. 3 (Chromos.. 0).

EMBRYOLOGIA EXPERIMENTALIS.

Ekman, G., 1 (Rana, 0), 2 (0).
Toivonen, S., 1 (0).

FAUNA.[1])

Generalia.

JOHANSEN, H., 1 (Sibirien, 0).
KIVIRIKKO, K. E., 2 (Mont. Thianschan., 0).
LEVANDER, K. M., 2 (Faun. litor., Lps., 0).

Crustacea.

SEGERSTRÅLE, S. G., 3 (Ab, N).
ZANDT, F., 1 (Coregonen-Parasiten).

Myriopoda.

FORSIUS, R., 18 (Fenn.).

Mallophaga.

HELLÉN, W., 4 (Fenn.).
TANNER, T. R., 1 (N, Oa, Tb).

Neuroptera.

KLINGSTEDT, H., 5 (Fenn.), 9 (Fenn.), 10 (Siberia), 11 (Fenn.).

Trichoptera.

FORSSLUND, K. H., 1 (Li, Lps).

Lepidoptera.

HELLÉN, W., 16 (Li).
KROGERUS, H., 1 (Li).
NORDMAN, A. F., 8 (Al).
VALLE, K. J., 5 (Lps).

Diptera.

AHLQVIST, H., 1 (Esth.).
FORSIUS, R., 3 (Ab, N, Ik), 4 (Al, Ab), 8 (Al, N).
FREY, R., 16 (Fenn.), 23 (Fenn.), 24 (Fenn.).

Aphaniptera.

NORDBERG, S., 2 (Fenn.).

Coleoptera.

HELLÉN, W., 10 (Ik).
LINDBERG, HAR., 49 (Haliplus, Fenn., 0).
LINDBERG, HÅK., 3 (Ab, N), 4 (Kl), 7 (Fenn.), 9 (Lps), 10 (Esth.), 15 (N).

Hymenoptera.

FORSIUS, R., 3 (Ab, N, Ik), 4 (Al, Ab), 5 (Fenn., 0), 8 (Al, N).
HELLÉN, W., 9 (Fenn.), 22 (Fenn.).
KROGERUS, R., 10 (Ik), 13 (Fenn.), 20 (Ab, N).

Hemiptera.

FORSIUS, R., 8 (Al, N).
HELLÉN, W., 17 (Ka).
KROGERUS, R., 6 (Ik).
LINDBERG, HÅK., 2 (Le), 3 (Ab, N), 4 (Kl), 8 (Lps), 15 (N), 16 (Oa, Om).

Pisces.

JÄRVI, T. H., 10 (Coregonus, Fenn., 0).
ZANDT, F., 1 (Coregonus).

Aves.

AHLQVIST, H., 2 (Esth.).
BRANDERS, K., 1 (Ta).
CAJANDER (KALELA), O., 1 (Ta).
FORSIUS, I., 4 (N).
MERIKALLIO, E., 1 (Äyräpäänjärvi, 0).
WALLGREN, G., 1 (N).

Mammalia.

NORDBERG, S., 3 (Al), 4 (Al, hist., 0).
WALLGREN, G., 1 (N).

FAUNA HIEMALIS.

FREY, R., 12 (Dipt.).
HUSTICH, I., 23 (Aves, mamm.).

GENETICA.

FEDERLEY, H., 1 (Kongress, 0), 3 (Kongr., 0), 5 (Chromos., 0), 7 (Kongr., 0), 9 (Pygaera).
KLINGSTEDT, H., 4 (Limnophilus).
PALMGREN, A., 49 (Nomencl., p. 443, 456).

HERMAPHRODITISMUS, GYNANDROMORPHISMUS.

EKLUND, O., 66 (Clupea harengus v. membras).
FREY, R., 30 (Chironomus staegeri).

[1]) Vide etiem Collectiones Societatis.

Segerstråle, C., 17 (Coregonus lavaretus).
Välikangas, I., 13 (Clupea harengus v. membras).

HYBRIDAE.

Pisces.

Välikangas, I., 14 (Leuciscus rutilus × Abramis blicca).

Aves.

Kalela, O., 2 (Lyrurus tetrix × Tetrao urogallus).
Välikangas, I., 2 (Lyr. tetr. × Tetr. urog.), 4 (Lagopus lagopus × Lyr. tetr.), 9 (Lyr. tetr. × Tetr. urog., Phasianus colchicus × Ph. c. torquatus), 18 (Tetr. urog. × Lagopus lagopus).

Mammalia.

Välikangas, I., 14 (Capra hircus × Ovis aries).

IMPORTATIO.

Frey, R., 10 (Hym.), 17 (Col.), 29 (Col.), 30 (Col., dipt.), 31 Orth., derm., col.), 33 (Col.), 34 (Col.), 42 (Col.).
Hellén, W., 13 (Col.).
Korvenkontio, V., 1 (Mamm.).
Krogerus, R., 19 (Col.).
Lindberg, Har., 60 (Moll.).
Lindberg, Håk., 13 (Col.).
Luther, A., 7 (Coel.), 8 (Moll.), 9 (Moll.).
Söderström, S., 1 (Turb.).

LIMNOLOGIA, HYDROBIOLOGIA, PLANCTON.

Buch, K., 1 (0).
Halme, E., 1 (0).
Häyrén, E., 27 (Kongress, 0).
Järnefelt, H., 2, 3 (0).
Kotilainen, M. J., 7 (0).
Valle, K. J., 1 (0).
Välikangas, I., 15 (Kongress, 0).

MIGRATIO.

Pisces.

Järvi, T. H., 5 (Salmo).
Segerstråle, C., 12 (Scomber scombrus).

Aves.

Bergman, G., 1 (0).
Dahl, A., 1.
Ekman, T. H. J., 2 (Fringilla montifringilla).
Forsius, I., 3 (Calidris alpina schinzii), 4, 6 (Calidris m. maritima), 7.
Häyrén, E., 11 (Ampelis garrulus).
Jägerskiöld, L. A., 1 (0).
Luther, A., 2 (Cygnus musicus).
Munck, L., 3 (Anser).
Odenwall, E., 3.
Olsoni, B., 5 (Fring. coelebs, Fr. montifringilla).
Palmgren, A., 42 (p. 329, 350), 52 (p. 238, 252), 55 (p. 212, 229).
Palmgren, P., 15 (Fring. coelebs), 16 (Erithacus rubecula, dygnsrytmik), 21 (Aktivitet o. vila, 0).
Paulsson, G., 1 (Cygnus musicus).
Schoultz, Å. von, 1 (Muscicapa p. parva).
Välikangas, I., 10.
—»— & Hytönen, O., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
—»— & Siivonen, L., 1.

MONSTROSITATES, TERATOLOGIA.

Frey, R., 17 (Col.), 34 (Orth.).
Välikangas, I., 1 (Amph.), 4 (Pisc.), 7 (Mamm., aves, pisc.), 9 (Mamm., pisc.), 16 (Rept.).

MORPHOLOGIA, ANATOMIA, HISTOLOGIA.

Friedmann, H., 1 (Generalia, 0).
Karling, T. G., 1 (Turb.), 6 (Nemert.), 8 (Turb.), 9 (Turb.).
Luther, A., 4 (Prot.).
Markewitsch, A. P., 1 (Crust.).
Palmgren, P., 20 (Generalia, 0).
Renfors, L., 1 (Polych.).
Välikangas, I., 17 (Mamm.).

NIDUS.

Hildén, I., 1 (Muscicapa p. parva).
Palmgren, P., 1 (Regulus, Aegithalus).

PALAEONTOLOGIA.

KALELA, O., 2 (Phocaena), 4 (Elephas primigenius).
OLSONI, B., 13 (Moll.).
TANNER, V., 3 (Echin., brach., bryoz., moll., crust., polych.), 4 (Moll.).
VÄLIKANGAS, I., 9 (Phoca sp.), 14 (Castor fiber).

PARASITAE.

Protozoa.

KOPPERI, A. J., 1 (Mamm.).

Crustacea.

MARKEWITSCH, A. P., 1 (Pisc.).
ODENWALL, E., 6 (Pisc.).
ZANDT, F., 1 (Pisc.).

Acarina.

NORDMAN, A. F., 9 (Homo).
VÄLIKANGAS, I., 9 (Mamm.).

Mallophaga.

BACKLUND, H. O., 1 (Aves), 2 (Aves).
HELLÉN, W., 1 (Aves), 4 (Aves, mamm.), 7 (Aves).
TANNER, T. R., 1 (Aves).

Diptera.

KROGERUS, R., 22 (Ins.).

Aphaniptera.

NORDBERG, S., 2 (Aves, mamm.).

Hymenoptera.

NORDMAN, A. F., 2 (Aran.), 8 (Lep.), 10 (Lep.).

Hemiptera.

LINDBERG, HÅK., 12 (Hem., 0).

PATHOLOGIA.

CARPELAN, J., 2 (Aves).
FORSIUS, R., 10 (Aves).
HÄYRÉN, E., 7 (Pisc.), 33 (Pisc.).
SEGERSTRÅLE, C., 16 (Pisc.).
VÄLIKANGAS, I., 7 (Pisc.), 9 (Aves), 17 (Mamm.).

PHAENOLOGIA.

DAHL, A., 1 (Aves, amph., hym., lep., plec.).

PHYSIOLOGIA.

PALMGREN, P., 14 (Aran.; sinneshår, 0).
PIPPING, MÄRTA, 1 (Pisc.; luktsinne, 0).
SUOMALAINEN, P., 2 (Pisc.; hajuaisti, 0).

PISCATORIA, PISCICULTURA.

HEIMBECK, B., 1 (Lofoten, 0).
SEGERSTRÅLE, C., 3 (Chile, Xiphias, 0), 19 (0).

SEXUALITAS.

HARTMANN, M., 1 (0).
HIITONEN, I., 15 (Interseksualisuus, 0).

SIGNATIO.

Pisces.

SEGERSTRÅLE, C., 13 (Esox).

Aves.

VÄLIKANGAS, I., 10.
—»— & HYTÖNEN, O., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
—»— & SIIVONEN, L., 1.

STADIA JUVENALIA.

FORSIUS, I., 1 (Blasticotoma filiceti).
JÄRVI, T. H., 8 (Anguilla).
SEGERSTRÅLE, S. G., 5 (Belone acus).

SYNONYMIA, NOMENCLATURA.

JÄRVI, T. H., 4 (Coregonus).
REICHARDT, A., 1 (Plegaderus).
SCHULZE, P., VIETS, K. & WILLMANN, C., 1 (Acar.).

SYSTEMA ET FORMAE NOVAE.

Turbellaria.

KARLING, T. G., 8 (Dalyellia), 9 (Promesostoma).

Nemertini.

KARLING, T. G., 6 (Prostomatidae).

Polychaeta.

KARLING, T. G., 7 (Haplobranchus).

Crustacea.

MARKEWITSCH, A. P., 1 (Salmincola).
ODENWALL, E., 4 (Asellus), 6 (Tracheliastes).

Neuroptera.

KLINGSTEDT, H., 5 (Sisyra), 6 (Heliconius), 8 (Boriomyia), 10 (Sialis), 11 (Sialis), 15 (Boriomyia).

Trichoptera.

FORSSLUND, K. H., 1 (Micrasema).

Lepidoptera.

MONTELL, J., 5 (Argynnis).
NORDMAN, A. F., 1 (Hydrilla).
VALLE, K. J., 5 (Hepialus).

Aphaniptera.

NORDBERG, S., 2 (Ceratophyllus, Acanthopsylla, Doratopsylla).

Coleoptera.

LINDBERG, HÅK., 6 (Deronectes), 9 (Sitona, p. 111, Agabus, p. 121).
REICHARDT, A., 1 (Plegaderus).

Hymenoptera.

HELLÉN, W., 9 (Oligosita), 27 (Priophorus).

Mollusca.

LUTHER, A., 9 (Limax).
VÄLIKANGAS, I., 19 (Anodonta).

Pisces.

MUNCK, L., 7 (Coregonus).
ODENWALL, E., 2 (Cottus), 7 (Coregonus).
RENDAHL, H., 1 (Misgurnus, 0), 2 (Cobitis).

Aves.

FORSIUS, I., 3 (Calidris).
HORTLING, I., 1 (Sturnus).
VALLE, K. J., 4 (Picus).

TECHNICA.

BACKLUND, H. O., 3 (Mikrofauna).

TRANSPORTATIO MARINA (Insecta).

NORDMAN, A. F., 4.
SEGERSTRÅLE, S. G., 2.
STORÅ, R., 2.

VAGATIO.

FREY, R., 18 (Pachytulus migratorius).
HUSTICH, I., 16 (Lemmus), 17 (Lemmus).
KORVENKONTIO, V., 5 (Lemmus).
NORDMAN, A. F., 6 (Lemmus, Microtus, Evotomys), 8 (Pieris brassicae, p. 141—142).
SEGERSTRÅLE, C., 6 (Alosa, Aspius, Anguilla), 7 (Abramis ballerus), 9 (Coregonus lavaretus, Anguilla), 13 (Esox).

VARIATIONES COLORIS.

Crustacea.

VÄLIKANGAS, I., 12 (Potamobius astacus; albin.).

Pisces.

VÄLIKANGAS, I., 2, 4, 12, 13 (Perca).

Reptilia.

HUSTICH, I., 2 (Pelias berus).

Aves.

CARPELAN, J., 2 (Lagopus lagop.).
REUTER, E., 18 (Anas boschas; albin.).
VÄLIKANGAS, 1 (Tetr. urog.; albin.), 2 (Corvus cornix, Hirundo rust.; albin.), 4 (Tetr. urog., Pica; albin.), 7 Lyr. tetr.; albin.), 9 (Fring. coelebs; Lyr. tetr.; albin.), 16 (Anthus trivialis; albin.), 20 (Passer dom.; albin.).

Mammalia.

KORVENKONTIO, V., 3 (Fiber. zibeth.; albin.), 4 (Fiber zib.).
VÄLIKANGAS, I., 1 (Mus musc.; semialb.), 4 (Agricola agr.; albin, Mus decum.), 7 (Mus musc., Lepus tim.; albin.), 12

(Sciur. vulg., Fiber zib.; albin.), 14 (Erinaceus, juv.; albin., Fiber zib.; hemialbin.).

ZOOGEOGRAPHIA.

Generalia.

KAUDERN, W., 1 (Celebes, 0).
KROGERUS, R., 21 (Hangöuddområdet, 0).
PALMGREN, P., 10 (Bibl.).

Evertebrata inferiora.

KARLING, T. G., 1 (Bresslauilla relicta; N).
LUTHER, A., 6 (Eriocheir sinensis; Ab, Ka).
VALLE, K. J., 3 (Gammaracanthus lor. v. lac.; Ka).
WIKSTRÖM, D. A., 1 (Aurelia; Ab).
ZANDT, F., 1 (Crust., Coregonen-Parasiten).

Insecta.

LINDROTH, C. H., 1 (Island, 0).
SEGERSTRÅLE, S. G., 2 (N).
STORÅ, R., 2 (N).

Orthoptera.

NORDMAN, A. F., 5 (Gomphocerus variegatus; Li), 12 (Tettigonia viridissima).

Neuroptera.

KLINGSTEDT, H., 5 (Sisyra; Fenn.), 6 (Helicoconis lutea; Fenn.), 9 (Boriomyia; Fenn.).

Lepidoptera.

HELLÉN, W., 16 (Li).
KANERVA, N., 1 (Hydrilla lepigone; N).
NORDMAN, A. F., 1 (Hydrilla lepigone), 8 (Al).

Diptera.

FREY, R., 2 (Platystoma seminationis; Al), 12 (Lps).

Coleoptera.

KROGERUS, R., 5 (Cassida murraea; N), 12 (Anoncodes rufiventris; Ka), 14 (Bledius, Dyschirius; Al).
KROGERUS, R., & LEMBERG, B., 1 (Anonc. rufiv.; Ka).
LINDBERG, HAR., 68.
LINDBERG, HÅK., 4 (Deronectes; Fenn.), 6 (Deronectes; Fenn.), 7 (Küstenkäfer; Fenn.), 9 (Lps).
REICHARDT, A., 1 (Plegaderus).

Hymenoptera.

KROGERUS, R., 13 (Fenn.).

Hemiptera.

HELLÉN, W., 17 (Ka).
LINDBERG, HÅK., 8 (Lps).

Mollusca.

LUTHER, A., 6 (Potamopyrgus crystallinus carinatus; Ab, N).
SEGERSTRÅLE, S. G., 6 (Mytilus edulis; N, Ka).

Pisces.

JÄRVI, T. H., 10 (Cottus quadricornus relictus).
ZANDT, F., 1 (Coregonen).

Aves.

FORSIUS, I., 4 (N).
HILDÉN, I., 1 (Muscicapa p. parva; N).
HUSTICH, I., 23 (Li).
PALMGREN, P., 3 (Parus cristatus; Al), 4 (Anas strepera; Al).
SCHOULTZ, Å. VON, 1 (Muscicapa p. parva; N).
VÄLIKANGAS, I., 6 (Alcedo atthis ispida; Ab, Ka).

Mammalia.

HUSTICH, I., 17 (Lemmus), 23 (Li).
VÄLIKANGAS, I., 11 (Eliomys quercinus; Ka).

ZOOLOGIA VENATORIA.

LEVANDER, K. M., 1.

Index Specierum.

PROTOZOA.[1]

Amoeba sp. [**9** : 171].
Henneguya zschokkei **5** : 208.
Hymenomonas coccolithophora **9** : 171.
— danubialis **9** : 167.
— roseola **9** : 165—171 (fig.).
— scherffeli **9** : 167, 171.
— stagnicola **9** : 171.
Lamblia intestinalis **8** : 258.
— microti **8** : 258—259.
— muris **8** : 258.
Ophrydium versatile **5** : 208; **20** : 6.
Paramaecium caudatum **20** : 7.
Pontosphaera stagnicola **9** : 170, 171.
Thecamoebaea **14** : 31.
Trachelocerca phoenicopterus **10** : 90.

COELENTERATA.

Aurelia aurita **8** : 14—17; **11** : 216—226 (fig.).
Cordylophora lacustris **13** : 24; **17** : 147.
Craspedacusta sowerbii **13** : 52.
Ephydatia fluviatilis **5** : 208.
— muelleri **12** : 248.
Hydra sp. **5** : 208.
Microhydra sowerbii **13** : 52.
Pelmatohydra oligactis **1** : 8.
Protohydra leuckarti **2** : 8—10; **10** : 90, 244, 395.
Spongilla lacustris **12** : 248; **20** : 9.

TURBELLARIA.

Acrorhynchus robustus **10** : 90.
Bipalium kewense **11** : 189.
Bresslauilla relicta **6** : 128—130 (fig.).
Convoluta sp. **10** : 90.
Dalyellia arctica **10** : 391.
— bergi **10** : 391.
— chlynovica **10** : 391.
— expedita **10** : 390.
— fairchildi **10** : 391.
— lutheri **10** : 391.
— *nigrifrons* **10** : 388—391 (fig.).
— polychaeta **10** : 391.
Dendrocoelum lacteum **1** : 8.
Microstoma lineare **2** : 9.
Monocelis hamata **10** : 90, 395.
Otoplana sp. **10** : 90, 395.
Plagiostoma lemani **10** : 390.
Planaria torva **1** : 8.
Polycelis nigra **1** : 8.
Promesostoma baltica **10** : 393—395.
— bilineatum **10** : 393—395.
— *cochlearis* **10** : 391—395 (fig.).
— graffi **10** : 395.
Promesostoma marmoratum **10** : 393—395.
— — v. groenlandicum **10** : 393.
— sp. **10** : 90.

ROTATORIA.

Monostyla lunaris **20** : 148.
Philodina roseola **20** : 5.

GASTROTRICHA.

Turbanella sp. **10** : 391.

NEMATODES.

Nematoda sp. **14** : 31.

NEMERTINI.

Amphiporus **10** : 84.
— cordiceps **10** : 90.
Carinoma **10** : 82.
Gononemertes **10** : 82.
Oerstedia **10** : 77—86.
Prostoma clepsinoides **10** : 88.
— obscurum **10** : 76—90 (fig.), 244.
Sacconemertes arenosa **10** : 76—90 (fig.).
Stichostemma graecense **10** : 76—90.
Tetrastemma eilhardi **10** : 84.
— obscurum **1** :8 ; **2** : 9; **10** : 86.
Tubulanus **10** : 82.

POLYCHAETA.

Haplobranchus aestuarinus **10** : 242—244.
— atlanticus **10** : 242—244.
— baicalensis **10** : 242, 244.
— *balticus* **10** : 242—244 (fig.).
— speciosus **10** : 242, 244.
Manayunkia **10** : 242.
Nereis diversicolor **2** : 10.
Potamoceros tricuspis **9** : 100, 102.
— triqueter **9** : 95.
Pygospio elegans **9** : 31—32 (fig.); **10** : 242.
Spirorbis sp. **9** : 94—96, 99, 100, 102.
Terebellides stroemi **10** : 242.

OLIGOCHAETA.

Allobophora chlorotica **17** : 336.
Helodrilus constrictus **5** : 126.
Lumbricus castaneus **5** : 126.
Nais (elinguis?) **1** : 8.
Stylaria lacustris **1** : 8.
Tubifex sp. **20** : 7.

HIRUDINEA.

Clepsine sexoculata **14** : 5.
Glossiphonia complanata **14** : 4—5.

TARDIGRADA.

Tardigrada sp. **14** : 31.

[1] Vide etiam Algae.

CRUSTACEA.

Acanthodiaptomus tibetanus **13** : 165.
Achtheres coregoni **14** : 8—11.
— percarum **11** : 41—43, 46.
— pseudobasanistes **14** : 8—11.
— sandrae **11** : 43.
Amphitoë rathkei **17** : 147.
Argulus coregoni **11** : 41; **14** : 8.
— foliaceus **11** : 40, 41, 45, 46; **14** : 8.
Asellus aquaticus **1** : 8.
— — f. typicus **3** : 16 (fig.).
— — v. *abyssalis* **3** : 16 (fig.); 133, 134.
— — v. freibergensis **3** : 16 (fig.).
— cavaticus **3** : 16 (fig.).
Balanus balanus **20** : 38, 43.
— crenatus **9** : 93, 94, 96—98, 100—102.
— improvisus **1** : 8; **9** : 166, 171.
— porcatus **9** : 93, 94, 96—98, 101, 102.
— sp. **9** : 96, 101, 103; **20** : 37.
Basanistes coregoni **14** : 8, 10.
Bathyporeia pilosa **17** : 149.
Bosmina coregoni **6** : 159.
— maritima **15** : 50.
— obtusirostris **6** : 159.
Branchionecta paludosa **6** : 226; **13** : 165.
Caligus rapax **14** : 8.
Calliopius laeviusculus **17** : 145, 147—149.
— rathkei **17** : 147, 148.
Copepoda sp. [**5** : 68].
Corophium lacustre **17** : 145, 146, 147, 149; **19** : 20—22, 299.
— volutator **17** : 146, 147, 149; **19** : 22.
Discocotyle sagittatum **14** : 8.
Ergasilus briani **11** : 41, 42, 46.
— gibbus **11** : 42.
— minor **11** : 42.
— sieboldi **11** : 40, 41, 42, 46.
— trisetaceus **11** : 42.
— sp. **11** : 40; **14** : 8.
Eriocheir sinensis **10** : 69—73, 470; **11** : 265; **12** : 248; **13** : 165; **17** : 191, 336.
Gammaracanthus loricatus v. lacustris **5** : 108—109.
Gammarus cancelloides **17** : 148.
— duebeni **17** : 149.
— locusta **1** : 8; **17** : 146, 148, 149.
— — f. zaddachi **17** : 146, 149.
— pulex **18** : 63; **20** : 8.
— sp. **19** : 22.
Holopedium gibberum **6** : 159.
Iaera marina **1** : 8.
Idothaea baltica **5** : 207.
— sp. **4** : 15.
Leander adspersus v. fabricii **5** : 207; **6** : 226; **14** : 166; **19** : 88.
Leptocheirus pilosus **17** : 145, 146, 149; **19** : 20—22, 299.
Leptodora kindti **6** : 159.
Lernaea cyprinacea **11** : 40.
Lernaeopoda thymalli **14** : 8.
— tuberculata **14** : 8.
Limnadia lenticularis **8** : 372.
Lithodes maja **5** : 207.
Melita palmata **17** : 149.
Mysis sp. **5** : 207.
Palaemon **5** : 207.
Pallasea quadrispinosa **5** : 108; **17** : 145, 148.
Pandanus borealis **19** : 88.
Polyartemia forcipata **7** : 317; **11** : 265.
Pontoporeia affinis **17** : 149.
— femorata **17** : 149.
Potamobius astacus **5** : 207; **6** : 100; **7** : 3.
— — var. color. **6** : 226.
— leptodactylus **6** : 100—101; **7** : 2, 317.
Salmincola lotae **11** : 41, 43—46 (fig.).
— sp. **11** : 41, 43.
Talitrus saltator **17** : 149.
Tracheliastes *fecundus* **5** : 80—81 (fig.).
— maculatus **5** : 81.
— polycolpus **5** : 81; **11** : 41.
— stellifer **5** : 81.
— sp. **5** : 207;[1] **11** : 41.
Verruca stroemia **9** : 94, 98, 102.

ARANEIDA.

Agelena labyrinthica **18** : 133—134.
Aranea sp. **4** : 121.
Epeira cornuta **9** : 132.
— cucurbitina **9** : 146.
Philodromus fallax **2** : 45.
Pisaura mirabilis **9** : 147.
Theridium (-on) **9** : 144, 145 (fig.), 147.

PSEUDOSCORPIONIDAE.

Chelifer sp. **5** : 207.
Pseudoscorpionidae sp. **5** : 207.

ACARINA.

Acarus casei **13** : 121.
— coleoptratorum **13** : 123.
— putrescentiae **13** : 122.
— rupestris **13** : 122.
— siro **13** : 121.
Adoristes ovatus **13** : 124, 125.
Allothrombium fuliginosum **13** : 121, 125.
Ameroseius echinatus **13** : 123.
Anyptes baccarum **13** : 122.
Arrenurus sp. **13** : 120.
Atax **13** : 119.
Bdella histrionica **13** : 122.
— lignicola **13** : 122.
— littoralis **13** : 122.
— longicornis **13** : 122.
— ornata **13** : 122.
Belaustium **13** : 125.
Belba clavipes **13** : 124.
— verticillipes **13** : 124.
— sp. **13** : 124.

[1] Per errorem Tracheliaster.

Brachypoda **13** : 120.
Bryobia praetiosa **13** : 122
Camisia biverrucata **13** : 124, 125.
— horrida **13** : 124.
— spinifer **13** : 124, 125.
Carabodes cephalotes **13** : 124.
— coriaceus **13** : 124.
— marginatus **13** : 124.
Cepheus **13** : 121.
— latus **13** : 123, 124.
Ceratixodes uriae **13** : 118.
Ceratoppia bipilis **13** : 124.
Ceratozetes sp. **13** : 124.
Cheyletus eruditus **13** : 125.
Coleolaelaps **13** : 121.
— integer **13** : 123.
Copriphis **13** : 121.
— sp. **13** : 123.
Cunaxa setirostris **13** : 121.
Cyta latirostris **13** : 122.
Dermanyssus gallinae **10** : 45; **19** : 22—24.
Dinothrombium tinctorius **13** : 122.
Eriophyes kiefferi **1** : 71, 153 (cecid.).
— rhodiolae **1** : 70.
Eriophyidae sp. **4** : 289.
Erythraeus adpendiculatus **13** : 125.
— electoralis **13** : 125.
— phalangoides **13** : 125.
— regalis **13** : 125.
— rupestris **13** : 125.
— sp. **13** : 122.
Eugamasus magnus **13** : 122, 123.
— sp. **13** : 122.
Eupodes pallescens **13** : 121.
— unifasciatus **13** : 121.
Euzetes sp.? **13** : 124.
Eviphis **13** : 121.
— ostrinus **13** : 123.
Eylais **13** : 119, 120.
— extendens **13** : 119.
— sp. **13** : 120 (larva).
Frontipoda **13** : 120.
Fuscozetes fuscipes **13** : 124.
Galumna sp.? **13** : 124.
Gamasus putrescentiae **13** : 122.
— scarabaeorum **13** : 123.
Glycyphagus domesticus **13** : 121.
Halacaridae sp. **1** : 8.
Hermannia sp. **13** : 124 (nympha).
Humerobates sp.? **13** : 124.
Hydrachna **13** : 119, 120.
Hyletastis globulus **13** : 123.
Ichoronyssus sp. **13** : 123.
Iphidozercon **13** : 121.
— inexpectatus **13** : 123.
Ixodes nivalis **13** : 118.
— ricinus **13** : 118.
Laelaps muris **13** : 123.
Leiognathus albatus **5** : 207.
Leptus phalangii **13** : 121.
Liacarus coracinus **13** : 124.
Liacarus nitens **13** : 124, 125.
Limnochares **13** : 119.
— aquatica **13** : 120.
Linopodes melaleucus **13** : 121.
— motatorius **13** : 121.
— sp. **13** : 121 (nympha?).
Liponyssus sp. **13** : 123.
Microtrombidium sp. **13** : 125.
Midea **13** : 120.
Mideopsis **13** : 120.
Myianoetus sp. **13** : 125.
Myobia musculi **13** : 121.
Neomolgus littoralis **13** : 122.
Neumania **13** : 120.
Notaspis coleoptratus **13** : 124.
Nothrholaspis carinatus **13** : 123.
Nothrus silvestris **13** : 124.
— sp. **13** : 124 (nympha).
Oppia splendens? **13** : 124.
— ? sp. **13** : 124, 125.
Oribata geniculatus **13** : 124.
Oribatella sp.? **13** : 124.
Oribotritia loricata **13** : 125.
Oxus **13** : 120.
Parasitus coleoptratorum **13** : 123.
— epsilon **13** : 122.
— eta **13** : 122.
— sp. **13** : 122.
Paratetranychus pilosus **12** : 219, 236.
Pelops occultus **13** : 124, 125.
— planicornis **13** : 124.
Penthaleus haematopus **13** : 121.
— major **13** : 121.
Pergamasus crassipes **13** : 123.
Phthiracarus globosus **13** : 125.
— sp.? **13** : 125.
Phyllocoptes schlechtendahlii **12** : 220, 236.
Piona **13** : 120.
— longipalpis **13** : 119.
Platynothrus peltifer **13** : 124.
Rhagidia sp.? **13** : 121.
Rhinothrombium nemoricola? **13** : 125.
Rhodacarus roseus **13** : 122.
Sarcoptes domesticus **13** : 121.
— scabiei **13** : 121.
Scheloribates confundatus **13** : 124, 125.
Scirula impressa **13** : 123.
Scirus longirostris **13** : 122.
Sejus **13** : 121.
— togatus **13** : 123.
Sphaerolophus globiger **13** : 125.
Spinturnix vespertilionis **13** : 123.
Thyas sp. **13** : 119.
Trachytes **13** : 121.
— pyriformis **13** : 123, 124.
Trombidium **13** : 119.
— coloratum **13** : 122.
— holosericeum **13** : 125.
— pexatum **13** : 125.
— tinctorium **13** : 122.

Trombidium sp. **13**: 125.
Tyroglyphus farinae **13** : 121.
Tyrophagus sp. **13** : 122.
Uropoda **13** : 121.
— vegetans **13** : 123.
Veigaia sp. **13** : 122.
Zercon triangularis **13** : 123.
— sp. **13** : 123.

MYRIOPODA.

Archiboreoiulus pallidus **11** : 14.
Blaniulus guttulatus **18** : 126—127, 151.
Brachydesmus superus **11** : 14.
Chilopoda sp. **5** : 207.
Choneiulus palmatus **11** : 14.
Chromatoiulus sjaelandicus **11** : 14.
Cylindroiulus britannicus **11** : 14.
— frisius **11** : 14.
— silvarum **11** : 14.
Diplopoda sp. **5** : 207.
Isobates varicornis **11** : 14.
Iulus terrestris **11** : 14.
Leptoiulus minutus **11** : 14.
— proximus **11** : 14.
Nopoiulus venustus **11** : 14.
Orthomorpha gracilis **11** : 14.
Polydesmus complanatus **11** : 14.
— coriaceus **11** : 14.
— denticulatus **11** : 14.
Polyxenus lagurus **11** : 14.
Polyzonium germanicum **11** : 14.
Proteroiulus fuscus **11** : 14.
Schizophyllum sabulosum **11** : 14.

THYSANURA.

Lepisma saccharina **4** : 288; **12** : 250; **13** : 168; **19** : 301.
Machilis polypoda **14** : 167.
Petrobius balticus **13** : 92 (fig.), 93, 168; **15** : 271; **19** : 19.

ORTHOPTERA.

Acridium bipunctatum **20** : 249.
Blatta orientalis **12** : 250.
Bryodema tuberculata **13** : 168.
Chorthippus bicolor **17** : 166, 169, 170.
— — ssp. brevis **15** : 271.
— — × biguttulus **17** : 170.
— biguttulus **17** : 166.
— montanus **18** : 266.
— parallelus **18** : 266.
— — f. montanus **4** : 288.
— — f. typicus **4** : 288.
Chrysochraon dispar **12** : 194—209 (fig.); **17** : 339.
Cosmoderus maculatus **12** : 250.
Ectobia lapponica **5** : 209.
— silvestris **5** : 209.
Gomphocerus **17** : 174.
Gomphocerus maculatus **14** : 124.
— variegatus **14** : 124—125, 167.
Gryllus domesticus **20** : 249.
Locusta viridissima **17** : 339; **19** : 301.
Locustidae sp. **14** : 167.
Mecostethus **12** : 207—209.
— grossus **17** : 166—170 (fig.); **18** : 109.
Metrioptera brachyptera **12** : 208.
Omocestus viridulus **18** : 141, 266; **20** : 249.
Pachytulus migratorius **7** : 172—174.
— — f. danicus **15** : 271.
Panchlora sp. **4** : 288; **5** : 209; **14** : 167.
Periplaneta americana **5** : 209; **16** : 150.
— australasiae **12** : 250.
— sp. **12** : 250.
Phyllodromia germanica **5** : 209.
Platycleis brachyptera **20** : 249.
— griseus **16** : 150; **18** : 134, 135.
— roeselii **18** : 266.
Podisma pedestris **18** : 266.
Psophus stridulus **18** : 266; **19** : 301.
Schistocerca gregaria **12** : 198—200, 203.
Sphingonotus coerulans **4** : 143; **6** : 228.[1]
— — f. intermedius **3** : 8[2], 9; **4** : 143—145.
Stauroderus bicolor **12** : 194; **18** : 266; **20** : 249.
Stenobothrus **12** : 203, 208.
— sp. **18** : 141.
Tachycines asynamorus **18** : 266.
Tettigonia cantans **19** : 206, 207; **20** : 249.
— viridissima **19** : 206—210.
Thamnotrizon cinereus **18** : 266.
Trimerotropis **10** : 3.
— citrina **12** : 203.

DERMAPTERA.

Forficula auricularia **4** . 288; **14** . 167; **18** : 266; **19** : 301.

COPEOGNATHA.

Lepinotus formicarius **4** : 30, 288.

THYSANOPTERA.

Chirothrips hamatus **19** : 27.
Thrips sp. **20** : 148.

MALLOPHAGA.

Colpocephalum (-lus) haliaëti **1** : 68, 152.
— pachygaster **1** : 68.
— subpachygaster **1** : 68, 152.
— sp. **9** : 192.
Degeeriella camerata **1** : 70, 152;[3] **3** : 5, 133.
— furva **1** : 70, 152.

---

[1] Per errorem coeruleus interm.
[2] S. coerulescens.
[3] Per errorem carnerata.

Degeeriella nebulosa **1**: 70, 152.
Docophorus acanthus **7**: 51.
— asturinus **7**: 51.
— bassanae **7**: 51.
— ceblebrachys **1**: 69, 152.
— colymbinus **7**: 51.
— communis **1**: 70, 152; **7**: 51.
— — v. cardinalis **7**: 52.
— cordiceps **7**: 52.
— crassipes **1**: 69, 152.
— cursor **1**: 69, 152; **5**: 209.
— excisus **7**: 52.
— gonothorax **1**: 70, 152.
— guttatus **7**: 52, 53.
— icteroides **7**: 52.
— lari **1**: 70; **7**: 52.
— leontodon **1**: 70.
— melanocephalus **7**: 52.
— ocellatus **1**: 69, 152.
— platyrhynchus **1**: 69, 152.
— pustulosus **1**: 70, 152.
— sturni **1**: 70, 152.
— subflavescens **1**: 70.
— — v. compar **1**: 70, 152.
— — v. fuscicollis **1**: 70, 152.
Goniocotes compar **7**: 53.
— hologaster **10**: 44.
Goniodes chelicornis **3**: 5, 133; **7**: 53.
— cupido **7**: 53.
— dissimilis **7**: 53; **10**: 43.
— meleagridis **10**: 43.
— stylifer **9**: 193; **10**: 43.
Linognathus piliferus **4**: 288.
Lipeurus hebraeus **1**: 69, 152.
— ochraceus **3**: 5; **7**: 52.
— temporalis **7**: 53.
— tetraonis **3**: 5, 133.
— variabilis **7**: 53.
Menopon anathorax **7**: 53.
— biseriatum **9**: 191—193; **10**: 43—45.
— cucullare **7**: 53.
— currucae **4**: 288.
— fulvofasciatum **7**: 53.
— longum **7**: 53.
— lutescens **1**: 6, 152; **7**: 53.
— mesoleucum **1**: 68, 69.
— pallidum **7**: 53; **10**: 44.
— pici **7**: 53.
Myrsidea subaequale **1**: 68, 152.
Nirmus cingulatus **1**: 6.
— furvus **7**: 52.
— fuscus **7**: 52.
— holophaeus **7**: 52.
— marginalis **7**: 52.
— punctatus **7**: 52.
— quadrulatus **1**: 70; **3**: 5.
— varius **7**: 52, 53.
Oncophorus heteroceros **7**: 52.
Philopterus gruis **20**: 249.
Physostomum mystax **1**: 69.
— nitidissimum **1**: 68, 70.
Ricinus nitidissimus **1**: 68, 152.
Strigiphilus heteroceros (-ceras) **1**: 69, 152; **7**: 52.
Trichodectes canis **1**: 69, 152.
— latus **1**: 69.
Trinoton luridum **1**: 68, 152.

ANOPLURA.

Hoplopleura acanthopus **18**: 266.
Pediculus capitis **15**: 271.
— vestimenti **19**: 301.
Phthirius pubis **19**: 301; **20**: 249.

PLECOPTERA.

Nemura sp. **7**: 236.

ODONATA.

Aeschna coerulea **5**: 209.
— serrata **15**: 271.
— subarctica elisabethae **6**: 228.
— viridis **4**: 288; **14**: 167.
Agrion cyathigerum **5**: 209
— hastulatum **5**: 209.
Calopteryx splendens **16**: 150.
— virgo **14**: 167; **16**: 150; **20**: 249.
Cordulia metallica **5**: 209.
Epitheca bimaculata **14**: 167.
Erythromma sp. **4**: 41.
Leucorrhinia albifrons **19**: 301.
— rubicunda **20**: 249.
Libellula depressa **18**: 266.
— fulva **4**: 288.
Nehalennia speciosa **12**: 250.
Onychogomphus forcipatus **18**: 266.
Orthetrum cancellatum **20**: 249.
— coerulescens **6**: 228.
Pyrrhosoma nymphula **20**: 249.
Somatochlora arctica **15**: 271.
— sahlbergi **6**: 228.
— sp. **14**: 167.
Sympetrum sanguineum **15**: 271.
— striolatum **16**: 150; **18**: 136.

EPHEMEROIDEA.

Baëtis scambus **6**: 228.
Chloëon simile **5**: 209.
Ephemera vulgata **5**: 209.

NEUROPTERA.

Boriomyia betulina **7**: 277 (mp.), 278, 279.
— concinna **5**: 106; **7**: 276, 277 (mp.), 278.
— *enontekiensis* **5**: 105—106 (fig.); **7**: 276, 277 (mp.), 278; **10**: 326—328 (fig.).
— mortoni **5**: 106; **7**: 276, 277 (mp.), 278, 279; **10**: 328.
— nervosa **5**: 105; **7**: 276, 278.
— persica **4**: 142.
— quadrifasciata **7**: 276, 277 (mp.), 278.
— subnebulosa **7**: 276, 277 (mp.), 278, 279.

Chauliodes **10** : 3.
Chrysopa abbreviata **2** : 45.
— carnea **10** : 3.
— dorsalis **3** : 126.
— perla **5** : 210.
— prasina **5** : 210.
— sp. **3** : 126; **14** : 107.
Coniopteryx borealis **6** : 228.
— tineiformis **4** : 288; **6** : 228.
Drepanopteryx phalaenoides **14** : 169.
Grocus boreus **19** : 303.
Helicoconis lutea **5** : 88—91 (mp.).
— — lapponica **5** : 90.
— — lutea **5** : 90.
Hemerobius **9** : 148.
— humulinus **10** : 4, 328.
— stigma **10** : 3—11 (fig.).
Myrmeleon formicarius **2** : 48; **4** : 288; **17** : 340; **20** : 250.
Palpares sp. **10** : 3, 9, 10.
Psectra diptera **18** : 267.
R(h)aphidia xanthostigma **19** : 303.
— sp. **17** : 340.
Sialis fuliginosa **8** : 1, 2, 4...14 (fig., mp.).
— japonica **8** : 12.
— *longidens* **8** : 1—3, 4...13 (fig.).
— lutaria **8** : 2, 3—13 (fig., mp.).
— *morio* **8** : 2, 3—13 (fig., mp.).
— sibirica **8** : 2, 3...14 (fig., mp.).
— *sordida* **8** : 2, 4—13 (fig., mp.).
— sp. **4** : 39; **6** : 160 (larvae); **17** : 340.
Sisyra dalii **5** : 85.
— fuscata **5** : 81—88 (fig., mp.).
— jutlandica **5** : 81—88 (fig., mp.).

MECOPTERA.

Boreus sp. **15** : 272.
Panorpa alpina **5** : 210.
— germanica **15** : 272.
— sp. **17** : 340.

TRICHOPTERA.

Agapetus comatus **10** : 379.
Agraylea cognatella **10** : 379.
Agrypnetes crassicornis **5** : 210.
Agrypnia pagetana f. hyperborea **10** : 380.
Apatania wallengreni **10** : 381.
Apatelia zonella v. *dalecarlica* **10** : 379, 381.
Arctopsyche ladogensis **10** : 380.
Asynarchus lapponicus **10** : 381.
Brachycentrus albescens **5** : 210.
Chaetopteryx obscurata **13** : 169.
Chilostigma sieboldi **12** : 250; **13** : 169.
Colpotaulius incisus **10** : 380.
Cyrnus flavidus **10** : 380.
Holostomis atrata **10** : 380.
— phalaenoides **5** : 210.
Hydropsyche pellucidula **10** : 380.
— sp. **10** : 380.
Hydroptila femoralis **10** : 379.
Lepidostoma hirtum **10** : 380.
Leptocerus annulicornis **10** : 380.
— cinereus **10** : 380.
— commutatus **10** : 380.
— excisus **5** : 210.
— nigronervosus **10** : 380.
— perplexus **10** : 380.
Limnophilus decipiens **4** : 32—37 (fig.), 179—182 (fig.).
— despectus **10** : 379, 380.
— diphyes **10** : 381.
— dispar **10** : 381.
— femoratus **10** : 380.
— fenestratus **10** : 380.
— lunulatus **4** : 179—182 (fig.).
— nebulosus **10** : 380.
— pantodapus **10** : 380.
— picturatus **10** : 380.
— trimaculatus **10** : 381.
Micrasema gelidum **10** : 380.
— nigrum **10** : 379, 380.
— setiferum **10** : 379.
Molanna albicans **10** : 380.
— angustata **10** : 380.
Molannodes tincta **10** : 380.
— zelleri **17** : 340.
Mystacides azurea **10** : 380.
— nigra **10** : 379, 380.
Mystrophora intermedia **10** : 378, 379.
Neureclipsis bimaculata **10** : 380.
Neuronia lapponica **10** : 380.
Oxyethira frici **10** : 379.
— sp. **10** : 379.
Parapatania **10** : 379.
— stigmatella **10** : 381.
Philopotamus montanus **10** : 380.
Phryganea grandis **18** : 268.
— obsoleta **10** : 380.
— striata **10** : 380.
— varia **10** : 380.
Platyphylax designatus **4** : 179.
Polycentropus flavomaculatus **10** : 380.
Stenophylax algosus **10** : 381.
— alpestris **10** : 381.
— caenosus **10** : 381.
— impar **10** : 381.
— nigricornis **10** : 381.
— stellatus **10** : 381.

LEPIDOPTERA.

Abraxas vide etiam Lomaspilis.
— grossulariata **18** : 136, 148, 172.
Abrostola asclepiadis **4** : 143, 144; **18** : 134, 135, 137, 153—154, 170.
— tripartita **18** : 135, 170.
Acalla ferrugana **18** : 175.
— hastiana **19** : 303.
— holmiana **18** : 175.
— variegana **18** : 175.
Acanthopsyche atra **18** : 174
Acentropus niveus **18** : 137, 174.

Acherontia atropos **1** : 6, 150; **12** : 252.
Acidalia vide etiam Scopula, Sterrha.
— fumata v. perfumata **7** : 170.
— inornata **17** : 341.
— — ab. **18** : 268.
— humiliata **18** : 154—155.
— pallidata **18** : 171.
— rubiginata **4** : 143.
— strigaria **16** : 151.
— ternata ssp. perfumata **14** : 64, 65, 67.
— violata **4** : 143, 144.
Acompsia cinerella **18** : 135, 179.
Acrobasis consociella **16** : 151; **17** : 341; **18** : 134, 135, 137, 141, 162—163, 174, 182.
— zelleri **18** : 134, 137, 163, 174.
Acrolepia assectella **18** : 138, 182.
Acronycta alni **18** : 167, 268.
— auricoma **18** : 167.
— — f. pepli **14** : 67, 169.
— cuspis **18** : 167.
— euphorbiae **18** : 167.
— leporina **18** : 167.
— megacephala **18** : 167.
— menyanthidis **17** : 341.
— psi **18** : 167.
— rumicis **18** : 167.
— tridens **17** : 341.
Actebia fennica **18** : 145.
Actinotia vide etiam Chloantha.
— hyperici **18** : 134, 137, 153, 169.
— polyodon **18** : 153, 169.
Adela degeerella **18** : 182.
— esmarkella **7** : 289.
— rufifrontella **5** : 76, 210.
Adopaea lineola **18** : 166.
Adscita (Procris) statices **18** : 173.
Aegeria vide etiam Trochilium.
— apiformis **18** : 156, 178.
— melanocephala **18** : 137, 155—157, 178; **20** : 151.
Aglia tau **20** : 251.
Aglossa pinguinalis **18** : 174.
Agrotis vide etiam Amphitrota, Eurois, Cerastis, Rhyacia, Triphaena.
— corticea **18** : 135, 140, 168.
— cursoria **3** : 8.
— — v. obscura **3** : 12.
— exclamationis **18** : 135, 140, 168.
— festiva ssp. conflua **14** : 64, 67.
— gelida **3** : 127.
— grisescens **18** : 268.
— hyperborea **12** : 252.
— nigricans **18** : 168.
— obelisca **18** : 168.
— pronuba **12** : 252; **14** : 169.
— praecox **18** : 268.
— putris **4** : 31, 289.
— recussa **18** : 168.
— rhaetica **12** : 252.
Agrotis segetum **18** : 139, 140, 168.
— subrosea ssp. subcoerulea **19** : 25.
— suecica **4** : 289.
— tecta **12** : 252.
— triangulum aberr. **15** : 272.
— vestigialis **3** : 11.
— ypsilon **18** : 168.
— sp. **4** : 39; **14** : 66.
Alabonia bractella **18** : 137, 151—152, 178.
Alucita baliodactyla **18** : 178.
Amathes vide etiam Orthosia.
— circellaris **18** : 169.
— helvola **18** : 169.
— litura **18** : 169.
— lota **18** : 169.
Amorpha vide etiam Smerinthus.
— populi **18** : 166.
Amphidasis vide Biston.
Amphipyra micans **4** : 140.
— perflua **6** : 228;[1] **20** : 251.
— tragopoginis **18** : 144, 169.
Amphisa prodromana **17** : 341; **18** : 175.
Amphitrota vide etiam Agrotis.
— ravida **18** : 145, 168.
Anacampsis ignobiliella **20** : 251.
— vorticella **18** : 179.
Anagoga (Numeria) pulveraria **18** : 172.
Anaitis paludata **14** : 65, 68.
— — v. sororiata **7** : 170.
Anarta bohemani **7** : 169.
— funebris **12** : 252.
— funesta **14** : 67.
— lapponica **14** : 67.
— leucocycla ssp. staudingeri **17** : 341.
— melaleuca **7** : 169; **12** : 252; **14** : 64, 65, 66, 67.
— melanopa **7** : 170; **12** : 252; **14** : 66, 67.
— myrtilli **18** : 170.
— richardsoni **6** : 228.
— zetterstedti **6** : 228.
Anchinia daphnella **19** : 303.
Ancylis biarcuana **18** : 176.
— comptana **18** : 135, 176.
— derasana **18** : 176.
— lactana **18** : 176.
— lundana **18** : 176.
— mitterbacheriana **18** : 176.
— myrtillana **7** : 171; **14** : 64, 65, 66, 69; **18** : 176.
— selenana **18** : 176.
— siculana **18** : 176.
— uncana **14** : 69; **18** : 176.
— unguicella **14** : 65, 66, 69; **18** : 176.
— upupana **2** : 58, 113.
Anerastia lotella **2** : 46; **3** : 9, 11.
Anomogyna (**14** : 66).
Anthocharis cardamines **18** : 165.
Anthrocera exulans **7** : 170.
— — vanadis **14** : 65, 66, 68.

[1] Per errorem Acronycta p.

Anthrocera meliloti **18** : 173.
Anticollix (Collix) sparsata **18** : 172.
Antitype (Polia) polymita **18** : 137, 169.
Apamea vide etiam Hydroecia.
— crinanensis **18** : 169.
— oculea **18** : 169.
— paludis **18** : 169.
Apatura ilia v. clytie **14** : 169.
— iris **15** : 272.
Aphomia sociella **17** : 341.
Aplecta vide etiam Mamestra.
— advena **18** : 168.
— nebulosa **18** : 168.
— tincta **18** : 168.
Aplota (Haplota) kadeniella **3** : 127, 132; **15** : 272; **19** : 19.
Aporia crataegi **18** : 165.
Arctia caja **18** : 173; **20** : 251.
— festiva **7** : 170.
— quenseli **15** : 273 (larva); **17** : 341.
Arenostola vide etiam Tapinostola.
— extrema **18** : 134, 136, 153, 169.
— hellmani **18** : 153, 169.
Argynnis vide etiam Rathora.
— adippe **18** : 166.
— aglaia **18** : 166.
— aphirape v. ossianus **7** : 169.
— arsilache **13** : 169.
— chariclea **10** : 74.
— — ab. *aili* **15** : 272.
— cydippe **18** : 166.
— euphrosyne **7** : 169.
— freija (freya) **7** : 169; **13** : 169.
— frigga **10** : 73, 74.
— improba **10** : 73.
— — improbula **12** : 252.
— improbula **10** : 73—74.
— ino **18** : 166.
— niobe **18** : 116.
— paphia **18** : 119; **19** : 203.
Argyresthia albistria **18** : 134, 137, 181.
— brockeella **18** : 181.
— conjugella **14** : 70; **18** : 181.
— cornella **18** : 181.
— goedartella **18** : 181.
— — ab. literella **18** : 181.
— illuminatella **18** : 181.
— nitidella **18** : 181.
— pygmaeella **14** : 70.
— retinella **18** : 181.
— sorbiella **18** : 181.
Argyritis pictella **18** : 135, 180.
Argyroploce antiquana **18** : 176.
— arbutella **14** : 65, 66, 69.
— bifasciana **20** : 251.
— bipunctana **7** : 171; **14** : 69.
— branderiana ab. viduana **18** : 176.
— capreana **18** : 176.
— cespitana **18** : 176.
— concretana **12** : 252.
— demissana **7** : 288.
Argyroploce dimidiana **18** : 176.
— dissolutana **12** : 252.
— *dovreana* **15** : 272.
— hyperboreana **14** : 69.
— inundana **5** : 210; **18** : 136, 137, 176.
— lacunana **14** : 64, 69; **18** : 176.
— — ab. paleella **17** : 341.
— lediana **7** : 171; **14** : 69.
— lemniscatana **12** : 252.
— lucivagana **17** : 341; **18** : 176.
— moestana **7** : 288.
— mygindana **18** : 176.
— oblongana **17** : 341.
— palustrana **7** : 171.
— pruniana **18** : 176, 268; **20** : 251.
— rivulana **18** : 176.
— roseomaculana **14** : 69; **15** : 272.
— sauciana **14** : 64, 65, 69.
— schaefferana **14** : 66, 69.
— schreberiana **18** : 176.
— schulziana **7** : 171; **14** : 66; **18** : 176.
— — iivarana **14** : 69.
— sororculana **14** : 69.
— striana **18** : 135, 176.
— turfosana **14** : 69.
— umbrosana **18** : 176.
— urticana **18** : 176.
— variegana **18** : 176.
— sp. **17** : 341.
Aristotelia ericinella **18** : 180.
Arsilonche albovenosa **18** : 137, 143—144, 167.
Asarta aethiopella **14** : 169.
Asphalia cinerea **18** : 167.
Asthena (Cidaria) candidata **18** : 172.
Athetis vide etiam Hydrilla.
— lepigone **18** : 144.
— palustris **18** : 169.
Atolmis quadra **16** : 151.
— rubricollis **18** : 268; **20** : 251.
Augiades sylvanus **18** : 166.
Bacotia sepium **18** : 268.
Bactra furfurana **18** : 177.
— lanceolana **18** : 177.
Bapta bimaculata **20** : 251.
— temerata **14** : 169.
Baptria tibiale ssp. *borealis* **14** : 169.
— — ssp. *fennica* **14** : 169.
Barathra vide etiam Mamestra.
— brassicae **18** : 146, 168.
Biston (Amphidasis) betularius **18** : 173.
— hirtarius **20** : 251.
— lapponarius **14** : 169.
— pomonarius **14** : 68.
— stratarius **16** : 151; **18** : 134, 136, 139, 149, 162, 173.
Blabophanes imella **18** : 182.
— spilotella **14** : 70.
Boarmia bistortata **18** : 173.
— punctinalis **18** : 268.
— repandata **18** : 173.

Boarmia ribeata **18** : 137, 173.
Boloria vide etiam Brenthis.
— arsilache ssp. aquilonaris **18** : 166.
Bombycia viminalis **18** : 168.
Bombyx mori **12** : 198, 199.
Bomolocha fontis **18** : 170.
— — ab. terricularis **17** : 341.
Borkhausenia cinnamomea **18** : 151, 178.
— flavifrontella **14** : 70.
— fuscescens **18** : 178.
— similella **14** : 64, 70; **18** : 178.
— stipella **7** : 172; **18** : 178.
— tinctella **18** : 134, 137, 178.
Brachmia gerronella? **18** : 163.
Brenthis vide etiam Boloria.
— aphirape ssp. ossianus **14** : 64, 65, 67.
— arsilache ssp. aquilonaris **14** : 64, 67.
— chariclea **14** : 65, 66, 67.
— euphrosyne **18** : 166.
— — ssp. lapponica **14** : 64, 67.
— freija **14** : 64, 67.
— frigga **14** : 65, 67.
— pales ssp. lapponica **18** : 268.
— polaris **14** : 65, 66, 67.
— selene **18** : 166.
— — ssp. hela **14** : 64, 67.
— thore ssp scandinavica **14** : 64, 67; **18** : 268.
Brephos nothum **6** : 228.
— parthenias **17** : 341.
Bryophila divisa **18** : 136, 137, 167.
— raptricula **20** : 251.
Bryotropha affinis **18** : 179.
— cinerosella **18** : 179.
— senectella **18** : 179.
— terrella **18** : 135, 179.
Bucculatrix cristatella **18** : 181.
— frangulella **18** : 181.
— ulmella **18** : 181.
Bupalus piniarius **4** : 39; **18** : 173.
Cabera vide etiam Deilinia.
Cacoecia costana **5** : 104, 105.
— lecheana **18** : 164, 175.
— musculana **18** : 175.
— piceana **18** : 175.
— rosana **18** : 175.
— semialbana **18** : 175.
— strigana **6** : 228.
Calamia lutosa **20** : 251.
— phragmitidis **3** : 4, 127, 132; **4** : 289.
Callimorpha menetriesii **20** : 251.
Callophrys rubi **18** : 166.
Calocalpe vide etiam Eucosmia.
— undulata **18** : 171.
Calocampa vide Chloantha, Xylina.
Calophasia lunula **5** : 210; **18** : 170.
Calymnia pyralina **9** : 17.
— trapezina **5** : 91—94; **18** : 169; **19** : 25.
Capua favillaceana **18** : 175.
Caradrina vide etiam Elaphria, Hoplodrina.
Caradrina lepigone **4** : 122.
— meskei **4** : 146.
— miranda **4** : 149.
— sp. **4** : 139.
Carpocapsa iuliana **18** : 134, 164, 177.
— pomonella **18** : 177.
— splendana **16** : 151;[1] **18** : 134, 164, 177.
— sp. **4** : 39.
Catocala fraxini **18** : 170.
— nupta **18** : 170.
— pacta **17** : 341; **18** : 170; **19** : 303.
— promissa **18** : 170.
— sponsa **18** : 170.
Celama vide etiam Nola.
— centonalis **18** : 134, 135, 150, 173.
Celerio vide etiam Deilephila.
— galii **18** : 166.
Cemiostoma orobi **4** : 288; **17** : 341.
— scitella **18** : 181.
— susinella **18** : 181.
Cerapteryx (Charaeas) graminis **18** : 168.
Cerastis (Agrotis) sobrina **18** : 168.
Cerostoma lucellum **18** : 181.
— radiatellum **18** : 164, 181.
— scabrellum **18** : 181.
— sequellum **18** : 181.
— sylvellum **18** : 181, 268.
— xylostellum **18** : 181.
Cerura bicuspis **18** : 134, 166.
— bifida **18** : 166.
Chaerocampa vide Pergesa.
Charaeas vide Cerapteryx.
Cheimatobia vide etiam Operophthera.
— brumata **5** : 94; **18** : 164.
Chelaria huebnerella **18** : 179.
Chloantha vide etiam Actinotia.
— hyperici **5** : 210.
— solidaginis **18** : 170.
Chloroclystis chloërata **18** : 172.
— debiliata **18** : 172.
— rectangulata **18** : 172.
Choreutis muellerana **18** : 178.
Chrysophanus vide etiam Heodes.
— amphidamas **14** : 169.
— — aberr. **3** : 127.
— hippothoë **18** : 268.
— phlaeas **7** : 286; **18** : 134.
— — f. americanus **7** : 286.
— — f. hyperboreus **7** : 286.
— — f. hypophlaeas **7** : 286.
— — f. polaris **7** : 286; **12** : 252.
Chrysopora hermannella **18** : 180.
— stipella **18** : 180.
— — v. naeviferella **18** : 180.
Cidaria vide etiam Asthena, Hydrelia, Oporinia, Pelurga.
— abrasaria **14** : 65, 68.
— albulata **18** : 172.
— alchemillata **18** : 172.

[1] Per errorem splendens.

Cidaria alternata **14** : 64, 68.
— annotinata **14** : 68.
— autumnalis **18** : 172.
— bicolorata **18** : 171.
— bilineata **18** : 172.
— caesiata **14** : 64, 65, 68.
— citrata **18** : 171.
— cognata **18** : 144.
— corylata **18** : 172.
— cucullata **18** : 136, 171.
— didymata **18** : 171.
— ferrugata **14** : 68; **18** : 171.
— fluctuata **18** : 171; **20** : 251.
— fulvata **17** : 341.
— galiata **18** : 136, 137, 171.
— hastata **14** : 64, 68; **18** : 172.
— hydrata **18** : 172.
— infuscata **6** : 228.
— juniperata **18** : 171.
— luctuata **14** : 68.
— miata **18** : 171; **19** : 303.
— munitata **14** : 64, 68.
— nebulata **18** : 172.
— ocellata **18** : 171.
— olivata **18** : 136, 137, 148, 171.
— polata **14** : 65, 66, 68.
— quadrifasciaria **18** : 171.
— ruberata **14** : 68.
— siterata **18** : 171.
— sociata **18** : 172.
— spadicearia **18** : 171.
— tristata **18** : 172.
— truncata **18** : 171.
— unangulata **18** : 172.
— variata **15** : 272.
— viridaria **18** : 171.
Clisiocampa castrensis **18** : 135; **20** : 251.
Clysia ambiguella **18** : 176.
Cnephasia chrysantheana **18** : 176.
— incertana **18** : 134, 135, 136, 175.
— osseana boreana **14** : 69.
— pentziana **18** : 176.
— virgaureana **18** : 176.
Codonia (Zonosoma) vide etiam Cosymbia.
— pendularia **14** : 67, 169.
— punctaria **4** : 289; **18** : 268; **19** : 303.
Coenonympha iphis **20** : 251.
— pamphilus **18** : 166.
Coleophora absinthii **3** : 127, 132.
— albicornis **20** : 251.
— alticolella **6** : 228.
— argentula **18** : 180.
— caelebipennella **16** : 151; **18** : 134, 164—165, 180.
— caespititiella **5** : 210; **18** : 180.
— ciconiella **17** : 341; **18** : 137, 165, 180.
— conspicuella **18** : 137, 180.
— deauratella **18** : 180.
— directella **16** : 151.
— flavipennella **18** : 180.
Coleophora frischella **3** : 127, 132.
— fuscedinella **18** : 180.
— galactaula **18** : 165, 180.
— *karvoneni* **20** : 251.
— millefolii **18** : 135, 180.
— murinipennella **18** : 180.
— nigricella **6** : 228.
— *obscuripalpella* **20** : 251.
— palliatella **17** : 341.
— *plumbella* **20** : 251.
— potentillae **20** : 251.
— pyrrhulipennella **6** : 228; **18** : 180.
— separatella **18** : 165, 180.
— silenella **18** : 180.
— sternipennella **18** : 180.
— *subdirectella* **18** : 135, 165, 180; **20** : 251.
— troglodytella **18** : 180.
— vacciniella **18** : 180.
— sp. **7** : 172; **14** : 70.
Colias hecla ssp. sulitelma **18** : 268.
— hyale **17** : 340; **18** : 157—158, 165, 268; **19** : 303; **20** : 251.
— nastes ssp. werdandi **15** : 273; **17** : 341; **18** : 268.
— palaeno **7** : 169; **14** : 64, 65, 66.
Collix vide Anticollix.
Colocasia coryli **18** : 167.
Comacla senex **10** : 337.
Conisania leineri **4** : 140.
Coscinia cribrum **18** : 137, 173.
Cosmia vide etiam Xanthia.
— fulvago **18** : 169.
— lutea **18** : 169.
— paleacea **18** : 169.
Cosmopteryx druryella **14** : 169; **15** : 272.
Cosmotriche potatoria **17** : 341.
Cossus cossus **5** : 211; **17** : 341; **18** : 183.
— terebra **16** : 151; **17** : 341; **18** : 157, 268; **19** : 303.
Cosymbia (Zonosoma) vide etiam Codonia.
— punctaria **18** : 171.
Crambus alienellus **14** : 65, 68.
— biarmicus **6** : 228.
— culmellus **18** : 174.
— ericellus **7** : 171; **14** : 68.
— falsellus **18** : 174.
— fascelinellus **2** : 46, 47; **3** : 9, 11.
— furcatellus **14** : 66, 68.
— hamellus **7** : 171.
— heringiellus **20** : 251.
— hortuellus **18** : 174.
— inquinatellus **18** : 174.
— maculalis **7** : 171; **14** : 64, 68.
— margaritellus **18** : 174.
— pascuellus **18** : 174.
— perlellus **18** : 137, 174.
— — f. warringtonellus **18** : 174.
— pinellus **18** : 174.
— pratellus **7** : 170; **18** : 174.
— salinellus **20** : 251.
— tristellus **18** : 174.

Crambus verellus **18** : 1 7, 174.
Craniophora ligustri **16** : 151; **18** : 167, 268.
— — ab. sundevalli **18** : 167.
Crocallis elinguaria **18** : 172.
Crymodes vide etiam Hadena.
— furva **18** : 146, 169.
Cryptoblabes bistriga **18** : 174.
Cucullia balsamitae **4** : 140.
— celsiae **4** : 140.
— umbratica **18** : 135, 170; **20** : 251.
Cyaniris argiolus **14** : 169.
Cybosia mesomella **18** : 173.
Cymatophora duplaris **18** : 167.
— or **17** : 341; **18** : 167.
Cymolomia hartigiana **4** : 288.
Dasychira fascelina **18** : 167; **20** : 251.
Deilephila vide etiam Celerio.
— galii **17** : 340.
Deilinia vide etiam Cabera.
— exanthemata **18** : 172.
— pusaria **18** : 172.
Depressaria angelicella **18** : 178.
— applana **18** : 178.
— artemisiae **18** : 134, 178.
— flavella **18** : 178.
— heracleana **18** : 178.
— libanotidella **3** : 127, 132.
— nervosa **10** : 337—339.
— pimpinellae **18** : 178.
— propinquella **17** : 341.
Diacrisia vulpinaria **18** : 173.
Dianthoecia vide etiam Harmodia.
Dichelia cinerana **7** : 171.
— gnomana **18** : 175.
— grotiana **18** : 175.
— lapponana **14** : 69.
— rubicundana **14** : 64, 65, 69.
Dicranura vinula **18** : 166; **19** : 303.
Dioryctria abietella **9** : 133; **18** : 174.
Diphtera vide etiam Moma.
— alpium **17** : 341; **18** : 167.
Diplodoma marginepunctella (-punctata) **17** : 341; **18** : 182.
Dipsosphaecia ichneumoniformis **17** : 341.
Dipterygia scabriuscula **18** : 169.
Drepana curvatula **18** : 167.
— falcataria **18** : 167.
— lacertinaria **18** : 167.
Dryobotodes (Dryobota) protea **18** : 169.
Dyschorista iners **18** : 169.
Elachista albidella **18** : 181.
— albifrontella **18** : 181.
— cerusella **5** : 210.
— dispilella **3** : 9.
— nigrella **18** : 181.
— pomerana **17** : 341.
— pullicomella **18** : 181.
Elaphria vide etiam Caradrina.
— clavipalpis **18** : 169.
— morpheus **18** : 169.
— selini **18** : 169.
Ematurga atomaria **18** : 173.
Endromis versicolora **15** : 272; **18** : 167.
Endrosa vide etiam Philea.
— irrorella **6** : 228.
Endrosis lacteella **6** : 228; **18** : 179.
Ennomos autumnaria **18** : 268.
— fuscantaria **14** : 169.
Epermenia chaerophyllella **18** : 181.
Ephestia elutella **18** : 135, 174.
— kuehniella **6** : 228.
Epiblema cana **18** : 177.
— coecimaculana **18** : 137, 177.
— demarniana **18** : 177.
— expallidana **18** : 177.
— nemorivaga **14** : 69.
— nisella **18** : 177.
— penkleriana **18** : 177.
— pflugiana **18** : 177.
— subocellana **18** : 177.
— tetraquetrana **14** : 64, 65, 69.
— tripunctana **18** : 177.
Epinephele jurtina **18** : 166.
Epineuronia vide etiam Tholera.
Epinotia corticana **18** : 164, 177.
— cruciana **14** : 69; **18** : 177.
— ericetana **14** : 64, 69; **18** : 177.
— neglectana **18** : 177.
— quadrana **7** : 171.
— ramella **18** : 177.
— ustomaculana **18** : 177.
Epione repandaria **18** : 172.
Epithectis moufetella **18** : 179.
— pruinosella **7** : 172; **14** : 70.
Erannis vide etiam Hibernia.
— defoliaria **18** : 172.
Erastia vide Eustrotia, Lithacodia.
Erebia euryale ssp. euryaloides **16** : 151; **20** : 251.
— lappona **7** : 169; **14** : 65, 66, 67.
— — v. pollux **7** : 169.
— medusa ssp. polaris **17** : 341.
— polaris **7** : 169.
Eriocrania semipurpurella **18** : 183.
— subpurpurella v. fastuosella **18** : 183.
— unimaculella **18** : 183.
Eriogaster lanestris **18** : 167, 268; **20** : 251.
Euclidia vide Gonospileia.
Eucosmia vide etiam Calocalpe.
— cervinata **17** : 341.
Eugonia fuscantaria **16** : 151.
Eumichtis vide etiam Hadena.
— adusta **18** : 169.
— satura **18** : 168.
Eupithecia absinthiata **18** : 172.
— assimilata **18** : 172.
— bilunulata **14** : 64, 68.
— castigata **18** : 172.
— dodoneata **16** : 151; **18** : 134, 136, 149, 162, 172.
— exiguata **18** : 172.
— helveticaria ab. arceuthata **18** : 172.

Eupithecia hyperboreata **14** : 64, 68.
— indigata **18** : 172.
— innotata **18** : 172.
— linariata **17** : 341.
— nanata **18** : 172.
— oblongata **18** : 172.
— pernotata **17** : 341.
— plumbeolata **18** : 172.
— satyrata **14** : 64, 68; **18** : 172.
— sinuosaria **18** : 172.
— sobrinata **18** : 172.
— subfulvata **18** : 172.
— subnotata **18** : 172.
— succenturiata **18** : 172.
— tantillaria **18** : 172.
— tenuiata **18** : 172.
— togata **18** : 172.
— valerianata **18** : 172.
— virgaureata ssp. altenaria **14** : 64, 68.
— vulgata **18** : 172.
Euplexia lucipara **18** : 169.
Eurois (Agrotis) occulta **18** : 168.
— prasina **18** : 168.
Eurrhypara urticata **18** : 174.
Eustrotia (Erastria) uncula **18** : 170.
Euxanthis angustana **18** : 176.
— hamana **18** : 176.
— zoegana **18** : 176.
Evergestis aenealis **18** : 135, 137, 175.
— frumentalis **5** : 210.
— straminalis **20** : 251.
Evetria buoliana **18** : 176, 268.
— resinella **14** : 69; **18** : 176.
Exapate congelatella **18** : 176.
Fumea **4** : 182.
— betulina **18** : 268.
— casta **18** : 137, 138, 174.
— crassiorella **5** : 210.
Gastropacha trifolii **18** : 268.
Gelechia continuella **7** : 172; **14** : 64, 70.
— diffinis **3** : 11; **18** : 134, 179.
— distinctella **18** : 135, 179.
— ericetella **18** : 179.
— galbanella? **7** : 172.
— infernalis **7** : 172; **14** : 70.
— lugubrella **14** : 70.
— malvella **18** : 268.
— nigra **16** : 151; **18** : 136, 179.
— peliella **18** : 134, 135, 179.
— rhombella **18** : 179.
— viduella **14** : 70.
— virgella **7** : 172; **14** : 65, 70.
Geometra vide Hipparchus.
Glyphipteryx equitella **18** : 178.
Gnophos myrtillata **18** : 173.
— obscuraria **18** : 173.
— sordaria **7** : 170.
Gonepteryx rhamni **18** : 165.
Gonodontis bidentata **18** : 172.
Gonospileia (Euclidia) glyphica **18**: 170.
— mi **18** : 170.
Gortyna (Helotropha) leucostigma **18** : 169.
— ochracea **4** : 289.
Gracilaria alchimiella **18** : 134, 180.
— azaleella **3** : 127, 132.
— elongella **18** : 180, 268.
— semifascia **19** : 303.
Grammesia vide etiam Meristis.
— sp. **4** : 139.
Grapholitha tedella **20** : 59.
Gymnoscelis pumilata **18** : 134, 137, 150, 160, 161—162, 172; **20** : 251.
Hadena vide etiam Crymodes, Eumichtis, Parastictis.
— lithoxylea **13** : 169; **16** : 151.
— secalis **4** : 289.
Halia brunneata **18** : 173.
— wauaria **18** : 173.
Haplota vide Aplota.
Harmodia vide etiam Dianthoecia.
— albimacula **18** : 135, 168.
— lepida ssp. capsophila **18** : 135, 168.
— nana **18** : 168.
Harpella forficella **16** : 151; **18** : 136, 151, 178.
Heliozela hammoniella **17** : 341.
— resplendella **18** : 182.
Helotropha vide Gortyna.
Hemaris fuciformis **20** : 251.
Hemimene alpinana **18** : 177.
— petiverella **18** : 177.
— plumbagana **18** : 177.
Heodes vide etiam Chrysophanus.
— phlaeas **18** : 166.
— virgaureae **18** : 166.
Hepialus fusconebulosus **7** : 287 (fig.).
— — f. gallicus **7** : 287 (fig.).
— — ssp. *hyperboreus* **7** : 286, 287 (fig.).
— humuli **18** : 183.
Heringia dodecella **18** : 179.
Herminia derivalis **18** : 137, 170.
— tentacularia **18** : 170.
Herse convolvuli **18** : 142.
Hesperia alveus **18** : 135, 166.
— andromedae **6** : 228; **15** : 273.
— centaureae **14** : 67; **20** : 251.
— malvae **18** : 166.
Heteropterus morpheus **14** : 169.
Hibernia (Hybernia) vide etiam Eranni.
— aurantiaria **20** : 251.
— defoliaria **4** : 289.
Himera pennaria **3** : 127.
Hipparchus (Geometra) papilionaria **18** : 170.
Hofmannophila pseudospretella **18** : 178.
Homoeosoma maritimum **18** : 137.
— nebulellum **16** : 151; **18** : 137, 174.
Hoplodrina alsines **18** : 169.
— blanda **18** : 169.
Horisme tersata **18** : 172.
Hybernia vide Hibernia.
Hydrelia (Cidaria) flammeolaria **18** : 172.

Hydrilla vide etiam Athetis.
— cinerea **4** : 141, 148, 151 (mp.).
— dissimilis **4** : 141, 149, 151 (mp.).
— distracta **4** : 141, 147, 148, 151 (mp.).
— hospes **4** : 122, 141, 148—151 (mp.).
— kitti **4** : 127—129, 139.
— lepigone **4** : 122—152 (fig., mp.); **5** : 103.
— — *fennica* **4** : 123—150 (fig., mp.).
— mindara **4** : 141, 150, 151 (mp.).
— miranda **4** : 131, 141, 145—150 (mp.).
— tristis **4** : 141, 148, 151 (mp.).
Hydroecia vide etiam Apamea.
— micacea **18** : 169.
Hyloicus pinastri **18** : 166.
Hylophila prasinana **17** : 341; **18** : 173.
Hypena proboscidalis **18** : 170.
— rostralis **18** : 170.
Hyphantidium terebrellum **18** : 174.
Hyphilare (Leucania) lithargyrea **18** : 169.
Hyponomeuta evonymellus **18** : 181.
— irrorellus **16** : 151; **18** : 136, 152, 181.
— malinellus **18** : 181.
— padellus **5** : 210; **18** : 181.
— vigintipunctatus **18** : 137, 181
Hyppa vide Lithomoia.
Incurvaria morosa **18** : 136, 151, 182.
— oehlmanniella **14** : 70.
— pectinea **18** : 182.
— rupella **18** : 182.
— tenuicornis **18** : 268.
— vetulella **7** : 172; **14** : 70.
Jaspidea celsia **14** : 169; **20** : 251.
Jodis lactearia **18** : 170.
— putata **18** : 170.
Laphygma (Caradrina) exigua **19** : 25.
Larentia vide etiam Ortholitha.
— adaequata **7** : 170.
— albulata **7** : 170.
— clavaria **18** : 171.
— hastata v. subhastata **7** : 170.
— incursata **7** : 170.
— minorata **16** : 151.
— munitata **7** : 170.
Lasiestra dovrensis **13** : 169.
Lasiocampa quercus **18** : 167.
— trifolii **17** : 341.
Laspeyresia cognatana **4** : 288.
— compositella **18** : 177.
— coniferana **14** : 69; **18** : 177.
— cosmophorana **7** : 288.
— duplicana **18** : 177.
— gallicana **18** : 177.
— nigricana **18** : 177.
— woeberiana **18** : 177.
Lemonia dumi **2** : 47.
Leucania vide etiam Hyphilare, Sideritis.
— impura **17** : 341.
Leucodonta bicoloria f. albida **18** : 268.
Limenitis populi **18** : 119, 158, 166; **20** : 251.
Limnaecia phragmitella **15** : 273.
Lipoptycha plumbana **18** : 177.
— saturnana **4** : 288.
Lita huebneri **4** : 289.
— kiningerella **18** : 134, 179.
— seminella **17** : 341; **18** : 179.
— strelitziella **14** : 169.
Lithacodia (Erastria) fasciana **18** : 134, 161, 170.
Lithocolletis alniella **18** : 181.
— apparella **13** : 169.
— coryli **18** : 181.
— cramerella **18** : 180.
— froelichiella **18** : 180.
— quercifoliella **18** : 181.
— sorbi **18** : 181.
Lithomoia (Hyppa) rectilinea **18** : 169.
Lithophane (Xylina) socia **18** : 170.
Lithosia complana **18** : 137, 173.
— griseola **16** : 151.
— lurideola **18** : 173.
— pallifrons **18** : 134, 137, 157, 173.
Lobophora vide etiam Mysticoptera.
— halterata **18** : 171.
— polycommata **17** : 341.
Lomaspilis (Abraxas) marginata **18** : 172.
Lophopteryx camelina **18** : 166.
Lozopera fennicana **4** : 289.
Lycaena vide etiam Plebejus, Polyommatus.
— baton **17** : 340.
— cyllarus **15** : 272.
— idas ssp. lapponica **14** : 65, 66, 67.
— optilete v. cyparissus **7** : 169; **14** : 65, 67.
— orbitulus **6** : 228.
— rusticus v. aquilinus **17** : 341.
Lygris populata **18** : 171.
— prunata **18** : 171.
— pyraliata **18** : 171.
— testata **18** : 171.
Lyonetia clerckella **18** : 181.
— prunifoliella **15** : 272.
Lypusa maurella **20** : 251.
Macroglossa stellatarum **12** : 252.
Macrothylacia rubi **18** : 167.
Madopa salicalis **17** : 341.
Malacosoma castrense **18** : 135, 137, 167, 268.
— neustrium **12** : 220, 226.
— sp. **4** : 39.
Mamestra vide etiam Aplecta, Barathra, Polia, Scotogramma.
— oleracea **17** : 341.
— persicariae **18** : 268.
— pisi **18** : 168.
— sp. **4** : 39.
Meliana flammea **18** : 154.
Melisoblaptes bipunctanus **4** : 143.
Melitaea athalia **18** : 143, 166.
— — ssp. scandinavica **13** : 169; **14** : 65, 66.
— cinxia **18** : 135, 137, 142—143, 147, 166, 268.
— iduna **7** : 169; **17** : 341.
Meristis vide etiam Grammesia.

Meristis trigrammica **18** : 135, 137, 146—147,169.
— — ab. evidens **18** : 147.
Metzneria metzneriella **18** : 179.
Miana vide etiam Oligia, Procus.
— bicoloria **16** : 151.
Micropteryx aureatella **7** : 172; **14** : 64, 70; **18** : 18, 183.
— calthella **18** : 183.
Moma alpium **18** : 268.
Mompha conturbatella **18** : 268.
— subbistrigella **18** : 180.
Monima (Taeniocampa) gothica **18** : 169.
Monopis rusticella **7** : 172; **14** : 70; **18** : 163, 182.
Myelois tetricella **7** : 171; **18** : 174.
Mysticoptera vide etiam Lobophora.
— sexalata **18** : 171.
Naenia typica **18** : 169.
Nemophora schwarziella **18** : 182.
— swammerdamella **18** : 182.
Nemoria viridata **12** : 252; **15** : 272.
Nephopteryx hostilis **18** : 174.
— rhenella **17** : 341; **18** : 136, 137, 174.
— similella **16** : 151; **18** : 134, 136, 163—164, 174.
Nepticula aëneella **18** : 182.
— albibimaculella **6** : 228.
— anomalella **18** : 182.
— atricapitella **18** : 182.
— aucupariae **18** : 182.
— comari **5** : 210.
— continuella **18** : 182.
— floslactella **18** : 182.
— glutinosae **18** : 182.
— lapponica **18** : 182.
— lediella **5** : 210.
— malella **18** : 182.
— microtheriella **18** : 182.
— myrtillella **5** : 210.
— nanivora **6** : 228.
— oxyacanthella **5** : 210.
— pomella **5** : 210.
— pulverosella **18** : 182.
— rubivora **5** : 210.
— sorbi **18** : 182.
— subbimaculella **18** : 182.
— tengstroemi **5** : 210.
— sp. **14** : 70.
Nola vide etiam Celama, Roeselia.
— carelica **18** : 268.
— cucullatella **18** : 150.
— strigula **16** : 151.
Nonagria sparganii **14** : 169; **17** : 341.
— typhae **10** : 337; **17** : 341.
Nothris kalevalella **18** : 268.
— verbascella **18** : 179.
Notocelia roborana **18** : 177.
— rosaecolana **3** : 127, 132.
— uddmanniana **18** : 177.
Notodonta dromedarius **18** : 166.
Notodonta ziczac **18** : 166.
Numeria vide Anagoga.
Nyctegretis achatinella **4** : 289.
Nymphula nymphaeata **5** : 211.
Oegoconia quadripunctata **16** : 151; **18** : 134, 179.[1]
Oeneis bore **7** : 169; **14** : 65, 66, 67; **17** : 341; **18** : 268; **20** : 251.
— norna **14** : 67; **17** : 341.
Olethreutes arcuella **18** : 176.
— nebulosana **7** : 171; **14** : 64, 69.
— schaefferana **7** : 171.
Oligia vide etiam Miana.
— bicoloria **18** : 137.
— strigilis **18** : 137.
Operopthera vide etiam Cheimatobia.
— brumata **18** : 171.
Opisthograptis luteolata **18** : 172.
Oporinia (Cidaria) autumnata **18** : 171.
— christyi **18** : 171, 268.
Orgyia antiqua **6** : 228; **18** : 167.
— ericae **17** : 340; **18** : 268; **20** : 251.
Orneodes hexadactyla **12** : 60, 252; **16** : 151.
Ornix avellanella **18** : 180.
— interruptella **7** : 172.
— polygrammella **14** : 70.
— scoticella **7** : 172; **18** : 180.
— sp. **14** : 70.
Orrhodia rubiginea **5** : 210.
— — ab. unicolor **4** : 289.
— wau-punctatum **12** : 252.
Ortholitha vide etiam Larentia.
— cervinata **18** : 171, 268.
— chenopodiata **18** : 171.
Orthosia vide etiam Amathes.
— circellaris **14** : 34, 37.
— nitida **18** : 268.
Oxyptilus leonuri **4** : 288.
— pilosellae **18** : 135, 178.
Oxytropia orbiculosa **4** : 140.
Paltodora striatella **18** : 179; **20** : 251.
Pammene clanculana **14** : 69.
— gallicolana **18** : 137, 177—178.
— insulana **18** : 177.
— populana **18** : 177.
— rhediella **18** : 177.
Pancalia leeuwenhoekella v. latreillella **18** : 180.
Pandemis heparana **18** : 175.
— ribeana **18** : 175.
Panolis sp. **4** : 39.
Papilio machaon **5** : 210; **14** : 66; **18** : 165.
Pararge achine **20** : 251.
— egeria **5** : 210.
— maera **18** : 166.
Parascotia fuliginaria **18** : 170.
Parasemia plantaginis **17** : 341; **18** : 173.
— — aberr. nov. **3** : 127.

[1] Per errorem Oecogonia.

Parasemia plantaginis f. raetzeri **14**: 169.
Parastictis vide etiam Hadena.
— basilinea **18** : 169.
— illyrica **18** : 169.
— lateritia **18** : 135, 169.
— lithoxylea **18** : 134, 136, 146, 169.
— monoglypha **18** : 169.
— obscura ab. remissa **18** : 169.
— pabulatricula **18** : 169.
— rurea **18** : 169.
— secalis **18** : 169.
— sublustris **18** : 137, 169.
— unanimis **18** : 169.
Parnassius apollo **14** : 169; **18** : 137, 144, 165, 268; **19** : 303.
— — ab. karelicus **2** : 252.
— mnemosyne **18** : 137, 165.
Pelosia muscerda **4** : 31.
Pelurga (Cidaria) comitata **18** : 172.
Pempelia ornatella **4** : 143.
Pergesa elpenor **18** : 166.
— porcellus **18** : 166.
Petilampa arcuosa **18** : 169.
Phalacropteryx graslinella **10** : 338; **18** : 268.
Phalera bucephala **17** : 152, 153; **18** : 166.
Phalonia ciliella **18** : 176.
— deutschiana **7** : 171; **14** : 69.
— dubitana **14** : 69; **18** : 176.
— geyeriana **18** : 176.
— kindermanniana **18** : 134, 176.
— kuhlweiniana **18** : 138, 176.
— nana **18** : 176.
— rutilana **7** : 171; **18** : 176.
— smeathmanniana **18** : 176.
— vulneratana **7** : 288.
Phasiane chlorosata **17** : 341.
Pheosia dictaeoides **18** : 166.
Philea vide etiam Endrosa.
— irrorella **18** : 173.
Philereme vide etiam Scotosia.
— rhamnata **18** : 136, 148—149, 171.
— vetulata **18** : 136, 137, 148, 171.
Phlyctaenodes sticticalis **7** : 287; **18** : 139, 175.
— verticalis **18** : 135, 138, 175.
Phragmatobia fuliginosa ssp. borealis **18** : 140, 173.
Phycita spissicella **16** : 151; **18** : 137, 164, 174.
Phyllocnistis sorhageniella **18** : 181.
Phylloporia bistrigella **18** : 182.
Phytometra vide etiam Plusia.
— bractea **20** : 251.
— gamma **18** : 139; **19** : 303.
Pieris brassicae **14** : 169; **18** : 141—142, 165.
— napi **18** : 165.
— — ssp. adalwinda **14** : 66; **19** : 303.
— rapae **13** : 169; **18** : 165.
— sp. **4** : 39.
Pionea crocealis **19** : 303.
Pionea decrepitalis **14** : 64, 69.
— forficalis **18** : 175.
— inquinatalis **14** : 64, 69.
— lutealis **18** : 175
— pandalis **18** : 175.
— prunalis **18** : 175.
Plagodis dolabraria **18** : 172.
Platyptilia bertrami **18** : 178.
— rhododactyla **12** : 252; **18** : 137, 141, 150—151, 178.
— tesseradactyla **14** : 69.
— zetterstedti **14** : 64, 69.
Plebejus vide etiam Lycaena.
— argus **18** : 166.
— idas **18** : 166.
— medon **18** : 135, 166.
Pleurota bicostella **7** : 172; **14** : 64, 70; **18** : 178.
Plodia interpunctella **18** : 268.
Plusia vide etiam Phytometra.
— chrysitis **18** : 170.
— diasema **14** : 65, 67.
— festucae **18** : 170.
— gamma **18** : 170.
— interrogationis **17** : 341.
— microgamma **14** : 67.
— moneta **5** : 210; **17** : 341.
— parilis **7** : 170; **14** : 66, 67; **15** : 273.
Plutella maculipennis **14** : 70; **18** : 181.
Poecilocampa populi **17** : 341; **18** : 167.
Polia vide etiam Antitype, Mamestra.
— contigua **18** : 168.
— dissimilis **18** : 168.
— glauca **18** : 168.
— nana **18** : 168.
— oleracea **18** : 137, 145—146, 168.
— persicariae **18** : 146, 168; **20** : 251.
— reticulata **18** : 168.
— thalassina **18** : 168.
Polopeustis annulatella **5** : 76, 210.
Polychrosis artemisiana **18** : 138, 176.
Polygonia c-album **18** : 166.
Polyommatus vide etiam Lycaena.
— chiron **18** : 135, 166.
— icarus **18** : 166.
Porphyrinia pannonica **4** : 140.
Praestilbia armeniaca **4** : 140.
Prays curtisellus **18** : 140, 181.
Procus vide etiam Miana.
— bicoloria **18** : 168.
— latruncula **18** : 168.
— strigilis **18** : 168.
Prothymia viridaria **18** : 170.
Protoparce convolvuli **18** : 268.
Proxenus **4** : 122, 137, 145.
— dissimilis **4** : 151.
— hospes **4** : 151.
— mindara **4** : 151.
— miranda **4** : 150.
Psammotis hyalinalis **18** : 174.
— pulveralis **18** : 174, 268; **20** : 251.

Psodos coracina **7** : 170; **14** : 66, 68.
— — v. wahlbergi **14** : 68.
Psoricoptera gibbosella **15** : 272.
Pterophorus distinctus **18** : 268.
— monodactylus **18** : 178.
— osteodactylus **14** : 64, 70.
— tephradactylus **14** : 70; **18** : 178.
Pterostoma palpinum **18** : 166.
Pygaera anachoreta **17** : 153.
— anastomosis **12** : 252.
— curtula **17** : 150—153; **18** : 166.
— pigra **17** : 150—153; **18** : 104, 166.
Pygmaena fusca **7** : 170; **14** : 64, 65, 66, 68.
Pyrameis atalanta **18** : 166.
— cardui **18** : 166.
Pyrausta cespitalis **18** : 135, 138, 175.
— flavalis **18** : 135, 137, 175.
— funebris **7** : 171.
— fuscalis **18** : 175.
— hamalis **14** : 69.
— perlucidalis **20** : 251.
— porphyralis **14** : 6 , 69.
— purpuralis **18** : 135, 175.
— terrealis **14** : 69.
Pyrrhia exprimens **17** : 341.
— purpurites **4** : 139.
— treitschkei **4** : 139.
— umbra **4** : 139; **17** : 341; **18** : 170; **20** : 251.
Radinogoes **4** : 122, 137, 145, 147.
— cinerea **4** : 151.
— distracta **4** : 151.
— lepigone **4** : 150.
— tristis **4** : 151.
Rathora (Argynnis) lathonia **18** : 166.
Recurvaria leucatella **18** : 179.
Rhinosia ferrugella **18** : 178.
Rhodophaea advenella **18** : 174.
Rhodostrophia vibicarla **18** : 171.
Rhopobota naevana **18** : 177.
Rhusina vide Stygiostola.
Rhyacia vide etiam Agrotis.
— augur **18** : 168.
— baia **18** : 167.
— brunnea **18** : 168.
— candelarum **18** : 137.
— castanea **18** : 134, 137, 167.
— c-nigrum **18** : 167; **20** : 251.
— dahlii **18** : 168.
— depuncta **18** : 137, 168.
— festiva ssp. conflua **18** : 168.
— fugax **4** : 140.
— grisescens **18** : 134, 137, 144, 168.
— lucernea **18** : 137, 144, 145, 168; **20** : 251.
— plecta **18** : 168.
— porphyrea **18** : 168.
— putris **18** : 160, 168.
— sigma **20** : 251.
— simulans **18** : 145; **20** : 251.
— triangulum **18** : 137, 167.
— xanthographa **18** : 135, 159—160, 168.
— — ab. cohaesa **18** : 159.
Rhyparia purpurata **18** : 268.
Roeselia vide etiam Nola.
— strigula **18** : 134, 136, 150, 173.
Roeslerstammia erxlebeniella **20** : 251.
Salebria betulae **18** : 174.
— faecella **18** : 174.
— formosa **18** : 174.
— fusca **14** : 68; **18** : 174.
— palumbella **18** : 174.
Sarrothripus revayanus **19** : 303.
— — ab. glaucanus **18** : 136, 150, 173.
Saturnia (Attacus) atlas **5** : 107.
— pavonia **18** : 167, 268.
Satyrus semele **18** : 134, 137, 166.
Scardia boleti **18** : 182.
Schoeyenia *glacialis* **13** : 169.
Sciaphila osseana **7** : 172
Scoliopteryx libatrix **18** : 170.
Scoparia ambigualis **18** : 174.
— borealis **14** : 64, 68.
— crataegella **18** : 174.
— dubitalis **18** : 174.
— murana ssp. tuoniana **14** : 68.
— pallida **5** : 210.
— sudetica **14** : 68; **18** : 174; **19** : 303.
— zelleri **18** : 137, 174.
— sp. **4** : 289.
Scopelosoma satellitium **18** : 169; **19** : 25.
Scopula vide etiam Acidalia.
— immorata **18** : 171.
— immutata **18** : 171.
— incanata **18** : 171.
— floslactata **18** : 171.
— ternata **18** : 171.
— virgulata **18** : 171.
Scotogramma (Mamestra) trifolii **18** : 168.
Scotosia vide etiam Philereme.
— rhamnata **16** : 151.
— vetulata **16** : 151.
Scythris chenopodiella **18** : 181.
— inspersella **18** : 181.
— siccella **3** : 11, 12.
Selagia spadicella **18** : 135, 174.
Selenephera lunigera **5** : 210.
— — lobulina **19** : 303.
Semasia aemulana **6** : 228.
— aspidiscana **14** : 69.
— candidulana **4** : 289; **16** : 151.
— hypericana **18** : 177.
— suomiana **4** : 289; **5** : 210.
Semiothisa liturata **14** : 68; **18** : 172.
— notata **14** : 68; **18** : 172.
— signaria **18** : 172.
Senta maritima **20** : 251.
Sideritis vide etiam Leucania.
— comma **18** : 169.
— conigera **18** : 169.
— impura **18** : 169.
— pallens **18** : 169.

Simaethis pariana **18** : 178.
Smerinthus vide etiam Amorpha.
— ocellata **17** : 153.
— populi **17** : 153.
— sp. **4** : 39.
Solenobia pineti **18** : 174.
— triquetrella **18** : 174, 268; **20** : 251.
Sophronia chilonella **14** : 169.
— semicostella **18** : 179.
— n. sp. **15** : 273.
Sorhagenia rhamniella **18** : 180.
Sphaeroeca obscurana **4** : 289.
Sphinx convolvuli **15** : 272.
— ligustri **16** : 151; **17** : 340; **18** : 166.
Spilosoma mendica **18** : 173.
— menthastri **18** : 173.
Stenolechia albiceps **18** : 134, 179.
— gemmella **14** : 169.
Stenoptilia bipunctidactyla v. plagiodactyla **4** : 288.
— pelidnodactyla **18** : 178.
— — ssp. borealis **7** : 288.
— pterodactyla **18** : 178.
— veronicae **18** : 138.
Sterrha vide etiam Acidalia.
— aversata f. spoliata **18** : 171.
— deversaria **18** : 134, 135, 137, 148, 171.
— dimidiata **18** : 170.
— emarginata **18** : 171.
— humiliata **18** : 134, 135, 137, 154—155, 171.
— inornata **18** : 148, 171.
— muricata **18** : 154.
— seriata **18** : 137, 170.
— serpentata **18** : 170.
— straminata **18** : 171.
— sylvestraria **18** : 134, 135, 171.
— virgulata **18** : 154.
— salicis **18** : 167.
— sp. **4** : 39.
Stygiostola (Rhusina) umbratica **18** : 169.
Swammerdamia caesiella **16** : 151; **18** : 136, 152, 181.
— conspersella **14** : 64, 65, 70.
— variegata **14** : 70.
Syllepta ruralis **18** : 175.
Tachyptilia populella **18** : 179.
Taeniocampa vide etiam Monima.
— gracilis **4** : 289.
Talaeporia tubulosa **18** : 174.
— sp. **4** : 182.
Tapinostola vide etiam Arenostola.
— elymi **2** : 45, 46; **3** : 10.
— extrema **16** : 151.
— hellmani **16** : 151.
Tarache titania **4** : 140.
Tebenna raschkiella **18** : 180.
Teleia empetrella **14** : 65, 70.
— fugitivella **18** : 179.
— luculella **18** : 137, 179.
— proximella **18** : 179.
Teleia triparella **18** : 179.
— sp. **7** : 172.
Tephroclystia pygmaeata **7** : 170.
— virgaureata v. altenaria **7** : 170.
Thalera fimbrialis **15** : 272.
Thalpophila matura **18** : 134, 135, 137, 147—148, 168.
Thecla sp. **18** : 166.
Thiodia citrana **18** : 135, 177.
Tholera vide etiam Epineuronia.
— cespitis **18** : 168.
— popularis **18** : 168.
Tholomiges turfosalis **17** : 341.
Thyatira batis **18** : 167; **19** : 303.
Tinagma dryadis **15** : 272.
Tinea angustipennis **18** : 134, 182.
— arcella **18** : 151, 182.
— arcuatella **14** : 70.
— cloacella **18** : 182.
— fuscipunctella **18** : 163, 182.
— granella **18** : 182.
— ignicomella **14** : 70; **18** : 182.
— misella **18** : 182.
— nigralbella **18** : 151, 182.
— pallescentella **4** : 288.
— pellionella **18** : 182.
— picarella **7** : 172.
Tischeria angusticolella **17** : 341; **18** : 136, 152, 182.
— complanella **18** : 164, 182.
— heinemanni **2** : 37, 113; **18** : 268.
Tmetocera ocellana **18** : 138, 177.
Tortrix conwayana **18** : 138, 175.
— diversana **17** : 341.
— forsterana **7** : 171; **14** : 64, 69; **18** : 175.
— *illustrana* **13** : 169.
— loefflingiana **18** : 164, 175.
— ministrana **7** : 171; **14** : 69; **18** : 175.
— osseana v. boreana **14** : 65.
— paleana **18** : 175.
— rusticana **18** : 175.
— viburniana **7** : 171; **14** : 65, 66, 69.
— viridana **5** : 94; **18** : 141, 164, 175.
Toxocampa pastinum **18** : 170.
Trachea atriplicis **18** : 161, 169.
Trichiura crataegi **14** : 67; **19** : 303.
— — ssp. ariae **18** : 268.
Trichophaga tapetiella **7** : 289; **17** : 341; **18** : 138, 152, 182.
Triphaena vide etiam Agrotis.
— fimbria **18** : 134, 137, 144—145, 167.
— pronuba **18** : 137, 158—159, 167.
— — f. innuba **18** : 167.
— subsequa **18** : 134, 137, 167.
Trochilium vide etiam Aegeria.
— apiforme **16** : 151.
— culiciforme **20** : 251.
— melanocephalum **16** : 151; **17** : 341; **18** : 136.
— spheciforme **18** : 178; **20** : 251.
Urbicola comma **18** : 166.

Vanessa antiopa **14** : 37; **17** : 341; **18** : 166.
— io **12** : 252; **18** : 268; **19** : 303.
— polychloros **14** : 169.
— urticae **7** : 236; **18** : 166.
Xanthia vide etiam Cosmia.
— fulvago **19** : 25.
Xanthospilapteryx auroguttella **18** : 180.
— syringella **18** : 180.
Xylina vide etiam Calocampa, Lithophane.
— furcifera **14** : 37.
— ingrica **14** : 21, 37.
— lambda **19** : 25.
— vetusta **18** : 170.
Xystophora elongella **17** : 341.
— farinosae **4** : 288.
— lucidella **18** : 138, 179.
— morosa **16** : 151.
— unicolorella **18** : 179.
Zeuzera pyrina **18** : 178, 183; **20** : 251.
Zonosoma vide Codonia, Cosymbia.
Zygaena exulans v. vanadis **4** : 289; **20** : 251.
— lonicerae **9** : 189.
— meliloti ab. totaruba **12** : 252.

DIPTERA.

Ablabesmyia barbitarsis **13** : 169.
Acarthophthalmus *minutus* **19** : 304.
Achalcus cinereus **5** : 210.
Acidia caesio **4** : 289; **5** : 210.
— lucida **5** : 210.
Acinia corniculata **18** : 268.
Acnemia longipes **12** : 251.
Acrocera globulus **14** : 169; **17** : 342.
Acroptena annulata **16** : 152.
Acrostilpna *similata* **16** : 152.
Adelphomyia fuscula **12** : 251.
Aëdes communis **6** : 229.
— punctor **6** : 229.
— sp. **3** : 127; **6** : 229.
Aldrovandiella halterata **6** : 152.
— transversalis **6** : 152.
— winthemi **6** : 152.
Allotrichoma laterale **16** : 152; **19** : 304.
Alophora aurulans **17** : 342.
— hemiptera **14** : 169; **17** : 342.
Anapausis rectiventris **6** : 152.
— soluta **6** : 152.
Anomalochaeta guttipennis **17** : 342.
Anopheles sp. **3** : 127.
Anthomyza fasciata **5** : 211.
Aphanotrigonum trilineatum **9** : 131.
Argyra argentina **13** : 169.
— magnicornis **5** : 112, 210.
Arthria analis **17** : 341.
Asilus crabroniformis **18** : 268.
Asphondylia thymi **1** : 37, 150 (cecid., larvae).
Aspistes analis **6** : 152.
— berolinensis **3** : 127, 132; **6** : 152.
Assuania distinguenda **9** : 129, 130, 138.
Atissa limosina **19** : 304.
Atractochaeta angustata **3** : 127, 132.
Atrichopogon meloësugans **12** : 251; **14** : 107; **20** : 252.
— *oedemerarum* **14** : 107.
Aulacogaster leucopeza **14** : 169.
Azelia gibbera **10** : 215.
Bibio crassipes **6** : 229.
— johannis **10** : 213.
— marci **10** : 213.
Boletina lundbecki **12** : 251.
Bolitophila pseudohybrida **12** : 251.
— spinigera **12** : 251.
Borboropsis fulviceps **20** : 252.
Borborus equinus **10** : 215.
— vitripennis **10** : 215.
— sp. **5** : 210.
Bucentes cristatus **10** : 215.
Calamoncosis aprica **9** : 133.
— duinensis **9** : 133.
— laminiformis **9** : 129, 133.
— oscinella **9** : 132.
Calomyia humeralis **12** : 250.
Campsicnemus marginatus **13** : 169; **19** : 19.
Catabomba selenitica **2** : 46.
Cecidomyia pini **6** : 229; **19** : 303.
— rosaria **2** : 7 (cecid.).
— salicis **2** : 7 (cecid.).
Cecidomyidae sp. **1** : 37, 38 (larvae); **8** : 258 (cecid.).
Cephenomyia ulrichi **17** : 342; **19** : 304; **20** : 252.
Ceratitis capitata **13** : 169.
Cerioides conopoides **13** : 169.
Ceroplatus sesoides **15** : 272.
Cetema cereris **9** : 129, 136.
— elongata **9** : 130, 136.
— myopina **9** : 136.
Chaetocladius xanthogyne **19** : 303.
Chaetorellia jaceae **19** : 27.
Chamaemyia geniculata **10** : 215.
Chamaesyrphus lusitanicus **14** : 169.
Chersodromia arenaria **5** : 111—112, 210.
— beckeri **12** : 251.
Chilosia albitarsis **10** : 214.
— alpina **14** : 169.
— hercyniae **6** : 229.
— langhofferi **6** : 229.
— nasutula **10** : 214.
— rotundata **15** : 272.
— sahlbergi **6** : 229.
— sp. **6** : 229.
Chionea sp. **13** : 169.
Chironomidae sp. (larvae) **1** : 8; **6** : 159; **15** : 17 . . . 21.
Chironomus bathophilus **6** : 159.
— cingulatus **13** : 169.
— dissidens **13** : 169.

Chironomus *luctuosus* **13** : 169.
— *mendax* **13** : 169.
— plumosus **6** : 155, 159, 161.
— staegeri **13** : 169.
Chloropisca glabra **9** : 130, 138.
Chlorops pumilionis **10** : 215; **12** : 220, 236.
— varsoviensis **9** : 136.
Chrysops **4** : 39.[1]
Chrysosoma auratum **18** : 269.
Chrysotus longipalpus **1** : 38, 150.
— suavis **1** : 39, 150.
Clusiodes ruficollis **5** : 211.
Cnemopogon apicalis **15** : 272.
Coelopa eximia **5** : 112.
Coenosia *ovulifera* **16** : 152; **18** : 269.
— paludis **16** : 152.
— pumila **10** : 215.
— *sallae* **16** : 152.
Colobaea bifasciella **10** : 214.
Columbiella verticalis **5** : 211.
Conioscinella albipalpis **9** : 130, 131.
— brachyptera **9** : 130, 131.
— cinctella **9** : 131.
— frontella **9** : 130, 131.
— — v. alpicola **9** : 131.
— — v. zürcheri **9** : 131.
— halophila **9** : 132; **15** : 272.
— meijerei **9** : 131.
— minutissima **9** : 132.
— nigrifrons **9** : 132.
— pumilio **9** : 132.
— — v. flavella **9** : 132.
Contarinia craccae **2** : 7 (cecid.).
— quercina **5** : 128 (cecid.).
— sp. **8** : 257 (cecid.).
Cordylura pubera **10** : 215.
Corynoscelis eximia **6** : 152.
Crataerrhina pallida **16** : 152.
Crypteria carteri **12** : 251.
Ctenophora guttata **14** : 169; **15** : 272.
— pectinicornis **15** : 272.
Culex apicalis **1** : 95, 150.
— pipiens **12** : 199, 203.
— sp. **15** : 21 (larva); **20** : 148.
Culicoides sp. **6** : 159.
Cylindrotoma distinctissima ssp. *tenebrarum* **20** : 251.
Cyrtopogon lateralis **14** : 169.
Cystiphora sonchi **2** : 7 (cecid.).
Dasyneura affinis **1** : 36, 151 (cecid.).
— brassicae **9** : 190.
— cirsii **1** : 36—37, 150 (cecid., larvae).
— dubia **1** : 36, 151 (cecid.).
— fraxinea **5** : 129, 210 (cecid.).
— fraxini **5** : 129 (cecid.).
— galiicola **5** : 129 (cecid.); **8** : 257 (cecid.).
— hygrophila **1** : 36, 150 (cecid.).
— hyperici **1** : 36, 151 (cecid.).
— papaveris **9** : 190.
Dasyneura populeti **1** : 35, 150? (cecid., larvae).
— pteridicola **1** : 36, 151 (cecid.).
— pyri **1** : 36, 150 (cecid., larvae).
— similis **5** : 129 (cecid.).
— sisymbrii **9** : 190.
— terminalis **1** : 36, 150 (cecid., larvae).
— veronicae **5** : 129 (cecid.).
— viciae **1** : 36, 150 (cecid., larvae).
— sp.? **1** : 36, 150 (cecid., larvae); **5** : 129 (cecid.).
Decembrina prima **18** : 268.
Delia uniseriata **16** : 152.
Desmometopa M-nigrum **16** : 152.
— sordidum **16** : 152.
Diaphorus halteralis **1** : 39, 150.
— hoffmannseggi **1** : 39.
Diarthronomyia hypogaea **13** : 169.
Dichaeta caudata **10** : 215.
Dicraeus fennicus **9** : 132.
— pallidiventris **9** : 130, 132.
— styriacus **9** : 132.
— — v. nitidus **9** : 132.
Dicranomyia caledonica **9** : 29; **12** : 251.
— frontalis **12** : 251.
— stylifera **9** : 29.
— tristis **12** : 251.
Dictenidia bimaculata **20** : 251.
Dictya umbrarum **10** : 214.
Diplotoxa dalmatina **9** : 130, 136; **19** : 19.
— messoria **9** : 129, 136.
Discocerina albifrons **19** : 304.
— aurifacies **12** : 251; **19** : 304.
— aurivillii **19** : 304.
— bohemani **19** : 304.
Ditaenia cinerella **10** : 214.
— schoenherri **10** : 214.
Dixa aestivalis **4** : 289.
— amphibia **4** : 289.
— hyperborea **4** : 289.
— nebulosa **4** : 289; **20** : 252.
— sp. **3** : 127.
Dolichopus acuticornis **5** : 210.
— consimilis **13** : 169.
— costalis **13** : 169.
— grandicornis **13** : 169; **19** : 19.
— griseipennis **19** : 304.
— gubernator **12** : 251.
— mannerheimi **14** : 169.
— pseudomigrans **20** : 252.
— wahlbergi **19** : 19.
— zetterstedti **12** : 251.
Drapetis sp. **3** : 127, 132.
Drosophila buscki **14** : 169.
— funebris **13** : 169.
— melanogaster **11** : 48; **13** : 169; **14** : 169; **17** : 174.
— sp. **5** : 211.
Earomyia lonchaeoides **14** : 169.

[1] Per errorem Chrysopus.

Echinomyia marklini **13** : 169.
Ectinocera borealis **6** : 229.
Einfeldia luctuosa **17** : 341.
Elachiptera cornuta **9** : 128, 130.
— numerata **9** : 129, 130.
— scrobiculata **9** : 131.
— tuberculifera **9** : 131.
— n. sp. **19** : 304.
Elephantomyia edwardsii **12** : 251.
Empis hyalipennis **5** : 210.
— lamellicornis **19** : 304.
— punctata **10** : 213.
— trigramma **10** : 213.
— univittata **12** : 250.
— vernalis **10** : 213.
Enicita annulipes **10** : 214.
Ephelia marmorata v. submarmorata **12** : 251.
Ephydra alandica **12** : 251.
Epichlorops puncticollis **9** : 130, 136.
Eribolus hungaricus **9** : 132.
— slesvicensis **9** : 132.
— sudeticus **9** : 132.
Erioptera beckeri? **2** : 37, 114.
— fuscipennis **2** : 37.
— nielseni **12** : 251.
— squalida **12** : 251.
Eristalis alpina **17** : 342.
— oestraceus **14** : 169.
Euribia sp.? **19** : 27.
Eustalomyia vittipes **12** : 251.
Eutaenionotum olivaceum **20** : 252.
Euthyneura pallida **3** : 127, 132.
Eutonia barbipes **19** : 19.
Eutropha variegata **9** : 130, 136.
Exechia dizona **12** : 251.
— trisignata **12** : 251.
Fannia coracina **16** : 152.
Forcipomyia eques **5** : 210; **14** : 107; **17** : 342.
Freraea albipennis **18** : 269.
Frontina laeta **17** : 342.
Fucellia maritima **2** : 45.
Gampsocera numerata **9** : 130.
Gastrophilus equi **19** : 304.
Gaurax dubia **9** : 133.
— — v. borealis **9** : 133.
— ephippium **6** : 229.
— maculipennis **9** : 129, 133.
Geosargus nigripes **19** : 304.
Glyptotendipes glaucus **13** : 169.
— sp. **6** : 159, 161.
Gonia sp. **4** : 289.
Goniopsita brevibucca **9** : 134.
— palposa **9** : 129, 134.
Gonomyia simplex **9** : 30.
— stackelbergi **9** : 30.
— tenella **9** : 30.
Hammerschmidtia conica **3** : 127.
Hapleginella laevifrons **9** : 133; **15** : 272.
Haplegis diadema **9** : 135.
Haplegis flavitarsis **9** : 135.
— tarsata **9** : 135.
Harmandia globuli **2** : 7 (cecid.).
— loewi **2** : 7 (cecid.).
— petioli **2** : 7 (cecid.).
Heligmoneura pallipes **19** : 19.
Helina allotalla **10** : 215.
— duplicata **10** : 215.
— flagripes **18** : 269.
— laticornis **3** : 127, 132.
Helomyza sp. **12** : 251.
Helophilus groenlandicus **20** : 252.
— hybridus **20** : 252.
— lapponicus **20** : 252.
— pendulus **10** : 214.
— trivittatus **19** : 304; **20** : 252.
Hemipenthes morio **19** : 304.
Hendelia nigripalpis **5** : 211.
Herina frondescentiae **10** : 214.
Hexatoma pellucens **13** : 169.
Hilara cornicula **10** : 213.
— femorella **6** : 229.
Homalocephala angustata **4** : 289.
— sp. **19** : 304.
Hoplodonta viridula **9** : 189.
Hyadina scutellata **17** : 342.
Hyalomyia aurulans **20** : 252.
— obesa **20** : 252.
Hybos grossipes **20** : 252.
Hydrellia argyropleura **12** : 251.
— concolor **19** : 19.
— fusca **14** : 169.
— mutata **14** : 169.
— thoracica **12** : 251.
Hydrina obtecta **19** : 304.
— posticata **19** : 304.
Hydrophoria conica **10** : 215.
Hydrophorus balticus **1** : 39, 150.
— bipunctatus **10** : 213.
— litoreus **10** : 213.
— magnicornis **5** : 113.
— micans **5** : 113.
— pilipes **5** : 112, 210; **14** : 169.[1]
Hygrodiplosis vaccinii **1** : 37, 151 (cecid., larvae); **6** : 229.
Hylemyia aestiva **10** : 215.
— conversata **12** : 251.
— *curtigena* **12** : 251.
— humerella **16** : 152.
— *indigena* **12** : 251.
Hylephila tavastica **16** : 152.
Ischyrosyrphus laternarius **13** : 169.
Iteaphila furcata **3** : 127, 132.
— nitidula **3** : 127, 132.
Ivalomyia limbata **16** : 152.
Laphria flava **18** : 268.
— ignea **19** : 19.

[1] Per errorem Hygrophorus.

Lasiops perpendicularis **16** : 152.
Lasioptera rubi **2** : 7 (cecid.); **9** : 188; **13** : 169.
Lasiosina approximatonervis **9** : 129, 136.
— cinctipes **9** : 130, 135.
— parvipennis **9** : 129, 135.
Leiomyza laevigata **17** : 342.
Leptis annulata **10** : 213.
— tringaria **3** : 127, 132.
Leptometopa latipes **16** : 152.
Leptosciara pusillima **18** : 268.
Leskea aurea **19** : 304.
Lestodiplosis callida **9** : 190.
Lestremioides borealis **18** : 268.
Leucophenga 5-maculata **20** : 252.
Leucopis alticeps **17** : 342.
— sp. **14** : 169.
Limnobia 4-maculata **20** : 252.
Limnobiidae sp. **4** : 289.
Limnophila fulvonervosa **2** : 12, 114.
— heterogyna **2** : 37—38, 114.
— *umbrarum* **20** : 252.
Limnophora aestuum **18** : 269.
— albifrons **18** : 269.
— karelica **12** : 251.
— *krogerusi* **18** : 269.
— *munda* **12** : 251.
— pollinifrons **16** : 152.
Liogaster splendida **14** : 169.
Liomyza laevigata **19** : 304.
Lipara lucens **15** : 272; **16** : 152.
Lonchaea hirticeps **19** : 304.
— sp. **17** : 342.
Lonchoptera lutea **10** : 213.
Lophosia fasciata **18** : 269.
Loxocera nigrifrons **12** : 251.
Lucilia sp. **2** : 47.
Lycia decipiens **12** : 251.
Lycoriella sp. **19** : 303.
Macrocera stigmoides **12** : 251.
Macrothorax ruficornis **19** : 304.
Madiza glabra **16** : 152.
— oscinina **9** : 129.
— palposa **9** : 129.
Mansonia richiardii **20** : 252.
Medetera seniculus **3** : 127, 132.
— sp. **17** : 342.
Melanostoma mellinum **10** : 214.
— scalare **10** : 214.
Melanum laterale **9** : 130, 136.
Meliera obscuripes **3** : 13, 127.
Melina angulata **16** : 152.
— *bisinuata* **16** : 152.
— *carinata* **16** : 152.
Melophagus ovinus **19** : 304.
Meoneura *anceps* **12** : 251.
— sp. **6** : 229.
Meromyza cerealium **9** : 135.
— pratorum **2** : 47; **9** : 129, 135.
— — v. decora **9** : 130, 135.
Meromyza saltatrix **9** : 129, 135.
— — v. nigriventris **9** : 129, 135.
— — v. variegata **9** : 135.
Microdon sp. **6** : 229 (larvae).
Microneurum aeneum **9** : 129, 134.
Microperiscelis annulata **16** : 152.
Micropeza corrigiolata **17** : 342.
Microphorella praecox **3** : 127, 132; **4** : 289.
Microphorus velutinus **10** : 213.
Microsania stigmaticalis **12** : 251.
Mikiola fagi **9** : 185.
Milichia ludens **16** : 152.
Minettia plumicornis **3** : 127, 132.
Misospatha ptarmicae **1** : 37, 151 (cecid.); **5** : 130 (cecid.).
Molophilus armatus **12** : 251.
— ater **10** : 213.
— flavus **12** : 251.
— gladius **12** : 251.
— obscurus **9** : 29.
Mosillus subsultans **19** : 304.
Mycomyia incisurata **12** : 251.
— pulchella **12** : 251.
Myopa fasciata **5** : 210.
Nemopoda pectinulata **10** : 214.
Nemotelus uliginosus **17** : 342.
Neoalticomerus formosus **20** : 252.
Neoascia floralis **10** : 214.
— petsamoënsis **16** : 152.
— podagrica **10** : 214.
Neopachygaster orbitalis **5** : 210.
Neophyllomyza acyglossa **15** : 272; **16** : 152.
Nephrotoma scalaris **2** : 12, 114.
Neurigona abdominalis **19** : 304.
— pallida **19** : 304.
Noëza pupillata **16** : 152.
Ocemyia atra **18** : 268.
Odinia boletina **17** : 342.
— maculata **16** : 152.
Odontomyia angulata **13** : 169.
— hydroleon **20** : 252.
Oedalea flavipes **3** : 127, 132.
Oligotrophus alopecuri **19** : 27, 303.
— capreae **1** : 37; **2** : 7 (cecid.).
— juniperinus **2** : 7 (cecid.); **9** : 187; **19** : 303.
— major **1** : 37 (cecid.); **2** : 7 (cecid.).
Oncodes gibbosus **14** : 169.
— pallipes **15** : 272.
Opomyza nigriventris **14** : 169.
Orbellia nivicola **5** : 210.
Ormosia clavata **9** : 29.
— hederae **9** : 29.
Ornithomyia avicularia **1** : 70; **3** : 6; **5** : 211; **16** : 152.
— sp. **12** : 251.
Orthocladius thienemanni **10** : 213.
Orthoneura linnaniemii **14** : 169.
Orygma luctuosa **5** : 112.

Oscinella anthracina **9** : 130, 134.
— — v. atripes **9** : 134.
— — v. fuscipes **9** : 134.
— atricornis **9** : 130.
— frit **9** : 129, 134; **10** : 215; **12** : 220, 236.
— — v. atricilla **9** : 134.
— maura **9** : 129, 134.
— — v. albiseta **9** : 134.
— nitidissima **9** : 130.
— trigonella **9** : 130, 134.
Oscinis bipunctifrons v. fennica **9** : 129, 138.
— brevimana **9** : 137.
— brunnipes **9** : 130, 136.
— calceata **9** : 138.
— figurata **9** : 138.
— freyi **9** : 129, 137.
— geminata **9** : 129, 138.
— gracilis **9** : 130, 138.
— hypostigma **9** : 129, 137.
— laevicollis **9** : 137; **20** : 252.
— lineata **9** : 129.
— meigeni **9** : 138.
— nasuta **9** : 129.
— nigripalpis **9** : 137.
— pallifrons **9** : 137.
— planifrons **9** : 137.
— — v. triangularis **9** : 137.
— pumilionis **9** : 128, 137.
— ringens **9** : 137.
— rufina **9** : 138.
— scalaris **9** : 129, 138.
— speciosa **9** : 129, 137.
— sulcella **9** : 129.
— triangularis **9** : 130.
— troglodytes **9** : 130, 137.
Oscinosoma cognata **9** : 133.
Oxycera **4** : 39.
— dives **12** : 251.
Parallelomma albipes **10** : 215.
Paragus tibialis **10** : 214.
Paratendipes nudisquama **13** : 169.
Parochtiphila coronata **12** : 251.
Paroxyna absinthii **16** : 152.
— plantaginis **14** : 169.
Pedicia arctica **2** : 12.
Pegomyia *fascinata* **16** : 152.
— interruptella **16** : 152.
— seitenstettensis **16** : 152.
Pegomyza *consanguinea* **16** : 152.
— socculata **16** : 152.
Pelecocera tricincta **5** : 210; **12** : 251.
Penthetria holosericea **10** : 213.
Perrisia affinis **2** : 7 (cecid.).
— galii **2** : 7 (cecid.).
— inclusa **2** : 7 (cecid.); **6** : 229; **9** : 186.
— iteobia **2** : 7 (cecid.).
— lotharingiae **6** : 148 (cecid.).
— strobi **2** : 7 (cecid.); **9** : 186.
— urticae **2** : 7 (cecid.).
— veronicae **2** : 7 (cecid.).
Phalacrocera replicata **20** : 251.
Phaonia erronea **12** : 251.
— gracilis **12** : 251.
— *isthmicola* **16** : 152.
— wahlbergi **16** : 152.
Pherbina punctata **10** : 214.
Philonicus albiceps **3** : 10, 11, 12, 13.
Phorbia *singularis* **16** : 152.
Phoridae sp. **4** : 289.
Phthiria canescens **18** : 268.
Phyllomyza formicae **16** : 152.
— securicornis **16** : 152.
— tetragona **16** : 152.
Phylloteles pictipennis **3** : 127, 133.
Phytomyza abdominalis **15** : 272.
— atricornis **20** : 252.
— luzulae **15** : 272.
— periclymeni **17** : 342.
Phytosciara halterata **18** : 268.
Piophila casei **4** : 289.
— lundbecki **5** : 112.
— varipes **10** : 214.
Piophilidae sp. **2** : 58.
Pipunculus halteratus **17** : 342.
— litoralis **3** : 127, 133.
— obtusinervis **17** : 342.
Platycephala planifrons **9** : 129, 135.
— umbraculata **9** : 130, 135.
Platychirus albimanus **10** : 214.
— — var. **16** : 151.
— angustitarsis **16** : 151.
— clypeatus **10** : 214.
— hirtipes **16** : 151.
— manicatus **10** : 214.
— nigrofemoratus **16** : 151.
— scutatus **10** : 214.
Platypalpus articulatoides **19** : 304.
— *boreoalpinus* **19** : 304.
— brunneitibia **19** : 304.
— coarctatus **19** : 304.
— interstinctus **19** : 304.
— *lapponicus* **19** : 304.
Platystoma seminationis **1** : 61, 151; **5** : 66.
Pleskeola sibirica **16** : 152.
Polyodaspis ruficornis **9** : 134.
Porphyrops communis **20** : 252.
— laticornis **12** : 251.
— praerosa **20** : 252.
Porricondyla gracilis? **19** : 303.
Prionocera **9** : 29, 30.
— abscondita **9** : 30.
— anceps **9** : 30.
— proxima **9** : 30.
— salicetorum **9** : 31.
— serricornis **9** : 30.
— subserricornis **9** : 30.
— tumidicornis **9** : 30.
— turcica **9** : 30, 31.
Procladius choreus **10** : 213.
Proshormomyia fischeri **9** : 185.
Psectrocladius *fennicus* **17** : 341.

Pseudopomyza atrimana **12** : 250; **16** : 152.
Psila atra **10** : 214.
Psilocephala ardea **15** : 272.
Psilopa leucostoma **5** : 211; **19** : 304.
Psilosciara sp. **19** : 303.
Psychoda sp. **4** : 289; **12** : 251; **15** : 272; **19** : 303.
Pycnoglossa setifemur **18** : 269.
Rhabdophaga rosaria **9** : 189.
— salicis **9** : 187.
Rhagoletis alternata **18** : 268.
Rhamphomyia amoena **10** : 213.
— anomala **6** : 229.
— aperta **6** : 229.
— chibinensis **20** : 252.
— longestylata **1** : 39, 150.
— phanerostigma **5** : 111, 210.
— plumipes **10** : 213.
— reflexa **6** : 229.
Rhingia rostrata **4** : 289.
Rhopalomyia millefolii **5** : 130 (cecid.); **9** : 187.
— tanaceticola **2** : 7 (cecid.); **5** : 130 (cecid.); **9** : 187.
Rhymosia praeformida **12** : 251.
Rondaniella bursaria **8** : 257 (cecid.).
Sapromyza rorida **10** : 214.
Sarcophaga kentejana v. lapponica **16** : 152.
— villeneuvei **16** : 152.
Scaptomyzella incana **10** : 215.
Scatella stagnalis **10** : 215.
Scatophaga merdaria **10** : 215.
— squalida **10** : 215.
— stercoraria **10** : 215.
— suilla **10** : 215.
Scatophila variegata **19** : 304.
Scatopse albitarsis **6** : 151.
— atrata **6** : 152.
— brevicornis **6** : 152.
— flavicollis **6** : 152.
— flavocincta **6** : 152, 229.
— fuscipes **6** : 152.
— geniculata **6** : 152.
— incompleta **6** : 151, 229.
— infumata **6** : 151.
— lapponica **6** : 152, 229.
— notata **6** : 152; **10** : 213.
— picea **17** : 341.
— pulicaria **6** : 152.
— subnitens **6** : 152.
— transversalis **17** : 341.
— tristis v. griseinervis **6** : 151.
— vaginata **6** : 152.
— sp. **6** : 229; **13** : 169.
Schizomyia pimpinellae **9** : 188.
Schoenomyza littorella **10** : 215.
Sciapus lobipes **3** : 127, 133.
— maritimus **3** : 10, 13.
Sciara sp. **6** : 229 (larvae); **13** : 169.
Semudobia betulae **1** : 37, 151 (cecid., larvae); **9** : 188.
Sepsis borealis **10** : 214.
— cynipsea **10** : 214.
Sergentia sp. **6** : 160 (larvae).
Sericomyia nigra **20** : 252.
Simulium latipes **1** : 11, 12, 150, 151.
Siphonella oscinina **9** : 129, 132.
Spermatolonchaea inquilina **19** : 304.
Sphaeromias pictus **13** : 169.
Sphaerophoria menthastri **10** : 214.
Sphegina kimakowiczi **16** : 151.
— verecunda **16** : 151.
Spilomyia diophthalma **14** : 169.
Stenodiplosis geniculati **19** : 26.
Stenopteryx hirundinis **3** : 127.
Stictochironomus sp. **6** : 160 (larvae).
Stictodiplosis corylina **1** : 37, 151 (cecid., larvae).
Stratiomys sp. **4** : 39.
Strongylophthalmyia *pictipes* **12** : 251.
Sturmia bella **17** : 342.
Symplecta novae-zemblae **9** : 29.
Syndiplosis petioli **9** : 186.
— quercicola **5** : 129 (cecid.).
Synneuron annulipes **6** : 152.
Syritta pipiens **10** : 214.
Syrphus diaphanus **15** : 272; **16** : 151.
— ribesii **14** : 34.
Tabanus **4** : 39.
— arpadi **14** : 169.
Tachinidae sp. **4** : 289; **5** : 211.
Tachista sabulosa **3** : 10.
Tachydromia brunneitibia **13** : 169.
— ecalceata **13** : 169.
— nonstriata **13** : 169.
— poppiusi **5** : 112, 210.
— sp. **13** : 169.
Tachypeza fuscipennis **5** : 210.
Tanytarsus sp. **6** : 160 (larvae).
Telmaturgus tumidulus **12** : 251.
Temnostoma vespiforme **20** : 252.
— — v. sericomyiaeforme **20** : 252.
Tephritis bardanae **16** : 152; **17** : 342; **18** : 268.
— cometa **17** : 342.
— dilacerata **14** : 169; **16** : 152.
— dioscurea **19** : 304.
Tetanocera ferruginea **10** : 214.
— silvatica **10** : 214.
— unicolor **10** : 214.
Tetanops sintenisi **20** : 252.
Tetanura pallidiventris **16** : 152.
Teucophorus spinigerellus **18** : 268.
Thaumatomyia notata **9** : 139.
— obscurella **9** : 129, 139.
— rufa **9** : 139.
— trifasciata **9** : 130, 139.
Themira sp. **12** : 251.[1]

[1] Per errorem Thenira.

Theobaldia alaskaënsis **1** : 95, 150.
Thrypticus crassiseta **13** : 169; **19** : 19.
— fennicus **19** : 19.
Tipula nubeculosa **2** : 12.
— rubripes **2** : 12, 114.
— scripta **2** : 12.
— sintenisi **12** : 251.
— subnodicornis **9** : 31.
Trachyopella atomus **20** : 252.
Trichieurina pubescens **12** : 251.
Trichocera **6** : 6.
— annulata **2** : 38, 114; **6** : 7.
— fuscata **6** : 7.
— hiemalis **6** : 7.
— maculipennis **6** : 7.
— parva **6** : 7.
— regelationis **6** : 7.
— rufescens **6** : 7.
— saltator **6** : 7.
Trichocladius lucida **10** : 213.
Trichotanypus choreus **10** : 213.
Tricimba cincta **9** : 129, 131.
Tricyphona contraria **12** : 251.
Tropidoscinis gallarum **9** : 133.
Volucella inanis **18** : 268.
Wachtliella persicariae **9** : 188.
Xylota eumera **12** : 251.
— silvarum **6** : 229.
— sp. **4** : 289.
Zabrachia minutissima **5** : 210.

APHANIPTERA.

Acanthopsylla **10** : 367.
— *lapponica* **10** : 359, 367—368 (fig.).
Amphipsylla sibirica **10** : 359.
— thoracica **10** : 355.
Ctenocephalus felis **13** : 169.
Ceratophyllus *affinis* **10** : 357, 362, 363 (fig.).
— borealis **10** : 357, 362, 363.
— columbae **10** : 357.
— *delichoni* **10** : 357, 363—364 (fig.).
— farreni **10** : 356.
— fasciatus **10** : 358.
— *freyi* **10** : 358, 364, 365 (fig.).
— fringillae **10** : 356.
— gallinae **10** : 355, 361, 362.
— garei **10** : 356.
— hirundinis **10** : 357.
— lunatus **10** : 358.
— melis **10** : 355.
— *microti* **10** : 358, 366—367 (fig.).
— mustelae **10** : 358, 366, 367.
— *palméni* **10** : 357, 361, 362 (fig.).
— penicilliger **10** : 359.
— *pteromydis* **10** : 358, 365—366 (fig.).
— rectangulatus **10** : 359.
— rusticus **10** : 357, 363—365.
— sciurorum **10** : 358, 365, 366.
— styx **10** : 357, 365.
Ceratophyllus vagabundus **10** : 356.
— walkeri **10** : 358.
Chaetopsylla globiceps **10** : 355, 361.
— trichosa **10** : 355, 361.
Ctenocephalus canis **10** : 355, 361.
— felis **10** : 361; **13** : 169.
Ctenophthalmus agyrtes **10** : 360.
— bisoctodentatus **10** : 360.
— uncinatus **10** : 360.
Ctenopsyllus segnis **10** : 360.
— silvatica **10** : 360.
Dasypsyllus gallinulae **10** : 359.
Doratopsylla cuspis **10** : 368.
— *fennica* **10** : 359, 368—369 (fig).
Hystrichopsylla talpae **10** : 355, 359.
Ischnopsyllus simplex **10** : 361.
Palaeopsylla minor **10** : 360.
— sorecis **10** : 360.
Paraceras melis **10** : 355, 359.
Pulex irritans **10** : 361.
Rhadinopsylla isacanthus **10** : 361.
Tarsopsylla octodecimdentata **10** : 359.

STREPSIPTERA.

Elenchinus delphacophilus **12** : 250.

COLEOPTERA.

Acanthocinus aedilis **9** : 107; **17** : 340.
Acanthoderes clavipes **17** : 340.
Acidota crenata **9** : 112 . . . 120; **14** : 19.
— quadrata **9** : 111, 113.
Acilius canaliculatus **4** : 111, 115; **14** : 20.
— — ab. kotulae **4** : 115.
— sulcatus **9** : 123.
Aclypea opaca **9** : 120; **14** : 19.
— undata **10** : 210.
Acmaeops septentrionis **9** : 107.
— smaragdula **9** : 107, 111.
Acrotrichis thoracica **10** : 210.
Acrulia inflata **9** : 109, 111, 120.
Acupalpus dorsalis **10** : 209; **14** : 19.
— flavicollis **5** : 95.
— meridianus ab. thoracicus **19** : 302.
Adalia bipunctata **14** : 19.
Adelocera conspersa **17** : 339.
Aderus pygmaeus **19** : 302.
Adimonia tanaceti **18** : 267.
Adonia arctica **5** : 209.
— mutabilis **14** : 33; **15** : 271.
Adoxus obscurus **17** : 5.
Aegialia arenaria **7** : 158, 163, 164.
— sabuleti **5** : 210; **9** : 115, 116, 117.
Agabus adpressus **9** : 121, 123, 125.
— affinis **4** : 112, 115.
— arcticus **7** : 223; **9** : 121—125.
— biguttulus **4** : 112, 115.
— bipustulatus **10** : 207.
— confinis **9** : 122, 124.

Agabus congener **4**: 103, 110, 115; **9**: 121, 122.
— — v. lapponicus **9**: 121—125.
— guttatus **4**: 110, 111, 115; **9**: 121, 123, 125.
— *haraldi* **9**: 121, 125.
— labiatus **10**: 207, 208, 209.
— melanarius **4**: 115.
— nigroaeneus **9**: 122, 123, 124.
— opacus **9**: 124, 125.
— serricornis **9**: 124.
— solieri **9**: 122—125.
— sturmi **4**: 113, 115.
— thomsoni **9**: 122, 123, 124.
— uliginosus **10**: 207.
— unguicularis **10**: 208.
— vittiger **9**: 122.
— zetterstedti **9**: 122, 124.
— sp. **4**: 41; **13**: 117.
Agapanthia villosoviridescens **20**: 250.
Agathidium laevigatum **9**: 113, 120.
— nigrinum **9**: 120.
— sphaerula **9**: 110.
Agelastica alni **19**: 302.
Agonum dorsale **16**: 151; **17**: 339.
— fuliginosum **14**: 19.
— gracilipes **14**: 19, 21; **15**: 271.
— sexpunctatum **14**: 19.
— viduum **14**: 19.
Agrilus ater **17**: 339.
— betuleti **5**: 210.
— laticornis **20**: 250.
— pseudocyaneus **12**: 250.
— roberti **19**: 302.
Aleochara grisea **7**: 158, 159 (mp.), 161, 164.
— obscurella **7**: 158.
— sparsa **3**: 126, 131.
— tristis **3**: 126, 131.
— verna **14**: 20.
— vestita **7**: 164.
Amara aenea **14**: 19; **19**: 27.
— alpina **1**: 65; **9**: 114.
— apricaria **9**: 117; **14**: 20; **18**: 59.[1]
— aulica **19**: 25—28.
— brunnea **9**: 106, 109, 113, 117, 118, 119; **14**: 19.
— convexiuscula **7**: 148, 150, 164.
— crenata **18**: 60, 61.
— daurica **5**: 209.
— eurynota **19**: 27.
— famelica **20**: 249.
— familiaris **10**: 210; **14**: 19.
— fulva **19**: 27.
— — forma **3**: 8.
— fulvipes **19**: 27.
— lucida **12**: 250.
— majuscula **18**: 59, 60, 61, 266.
— plebeja **14**: 19; **19**: 25—28.
— praetermissa **9**: 117.
— quenseli **9**: 117, 119.
Amara silvicola **7**: 154, 164.
— similata **14**: 19; **19**: 27.
— tibialis **14**: 19.
— torrida **9**: 117, 119.
Amidobia parallela **4**: 30.
Amischa analis **14**: 19.
Anacaena limbata **4**: 110, 116; **10**: 207, 208; **14**: 20.
— variabilis **4**: 113.
Anatis ocellata **14**: 20, 21,[1] 22;[1] **17**: 6.
Ancyrophorus omalinus **5**: 210[2]; **7**: 222; **9**: 115, 116; **15**: 271.
Anisodactylus binotatus ab. spurcaticornis **4**: 288.
Anisosticta strigata **9**: 108, 109; **13**: 168.
Anisotoma glabra **9**: 109.
Anobium striatum **18**: 138, 139.
Anoncodes rufiventris **3**: 9, 13, 126, 131, 132; **5**: 66; **6**: 228.
Anoplus plantaris **9**: 109.
Anthicus antherinus **14**: 20.
— ater **10**: 210.
— axillaris **2**: 44, 113; **3**: 126, 132.
— bimaculatus **7**: 148, 153, 154, 164.
— flavipes **7**: 148, 153, 154, 164.
— floralis **14**: 20.
— gracilis **20**: 250.
— sellatus **3**: 8; **7**: 154, 164.
— — ab. humeralis **6**: 228.
Anthobium lapponicum **9**: 107, 108, 109.
— *sorbicola* **18**: 266.
Anthonomus rubi **14**: 20.
Anthophagus alpinus **9**: 110, 111, 113.
— caraboides **9**: 110, 111.
— omalinus **9**: 107, 108, 110.
Anthracus consputus **13**: 168.
Anthrenus museorum **18**: 267.
Anthribus albinus **18**: 151.
Apate cornuta **3**: 126, 132.
Aphodius fimetarius **14**: 19, 20, 21, 23.
— fossor **14**: 19.
— lapponum **9**: 120.
— lividus **13**: 168.
— niger **14**: 19, 20, 23.
— piceus **9**: 120, 121.
— plagiatus v. immaculatus **10**: 210, 211.
— pusillus **14**: 19.
— scropha **2**: 8, 113.
— sphacelatus **14**: 19.
Aphthona euphorbiae **13**: 168; **14**: 168.
Apion amethystinum **10**: 202.
— dispar **9**: 183.
— hookeri **9**: 183.
— *lindbergi* **18**: 267; **19**: 302.
— minutissimum **20**: 250.
— viciae **9**: 111.
Aploderus caesus **1**: 34, 149.
— coelatus **1**: 34; **9**: 119.

[1] Per errorem apricans.

[1] Per errorem Anaitis o.
[2] Per errorem Ancylophorus.

Arpedium brachypterum **9** : 114; **10** : 341.
— brunnescens **9** : 111, 113, 114, 118.
— norvegicum f. kittilense **10**: 341—342.
— — f. typicum **10** : 341—342.
— quadrum **9** : 111, 113.
— tenue **9** : 111—114, 120.
— sp. **7** : 210.
Asaphidion pallipes **9** : 115.
Asemum striatum **9** : 107.
Asiobates pygmaeus **4** : 116.
Astenus filiformis **17** : 5.
Atheta **10** : 342.
— acufangula **17** : 339.
— allocera **9** : 120.
— analis **9** : 111.
— arctica **9** : 111 . . . 119.
— atramentaria **5** : 96; **9** : 118, 119, 120.
— aubei **9** : 108.
— autumnalis **10** : 209.
— basicornis **3** : 126.
— britteni **20** : 249.
— cinnamoptera **9** : 120.
— clancua **10** : 342.
— cribripennis **4** : 288.
— depressicollis **9** : 108, 116, 119, 120.
— diversa **4** : 288.
— dvinense **5** : 96.
— elongatula **10** : 210.
— euryptera **9** : 111.
— excelsa **9** : 120.
— fallax **20** : 249.
— flavipes **7** : 158, 160, 164.
— fractipes **5** : 96.
— fungi **9** : 113, 118, 119, 120.
— georgiana **4** : 288.
— graminicola **9** : 109, 113 . . . 119; **10** : 210.
— hercynica **20** : 249.
— hodierna **2** : 11, 113; **10** : 210, 211?
— hygrobia **9** : 113, 118, 120.
— inhabilis **3** : 126.
— inquinula **18** : 267.
— ischnocera **4** : 288.
— islandica **9** : 109, 112, 115, 116.
— laevicauda **9** : 109, 113 . . . 119.
— languida **13** : 168.
— linearis **9** : 106, 110.
— liturata **10** : 342.
— longicornis **9** : 110.
— luteipes **10** : 210.
— magniceps **4** : 288.
— marina **7** : 158.
— melanocera **10** : 209, 210.
— microptera **9** : 111 . . . 120.
— monticola **4** : 288.
— muensteri **9** : 112; **13** : 168.
— nesslingi **4** : 288; **5** : 96.
— oblongiuscula **20** : 249.
— orbata **10** : 210.
— orphana **9** : 113.
— piligera **10** : 342.
Atheta pilicornis **9** : 121.
— puncticeps **7** : 158, 160, 164.
— pygmaea **10** : 210; **14** : 19.
— ripicola **9** : 108, 115.
— rudiventris **10** : 342.
— setigera **4** : 288; **7** : 148, 152; **9** : 120.
— sibirica **9** : 113.
— sparre-schneideri **9** : 119.
— subtilis **9** : 106, 120.
— subplana **9** : 117.
— trinotata **9** : 113.
— vaga **9** : 108 . . . 118.
— vestita **7** : 158, 159 (mp.), 161; **9** : 119; **10** : 210, 211.
— xanthopus **9** : 120.
— zosterae **2** : 11.
— sp. **5** : 209; **14** : 19.
— subg. Metaxya **10** : 342.
— subg. Rhagocneme **5** : 96.
Athous niger **4** : 288.
— — f. scrutator **18** : 267.
— subfuscus **14** : 19.
— zebei **3** : 126, 132.
Atomaria analis **9** : 111, 113, 120.
— apicalis **14** : 19.
— procerula **9** : 120.
— prolixa **9** : 113.
— ruficornis **14** : 19.
Badister bipustulatus **14** : 19.
— dilatatus **19** : 19.
— peltatus **14** : 19, 20, 21.
Bagous limosus **19** : 302.
Balaninus crux **14** : 168; **18** : 267.
— nucum **18** : 267; **19** : 302.
Baptolinus pilicornis **9** : 106, 109.
Batrisodes adnexus **15** : 271.
Bembidion(-dium) aeneum **7** : 158; **12** : 250.
— aeruginosum **9** : 115, 117, 118.
— assimile **14** : 168.
— biguttatum **19** : 19.
— bipunctatum **1** : 65, 66; **9** : 115—119; **10** : 210, 211; **14** : 18.
— crenulatum **5** : 209.
— doris **10** : 209, 210; **14** : 18, 21.
— fellmani **9** : 116, 118, 119.
— gilvipes **14** : 18.
— grapei **14** : 18.
— grapeoides **17** : 339.
— guttula **10** : 209; **14** : 18, 20.
— hasti **1** : 65, 66; **9** : 116, 118, 119.
— humerale **14** : 18; **15** : 271.
— hyperboraeorum **5** : 209; **9** : 115, 116.
— lampros **14** : 18.
— lapponicum **7** : 222; **9** : 115, 116.
— nitidulum **17** : 339.
— obliquum **10** : 210, 211; **14** : 18, 20.
— octomaculatum **16** : 151.
— pallidipennis **7** : 148, 154.
— palméni **5** : 209.
— prasinum **9** : 115, 116.

Bembidion(-dium) punctulatum **15** : 271.
— quadrimaculatum **14** : 18, 20; **17** : 5.
— ruficolle **15** : 271.
— rupestre **7** : 222; **9** : 115—118.
— saxatile **7** : 148, 150, 154, 164; **9** : 115, 116; **10** : 209, 210, 211.
— siebkei **12** : 250.
— tenellum **2** : 8, 113.
— — ab. triste **2** : 8, 113.
— transparens **9** : 118; **14** : 18, 21; **20** : 249.
— varium **10** : 210, 211; **19** : 19.
— virens **9** : 115, 116.
Berosus luridus **4** : 103; **10** : 208.
— spinosus **7** : 158, 159 (mp.), 161, 164.
Bidessus unistriatus **10** : 207, 208.
Blaps mortisaga **17** : 339.
Blastophagus piniperda **9** : 107.
— sp. **15** : 223.
Bledius arcticus **9** : 115.
— arenarius **1** : 29; **3** : 11—13; **5** : 72, 73; **7** : 148, 149 (mp.), 152, 154, 164.
— — v. subniger **7** : 152.
— bernhaueri **13** : 168.
— bicornis **7** : 151.
— cribricollis **19** : 19.
— defensus **15** : 271.
— diota **3** : 13; **7** : 151; **19** : 302.
— erraticus **9** : 160, 161; **11** : 3.
— — ab., v. bosnicus **9** : 115, 160.
— fracticornis **10** : 209.
— — v. laetior **1** : 30.
— fuscipes **1** : 29, 149; **5** : 71—73; **9** : 115.
— hinnulus **7** : 151, 160, 164.
— *krogeri* **5** : 210.
— litoralis v. lugubris **1** : 29, 149.
— longulus **9** : 115, 116.
— opacus **1** : 29.
— — v. minor **3** : 126, 132.
— pallipes **1** : 29; **15** : 271.
— pudens **17** : 339.
— rastellus **1** : 29.
— subterraneus **1** : 29; **9** : 115.
— talpa **1** : 29; **9** : 115, 116.
— terebrans **1** : 29, 149.
— tibialis **5** : 72, 73.
— tricornis **7** : 148, 151, 160, 164; **19** : 302.
— vilis **5** : 210; **7** : 221, 222; **9** : 115, 116.
— sp. **3** : 8.
Blethisa multipunctata **9** : 117; **14** : 18.
Blitophaga opaca **9** : 112, 117.
Bolitobius speciosus **9** : 109, 120.
— thoracicus **9** : 111; **14** : 19.
Bolitochara mulsanti **2** : 11.
Bolitophagus reticulatus **9** : 110.
Boreaphilus henningianus **9** : 111, 112, 113.
Boromorphus tagenoides **15** : 271.
Brachonyx pineti **17** : 6.
Brachygluta helferi **19** : 302.
Brachypterus urticae **14** : 19.
Brachytarsus undulatus **20** : 250.
Brachyusa concolor **5** : 210; **9** : 115, 116.
Bradycellus collaris **14** : 20; **17** : 5.
— *ponderosus* **20** : 249.
— similis **2** : 37; **18** : 266.
Broscus cephalotes **18** : 266.
Bruchidius obtectus **4** : 288; **5** : 96.
Brychius cristatus v. rossicus **4** : 288; **9** : 121, 125.
— elevatus v. rossicus **4** : 112, 113.
— rossicus **15** : 271.
Bryocharis cingulata **2** : 37.
Bryoporus rugipennis **9** : 111, 114.
Buprestis octoguttata **17** : 5.
Byrrhus arietinus **9** : 114.
— fasciatus **9** : 117, 118; **14** : 19.
Bythinus macropalpus **18** : 267.
Byturus tomentosus **14** : 19; **20** : 250.
Cafius xantholoma **7** : 158, 160, 164; **10** : 209, 210, 211.
Calathus erratus **17** : 5.
— melanocephalus **7** : 220; **9** : 117, 118, 119.
— — varr. **9** : 117, 118.
— micropterus **17** : 5.
Calitys scabra **20** : 249, 250.
Callidium aeneum **19** : 302.
— violaceum **9** : 107.
Calodera aethiops **9** : 113.
Calopus serraticornis **3** : 126.
Calosoma denticollis **12** : 60, 250.
Calvia quatuordecimguttata **14** : 20, 21.[1]
Carabus cancellatus **3** : 126.
— catenulatus v. strandi **9** : 117, 118.
— glabratus **9** : 107; **19** : 28.
— granulatus **13** : 123.
— nemoralis monstr. **6** : 228.
— nitens **6** : 228; **14** : 18.
Cardiophorus ruficollis **17** : 5.
Carphoborus minimus **20** : 250.
Cartodere argus **16** : 151.
Cassida murraea **1** : 61, 149; **4** : 338; **5** : 66.
— nebulosa **14** : 20, 21.
— nobilis **13** : 168.
— rubiginosa **1** : 63.
— sparre-schneideri **1** : 63, 149; **4** : 338.
Cateretes bipustulatus **9** : 109.
Catops nigrita **9** : 111, 120, 121.
— sp. **18** : 266.
Cercyon analis **14** : 19.
— depressus **7** : 158, 161 (mp.), 162, 164.
— flavipes **10** : 209, 210.
— litoralis **5** : 209; **7** : 158, 161 (mp.), 162, 164; **9** : 118, 119; **14** : 19.
— melanocephalus **9** : 119, 120.
— ruficornis **10** : 211.
— terminatus **10** : 209.
— unipunctatus **9** : 119.

[1] Per errorem Calnia.

Cetonia aurata **19** : 302.
— — ab. tingens **19** : 302.
— cuprea f. cuprina **18** : 267.
Ceutorrhynchidius barnevillei **19** : 302.
Ceuthorrhynchus floralis **14** : 20.
— inaffectatus **18** : 267.
Chaetarthria seminulum **4** : 111, 117; **14** : 19.
Chaetocnema concinna **14** : 20.
— hortensis **14** : 20, 21, 23.
— sahlbergi **9** : 108.
Chalcophora mariana **17** : 339.
Chilocorus bipustulatus **17** : 339.
— renipustulatus **14** : 33, 34.
Chlaenius sulcicollis **12** : 250.
— tristis **14** : 18, 21; **19** : 19.
Chlorophorus herbsti **12** : 250.
Choleva **2** : 108.
— angustata **2** : 44; **5** : 210.
— *aquilonia* **2** : 44; **6** : 228.
— — v. *brevicollis* **2** : 44.
— elongata **2** : 44; **3** : 126.
— glauca **2** : 44; **3** : 126.
— oblonga **2** : 44.
— spinipennis **6** : 228.
— sturmi **2** : 44.
Chromoderus fasciatus **9** : 128.
Chrysanthia viridis **14** : 107.
Chrysomela cerealis **9** : 128.
— fastuosa **9** : 128.
— haemoptera **16** : 87, 151.
— marginata **9** : 117.
— staphylea **9** : 117, 118.
Cicindela hybrida maritima **7** : 148, 149 (mp.), 150, 154, 164.
— maritima **3** : 11.
— silvatica **17** : 5.
Cionus scrophulariae **14** : 20; **17** : 340.
Cis bidentatus **9** : 110.
— boleti **9** : 110.
— hispidulus **9** : 110; **18** : 267.
— jacquemarti **9** : 110.
— sp. **15** : 272.
Cleonus **9** : 128.
— fasciatus **19** : 302 (cecid.).
— nebulosus **4** : 288.
— piger **20** : 250.
Clivina fossor **9** : 115.
Cneorrhinus plagiatus **2** : 46; **7** : 154, 164.
Coccidula rufa **14** : 19.
— scutellata **19** : 302.
Coccinella divaricata **17** : 5.
— hieroglyphica **9** : 108; **14** : 19, 21; **17** : 5.
— quinquepunctata **17** : 5.
— septempunctata **14** : 19 . . . 23, 33, 34, 37; **17** : 5.
— trifasciata **9** : 108.
— undecimpunctata **7** : 148, 153, 155, 164; **14** : 19.
— — v. brevifasciata **9** : 117, 118.
Coelambus impressopunctatus **4** : 112, 114; **10** : 205 . . . 208.
— marklini **10** : 207, 208, 209; **14** : 19, 21.
— parallelogrammus **7** : 148, 154.
Coeliodes nigritarsis **9** : 108.
Coelostoma orbiculare **4** : 116; **10** : 207; **14** : 19.
Colon pseudolatum **18** : 266.
Colymbetes dolabratus **9** : 121—125.
— paykulli **4** : 115; **9** : 124, 125; **14** : 20.
— striatus **4** : 115.
— sp. **4** : 41.
Coninomus constrictus **4** : 30.
Coniophthalma germanica **13** : 168.
Corticaria eppelsheimi **14** : 4.
— fulva **19** : 302.
— fuscula **10** : 210.
— lapponica **9** : 110.
— latipennis **9** : 113.
— longicollis **4** : 30.
— muensteri **15** : 271.
— *obsoleta* **15** : 271.
Corticarina lambiana **13** : 168; **15** : 271.[1]
Corylophus cassidoides **15** : 271.
Corymbites affinis **9** : 111, 112; **14** : 19.
— castaneus **20** : 250.
— costalis **9** : 108, 111, 112.
— melancholicus **9** : 111, 112.
— sjaelandicus **14** : 19.
Coryphium angusticolle **9** : 120.
— hyperboreum **1** : 62—63, 149.
— parvulum **1** : 63.
Cossonus parallelopipedus **12** : 250.
Creophilus maxillosus **9** : 120.
Crepidodera femorata **9** : 108, 109, 111, 112.
Criocephalus decoratus **17** : 6.
— rusticus **17** : 6.
Cryptocephalus **13** : 117.
— labiatus **9** : 107.
— marginatus **12** : 250.
— pini var. **5** : 210.
— quadripustulatus v. similis **9** : 107.
Cryptohypnus hyperboreus **1** : 65.
Cryptophagus badius **9** : 110, 120.
— cellaris **19** : 302.
— lapponicus **9** : 120, 121.
— lysholmi **14** : 168.
— pubescens **18** : 267.
— scanicus **14** : 19.
— sp. **9** : 148.
Cryptopleurum minutum **9** : 120; **14** : 19.
Cryptorrhynchus lapathi **12** : 250.
Cychramus quadripunctatus **18** : 267.
Cychrus caraboides v. pygmaeus **9** : 111.
— rostratus **18** : 266; **19** : 302.
Cyclonotum orbiculare **10** : 208.
Cylletron nivale **9** : 108 . . . 114.

[1] Per errorem Corticaria.

Cymbiodyta marginella **4** : 112, 117; **10** : 208, 209.
Cymindis macularis **17** : 5.
— vaporariorum **9** : 114.
Cyphon padi **14** : 19.
— variabilis **9** : 108, 109; **14** : 19.
Cyrtosus sp. **15** : 271.
Cytilus sericeus **9** : 115; **14** : 19, 21.
Dadobia immersa **9** : 110.
Dascillus cervinus **20** : 250.
Dasytes obscurus **17** : 5.
Denticollis linearis **9** : 107, 112.
Deporaus betulae **9** : 109.
Dermestes atomarius **10** : 210, 211.
— frischi **13** : 168.
— murinus **14** : 19.
— peruvianus **18** : 267; **19** : 302.
— vulpinus **13** : 168.
Deronectes alpinus **4** : 102—107 (mp.).
— assimilis **4** : 105 (mp.)—107.
— depressus **4** : 102, 112, 114; **10** : 205, 206.
— griseostriatus **4** : 102—107 (mp.); **6** : 55—60 (mp.), 228.
— — v. maritimus **6** : 55—60 (fig., mp.), 228; **9** : 103, 124.
— maritimus **4** : 103, 104.
— multilineatus **4** : 103; **6** : 55—60 (fig., mp.); **7** : 223; **9** : 103, 122—125.
— sanmarki **4** : 105 (mp.)—107.
— septentrionalis **4** : 105 (mp.)—107; **6** : 228.
— sp. **4** : 102.
Dichirotrichus pubescens **5** : 112; **7** : 158, 159 (mp.), 160, 164, 165; **9** : 117, 118.
Dictyopterus sanguineus **17** : 5.
Dilacra luteipes **5** : 95.
Dinaraea angustula **19** : 302.
Dircaea quadriguttata **14** : 168.
Dirrhagus pygmaeus **20** : 250.
Dochmonota rudiventris **10** : 342.
Donacia obscura **9** : 108.
Dorytomus affinis **14** : 34.
— salicis **9** : 110.
— taeniatus **9** : 110, 113, 114.
Dromius agilis **9** : 128; **17** : 5.
— cordicollis **9** : 128.
— linearis **19** : 28.
— marginellus **17** : 5.
— nigriventris **19** : 28.
— quadraticollis **9** : 128.
— quadrinotatus **19** : 302.
Dryophthorus corticalis **15** : 271.
Dryops auriculatus **9** : 122; **10** : 207.
— ernesti **14** : 19.
— griseus **10** : 207, 208.
— similaris **15** : 271.
Dynastinae sp. **17** : 339.
Dyschirius angustatus **11** : 3—4.
— arenosus **5** : 72.
— globosus **5** : 71; **9** : 115, 117, 118, 119.
— helléni **16** : 151.
Dyschirius impunctipennis **5** : 71, 72, 73; **7** : 149 (mp.), 152, 158, 160.
— lüdersi **14** : 18.
— norvegicus **13** : 168.
— obscurus **3** : 11, 12; **7** : 148, 149 (mp.), 150, 152, 154, 164.
— politus **3** : 13; **5** : 71.
— salinus **7** : 158, 160, 164; **19** : 302.
— septentrionis **7** : 221, 222; **9** : 115, 116, 119.
— sp. **3** : 8.
Dytiscus lapponicus **9** : 123, 124.
— circumcinctus **4** : 111, 116, 288.
— marginalis **4** : 111, 115; **14** : 21.
— sp. **4** : 41.
Elaphrus angusticollis **15** : 271.
— cupreus **9** : 108, 109, 115, 119.
— jakovlewi **6** : 228.
— riparius **9** : 115, 116, 118, 119; **10** : 210.
Elater balteatus **14** : 19; **17** : 5.
Eledona agaricola **18** : 267.
Encephalus complicans **5** : 209.
Endomychus coccineus **9** : 111.
Enicmus consimilis **9** : 110, 111.
— minutus **9** : 121.
— — v. anthracinus **9** : 121.
— *planipennis* **15** : 271.
— sp. **14** : 19.
Ennearthron affine **12** : 250.
Enochrus bicolor **4** : 117; **7** : 148, 152, 155, 163, 164; **10** : 205, 207.
— coarctatus **10** : 208.
— fuscipennis **10** : 205, 206, 207, 208.
— frontalis **4** : 117; **10** : 208; **14** : 19.
— melanocephalus **4** : 110, 117; **7** : 155, 156 (mp.), 157, 164, 165.
— minutus **4** : 110, 117; **10** : 207, 209; **14** : 19, 20.
— quadripunctatus **4** : 110, 117; **10** : 208.
— sahlbergi **7** : 155, 156 (mp.), 157, 158, 164, 165; **14** : 19.
— testaceus **4** : 110, 117; **10** : 208.
Eonius bimaculatus **3** : 8, 12, 13.
Epuraea angustula **9** : 106.
— boreella **9** : 106.
— depressa **9** : 110, 111.
— laeviuscula **9** : 106.
— longula **18** : 267.
— pygmaea **14** : 19.
— thoracica **9** : 106.
— unicolor **9** : 110.
— variegata **9** : 110.
— sp. **18** : 267.
Eremotes ater **18** : 151.
Ernobius abietis **9** : 133.
— mollis **14** : 19.
Euaestethus bipunctatus **9** : 112.
Eucinetus haemorrhous **14** : 19, 21; **20** : 250.
Euconnus nanus **2** : 11.
Eudectus giraudi **2** : 37, 113; **9** : 109.

Euplectus bescidicus **2** : 11;[1] **5** : 209.
— karsteni **2** : 11; **4** : 30; **9** : 110.
— piceus **2** : 11.
— punctatus **2** : 11, 113.
Europhilus aldanicus **9** : 108.
— fuliginosus **9** : 109, 111, 112.
Euryalea **4** : 177.
Euthia deubeli **2** : 11.
Evodinus interrogationis **9** : 111.
Exochomus quadripustulatus **19** : 302.
Falagria sulcata **9** : 120.
Falagriola nigra **12** : 250.
Formicoxenus nitidulus **4** : 30.
Galerucella calmariensis **14** : 20.
— grisescens **14** : 20.
Gastroidea polygoni **14** : 20.
— viridula **9** : 111.
Gaurodytes congener **14** : 19.
— haraldi **13** : 168.
— infuscatus **12** : 250.
Geodromicus globulicollis **9** : 116.
— plagiatus **9** : 115, 116; **14** : 19, 20.
Georyssus crenulatus **20** : 249.
Geostiba circellaris **9** : 118.
Glischrochilus quadriguttatus **6** : 228.
Gnathoncus rotundatus **6** : 228.
Gnypeta carbonaria **5** : 96.
— coerulea **9** : 115, 116, 118.
— ripicola **5** : 96, 209.
Graphoderes bilineatus **4** : 111, 115.
— zonatus **4** : 112, 115.
— sp. **4** : 41.
Graptodytes granularis **4** : 112.[2]
— lineatus **4** : 111, 114.
— pictus **4** : 114.
Gronops inaequalis **18** : 60, 61, 267.
— lunatus **18** : 60.
Grypus equiseti **9** : 108, 109, 115, 116.
Gymnusa brevicollis **9** : 116.
— variegata **9** : 109.
Gyrinus aeneus **4** : 116.
— edwardsi **4** : 116.
— minutus **4** : 116.
— natator v. wankowiczi **4** : 116.
— opacus **9** : 123, 124, 125; **10** : 209; **15** : 19.
— thomsoni **4** : 112, 116, 288.
— sp. **15** : 17, 20.
Gyrocecis conicicollis **4** : 30.
Gyrophaena joyi **14** : 168.
— joyioides **18** : 267.
— williamsi **18** : 267.
Haemonia mutica **7** : 147, 158, 161 (mp.), 162, 164; **10** : 204, 205, 206, 210; **13** : 168.
— — v. curtisi (**7** : 162).
— — lapponica **13** : 168.
Haemonia piligera (pilifera) **18** : 59, 61.
— pubipennis **7** : 162; **18** : 59, 61, 267.
Haliplus confinis **9** : 121, 125; **10** : 205, 207.
— flavicollis **7** : 155, 156 (mp.), 163, 164, 165.
— fluviatilis **12** : 250.
— fulvus **4** : 111, 113.
— — v. lapponum **9** : 121, 125.
— heydeni **4** : 111, 113.
— immaculatus **4** : 111—113; **10** : 205, 206, 207.
— lapponum **6** : 228.
— lineolatus **9** : 123.
— obliquus **7** : 149 (mp.), 155, 163, 164, 165; **10** : 205, 206, 207.
— ruficollis **4** : 110, 113; **10** : 207, 208.
— variegatus **10** : 207, 208.
— varius **4** : 112, 113.
— sp. **7** : 157; **12** : 146.
Haltica chamaenerii **17** : 5.
— oleracea **14** : 168; **17** : 5.
— sandini **9** : 107; **17** : 5.
— tamaricis **14** : 168.
Halyzia sedecimguttata **14** : 19.
Haplocnemus nigricornis **17** : 5.
— pini **17** : 339.
— tarsalis **9** : 107.
Harminius undulatus **9** : 106.
Harpalus **9** : 127.
— distinguendus **3** : 126, 132.
— pubescens **14** : 19.
— rufipes **19** : 27.
Hedobia imperialis **18** : 134, 135.
Helmis maugei **9** : 122.
— megerlei ab. aenea **9** : 122.
Helochares griseus **4** : 116; **10** : 205—208.
Helophorus aquaticus v. aequalis **10** : 205, 207.
— avernicus **13** : 116.
— brevipalpis **4** : 112, 116; **10** : 207.
— glacialis **9** : 114, 123.
— granularis **4** : 103, 110, 112, 113,[1] 116, **10** : 207, 208, 209.
— griseus **4** : 110, 116.
— guttulus **14** : 19.
— laticollis **14** : 168.
— minutus **10** : 204, 207, 210.
— tuberculatus **14** : 20.
— viridicollis **4** : 113, 116; **10** : 207; **14** : 19.
Heterocerus flexuosus **3** : 13; **7** : 158, 162, 164.
— fusculus **14** : 19.
— obsoletus **7** : 153, 164.
— sp. **3** : 8.
Hippodamia arctica **9** : 114.
— septemmaculata **14** : 20.
— tredecimpunctata **14** : 19, 20, 34.
Hippuriphila *glabricollis* **5** : 210.
— laevicollis **9** : 103, 115.

[1] Per errorem bescidus.
[2] Per errorem Hydroporus granulatus.

[1] Per errorem granulatus.

Hister bissexstriatus **10** : 210, 211.
— carbonarius **10** : 210, 211.
— stercorarius **20** : 249.
— striola **14** : 19.
— unicolor **9** : 119, 120.
Hydaticus laevipennis **4** : 112, 115, 288.
— transversalis **4** : 112, 115, 288.
Hydraena pulchella **14** : 168.
— riparia **4** : 111, 116.
Hydrobius fuscipes **4** : 103, 113, 116; **9** : 124, 125; **10** : 208; **14** : 19.
— — ab., v. subrotundus **4** : 116; **9** : 123,[1] 124[1].
— — v. rottenbergi **4** : 110, 116.
— picicrus **4** : 116.
Hydrochus brevis **10** : 207, 208.
— carinatus **17** : 339.
Hydrophilus caraboides **4** : 112, 117; **10** : 208.
Hydroporus acutangulus **9** : 122.
— angustatus **10** : 208.
— brevis **9** : 122.
— discretus **10** : 207, 208.
— dorsalis **4** : 111, 112, 114; **9** : 122; **10** : 208.
— elongatulus **10** : 207, 209.
— erythrocephalus **4** : 111, 114; **9** : 122, 123; **10** : 207, 208.
— — ab., v. deplanatus **4** : 114; **9** : 122.
— fuscipennis **9** : 122, 123.
— glabriusculus **9** : 123, 125.
— granularis **4** : 103; **10** : 207, 208.
— griseostriatus **10** : 207, 209, 211.
— halensis **10** : 208.
— lapponum **9** : 122, 123, 124.
— lineatus **10** : 208.
— melanarius **9** : 123, 124.
— melanocephalus **4** : 103; **9** : 122—125; **14** : 19.
— memnonius **9** : 122—125.
— multilineatus **10** : 209.
— nigrita **9** : 121, 122, 124.
— notatus **10** : 207, 208, 209.
— obscurus **4** : 103, 114; **9** : 122, 123; **10** : 207.
— palustris **4** : 112—114; **9** : 121, 122, 123, 125; **10** : 205, 206.
— pictus **4** : 111, 288.
— planus **10** : 207.
— rufifrons **9** : 123.
— striola **9** : 122, 123, 124; **10** : 207, 208.
— tartaricus **9** : 122—125.
— tristis **4** : 110, 113, 114; **9** : 122; **14** : 19.
— umbrosus **4** : 110, 111, 113, 114; **9** : 123, 125; **10** : 207, 208.
— sp. **14** : 21.
Hydrous aterrimus **4** : 111, 117, 288.
Hygrotus inaequalis **4** : 111, 114; **10** : 205—208; **14** : 19.
Hygrotus reticulatus **4** : 114.
— versicolor **4** : 111, 114.
Hylastes ater **9** : 107; **14** : 20, 21.
— opacus **14** : 20.
Hylecoetes(-tus) dermestoides **9** : 109; **20** : 250.
— flabellicornis **20** : 250.
Hylesinus **13** : 117.
Hylobius abietis **9** : 107; **17** : 6.
— piceus **9** : 107.
— transversovittatus **18** : 267.
Hylotrupes bajulus **18** : 138—139.
Hylurgops palliatus **9** : 107; **16** : 151.
Hymenorus doublieri **4** : 142.
Hyphydrus ovatus **4** : 111, 114.
Hypnoidus dermestoides **9** : 115, 116.
— hyperboreus **9** : 117.
— pulchellus **9** : 115, 116.
— riparius **9** : 115—118.
— rivularius **9** : 113—118.
Ilybius aenescens **4** : 115; **14** : 20.
— angustior **9** : 122—125.
— ater **4** : 115; **14** : 20.
— crassus **9** : 123.
— fuliginosus **10** : 207.
— guttiger **4** : 103, 115; **9** : 122,[1] 123,[1] 124; **14** : 19.
— subaeneus **9** : 122, 123.
Ips acuminatus **9** : 107; **14** : 20, 21.
— typographus **14** : 20.
Ischnopoda atra **10** : 209.
Laccobius alutaceus **10** : 207.
— decorus **7** : 155, 156 (mp.), 157, 158, 163, 164, 165; **10** : 204, 205, 206, 210.
— minutus **4** : 113, 116; **10** : 204, 205, 207, 210; **14** : 19.
Laccophilus hyalinus **4** : 112, 114.
— interruptus **4** : 114.
— minutus **4** : 111, 114.
— virescens **4** : 114, 288.
Laemophloeus ater **20** : 249.
— muticus **9** : 120.
Lagria hirta **20** : 250.
Larinus sturnus **13** : 168.
Latheticus oryzae **12** : 250.
Lathridius alternans **6** : 163—164, 228.
— bergrothi **6** : 164; **19** : 302.
— pandellei **6** : 164.
— rugicollis **6** : 164.
— variolosus **9** : 112.
Lathrobium brunnipes **9** : 111.
— geminatum **10** : 209.
— terminatum **9** : 108, 119; **10** : 209; **14** : 19.
Lathropus sepicola **20** : 250.
Leptacinus formicetorum **4** : 30.
Leptidea brevipennis **10** : 336; **20** : 249.

[1] Per errorem subrotundatus.

[1] Per errorem guttifer.

Leptinotarsa **8** : 81.
Leptura rubra **17** : 6, 339.
— sanguinolenta **17** : 6.
Leptusa angusta **9** : 110.
— pulchella **9** : 109.
Lesteva pubescens **16** : 151.
Librodor hortensis **20** : 249.
Limnebius nitidus **10** : 207.
— *Paer-Haraldi* **18** : 267.
— truncatulus **4** : 110,[1] 116;[1] **10** : 209.
Limnichus pygmaeus **15** : 271.
Limnius tuberculatus **10** : 207.
Liodes ciliaris **7** : 148, 152, 154, 164.
— dubia **9** : 112.
— flavicornis **15** : 271.
— pallens **15** : 271.
Liopus nebulosus **18** : 136.
— punctulatus **18** : 267.
Lissodema cursor **16** : 151.
Lixus iridis **5** : 210; **17** : 340.
— paraplecticus **20** : 250.
Lochmaea suturalis **17** : 5.
Longitarsus holsaticus **9** : 108.
— nigerrimus **17** : 340.
— rubiginosus **12** : 250.
Lorocera pilicornis **9** : 113; **10** : 210.
Lycoperdina succincta **18** : 267.
Magdalis (-linus) carbonarius **4** : 288; **9** : 109.
— ruficornis **14** : 20.
Malachius viridis **12** : 250.
Malthodes brevicollis **9** : 108.
— flavoguttatus **9** : 108, 110.
— fuscus **9** : 108.
— guttifer **9** : 108, 110, 112.
— minimus **14** : 168.
— mysticus **9** : 110.
Mannerheimia arctica **7** : 210; **9** : 113, 114.
Mecinus collaris **7** : 163.
Megarthrus depressus **9** : 120.
— nigrinus **9** : 120.
Melandrya barbata **12** : 250.
Melanimon tibiale **17** : 5.
Melanophila appendiculata **9** : 107.
Melasoma lapponica **9** : 110.
— populi **14** : 20.
— tremulae **14** : 20, 21.
— vigintipunctata **1** : 6, 149.
Meligethes aeneus **14** : 19.
— bidens **17** : 339.
— morosus **18** : 267.
— picipes **18** : 267.
— serripes **18** : 267.
— tristis **18** : 267.
— viridescens **18** : 267.
Meloë **14** : 107.
— brevicollis **17** : 339.
Micralymma marinum **5** : 112; **7** : 158, 160, 164, 165.
Micrelus ericae **9** : 107; **17** : 5.
Micridium halidayi **5** : 96.
Microdota nesslingi **5** : 96.
Microlestes minutulus **14** : 19, 20.
Miscodera arctica **1** : 65; **4** : 288; **9** : 117.
Mycetoporus boreellus **9** : 111.
— brunneus **9** : 112, 113; **14** : 19.
— — v. bimaculatus **14** : 19.
— longicornis **9** : 111.
— monticola **9** : 111, 113, 114.
— mulsanti **9** : 111, 114.
— niger **9** : 111, 113, 114, 120.
— nigrans **9** : 114.
— pachyraphis **9** : 111.
— punctus **9** : 111.
— splendidus **9** : 111, 113, 120.
Myllaena dubia **9** : 108, 109.
— gracilicornis **2** : 37, 113.
— minuta **4** : 288.
— *scheerpeltzi* **5** : 210.
Myrmecoxenus vaporariorum **17** : 339.
Myrmetes piceus **4** : 30.
Myrrha 18-guttata **17** : 5; **18** : 267.
Nanoglossa marginalis **2** : 11, 113.
Nartus grapei **4** : 112, 115.
Nebria gyllenhali **7** : 220; **9** : 115, 119; **10** : 209, 210, 211.
— — v. balbii **9** : 119.
— nivalis **7** : 220.
Necrophorus vespillo **14** : 33.
— vespilloides **9** : 120; **14** : 20.
Negastrius pulchellus **7** : 221.
Nemadus colonoides **2** : 11.
Neobisnius villosulus **15** : 271.
Neuraphes minutus **2** : 11.
Nivellia extensa **12** : 250.
Notaris aethiops **9** : 109.
— — v. lapponicus **9** : 112, 117.
Noterus crassicornis **4** : 111, 114; **10** : 208.
Notiophilus aquaticus **9** : 114, 117, 119; **10** : 210.
— germinyi **17** : 5.
— palustris **14** : 18.
— reitteri **9** : 114.
Notothecta flavipes **4** : 30.
Nudobius lentus **9** : 106.
Oberea oculata **18** : 267.
Obrium cantharinum **5** : 210; **17** : 339; **20** : 250.
Ocalea picata **7** : 157, 164, 165.
Ochthebius impressus **4** : 116; **10** : 207.
— lenensis **5** : 95—96.
— margipallens **5** : 96.
— marinus **5** : 96; **7** : 148, 152, 154, 155, 163, 164; **10** : 207; **14** : 19.
Octotemnus glabriculus **9** : 110.
Ocyusa incrassata **9** : 111, 113.
Oedemera femorata **14** : 107.
Olisthaerus megacephalus **9** : 106.
— substriatus **9** : 106.
Olisthopus rotundatus **15** : 271.

[1] Per errorem truncatus.

Olophrum assimile **10** : 210.
— boreale **9** : 108, 109, 113, 114, 117, 119; **10** : 211.
— consimile **7** : 148, 150, 154, 164; **9** : 111, 112, 119.
— fuscum **6** : 228.
— helléni **5** : 210.
— rotundicolle **9** : 109, 118.
Omalium excavatum **9** : 121.
— laeviusculum **5** : 112; **7** : 148, 151, 164; **9** : 119.
— laticolle **5** : 209.
— riparium **7** : 158, 159 (mp.), 160, 164; **9** : 118, 119; **10** : 209, 211.
— rivulare **9** : 120.
— septentrionis **9** : 117, 120, 121.
— strigicolle **9** : 120.
— sp. **7** : 220.
Omosita colon **14** : 19, 20.
Ontholestes murinus **9** : 120.
Orchesia micans **9** : 110; **14** : 20.
Orchestes fagi **10** : 76.
— quercus **18** : 164.
Oreodytes sanmarki **9** : 121, 125.
Orithales serraticornis **9** : 111, 112.
Orthoperus punctulatus **19** : 302.
Orthotomicus laricis **14** : 20.[1]
— longicollis **20** : 250.
— rugosus **14** : 20.
— suturalis **9** : 107.
Oryctes nasicornis **4** : 288; **12** : 250; **13** : 123, 168; **16** : 151; **17** : 339; **18** : 267; **20** : 250.
Oryzaephilus surinamensis **15** : 271.
Osmoderma eremita **14** : 168 (larvae).
Othius lapidicola **9** : 111, 117.
— melanocephalus **9** : 113.
Otiorrhynchus arcticus **9** : 117, 118.
— dubius **9** : 111, 113, 117.
— rugifrons **17** : 339.
Oxyomus silvestris **18** : 267; **19** : 302.
Oxypoda annularis **9** : 111, 114, 120.
— borealis **9** : 119, 120, 121.
— haemorrhoa **9** : 112.
— funebris **9** : 111, 113.
— lateralis **9** : 111, 113, 114.
— longipes **3** : 126, 132.
— lugubris **2** : 36—37, 113; **9** : 111, 113, 114.
— procerula **9** : 111, 113.
— skalitzkyi **9** : 120.
Oxyporus rufus **12** : 250.
Oxytelus laqueatus **9** : 119, 120; **14** : 19.
— — f. *degener* **15** : 271.
— nitidulus **10** : 209; **14** : 20.
— rugosus **14** : 21.
Pachnida nigella **18** : 267.
Pachyta interrogationis **14** : 168.
— lamed **18** : 267.
Paramysia oblongoguttata **14** : 20, 21; **17** : 6.
Paratinus femoralis **7** : 148, 153, 154, 164.
Pardileus calceatus **9** : 127.
Paromalus complanatus **20** : 250.
Patrobus assimilis **9** : 111, 113, 114, 117.
— excavatus **10** : 209.
— septentrionis **7** : 220; **9** : 114, 117, 118, 119.
Pelophila borealis **9** : 117, 118, 119.
Pentanota meuseli **4** : 176[1]—177, 288.[2]
Perileptus areolatus **15** : 271.
Phaedon armoraciae v. concinnus **9** : 117.
— cochleariae **12** : 224, 241.
— concinnus **10** : 210, 211; **14** : 20.
Phalacrus caricis **14** : 19.
— substriatus **9** : 108; **14** : 19.
Pheletes aeneoniger **14** : 19.
Philhydrus melanocephalus **4** : 117.
— minutus **4** : 103.
Philonthus aeneus **7** : 220.
— albipes v. alpinus **9** : 120.
— cephalotes **9** : 119, 120, 121.
— concinnus **10** : 210.
— debilis **9** : 119.
— finmarkicus **9** : 119.
— fumarius **14** : 168.
— furcifer **20** : 249.
— fuscipennis **14** : 19.
— marginatus **9** : 120.
— micans **10** : 210.
— nigrita **9** : 116.
— nigritulus **10** : 209, 210.
— politus **9** : 119, 120; **14** : 19.
— puella **9** : 119, 120.
— punctus **17** : 339.
— quisquiliarius **10** : 209.
— rectangulus **13** : 168; **17** : 339.
— thermarum **17** : 339.
— umbratilis **10** : 209, 210; **14** : 19.
— varians **9** : 119.
— velox **15** : 271.
— sp. **14** : 19, 168.
Phloeonomus lapponicus **9** : 106, 110.
— pusillus **9** : 106.
Phloeotrya rufipes **17** : 339; **19** : 302.
Phylan gibbus (**7** : 158, 162).
Phyllobius oblongus **20** : 250.
Phyllodecta polaris **1** : 63, 149; **13** : 168.
— vitellinae **1** : 63; **9** : 108, 110, 111, 113, 114.
— vulgatissima **14** : 168.
Phyllotreta flexuosa **9** : 111.
— ochripes **15** : 271; **17** : 340.
— undulata **14** : 20.
— vittata **14** : 21.
— vittula **14** : 20.
— zimmermanni **15** : 23; **18** : 58, 59, 61.
Phymatodes testaceus **17** : 339.
— — variabilis **13** : 168.

[1] Per errorem Orthomicus.

[1] Per errorem menseli.
[2] Per errorem munseli.

Phytobius velaris **9** : 115.
Phytodecta affinis **9** : 108, 110.
— pallidus **9** : 108, 110, 111, 113, 114.
Phytonomus fasciculatus **12** : 250.
— ornatus **9** : 112; **10** : 209; **15** : 271.
— pedestris **9** : 112.
— variabilis **4** : 288; **5** : 97; **9** : 112; **15** : 271.
— viciae **13** : 168.
Pissodes pini **9** : 107.
Pityogenes chalcographus **14** : 20.
Plagiodera versicolora **9** : 108.
Plagionotus arcuatus **13** : 168.
Platambus maculatus **4** : 112, 113, 115.
Plateumaris discolor **9** : 108, 109.
Platynus dolens **11** : 227.
— ericeti **11** : 227.
— gracilipes **11** : 227.
— ruficornis **10** : 209, 211.
Platynychus cinereus **2** : 35, 113.
Plegaderus adonis **10** : 396.
— barani **10** : 396.
— discisus **10** : 395.
— dissectus **10** : 396, 397.
— haraldi **10** : 395—398.
— rumaniae **10** : 396, 397.
— sanatus **10** : 396, 397, 398.
— — ssp. gobanzi **10** : 396, 397.
— saucius **12** : 250.
— vulneratus **10** : 396.
Podabrus lapponicus **9** : 107.
Podistra pilosa **9** : 107, 108, 109.
— rufotestacea **9** : 110.
Poecilonota conspersa **19** : 302.
Pogonochaerus decoratus **17** : 6; **20** : 250.
— fasciculatus **17** : 6.
Polydrosus ruficornis **9** : 109.
— tereticollis **9** : 109.
Polygraphus polygraphus **4** : 288.
Prionychus ater **16** : 151.
Propylaea quatuordecimpunctata **14** : 20.
Prosternum (-non) tesselatum **14** : 19; **18** : 150.
Proteinus altaicus **10** : 341.
— apicidens **10** : 341.
— brachypterus **10** : 341.
Psammobius sulcicollis **7** : 154, 164; **15** : 271.
Pseudophonus **9** : 127.
— griseus **9** : 127.
— pubescens **9** : 127.
— ruficornis **9** : 127.
Psylliodes cuprea v. isatidis **7** : 163.
— marcida **7** : 158, 162, 164.
— picina **17** : 339.
Ptenidium formicetorum **4** : 30.
— punctatum **7** : 158, 161, 164.
Pteroloma forsstroemi **9** : 111; **20** : 249.
Pterostichus aterrimus **13** : 168.
— diligens **9** : 118.
— gracilis **19** : 19.
— lepidus **17** : 5.
Pterostichus madidus **18** : 266.
— minor **14** : 19.
— nigritus **14** : 19, 20.
— oblongopunctatus **9** : 117.
— vernalis **10** : 210.
— vulgaris **19** : 27.
Ptilium modestum **18** : 266.
Ptinus dubius **19** : 302.
— tectus **6** : 228; **13** : 168; **17** : 339.
Pullus ferrugatus **5** : 210.
Pytho depressus **9** : 106.
Quedius arcticus **9** : 117, 119.
— boops **9** : 111, 117.
— brevicornis **2** : 11.
— fulvicollis **9** : 111, 114, 117.
— laevigatus **9** : 106, 109.
— limbatus **2** : 11.
— lucidulus **19** : 302.
— mesomelinus **2** : 11; **9** : 106.
— picipennis v. molochinus **9** : 117.
— scitus **2** : 11.
— tenellus **19** : 302.
— umbrinus **7** : 157, 164, 165; **10** : 209, 210, 211.
Rabocerus gabrieli **14** : 20.
Rhagium mordax **9** : 107.
Rhagocneme dvinense **5** : 96.
Rhagonycha elongata **9** : 107; **17** : 5.
— limbata **9** : 107, 108, 110, 111.
— testacea **9** : 108, 109.
Rhantus exoletus **4** : 103, 115; **9** : 122.
— notatus **4** : 111, 112, 115.
— — ab. virgulatus **4** : 115.
— punctatus **17** : 339.
— suturellus **4** : 115; **9** : 121—125.
Rhinomacer attelaboides **17** : 6.
Rhinoncus castor **14** : 20.
Rhinosimus planirostris **14** : 20; **18** : 151.
— ruficollis **20** : 250.
Rhizophagus dispar **9** : 110.
— ferrugineus **9** : 107; **14** : 19.
— picipes **12** : 250.
Rhopalodontus perforatus **9** : 110.
Rhynchaenus foliorum **9** : 108, 110, 111, 114.
— salicis **9** : 108, 110.
— stigma **9** : 108, 110.
— sp. **18** : 177.
Rhynchites **4** : 39.
— betulae **4** : 40.
Rushia pareyssi **4** : 142.
Salpingus castaneus **19** : 302.
Saperda populnea **3** : 126.
— — salicis **13** : 168.
— scalaris **19** : 302.
Saprinus immundus **1** : 6, 149; **3** : 126.
— rugifrons **7** : 154, 164.
Scaphidema metallicum **9** : 110, 111.
Scaphosoma subalpinum **6** : 228; **9** : 109, 110.
Schizotus pectinicornis **9** : 107.

Scolytus intricatus **18** : 151, 164.
— mali **18** : 267.
Scopaeus laevigatus **5** : 95; **15** : 271; **17** : 339..
Scydmaenus collaris **2** : 11.
Scymnus bipunctatus **17** : 5.
— frontalis **17** : 5.
— nigrinus **17** : 5.
— suturalis **17** : 5.
Semanotus undatus **16** : 151.
Serica brunnea **17** : 6.
Sericoderus lateralis **14** : 168.
Sericus brunneus **9** : 107, 112, 117; **14** : 19.
Silusa **4** : 177.
Silvanus surinamensis **5** : 210.
Sitodrepa panicea **6** : 228.
Sitona crinitus **9** : 111.
— *decipiens* **9** : 111, 112.
— lineellus **9** : 111.
— suturalis **14** : 20.
Soronia punctatissima **18** : 267.
Sospita 20-guttata **20** : 250.
Spercheus emarginatus **15** : 271.
Spondylus buprestoides **17** : 339.
Stenichnus exilis **9** : 109.
Stenochorus meridianus **15** : 271.
Stenolophus mixtus **4** : 288; **5** : 95; **15** : 271.
Stenostola ferrea **19** : 302.
Stenus argus **9** : 112.
— bifoveolatus **9** : 108, 109, 113, 115; **10** : 209.
— bilineatus **9** : 115.
— binotatus **10** : 209.
— boops **9** : 112, 115.
— buphthalmus **10** : 209.
— canaliculatus **9** : 115, 118; **14** : 19.
— carbonarius **9** : 111, 113, 115, 116, 118; **10** : 210.
— cautus **9** : 112.
— confusus **9** : 108; **10** : 342.
— coarcticollis **9** : 108, 111, 114.
— crassus v. formicetorum **9** : 113.
— fasciculatus **9** : 112.
— flavipalpis **9** : 111, 113.
— fuscipes **9** : 112, 115.
— hyperboreus **9** : 113.
— incrassatus **10** : 209.
— juno **14** : 19.
— labilis **9** : 113; **10** : 342.
— lativentris **10** : 342.
— niveus **9** : 108, 109, 112.
— pallitarsis **9** : 108.
— palposus **9** : 115, 116.
— palustris **9** : 111, 112.
— proditor **9** : 109, 112.
— pubescens **9** : 108, 109, 115.
— pusillus **19** : 302.
— rogeri **13** : 168.
— ruralis **9** : 115, 116.
— scabriculus **5** : 95; **9** : 112.
Stenus strandi **13** : 168.
— sp. **4** : 288; **5** : 209; **14** : 20.
Stilbus oblongus **15** : 271.
Strophosomus fulvicornis **12** : 250; **17** : 5.
— rufipes **17** : 5, 6.
Syncalypta cyclolepidia **9** : 116.
— paleata **15** : 271.
— spinosa **10** : 202; **15** : 271.
Syntomium aeneum **9** : 111.
Systenocerus caraboides v. rufipes **18** : 267.
Tachinus elongatus **9** : 119.
— laticollis **9** : 118, 119.
— pallipes **9** : 120.
— proximus **9** : 113, 119, 120.
— rufipes **10** : 210.
Tachyporus hypnorum **10** : 209; **17** : 5.
Tachys bistriatus **15** : 271.
Taenosoma subtilis **3** : 126, 132.
Tarsonemus univittatus **12** : 250.
Temnochila coerulea **4** : 142; **10** : 398.
Tenebrio molitor **14** : 168.
Tentyria laevigata **19** : 302.
Tetratoma ancora **5** : 210.
Tetropium castaneum **19** : 302.
— luridum **19** : 302.
Thanatophilus lapponicus **9** : 118, 120.
Thiasophila angulata **4** : 30.
— inquilina **3** : 126, 132.
— wockei **16** : 151.
Thinobius brevipennis **14** : 168.
— longipennis **5** : 210.
Trachyphloeus aristatus **17** : 340.
Trechus quadristriatus **14** : 18.
— — ssp. fennicus **3** : 126, 132.
Tribolium castaneum **18** : 267.
— destructor **15** : 271.
— mercator **16** : 151.
Trichius fasciatus **18** : 267.
Trichocellus cognatus **9** : 117, 119.
Trichoferus gayi **14** : 168.
Trichonotus scropha **2** : 8.
Trichopteryx fascicularis **9** : 119.
— grandicollis **9** : 119.
— intermedia **9** : 118, 120.
— montandoni **4** : 30.
Trigonogenius globulus **13** : 168; **18** : 267.
Triplax aenea **9** : 110.
— russica **9** : 110.
Trogophloeus corticinus **10** : 209.
— lindbergi **14** : 168.
— rivularis **10** : 209.
— schneideri **5** : 210.
Tropideres undulatus **5** : 210.
Trypodendron lineatum **9** : 107.
Tychus niger **14** : 19.
Typhaea stercorea **13** : 168.
Upis ceramboides **20** : 250.
Velleius dilatatus **14** : 168.
Xanthochroa carniolica **4** : 142.
Xylita laevigata **9** : 107.

Xylotrechus rusticus **17** : 340.
Zabrus sp. **19** : 26, 27.
Zyras collaris **14** : 19; **17** : 339.

HYMENOPTERA.

Abia candens **37** : 340; **20** : 250.
— fasciata **20** : 250.
Acanthocryptus quadrispinus **10** : 338.
Acantholyda hieroglyphica **20** : 250.
— pinivora **4** : 39.
— stellata **4** : 39.
Aclastus gracilis **10** : 338.
Acrodactyla polita **14** : 168.
Adelura florimela **2** : 47.
Aethecerus dispar **19** : 302.
Agathis breviseta **20** : 250.
— glabricula **2** : 47.
— similator **19** : 303.
— syngenesiae **2** : 47.
Agrypon minutum **14** : 168; **16** : 151.
Aleiodes bicolor **10** : 341.
— incertus **10** : 341.
— nigricornis **9** : 148, 155.
Alysia mandibulator **2** : 47.
Amauronematus humeralis **13** : 168.
— leucolaenus **14** : 168.
— viduatus **14** : 168.
Amblyjoppa proteus **19** : 303.
Amblyteles amatorius **20** : 250.
— palliatorius **19** : 302.
— simplicidens **10** : 337.
— subsericans **9** : 155.
Andrena labialis **3** : 126.
Andricus curvator **1** : 35 (cecid.); **2** : 5 (cecid.); **9** : 191 (cecid.); **18** : 267.
— foecundatrix **9** : 191 (cecid.).
— inflator **2** : 5 (cecid.), 6; **9** : 186.
— marginalis **1** : 34—35, 149 (cecid.); **5** : 131 (cecid.).
— quercus-radicis gen. sex. trilineatus **5** : 130 (cecid.).
— quercus ramuli **2** : 5 (cecid.); **5** : 131 (cecid.).
— terminalis **9** : 133.
— sp.? **2** : 5, 6 (cecid.); **9** : 187, 190 (cecid.).
Angitia chrysosticta **10** : 340.
— punctipes **10** : 340.
— rufipes **18** : 180.
— sp. **2** : 46.
Anilasta didymator **10** : 340.
— (horticola?) **18** : 142.
— notata **10** : 340.
Anisobas hostilis **2** : 45.
Anomalon biguttatum **14** : 168.
Anthophora marginata **13** : 168.
Aoplus personatus **20** : 250.
Apechtis compunctor **10** : 338.
— viduata **10** : 338.
Aphanoroptrum abdominale **2** : 46.
Aphidius sp. **2** : 47.
Arge metallica **13** : 168; **20** : 250.
Arge pagana **16** : 151.
— rosae **18** : 151.
Aspilota dilatata **2** : 47.
— sp. **2** : 47.
Astomaspis nanus **10** : 338.
— scabriculus **2** : 45; **10** : 338.
Atanycolus initiator **18** : 267.
Athalia colibri **14** : 33, 168.
— scutellariae **19** : 302.
Atractodes breviscapus **10** : 338.
— croceicornis **10** : 338.
— sp. **2** : 46.
Aulacidea hieracii **2** : 5 (cecid.); **9** : 188 (cecid.).
— macula **1** : 35, 150 (cecid.); **9** : 188 (cecid.).
Automalus alboguttatus **15** : 272.
Aylax glechomae **8** : 256 (cecid.).
— jaceae **19** : 303.
— latreillei **8** : 257 (cecid.).
— sp. **9** : 186 (cecid.).
Baeosemus mitigiosus **19** : 302.
Barichneumon lepidus **10** : 337.
— sexalbatus **19** : 302.
Barylypa insidiator **10** : 340.
Bassus laetatorius **10** : 340.
— variicoxa **2** : 46.
Blasticotoma filiceti **1** : 6, 150 (larvae).
Bombus alpinus **4** : 288; **6** : 228; **14** : 168.
— consobrinus **17** : 340.
— hyperboreus **6** : 228.
— subterraneus **19** : 303.
— sp. **7** : 236.
Brachycryptus erythrocerus **10** : 337.
Brachygaster minuta **5** : 209; **10** : 340.
Bracon anthracinus? **2** : 47.
— fulvipes **10** : 340.
— fumipennis **2** : 47.
— longicauda **2** : 47.
— megapterum v. wesmaëli **10** : 340,
Caenocryptus macilentus **15** : 272.
Callidiotes luridator **16** : 151.
Callimome abbreviatum **9** : 188.
— abdominale **9** : 186.
— — v. nigricorne **9** : 186.
— alpinum **9** : 187.
— amoenum **9** : 187.
— arundinis **9** : 186.
— auratum **9** : 188.
— azureum **9** : 186.
— bakkendorfi **9** : 188.
— bedeguaris **9** : 186.
— caudatum **9** : 186.
— cyaneum **9** : 185.
— cyanimum **9** : 187.
— druparum **17** : 340.
— eglanteriae **9** : 186.
— fastuosum **9** : 185.
— fulgens **9** : 185.
— galii **8** : 257.

Callimome glechomae **9**: 186.
— hieracii **9**: 187.
— juniperi **9**: 187.
— liogaster **9**: 188.
— ? millefolii **9**: 187.
— nobile **9**: 185.
— persicariae **9**: 188.
— quercinum **9**: 186.
— socium **9**: 188.
— speciosum **9**: 185.
— spilopterum **9**: 187.
— tanaceticola **9**: 187.
— tipularium **9**: 187.
— triangulare **9**: 188.
— ventrale **9**: 185.
Callimomus arcticus **9**: 185.
— chrysocephalus **9**: 185.
— discolor **9**: 185.
— purpurascens **9**: 185.
— scaposus **9**: 185.
Calyptus mucronatus? **2**: 47.
Camponotus **5**: 211.
— herculeanus **20**: 250.
Campoplex foveolatus **10**: 340.
— obliteratus **10**: 340.
— pugillator **10**: 340.
— sobolicida **10**: 340.
— tenuis **16**: 151.
— xenocamptus **10**: 340.
— ? zonellus **10**: 340.
Casinaria scabra **10**: 340.
Cemonus unicolor **9**: 149.
Cenocoelius agricolator **16**: 151.
Centeterus grandiceps **19**: 302.
Centrobia similis **4**: 39.
— foersteri **4**: 40.
Cephaleia annulata **20**: 250.
— reticulata **5**: 209; **20**: 250.
Cephus infuscatus **13**: 168.
Ceropales maculatus **4**: 119, 122.
Chaetostricha pulchra **4**: 40.
— schlicki **4**: 40.
Chalcididae sp. **8**: 258.
Charops cantator **18**: 173.
Chasmias paludicola **10**: 337.
Chasmodon apterus **2**: 47.
Chelonus carbonator **2**: 47.
Chorinaeus funebris **10**: 340.
Chrysis inaequalis **9**: 149.
Cladius pectinicornis **18**: 151.
Cleptes semiaurata **12**: 250.
Clistopyga incitator **10**: 339.
Coelichneumon castaneiventris **10**: 337.
— funebris **18**: 267.
— periscelis **17**: 340.
— ruficauda **19**: 302.
— solutus **19**: 302.
— sugillatorius **10**: 337.
Coelinius viduus **2**: 47.
Coeloides abdominalis **2**: 47.
Coleocentrus caligatus **17**: 340.
Collyria calcitrator **14**: 168.
Colpomeria quadrisculpta **14**: 168.
Colpotrochia elegantula **10**: 340.
Crabro ambiguus **12**: 250.
— aphidum **7**: 6.
— cinxius **9**: 189.
— fossorius **17**: 340.
— ingricus **3**: 126.
— kiesenwetteri **1**: 13, 149.
— lapponicus **7**: 5.
— maeklini **7**: 5.
— podagricus **7**: 6.
— vagabundus **9**: 149.
— walkeri **7**: 6.
— sp. **15**: 272.
Cratichneumon nigritarius **10**: 337.
— varipes **19**: 302.
Cratocryptus erythropus **10**: 338.
— femoratus **15**: 272.
— longicauda **10**: 338.
— renovator **15**: 272.
Crematogaster sp. **3**: 126.
Croesus septentrionalis **14**: 168 (larvae).
Crossocerus walkeri **7**: 6.
Cryptopimpla caligata **14**: 168.
Cryptopristus caliginosus **9**: 189.
Crypturus sp. **9**: 154.
Cryptus obscuripes **10**: 337.
— seductorius **9**: 149.
— viduatorius **2**: 45.
Cteniscus dorsator **10**: 339.
— flavomaculatus v. hostilis **10**: 339.
— gnathoxanthus **10**: 339.
— succinctus **19**: 303.
Ctenopelma xanthostigma **15**: 272.
Cymatoneura undulata **10**: 340.
Cymodusa cruentata **10**: 340.
— leucocera **10**: 340.
— petulans **10**: 340.
Cynips divisa v. atridivisa **6**: 148.
— — v. divisa **6**: 148.
— eglanteriae **2**: 5 (cecid.).
— longiventris v. forsiusi **6**: 149.
— rosae **2**: 5 (cecid.).
Dasypoda plumipes **13**: 168.[1]
Deuteragenia hircana **4**: 118.
— intermedia **4**: 118.
Diaborus lituratorius **10**: 339.
Dicaelotus cameroni **19**: 302.
— erythrostoma **10**: 337.
— pumilus **10**: 337.
Dicolus excubitor **10**: 339.
Diomorus armatus **9**: 189.
Diplolepis divisa **2**: 7 (cecid.).
— longiventris **2**: 7 (cecid.); **18**: 177, 267.
— — v. forsiusi **9**: 185, 186.
— quercus folii **2**: 8 (cecid.), 114.
Dolerus aeneus **17**: 340.
— gibbosus **14**: 168.

[1] Per errorem plumpipes.

Dolerus nigratus **17** : 340.
— picipes **17** : 340.
Doryctes mutillator **10** : 341.
— obliteratus **2** : 47.
Empria pulverata **9** : 148.
Encyrtus sp. **18** : 179.
Enicospilus merdarius **10** : 340.
— ramidulus **10** : 340.
Entodecta tenuicornis **20** : 250.
Ephedrus lacertosus? **2** : 47.
Ephialtes gnathaulax **10** : 339.
— haemorrhoidalis **18** : 176.
— imperator **10** : 339.
Episyron rufipes **4** : 119, 121.
Epitomus pygmaeus **10** : 337.
Epiurus arundinator **10** : 338.
— depositor **10** : 338.
— inquisitor **16** : 151.
— melanopygus **10** : 338.
— nucum **18** : 150, 163.
— vesicarius **18** : 180.
Eriplatys ardeicollis **19** : 302.
Erromenus zonarius **10** : 339.
Eumenes pedunculata v. *lapponica* **19** : 303.
— — v. *punctata* **19** : 303.
— pomiformis mediterraneus **9** : 149.
Euphorus brevispina **2** : 47.
Euplectrus bicolor **19** : 24—25.
Eusterinx divulgata **10** : 339.
Euura medullaria **9** : 188 (cecid.).
— saliceti **2** : 5 (cecid.).
— venusta **2** : 5 (cecid.).
Exallonyx confusus **16** : 151.
— ligatus **16** : 151.
— microcerus **16** : 151.
Exenterus marginatorius **10** : 339.
Exephanes occupator **10** : 337.
Exetastes nigripes **2** : 46.
Exochilum circumflexum **10** : 340.
Exochus affinis **14** : 168.
— erythronotus **19** : 303.
— lentipes **19** : 303.
Exolytus laevigatus **10** : 338.
— ripicola **16** : 151.
Exyston cinctulus **10** : 339.
Fenusella pygmaea **18** : 164.
Formica fusca **5** : 211; **20** : 250.
— — ssp. glebaria **20** : 250.
— picea **20** : 250.
— pratensis **18** : 164.
— rufa **2** : 35; **4** : 30; **14** : 21; **20** : 250.
— uralensis **20** : 250.
Gambrus incubitor **10** : 338.
Gasteruption sp. **20** : 250.
Gelis acarorum **2** : 46.
— agilis **2** : 45; **10** : 338.
— carnifex lutescens **2** : 45.
— cursitans **10** : 338
— festinans **2** : 45.
— instabilis **10** : 338.
— micrurus **2** : 45.
Gelis pumilus **2** : 45.
— ruficornis **2** : 45; **10** : 338.
— — comes **2** : 45.
— — petulans **2** : 45.
— sp. **9** : 147.
Genarches sulphuratus **15** : 272.
Glypta cubitoria **10** : 339.
— fronticornis **10** : 339.
— heterocera **10** : 339.
— monoceros **10** : 339.
— parvicaudata **2** : 46.
— superba **10** : 339.
— ? tenuicornis **10** : 339.
— sp. **9** : 149.
Glyptomorpha variegata **2** : 46.
Gonatopus conjunctus **2** : 48.
— flavicornis **2** : 47.
— luteicornis **3** : 8.
— mayeti? **2** : 48.
— pilosus **2** : 48.
Goniocryptus inimicus **10** : 337.
— lapponicus **2** : 45.
— legator **2** : 45; **10** : 337.
Gyrocampa senilis **2** : 47.
Habrobracon stabilis **2** : 47.
Hadrodactylus flavifrontator **10** : 339.
— larvatus **2** : 46.
— paludicola **10** : 339.
Harmolita calamagrostidis **9** : 189.
Hartigia nigra **19** : 302.
Hedychridium roseum **18** : 267.
Helictes mediator v. borealis **10** : 339.
Hemiteles aestivalis **2** : 45.
— areator **2** : 45; **10** : 338.
— ornatulus **2** : 45.
— sp. **2** : 45.
Herpestomus nasutus **19** : 302.
— xanthopygus **19** : 302.
Himertus sepulchralis **20** : 250.
Holocremna? tarsator **10** : 340.
— sp. **2** : 46.
Homonotus sanguinolentus **4** : 119.
Homotropus bizonarius **2** : 46.
— elegans nigritarsis **2** : 46.
— signatus **2** : 46; **10** : 339.
Hybothorax graffii **2** : 48; **13** : 168.
Hoplismenus uniguttatus **15** : 272.
Hoplocampa alpina **16** : 151.
Hygrocryptus carnifex **10** : 338.
— palustris **10** : 338.
Hygroplitis russatus **10** : 341.
Ichneumon albosignatus **14** : 168.
— analis **18** : 267.
— captorius **10** : 337.
— clarigator v. subniger **14** : 168.
— confusorius **10** : 337.
— extensorius **10** : 337.
— gracilicornis **10** : 337.
— ignobilis **10** : 337.
— latrator **10** : 337.
— ligatorius **10** : 337.

Ichneumon melanobatus **10** : 337.
— melanotis **18** : 267.
— neréni **10** : 337.
— sicarius **14** : 168.
— sugillatorius var. nov. **14** : 168.
— tuberculipes **10** : 337; **19** : 302.
Idiasta subannellata **2** : 47.
Isadelphus? ruficornis **10** : 338.
Ischnocerus filicornis **10** : 338.
Ischnus nigricollis **10** : 337.
Iseropus stercorator **10** : 339.
Isomalosoma hieronymi **1** : 12, 35, 149 (cecid.); **2** : 48;[1] **3** : 9[1] (cecid.).
Itoplectis alternans **18** : 163, 176.
— — v. kolthoffi **10** : 339.
— maculator **10** : 339; **18** : 175, 176.
Kaltenbachia angusta **15** : 272.
Labrorhychus flexorius **10** : 340.
Lampronota melancholica **2** : 46; **10** : 339.
Lasius flavus **20** : 250.
— fuliginosus **4** : 30.
— mixtus **19** : 303; **20** : 250.
— niger **14** : 34; **20** : 250.
Lathromeris scutellaris **4** : 40.
Leptocryptus lamina **10** : 338.
— pellucidator **10** : 338.
Leptothorax acervorum **20** : 250.
Leucospis dorsigera **9** : 149.
Lioterphus pallidicornis **9** : 188.
Lissonota artemisiae **14** : 168.
— bellator **10** : 339.
— cylindrator **2** : 46.
— dubia **2** : 46.
— errabunda **18** : 163.
— ? fletcheri **10** : 339.
— insignita **2** : 46; **3** : 9.
— magdalenae **10** : 339.
Loderus vestigialis ab. plaga **12** : 250.
Lophyrus nemorum **13** : 168.
Lycaota xylostei **16** : 151.
Lyda reticulata **13** : 168.
Lygaeonematus compressicornis **13** : 168.
— lanifica **17** : 340.
— micronematica **17** : 340.
— retusus **13** : 168.
Macrocentrus thoracicus **2** : 47.
Macrophya carinthiaca **14** : 168.
Medophron afflictor **10** : 338.
Megachile centuncularis **9** : 149.
— sp. **15** : 272; **19** : 303.
Megastigmus abietis **9** : 191.
— aculeatus **9** : 191.
— bipunctatus **9** : 190.
— brevicaudis **9** : 190.
— dorsalis **9** : 190.
— seitneri **9** : 191.
— suspectus **9** : 190.
— — v. pinsapinis **9** : 190.
Megastylus pleuralis **10** : 339.
Melanichneumon albopictus **10** : 337.
— bimaculatus **19** : 302.
— faunus **18** : 267.
— fortipes **18** : 267.
— nudicoxa **18** : 267.
Meloboris crassicornis **10** : 340.
— ischnocera **10** : 340.
— paludicola **10** : 340.
— rufiventris **10** : 340.
Meniscus catenator **2** : 46.
— pimplator **18** : 175.
— setosus **18** : 183.
Mesochorus tetricus **18** : 142.
Mesoleius alticola **10** : 339.
— aulicus **10** : 339.
Mesora gilvipes **2** : 47.
Meteorus cinctellus **2** : 47.
— pulchricornis **9** : 148.
— rubens **2** : 47.
— scutellatus **18** : 163.
Metopius dentatus **4** : 288.
Microbracon urinator **19** : 303.
Microcryptus arrogans **10** : 338.
— basizonius **10** : 338.
— nigrocinctus **2** : 45; **10** : 338.
— opaculus **10** : 338.
— rufoniger **10** : 338.
Microdus clausthalianus **2** : 47.
— linguarius **20** : 250.
Microgaster globatus **18** : 163.
— sp. **5** : 209; **6** : 228; **19** : 25.
Micrope macilenta **10** : 337.
Monodontomerus nitidus **9** : 189.
— obscurus **9** : 189.
— obsoletus **9** : 189.
— rugulosus **9** : 189.
— virens **9** : 189.
Monomorium pharaonis **13** : 169.
Monostegia abdominalis **12** : 250; **13** : 168.
Mutilla europaea **4** : 288; **19** : 303.
Myiocephalus boops **2** : 47; **10** : 341.
Myrmica sabuleti **20** : 250.
— — ssp. lonae **20** : 250.
— scabrinodis v. lobicornis **3** : 18.
— — v. schencki **3** : 18, 126, 132.
— schencki **20** : 250.
— sulcinodis **20** : 250.
Nematus erichsoni **14** : 168.
— princeps **12** : 250.
Nemeritis sp. **18** : 151.
Neorhacodes enslini **15** : 272.
Nepiera collector **2** : 46.
Neuroterus lenticularis f. agama **2** : 7 (cecid.).
— — f. sex. quercus baccarum **2** : 7 (cecid.).
— tricolor **17** : 340.
Neurotoma iridescens **20** : 250.
Nomia ruficornis **9** : 149.
Nosopaeus stramineipes **2** : 47.
Odontomerus spinipes **20** : 250.

[1] Per errorem Isthmosoma; vide **4** : 338.

Odynerus **9** : 189.
Olesicampa fulviventris **2** : 46.
— praecox **10** : 340.
Oligosita *brevipennis* **4** : 41—42 (fig.).
— engelharti **4** : 42.
— incrassata **4** : 42.
— nudipennis **4** : 41.
— subfasciata **4** : 42.
Omalus violaceus **18** : 134.
Omorga borealis **10** : 340.
— ? multicincta **10** : 340.
— ? mutabilis **10** : 340.
— sp. **2** : 46.
Ophion luteus **16** : 151; **18** : 166.
Ophioneurus signatus **4** : 40.
Ophthalmochorus brischkei **18** : 267.
— melanocephalus **19** : 303.
Opiinae sp. **2** : 47.
Orgilus obscurator **2** : 47.
— parvipennis **20** : 250.
Ormyrus punctiger **1** : 35, 149; **9** : 191.
— tubulosus **9** : 191.
Orotylus mitis **19** : 302.
Orthocentrus? ambiguus **10** : 340.
— protuberans **2** : 46.
Oryssus abietinus **17** : 340.
Osmia **9** : 189.
— ligurica **9** : 149.
Pachynematus clitellatus **17** : 340.
— *dentatus* **14** : 168; **17** : 340.
— excisus **17** : 340.
— nigriceps **13** : 168.
Pamphilius histrio **20** : 250.
Panurginus romani **5** : 209.
Paururus noctilio **17** : 340; **18** : 267; **20** : 250.
Pezomachus fasciatus **9** : 147.
— macrurus **9** : 147.
Phaenoserphus calcar **16** : 151.
— viator **16** : 151.
Phaeogenes curator **10** : 337.
— fuscicornis **19** : 302.
— melanogonus **10** : 337.
— rusticatus **10** : 337.
— semivulpinus **18** : 175.
— stipator **10** : 337.
— tibiator **10** : 337.
Phanerotoma dentata **18** : 163.
Phobocampa bicingulata **10** : 340.
Phygadeuon cylindraceus **2** : 45.
— lapponicus **10** : 338.
— ocularis **10** : 338.
— pallidicarpus **18** : 267.
— subspinosus **10** : 338.
— trichops **10** : 338.
— sp. **2** : 45.
Phytodiaetus polyzonias **18** : 163.
— segmentator **9** : 154.
Pimpla arctica **10** : 338.
— flavicoxis **10** : 338.
— instigator **10** : 338.
— turionellae **10** : 338; **18** : 163.
Platyderes diffinis **12** : 250; **18** : 134, 135.
Platylabus decipiens **10** : 337.
— iridipennis **19** : 302.
— latiscapus **19** : 302.
— muticus **19** : 302.
— pactor **19** : 302.
Plectiscus canaliculatus **10** : 339.
Plectocryptus rufipes **18** : 267.
Polyblastus palaemon **2** : 46.
Polysphincta clypeata **9** : 151.
— discolor **10** : 339.
— eximia **9** : 151.
— nielseni **9** : 151.
— pallipes **9** : 151, 154.
— percontatoria v. gracilis **9** : 144—156.
— pulchrator **9** : 146.
— tuberosa **9** : 146, 148, 151; **14** : 168.
Pompiloides sexmaculatus **4** : 119, 121, 143,[1] 288.
Pompilus femoralis v. fennicus **4** : 288.
— plumbeus **2** : 45.
Pontania capreae **2** : 5 (cecid.).
— crassipes **18** : 267.
— leucosticta **2** : 5 (cecid.).
— phylicifoliae **2** : 5 (cecid.).
— vesicator **19** : 302.
— viminalis **2** : 5 (cecid.).
Prestwichia aquatica **4** : 40—41.
Priocnemis coriaceus **4** : 118.
— fuscus **4** : 118.
— minor **4** : 288.
Priophorus foveivaginatus **13** : 52, 169.
— tener **13** : 52.
Pristiphora amentorum **13** : 168.
Promethes (-thus) cognatus **10** : 339.
— dorsalis **10** : 340.
— laticarpus **2** : 46.
— pulchellus **2** : 46.
Prosopis confusa **9** : 149.
Proterops nigripennis **10** : 341.
Psammochares abnormis **4** : 118.
— aculeatus **4** : 118, 119, 121.
— campestris **4** : 118.
— carinulatus **4** : 119.
— chalybeatus **4** : 121.
— cinctellus **4** : 118.
— crassicornis **4** : 118, 119, 120.
— dispar **4** : 121.
— fumipennis **4** : 118.
— fuscomarginatus **4** : 118, 119, 120.
— fuscus **4** : 118.
— gibbus **4** : 118.
— guentheri **4** : 119.
— infuscatus **4** : 118, 119, 121, 122.
— lanuginosus **4** : 118, 119, 120.
— minutus **4** : 118.
— plumbeus **4** : 118, 119, 120, 122.
— proximus **4** : 118.

[1] Per errorem sexpunctatus.

Psammochares rufus **4** : 118.
— sahlbergi **4** : 119.
— signaticeps **4** : 120.
— spissus **4** : 119.
— unguicularis **4** : 118.
— wesmaëli **4** : 119.
— westerlundi **4** : 119.
Pseudagenia albifrons **18** : 134, 135.
— carbonaria **9** : 149.
Pseudoclavellaria amerinae **20** : 250.
Pseudotorymus brassicae **9** : 190.
— carinatus **9** : 189.
— militaris **9** : 190.
— papaveris **9** : 190.
— salicis **9** : 189.
Pteronidea ferruginea **13** : 168.
— lienterica **20** : 250.
— *macroserrata* **18** : 267.[1]
— melanaspis **14** : 168.
— miliaris **13** : 168.[2]
— pseudonotabilis **13** : 168.[2]
— *vernalis* **14** : 168.
Pteronus ribesii **18** : 172.
Pygostolus falcatus **20** : 250.
Rhadinopimpla brachylabris **20** : 250.
Rhizarcha sp. **2** : 47.
Rhodites eglanteriae **9** : 186; **18** : 267.
— mayri **9** : 186; **20** : 250.
— rosae **9** : 186, 191.
Rhogas praetor **15** : 272.
— rugulosus **10** : 341.
— sp. **13** : 169.
Sagaritis crassicornis **2** : 46.
— erythropus **10** : 340.
— holmgreni **10** : 340.
Saotis brevispina **2** : 46.
Scolioneura tenella **18** : 267.
Scolobates longicornis **15** : 272.
Scopiorus propinquus **2** : 46.
Selandria flavistigma **15** : 272.
— stramineipes **19** : 302.
Sirex gigas **17** : 340; **19** : 302; **20** : 250.
Spathius exarator **18** : 139.
Spilichneumon stagnicola **14** : 168.
Spilocryptus solitarius **19** : 337.
Spinolia maculipennis **18** : 174.
Stauropoctonus bombycivorus **16**: 151.
Stelis signata **12** : 250.
Stenichneumon calcatorius **18** : 267.
— castaneus **10** : 337.
— culpator **19** : 302.
— torpidus **17** : 340.
Stilpnus crassicornis **10** : 338.
Stiphrosomus ambulator **10** : 339.
— fuscicornis **10** : 339.
Stylocryptus kriegeri **16** : 151.
Sychnoporthus erosus **10** : 339.
Synergus evanescens **2** : 5.
Synomelix xanthostomus **10** : 339.
Tenthredo fagi **19** : 302.
— nigerrima **19** : 302.
Tenthredopsis auriculata **16** : 151.
Thalessa curvipes **19** : 303.
Therobolus ruficeps **2** : 47.
Thyreopus maeklini **7** : 5.
Tremex fuscicornis **15** : 67, 272.
Trichiocampus aeneus **18** : 267.
Trichocryptus cinctorius **10** : 338.
Trichogramma **4** : 38.
— evanescens **4** : 39.
— piniperdae **4** : 39.
Tricholabus strigatorius **10** : 337.
Trichomma enecator **15** : 272.
Trigonalys hahni **20** : 250.
Trigonaspis megaptera **9** : 185; **16** 151.
Tromatobia oculatoria **9** : 151.
— ovivora v. concors **10** : 339.
Tryphon elongator **10** : 339.
Tylocomnus scaber **10** : 340.
Vespa crabro **17** : 340.
— media **16** : 151; **18** : 144.
— rufa **14** : 21.
— vulgaris **5** : 211.
— sp. **4** : 288.
Vipio guttiventris **1** : 12, 149.
Xenoschesis fulvipes **10** : 339.
Xestophanes brevitarsis **1** : 35 (cecid.).
Xiphydria camelus **3** : 126; **18** : 151; **20** : 250.
Xorides depressus **2** : 46.
Zaglypta (-ptus) variipes **9** : 151; **10** : 399.

[1] Per errorem macrocrenata.
[2] Per errorem Prionidea.

HEMIPTERA.

Acalypta carinata **7** : 203, 211.
— nigrina **7** : 199, 203, 211; **18** : 22.
Acanthia opacula **7** : 204, 208, 222.
— orthochila **7** : 204, 220.
— pallipes **7** : 204, 208, 222.
— saltatoria **7** : 204, 221.
— — v. fucicola **7** : 204, 206. 208, 221, 222.
— scotica **7** : 204, 220.
— trybomi **7** : 206.
Acanthosoma haemorrhoidale **16** : 150; **17** : 339; **18** : 266.
Achorotile albosignata **1** : 64, 67; **2** : 11.
Acompocoris alpinus **17** : 6.
— pygmaeus **17** : 6.
Adelphocoris lineolatus **17** : 5.
Agallia venosa **18** : 23.
Aleurochiton aceris **9** : 28.
Aleurodes fragariae **9** : 28.
— lonicerae **18** : 24.
— rubi **12** : 252; **13** : 170.
— — minor **12** : 252.
— vaccinii **9** : 28.
— vaporariorum **9** : 28.
Aleurotylus? filicium **9** : 28.

Allaeotomus gothicus **9** : 19; **17** : 6.
Allodaphus rufescens **17** : 5.
Anthocoris confusus **9** : 19; **18** : 22.
— nemorum **7** : 199, 203, 207, 213; **18** : 22.
Anuraphis lychnidis **15** : 273.
Aphalara calthae **7** : 204, 232.
— ericae **17** : 5.
— nebulosa **7** : 204, 207, 232.
Aphanus phoeniceus **1** : 89, 151; **17** : 5.
Apheloch(e)irus aestivalis **3** : 127.
— sp. **4** : 41; **5** : 211.
Aphrodes trifasciatus **17** : 5.
Aradus angularis **18** : 266.
— betulae **7** : 203, 208, 212.
— bimaculatus **16** : 150.
— crenaticollis **7** : 203, 212.
— lugubris **7** : 203, 211, 212.
Aspidiotus rapax **19** : 302.
Asterochiton aceris **4** : 289.
Athysanus brevipennis **1** : 64, 65, 67.
— grisescens **1** : 64, 67.
— pallens **1** : 64, 65, 67.
Batysmatophorus reuteri **7** : 204, 224; **11** : 170.
Balclutha punctata **18** : 23.
Berytinus minor **18** : 22.
Berytus crassipes **2** : 12.
— minor **2** : 12.
Brachycolus stellariae **5** : 131 (cecid.).
Bythoscopus fenestratus **18** : 23.
— flavicollis **18** : 23.
— rufusculus **18** : 23.
Callicorixa producta **7** : 204,[1] 207, 223.
Calocoris fulvomaculatus **7** : 199, 203, 208, 214, 217; **18** : 22.
— norvegicus **9** : 19.
Calyptonotus rolandri **19** : 301.
Capsus ater **18** : 22.
Centrotus cornutus **18** : 23.
Chartoscirta cincta **18** : 23.
— elegantula **18** : 23.
Chermes sp. **20** : 59.
Chilacis typhae **18** : 22.
Chiloxanthus borealis **7** : 199.
— pilosus **7** : 199, 203, 207, 219.
Chionaspis salicis **4** : 289; **14** : 168.
Chlamydatus pulicarius **1** : 65, 66; **7** : 199, 203, 207, 217; **18** : 22.
— pullus **7** : 203, 218.
— saltitans **7** : 199, 203, 218.
— signatus **7** : 203, 218.
— wilkinsoni **1** : 65, 66; **7** : 199.
Chloriona prasinula **18** : 24.
— smaragdula **12** : 252.
— unicolor **18** : 24.
Chlorita flavescens **18** : 24.
Chlorochroa juniperina **14** : 21, 24; **17** : 6; **18** : 21.
Chlorochroa pinicola **14** : 20, 21, 24, 33, 34, 37.
Cicadella viridis **18** : 23.
Cicadula sexnotata **1** : 64, 65, 67; **4** : 42; **7** : 199, 204, 208, 229.
— viridigrisea **19** : 19.
— sp. **18** : 23.
Cimex lectularius **7** : 203, 212.
Cixius cunicularius **18** : 24.
— stigmaticus **7** : 204, 229; **18** : 24.
Coranus subapterus **2** : 12; **17** : 5.
Coriomeris denticulatus **19** : 19.
Corixa carinata **1** : 65, 66; **7** : 204, 207, 223; **10** : 209.
— fabricii **4** : 103.
— linnei **4** : 103.
— praeusta **1** : 65, 66; **4** : 102, 103.
— — v. socia **1** : 65, 66.
— semistriata **4** : 103.
— striata **4** : 103.
Corixidae sp. **15** : 17, 19, 20.
Corizus sp. **2** : 11.
Coryphaelus gyllenhali **18** : 24.
Cremnocephalus umbratilis **17** : 6.
Cymatia bonsdorffi **18** : 23.
Cymus glandicolor **14** : 20; **18** : 22.
Cyrtorrhinus caricis **18** : 22.
Delphax alpina **7** : 199, 204, 207, 226, 231, 232.
— bohemani **7** : 204, 208, 230.
— collina **7** : 204, 230.
— discolor **7** : 204, 207, 229.
— pellucida **7** : 204, 207, 226, 230.
Deltocephalus calceolatus **2** : 11.
— costalis **18** : 23.
— distinguendus **18** : 24.
— limbatellus **1** : 64, 65, 67; **7** : 199, 204, 206, 207, 225, 229.
— lividellus? **1** : 64, 67.
— ocellaris **7** : 204, 224.
— pascuellus **18** : 24.
— pulicaris **7** : 204, 224; **18** : 24.
— sabulicola **1** : 89, 151; **2** : 47; **3** : 8.
— striatus **2** : 48; **7** : 199, 204, 207, 224; **18** : 24.
— torneellus **13** : 170.
Deraeocoris scutellaris **17** : 5.
Dicraneura flavipennis **18** : 24.
— variata **18** : 24.
Dicranotropis hamata **18** : 23.
Dicrooscytus rufipennis **17** : 6; **18** : 22.
Dicyphus globulifer **18** : 22.
Ditropis borealis **7** : 207.
Dolycoris baccarum **14** : 20, 21; **18** : 21.
Doratura stylata **18** : 23.
Drylix atricapilla **12** : 252.
Drymus brunneus **7** : 203, 207, 210.
Elasmostethus interstinctus **14** : 20 . . . 24, 33—37; **18** : 21.
Elasmucha fieberi **18** : 21.
— grisea **14** : 20, 21, 34, 37; **18** : 266.

[1] Corixa p.

Elatophilus nigrellus **1** : 89, 151.
— nigricornis **7** : 203, 213; **9** : 19.
— stigmatellus **17** : 6.
Empoasca sp. **18** : 24.
Eremocoris erraticus **7** : 199, 203, 208, 210; **14** : 20.
Eriopeltis lichtensteini **19** : 302.
Erythria aureola **17** : 5.
Erythroneura rubrovittata **17** : 5.
Euacanthus interruptus **18** : 23.
Eupteryx atropunctata **18** : 24.
— germari **17** : 6.
— notata **1** : 64, 67; **7** : 204, 207, 229.
— sexpunctata **18** : 24.
Eurydema oleraceum **14** : 20, 21; **18** : 21.
Eurygaster maura **18** : 21.
Euryopicoris nitidus **7** : 199.
Euscelis brevipennis **7** : 204, 207, 226; **18** : 24.
— grisescens **7** : 204, 208, 225, 227; **18** : 24.
— pallens **7** : 199, 204, 206, 207, 226, 231, 232; **18** : 24.
— striatulus (striatulellus) **17** : 5; **18** : 24.
Euschistus variolarius **12** : 198, 199, 202.
Geocoris dispar **9** : 18.
— grylloides **9** : 18.
— lapponicus **2** : 11; **7** : 199, 203, 209; **17** : 5; **18** : 22.
Gerris asper **7** : 203, 207, 218.
— lacustris **4** : 103; **7** : 203, 207, 219; **14** : 20; **18** : 23.
— odontogaster **7** : 203, 207, 219; **18** : 23.
— rufoscutellatus **18** : 23.
— thoracicus **18** : 23.
Globiceps flavomaculatus **18** : 22.
— salicicola **7** : 203, 208, 216; **18** : 22.
Gnathoconus picipes **14** : 167.
Gonianotus marginepunctatus **1** : 89, 151.
Grypotes fallax **18** : 24.
Hadrodema pinastri **17** : 6.
Halosalda lateralis **18** : 23.
Hebrus ruficeps **18** : 22.
Ischnocoris angustulus **2** : 12.
Ischnodemus sabuleti f. brachyptera **1** : 89, 151.
Ischnorhynchus resedae **18** : 22.
Jalla dumosa **14** : 21, 24, 33, 34, 167.
Labops sahlbergi **2** : 11; **7** : 203, 216; **18** : 22.
Lamproplax picea **13** : 170.
Lecanium corni **15** : 273.
Liburnia albocarinata **18** : 24.
— albostriata **18** : 24.
— alpina **1** : 64, 65, 67; **7** : 199.
— bohemani **7** : 221.
— discolor **18** : 24.
— excisa **1** : 89, 151; **2** : 48; **18** : 24.
— forcipata **18** : 24.
— obscurella **18** : 24.
— paludosa **18** : 24.
— pellucida **1** : 64, 67; **7** : 199; **18** : 24.
— pullula **18** : 24.
Liburnia reyi **18** : 24.
— sordidula **18** : 24.
Limotettix paludosa **18** : 24.
— striola **18** : 24.
Lyctocoris campestris **13** : 170.
Lygus contaminatus **18** : 22.
— pratensis **7** : 203. 207, 214; **14** : 20; **18** : 22.
— — punctatus **17** : 5.
Macrodema micropterum **17** : 5.
Macropsis cerea **18** : 23.
Macrosiphoniella millefolii **5** : 211.
Mecomma ambulans **7** : 199, 203, 216.
Mesocerus marginatus **18** : 21.
Mesovelia fuscata **18** : 22.
Metatropis rufescens **18** : 22.
Micracanthia marginalis **12** : 252.
Microphysa elegantula **9** : 19.
— pselaphiformis **1** : 66; **7** : 199, 203, 214.
Microvelia schneideri **9** : 19; **18** : 22.
Miris dolabratus **7** : 203, 207, 215.
Monalocoris filicis **18** : 22.
Myrmedobia tenella **7** : 203, 214.
Myrmus miriformis **18** : 21.
Mytilaspis citricola **19** : 302.
Nabis flavomarginatus **7** : 203, 207, 212.
— lineatus **12** : 252; **17** : 339.
— vagans **17** : 5.
Neides tipularius **2** : 12.
Neocoris bohemani **3** : 11.
— nigritulus **3** : 11.
Neomaskellia **9** : 28.
Neophilaenus exclamationis **18** : 23.
— lineatus **18** : 23.
Neottiglossa pusilla **18** : 21.
Nepa cinerea **18** : 23.
Notonecta glauca **4** : 103.
— lutea **18** : 23.
— sp. **4** : 41; **18** : 23 (larvae).
Nysius ericae v. obscuratus **1** : 65, 66; **7** : 199, 203, 208, 209.
— helveticus **18** : 22.
— jacobaeae **18** : 22.
— lineatus **17** : 5.
— thymi **14** : 20; **18** : 22.
Oncopsis flavicollis **7** : 204, 224.
— lanio **16** : 150.
Ophiola striatula **7** : 199.[1]
Orthezia cataphracta **7** : 199, 204, 207, 234.
Orthocephalus saltator **18** : 22.
Orthops kalmi **18** : 22.
Orthotylus ericetorum **17** : 5.
— flavosparsus **9** : 18; **18** : 22.
— fuscescens **17** : 6.
— marginalis **18** : 22.
— tenellus **19** : 301.
Pachybrachius fracticollis **18** : 22.
Pachycoleus rufescens **13** : 170.
Palomena prasina **16** : 150.

[1] Per errorem striata.

Paralimnus phragmitis **18** : 23.
— r o t u n d i c e p s **18** : 23; **19** : 301.
Pentatoma rufipes **14** : 339.
Philaenus spumarius **18** : 23.
— — v. trilineatus **18** : 23.
— — v. pallidus **18** : 23.
Phimodera humeralis **1** : 89, 151.
— lapponica **17** : 5.
Phytocoris pini **17** : 6.
— v a r i p e s **9** : 19.
Picromerus bidens **18** : 21.
Piesma quadrata **9** : 18.
— s a l s o l a e **3** : 5—6, 8, 127, 133; **4** : 143, 144; **9** : 18.
— variabilis **9** : 18.
Piezostethus formicetorum **17** : 339.
— galactinus **13** : 169.
— lativentris **17** : 5.
— parvulus **5** : 211.
Pilophorus cinnamopterus **17** : 6.
Pionosomus varius **1** : 89, 151; **17** : 5.
Pithanus maerkeli **18** : 22.
Plagiognathus chrysanthemi **18** : 22.
Plesiocoris rugicollis **7** : 199, 203, 208, 215, 217; **18** : 22.
Plesiodema pinetellum **17** : 6; **18** : 22.
Plinthisus pusillus **2** : 12.
Poeciloscytus unifasciatus **18** : 22.
— v u l n e r a t u s **19** : 301.
Psallus aethiops **7** : 203, 208, 217.
— — v. flaviculus **7** : 217.
— ambiguus **7** : 199; **18** : 22.
— graminicola **1** : 65, 66; **7** : 199, 203, 208, 217; **18** : 22.
— obscurellus **17** : 6.
— roseus **18** : 22.
Pseudococcus adonidum **17** : 339.
Psylla betulae v. nana **7** : 204, 232.
— mali **12** : 220, 236.
— nigrita **7** : 204, 207, 208, 233.
— palméni **7** : 199, 204, 233.
— n. sp. **7** : 204, 207, 233.
Psylliopsis fraxini **5** : 131 (cecid.).
Pterochlorus r o b o r i s **2** : 34—35, 114; **18** : 164.
Pycnopterna striata **18** : 22.
Pygolampis bidentata **2** : 12, 114; **17** : 339.
Raglius pini **18** : 22.
Ranatra **4** : 41.
— linearis **6** : 229; **10** : 204; **12** : 252; **14** : 167; **15** : 273; **16** : 150; **17** : 339.
Reduviolus brevis **18** : 22.
— ferus **18** : 22.
— flavomarginatus **18** : 22.
Rhacognathus punctatus **7** : 203, 208, 217; **18** : 21.
Rhopalus maculatus **18** : 21.
— t i g r i n u s **18** : 266.
Rhyparochromus chiragra **2** : 11.
Salda b o r e a l i s **1** : 65, 66; **4** : 338; **7** : 199, 206.
Salda fennica **9** : 19, 20.
— litoralis **1** : 66; **7** : 203, 207, 220; **18** : 23.
— marginalis **9** : 18, 20.
— morio **18** : 23.
— opacula **14** : 20.
— p i l o s a **6** : 229.
— scotica **1** : 65, 66; **10** : 209.
— saltatoria **1** : 66.
Saldula opacula **18** : 23.
— pallipes **18** : 23.
— saltatoria **18** : 23.
Scaphoideus formosus **18** : 24.
Sciocoris c u r s i t a n s **1** : 89, 151; **3** : 127, 133.
— microphthalmus **17** : 339.
Scolopostethus affinis **7** : 203, 207, 210; **18** : 22.
— decoratus **17** : 5.
— pilosus **18** : 170.
Sehirus biguttatus **14** : 33; **17** : 5.
Sigara carinata **15** : 19; **18** : 23.
— distincta **18** : 23.
— fabricii **18** : 23.
— fossarum **18** : 23.
— hellensi **18** : 23.
— praeusta **18** : 23.
— producta **15** : 19; **18** : 23.
— semistriata **18** : 23.
— striata **18** : 23.
— sp. **15** : 19—21.
Stagonomus pusillus **2** : 11, 114; **17** : 339.
Stenodema calcaratum **18** : 22.
— holsatum **7** : 203, 215; **18** : 22.
— virens **18** : 22.
Stephanitis r h o d o d e n d r i **15** : 273.
Stictopleurus crassicornis **18** : 21.
Stiroma affinis **18** : 24.
— albocarinata **18** : 24.
— bicarinata **7** : 204, 207, 232.
— borealis **1** : 64, 65, 67; **7** : 199, 204, 207, 226, 231, 232.
— thoracica **18** : 24.
Strongylocoris leucocephalus **7** : 203, 217.
Stygnocoris fuligineus **2** : 12.
— pedestris **17** : 5.
— pygmaeus **17** : 5.
Taphropeltus hamulatus **2** : 11, 12, 114.
Teratocoris saundersi **7** : 203, 216; **18** : 22.
— viridis **7** : 199, 203, 207, 215, 216.
— — v. hyperboreus **1** : 64, 65, 66; **7** : 199.
Thamnotettix cruentatus **17** : 5.
— e d w a r d s i **12** : 252.
— flaveolus **18** : 24.
— prasinus **18** : 24.
— — v. stupidulus **1** : 64, 65, 67.
— stupidulus **7** : 199, 204, 207, 227, 228.
— subfusculus **1** : 64, 67; **7** : 199, 204, 207, 227; **18** : 24.
— sulphurellus **18** : 24.
— torneellus **1** : 64, 65, 67; **7** : 199, 204, 206, 207, 227; **18** : 24.

Thamnotettix vittiventris **18** : 24.
Thyreocoris scarabaeoides **17** : 339.
Trapezonotus agrestis **2** : 12; **7** : 208.
— anorus **2** : 12.
— arenarius **7** : 203, 209; **17** : 5.
Trigonotylus ruficornis **18** : 22.
Trioza cirsii **7** : 204, 234.
— salicivora **7** : 204, 233.
— saundersi **7** : 204, 233.
Triphleps nigra **4** : 289.
Troilus luridus **9** : 17, 127; **14** : 21, 23, 24, 33—35, 167.
Tropistethus holosericeus **2** : 11.
Ulopa reticulata **17** : 5; **18** : 23.
Vacuna dryophila **18** : 164.
Velia currens **9** : 19.
Zicrona coerulea **7** : 208.

MOLLUSCA.

Abra longicallis **9** : 97, 102.
Acmaea testudinalis **9** : 94.
Acroloxus lacustris **13** : 165.
Admete viridula **9** : 100.
Amauropsis islandica **9** : 98.
Amnicola steini **13** : 165; **15** : 269.
Amphipeplea glutinosa **5** : 207.
Anodonta **11** : 12, 13; **15** : 22; **20** : 9.
— anatina **5** : 208; **8** : 372; **14** : 66.
— cygnea cellensis **11** : 10—14 (fig.), 265; **13** : 132, 133, 165.
— — cygnea **11** : 10.
— — piscinalis **11** : 10, 13—14 (fig.); **15** : 269.
— — — f. ponderosa **11** : 14.
— — — f. ventricosa **11** : 14.
Anomia aculeata **9** : 95, 96, 101.
— ephippium **9** : 93, 94, 96, 97, 99—102.
— — f. typica **9** : 95, 96, 100.
— — v. cylindrica **9** : 95, 100.
— — v. squamula **9** : 96.
— squamula **9** : 97, 100.
— — f. cylindrica **9** : 100.
Antalis entalis **9** : 100, 102.
— striolata **9** : 100, 101.
Aphrodite groenlandica **9** : 100.
Aplexa hypnorum **13** : 165.
Arianta arbustorum **11** : 265.
Arion subfuscus **5** : 207.
Armiger crista **13** : 165.
Astarte compressa **9** : 95, 96, 98—103; **10** : 369.
— — f. typica **9** : 97.
— semisulcata v. withami **9** : 101.
— warhami **9** : 100, 101.
Axinus flexuosus **9** : 97, 99, 102.
— gouldii **9** : 97, 102.
Bela pyramidalis **9** : 98.
— simplex **9** : 94.
— trevalyana **9** : 97.
Buccinum donovani **9** : 100.
— finmarchianum **9** : 101.
Buccinum finmarchianum v. scalaris **9** : 98.
— groenlandicum **9** : 93, 96.
— undatum **9** : 93, 94, 100.
— — formae **9** : 96.
— — f. relictum **9** : 97.
— — f. typicum **9** : 96, 97, 101, 102.
— — var. **9** : 95.
— — v. coeruleum **9** : 93, 94, 96—98, 100—102.
— — v. groenlandicum **9** : 93.
Cardium ciliatum **9** : 100—102.
— edule **2** : 10; **4** : 15, 16, 65; **9** : 96, 102.
— — f. typica **9** : 97, 98.
— — var. **9** : 94, 97, 98.
— fasciatum **9** : 96 . . 102; **10** : 369.
Clausilia sp. **5** : 207.
Crenella decussata **9** : 97.
Cyamium minutum **9** : 95.
Cyprina islandica **9** : 94—98, 100—102; **10** : 369.
Gibbula cineraria **9** : 97.
— intermedia **9** : 99, 102.
— tumida **9** : 102.
— — v. intermedia **9** : 100.
Helix arbustorum **5** : 207.
— fruticum **5** : 207.
— lapicida **5** : 207.
— pomatia **15** : 4.
— sp. **5** : 207.
Hydrobia jenkinsi **10** : 11, 96, 470; **11** : 265.
Lacuna divaricata **9** : 93.
Leda minuta **9** : 97.
— pernula **9** : 95, 99—102.
Lepeta coeca **9** : 99, 102.
Limax cinereoniger **17** : 2—3.
— cinereus **17** : 2—3.
— maximus **17** : 2—3.
— — v. cinereoniger **5** : 207; **17** : 2.
— — v. cinereus **17** : 2; **19** : 299.
— tenellus **7** : 296, 307.
— sp. **5** : 207.
Limnaea ovata **1** : 8; **5** : 207.
— palustris **1** : 8.
— stagnalis **1** : 8; **5** : 207.
Littorina litorea **9** : 94, 96, 98, 100, 101; **10** : 369.
— — f. typica **9** : 97.
— palliata **9** : 93—95, 98, 100, 102.
— — varr. **9** : 96, 97.
— rudis **9** : 93, 96—98; **20** : 37.
— — f. typica **9** : 96, 98.
— — groenlandica **20** : 43.
— — v. palliata **9** : 102.
— sp. 37, 38.
Lunatia montagui **9** : 100.
Macoma baltica **9** : 100, 101.
— — f. typica **9** : 95, 97, 98.
— — v. groenlandica **9** : 102.
— — v. trigona **9** : 95.
— calcaria **9** : 94—102.
— — varr. **9** : 97.

Macoma calcaria v. sabulosa **9** : 95.
— — v. thorelli **9** : 102.
Margarita groenlandica **9** : 95—97, 102.
— helicina **9** : 96, 99, 102.
Modiola modiolus **10** : 369.
Modiolaria sp. **9** : 101.
Moelleria costulata **9** : 95, 99, 102.
Montacuta bidentata **9** : 97.
Murex brandaris **3** : 50.
Mya arenaria **12** : 173.
— truncata **9** : 95, 98—100; **10** : 369.
— — f. typica **9** : 94, 95, 97, 98, 100—102
— — v. ovata **9** : 100, 102.
— — v. uddevallensis **9** : 97.
Mytilus edulis **4** : 15, 65; **9** : 93—95, 97—102; **10** : 369; **17** : 146; **19** : 5—7.
— modiolus **9** : 93—102.
— sp. **20** : 35, 37.
Natica affinis **9** : 96, 98, 100, 102.
— clausa **9** : 97—102.
Neptunea despecta **9** : 99, 100—103.
Neritina fluviatilis **1** : 8; **17** : 48, 146.
Nicania banksii **9** : 93, 97, 99—102.
— — f. typica **9** : 95.
— — varr. **9** : 97, 100.
— — v. globosa **9** : 95, 99.
Nucula tenuis **9** : 95, 102.
Odostomia sp. (unidentata?, turrita?) **9** : 96.
Ommatostrephes sagittatus **17** : 178—179, 336.
Onoba aculens **9** : 96, 97.
— striata **9** : 97, 100.
Paludina contecta **10** : 470.
Panopea norvegica **9** : 95, 100—102.
Patula ruderata **5** : 207.
Pecten groenlandicus **9** : 95.
— islandicus **9** : 93—97, 99—102; **10** : 369.
— — var. **9** : 95, 100.
Pisidium sp. [**6** : 160].
Placophora sp. **9** : 95, 97—101.
Planorbis corneus **14** : 166.
Polytropa lapillus **9** : 93, 94, 96—98, 102.
Portlandia arctica **9** : 101.
— lenticula **9** : 95, 100, 102.
Potamopyrgus crystallinus **13** : 165.
— —, v., ssp. carinatus **10** : 11—13, 96,[1] 470.
— — ssp. — f. aculeatus **10** : 12.
Pseudachatina sp. **14** : 18.
Puncturella noachina **9** : 95, 100—102.
Purpurea sp. **10** : 369.
Pyrene rosacea **9** : 102.
Rissoa inconspicua f. typica **9** : 97.
Saxicava pholadis **9** : 93—95, 97—101; **10** : 399.
Sphaerium corneum **5** : 208.
— nitidum **13** : 165.
Succinea putris **5** : 207.
Tectura rubella **9** : 94, 95, 97, 100—102.
Tectura virginea **9** : 93—95, 97—102.
Tellina baltica **4** : 65; **5** : 208; **12** : 173.
Theodoxus fluviatilis **17** : 146.
Thracia truncata **9** : 95—97, 101.
Trichotropis borealis **9** : 102.
Tridonta borealis **9** : 93—95, 97, 98, 101, 102.
— — var. **9** : 97.
Trophon clathratus **9** : 97, 100, 102.
— truncatus **9** : 93, 97, 102.
Tropidiscus carinatus **17** : 336.
Unio pictorum **5** : 208.
— tumidus **5** : 208.
— sp. **20** : 9.
Velutina laevigata **9** : 99, 100.
Venus gallina **9** : 94.
Yoldia limatula **9** : 100, 102.
Zirphaea crispata **9** : 94, 98.
— — f. typica **9** : 95.

[1] Per errorem carmatus.

BRYOZOA.

Bryozoa sp. **9** : 94, 97, 98, 102.
Membranipora pilosa **4** : 183; **9** : 173.
— — v. membranacea **1** : 7, 8.
Plumatella fungosa **1** : 7.
— repens **1** : 7.
Victorella continentalis **1** : 8.
— p a v i d a **1** : 7—8, 153.
— symbiotica **1** : 8.

BRACHIOPODA.

Rhynchonella psittacea **9** : 101, 102.
Waldheimia crania **9** : 101.

ECHINODERMATA.

Solaster papposus **5** : 208.
Strongylocentrotus droebachiensis **9** : 94—102.

CYCLOSTOMATA, PISCES.

Abramis ballerus **14** : 110.
— björkna **1** : 143; **3** : 124.
— brama [**2** : 60]; [**4** : 50]; **5** : 69, 81; [**6** : 155, 160]; **11** : 42, [217, 220]; **19** : 79.
— — f. monstr. **3** : 124.
— vimba **3** : 124.
Acerina cernua **3** : 124; **4** : 285; **5** : 207; **11** : 41, 46.
Ac(c)ipenser sturio **6** : 226; **9** : 234; **10** : 470.
Alburnus alburnus **11** : 41, 42, 46.
— lucidus **1** : 143; **3** : 124.
Alosa finta **14** : 4.
Ammodytes lanceolatus **8** : 372; **9** : 234; **10** : 470.
— tobianus **7** : 317; **10** : 470; **13** : 165.
Anguilla anguilla (**11** : 190].
— vulgaris **14** : 4; **15** : 51; [**20** : 78].
Aspius rapax **14** : 4; **15** : 269.

Belone acus **19** : 4.
— vulgaris **4** : 285; **6** : 226; **11** : 265; **12** : 248; **13** : 165; **15** : 269; **16** : 2; **19** : 79.
Carassius carassius **11** : 42.
Centronotus gunellus **2** : 108; **12** : 248.
Clupea alosa finta **1** : 141, 143, 149; **6** : 226; **14** : 166; **16** : 1, [2]; **17** : 336.
— harengus v. membras **1** : 143; **2** : 108; **4** : 15; **7** : 317; [**18** : 25]; [**19** : 78, 79, 80]; **20** : 2.
— sprattus **19** : 79.
Cobitis taenia **11** : 41.
— — taenia **10** : 329—336.
— — ssp. *granoei* **10** : 332—336 (fig.).
— — ssp. *lutheri* **10** : 330—336 (fig.).
Coregonus **5** : 116—125.
— albula [**2** : 60]; **6** : [160], 226; **11** : 41; **14** : 8; [**19** : 79].
— albus **14** : 9.
— ardeti **14** : 9.
— bolmeniensis **14** : 8.
— fera **5** : 117, 118, 124.
— — f. inarensis **5** : 119, 120, 123.
— — lavaretus **14** : 8.
— generosus **5** : 118, 121—124.
— — f. aspia **5** : 119, 121, 123.
— holsatus **5** : 117, 118, 120, 123, 124.
— — f. anarensis **5** : 119, 123.
— lavaretus **2** : 108; **5** : 116, 118, 123, 125, 208; **10** : 354; **11** : 41; **14** : 8; **15** : 51; **16** : 86; **18** : 25; **19** : 79, 80.
— — järvii **10** : 354.
— — f. lapponica **5** : 119.
— — f. typica **5** : 116, 119, 122—124.
— — v. polonica **14** : 10.
— macrophthalmus **5** : 119.
— oxyrrhynchus **5** : 116; **14** : 8.
— wartmanni **5** : 118, 119, 121—124; **10** : 354.
— — f. borealis **5** : 119, 120.
Cottus gobio **2** : 57; **3** : 124; **11** : 41.
— — v. *roseus* **2** : 56—57, 108, 112.
— koshewnikowi **15** : 23.
— poecilopus **2** : 57; **3** : 124.
— quadricornis **3** : 124; **5** : 76, 206; **19** : 299.
— — ssp. relictus **20** : 79—80.
— sp. [**11** : 217].
Cyclopterus lumpus **3** : 124; **5** : 207.
Cyprinopsis carassius **3** : 124.
Esox lucius [**2** : 60]; **5** : 207; [**6** : 160]; **11** : [40], 41, 46; [**17** : 142—144, 153—161].
— — f. monstr. **3** : 124.
Gadus callarias **19** : 78, [79].
— morrhua **4** : 15; **18** : 25.
Gasterosteus aculeatus **3** : 124; **5** : 206; **6** : 121—122; **11** : 41, 46.
— pungitius **3** : 124; **5** : 206.
Gobio gobio **11** : 41, 42.
Gobius microps **14** : 166.
— niger **2** : 108; **4** : 285; **15** : 269.
— minutus **2** : 108.
Lampetra fluviatilis **14** : 127—128.
Leuciscus cephalus **9** : 234; **19** : 88.
— erythrophthalmus **3** : 124.
— grislagine **3** : 124.
— idus **11** : 41.
— — auratus **5** : 207.
— rutilus **3** : 124; [**6** : 160].
— — aberr. **1** : 143.
— — f. monstr. **4** : 285.
— — × Abramis blicea **8** : 372.
Liparis lineatus **5** : 207; **6** : 226; **10** : 470.
Lota lota **11** : 41, 43, 46; **16** : 86.
— — maculosa **11** : 43.
— vulgaris **4** : 285.
Lucioperca lucioperca **11** : 42, 43, [217]; **19** : 88.
— sandra [**6** : 160].
Macrurus fabricii **14** : 166.
Misgurnus **10** : 329.
Mugil capito **1** : 6, 141, 143, 149.
Nemachelius barbatulus **11** : 41.
Nerophis ophidion **2** : 108; **3** : 124.
Osmerus eperlanus **2** : [60], 108; [**6** : 160].
— — v. spirinchus **11** : 41, 42, 46.
Pelecus cultratus **9** : 234; **13** : 165; **14** : 166.
Perca fluviatilis **2** : 59—60, 112; [**6** : 160]; **11** : 41, 42, 46.
— — f. monstr. **5** : 206.
— — var. color. **2** : 108; **3** : 124; **6** : 225; **7** : 317 (aurea).
Petromyzon fluviatilis **19** : 80.
— marinus **11** : 265.
Phoxinus aphya [**2** : 60]; **3** : 124; **4** : 285; **5** : 207.
Pleuronectes flesus **2** : 108; [**11** : 217].
— platessa **9** : 234.
Pygosteus pungitius **11** : 41.
Rutilus rutilus **11** : 41, 42, 46.
Salmo salar **3** : 124; **5** : 207; [**11** : 190].
— trutta **5** : 125; **15** : 23, 269.
— — m. fario **11** : 41.
Sarda sarda **15** : 269.
Scardinius erythrophthalmus **11** : 41.
Scomber scombrus (scomber) **6** : 225; **8** : 372; **13** : 165; **14** : 166; **15** : 269; **17** : 2, 336.
Silurus glanis **1** : 141, 143, 149; **8** : 372; **10** : 470; **15** : 269.
Siphonostoma typhle **2** : 108; **3** : 124.
Spinachia spinachia **9** : 234; **11** : 265; **12** : 248.
— vulgaris **12** : 4; **14** : 166; **15** : 269.
Thymallus thymallus **11** : 41, 46.
Tinca tinca **11** : [40], 42; **17** : 24; **19** : 87—88.
— vulgaris **9** : 234.
Zoarces viviparus **2** : 108; **3** : 124; **5** : 207.
Xiphias sp. [**9** : 160].

AMPHIBIA.

Bufo vulgaris **3** : [20], [131]; **5** : 206; [**20** : 12—13].
Rana arvalis **3** : 20; **11** : 265.

Rana esculenta **17** : 23.
— r i d i b u n d a **17** : 23—24, 336.
— temporaria **1** : 143 (larv. monstr.); **3** : [20], 21, [131]; **5** : 206; [**20** : 12—13].
— sp. **5** : 206; **7** : 236.
Triton cristatus **5** : 206; **9** : 234.
— vulgaris **5** : 206.

REPTILIA.

Anguis fragilis **3** : 124; **5** : 206; [**10** : 98].
Lacerta agilis **20** : 2.
— vivipara **1** : 143; **3** : 124; **5** : 206; **9** : 234; [**20** : 13].
Pelias berus **3** : 124; **4** : 285; **5** : 206; [**6** : 78]; **10** : 98.
Tropidonotus natrix **2** : 108; **4** : 285; **5** : 206; [**10** : 98]; [**20** : 12—13].
Vipera berus [**20** : 12—13].

AVES.

Acanthis flavirostris **2** : 31, 106.
— linaria **2** : 32; **7** : 282; **11** : 173; **16** : 33.
— spinus **7** : 282.
Accipiter gentilis **2** : 107; **3** : 122; **4** : 47, 283; **5** : 127, 204; **6** : 10, 14; **7** : 13; **8** : 104, 112; **10** : 356, 357, 358; **11** : 62; **12** : 78, 87; **13** : 56, 67; **14** : 74, 82; **15** : 144, 155; **17** : 243, 253.
— — buteoides **13** : 165.
— nisus **1** : 143; **2** : 107; **3** : 122; **4** : [45], 46, [47], 283; **5** : 127, 204; **6** : 10, 14; **7** : 9, 283; **8** : 104, 112; **9** : 36; **10** : 102, 111, 356, 357, 360; **11** : 62; **12** : 78, 87; **13** : 56, 67; **14** : 74, 83; **15** : 144, 155; **17** : 243, 254.
Acrocephalus schoenobaenus **5** : 127; **7** : 8; **8** : 104; **12** : 78; **13** : 56; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
— s c i r p a c e u s **6** : 225; **14** : 165;[1] **17** : 336.
Aegithalos (-lus) caudatus **2** : 106; **3** : 4, 131; **4** : 282; **5** : 204; **7** : 281; **8** : 104, 318; **10** : 102; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
Aegolius funereus **8** : 104, 111; **9** : 36; **10** : 356; **11** : 62; **12** : 78; **13** : 56, 65; **14** : 74, 81; **15** : 144; **17** : 252.
— tengmalmi **1** : 143; **2** : 107; **5** : 127, 204; **7** : 9.
Alauda arvensis **1** : 142; **2** : 106; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 126, 203; **6** : 10; **7** : 8, 236, 282; **9** : 35; **10** : 102, 216, 355, 357; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143.
Alca torda **1** : 143; **4** : 285; **5** : 206; **6** : 11, 24; **8** : 105, 189; **9** : 27, 36, 66; **10** : 103, 134; **11** : 62, 94; **12** : 79, 105; **13** : 56, 86, 118; **14** : 74; **15** : 144, 173, 226; **17** : 243.

[1] Per errorem scirpaeus.

Alcedo atthis ispida **2** : 44, 107, 112; **4** : 98, 283; **13** : 48.
Ampelis garrulus **4** : [184—185], 283; **7** : 282.
Anas acuta **2** : 107; **4** : 284; **5** : 205; **7** : 9, 14; **8** : 104; **10** : 217; **11** : 62, 72; **12** : 78; **14** : 74, 84; **15** : 144.
— boschas **1** : 68; **7** : 52, 283; **8** : 189.
— — var. color. **18** : 109.
— crecca **3** : 123; **4** : 285; **5** : 127, 205; **6** : 10, 15; **7** : 9, 14; **8** : 104, 114; **9** : 36; **10** : 102, 114; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
— domestica [**10** : 43].
— penelope **1** : 143; **4** : 285; **5** : 127; **6** : 10; **7** : 9; **10** : 102; **15** : 144; **17** : 255.
— platyrhyncha **1** : 143; **4** : 30, 285; **5** : 127, 205; **6** : 10, 14; **7** : 9, 14; **8** : 104, 113; **9** : 36, 42; **10** : 102, 113, 217; **11** : 62, 72; **12** : 78, 87; **13** : 56, 68; **14** : 74, 84; **15** : 144, 156; **17** : 240, 243, 254.
— — aberr. **2** : 107.
— querquedula **2** : 107; **10** : 115, 470.
— strepera **2** : 107; **4** : 62.
— sp. **11** : 62; **12** : 78; **15** : 144.
Anser anser **4** : 284; **8** : 192; **14** : 74, 84; **15** : 227; **17** : 243.
— c o e r u l e s c e n s **4** : 152.
— domesticus [**10** : 43].
— erythropus **2** : 33; **4** : 284; **5** : 205; **8** : 371; **11** : 265.
— fabalis **2** : 58; **5** : 205; **14** : 74.
— hyperboreus **4** : 152.
— sp. [**2** : 40]; **4** : 43; **7** : 236, 283.
Anthus cervinus **4** : 282;[1] **5** : 203; **6** : 10.
— litoralis **1** : 142.
— pratensis **3** : 121; **4** : 46, 47, 282; **5** : 126, 203; **6** : 10; **7** : 8; **8** : 104; **9** : 35; **10** : 102, 216, 355, 356, 357, 361; **11** : 61; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
— richardii **1** : 110.
— rufogularis **7** : 317; **8** : 104; **9** : 35; **15** : 143.
— spinoletta **10** : 355, 356, 357.
— — litoralis **2** : 106; **4** : 282; **6** : 10; **8** : 104; **9** : 35; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55, 61; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
— trivialis **1** : 142; **2** : 106; **4** : 47, 282; **5** : 126, 203; **6** : 10; **7** : 8, 282; **8** : 104, 108; **9** : 35; **10** : 102, 216; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242, 247.
— — var. color. **9** : 233.
— sp. **6** : 10; **9** : 35; **11** : 61; **15** : 143; **17** : 242.
Apus apus **1** : 143; **5** : 127, 204; **6** : 10; **7** : 8, 283; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 102, 357; **11** : 62; **12** : 78, 85; **13** : 56, 65; **14** : 74; **15** : 144.
Aquila chrysaëtus (-tos) **1** : 69, 143, 152; **3** : 122; **4** : 284; **5** : 204; **10** : 102; **12** : 207.
— clanga **3** : 122.

[1] Deleatur; vide **4** : 338.

Ardea cinerea **8** : 193; **12** : 247.
Arenaria interpres **1** : 143; **2** : 32; **5** : 205; **6** : 10; **7** : 9, 52; **8** : 104, 189; **9** : 36, 44; **10** : 102, 115, 470; **11** : 62, 75; **12** : 79, 89; **13** : 56, 69; **14** : 74, 86; **15** : 144, 158; **17** : 243, 256.
Asio accipitrinus **1** : 69, 152.
— flammeus **3** : 122; **4** : 284; **5** : 204; **7** : 9; **8** : 104, 111; **9** : 36; **11** : 62; **13** : 56; **14** : 74, 81; **17** : 243.
— otus **1** : 143; **2** : 107; **3** : 122; **4** : 284; **5** : 127, 204; **6** : 10; **7** : 8; **10** : 102, 110; **11** : 62; **12** : 78; **13** : 56, 65; **14** : 74; **15** : 144, 153; **17** : 243, 252.
Astur gentilis **1** : 143.
— palumbarius **7** : 51, 283.
Bombycilla garrulus **2** : 106; **5** : 126, 204; **6** : 10; **10** : 102; **14** : 73; **15** : 143, 150; **17** : 231.
Botaurus stellaris **3** : 123; **6** : 225; **13** : 165; **14** : 74; **17** : 336.
Branta bernicla **3** : 123; **8** : 371; **10** : 217; **12** : 247.
— leucopsis **2** : 58; **10** : 470.
— ruficollis **2** : 59.
Bubo bubo **1** : 69, 143; **2** : 107; **3** : 122; **4** : 284; **5** : 204; **6** : 10; **7** : 8, 52; **8** : 104, 192; **10** : 102, 356, 357, 360; **12** : 78; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144, 153; **17** : 243, 252.
Bucephala clangula **3** : 123; **4** : 285; **5** : 127; **6** : 10; **7** : 9; **8** : 104; **10** : 102; **11** : 62; **13** : 56, 69; **14** : 74; **15** : 144, 157; **17** : 243, 255.
Buteo buteo **1** : 69; **5** : 204; **7** : 53, 283; **10** : 356, 361; **11** : 71.
— intermedius **1** : 143.
— lagopus **3** : 122; **4** : 284; **5** : 204; **7** : 9, 13; **9** : 36; **11** : 172; **12** : 78, 86; **16** : 24, [27].
— vulpinus intermedius **6** : 10, 14; **7** : 9, 317; **9** : 36, 42; **10** : 102; **11** : 62, 70, 71; **12** : 78, 87; **13** : 55, 67; **14** : 74. 82; **15** : 144; **17** : 243, 253.
— sp. **6** : 10; **8** : 104; **9** : 36.
Calandrella brachydactyla **7** : 317.
Calcarius lapponicus **4** : 282; **5** : 203; **6** : 10; **9** : 35; **11** : 61; **14** : 73; **16** : 24; **17** : 242.
Calidris alpina **1** : 143; **2** : 107; **4** : 284; **5** : 205; **6** : 10; **10** : 103, 218, 470; **11** : 62.
— — alpina **1** : 108; **3** : 123.
— — pusilla **3** : 123.
— — schinzii **1** : 108—109, 148; **3** : 123.
— canutus **2** : 32; **3** : 123; **5** : 205; **7** : 317; **12** : 248.
— ferruginea **2** : 107; **3** : 123; **4** : 284; **7** : 317.
— maritima **4** : 42, 284; **5** : 205; **8** : 371; [**16** : 43].
— minuta **1** : 143; **2** : 107; **3** : 123; **4** : 284; **5** : 205; **7** : 317.
— temminckii **1** : 143; **3** : 123; **4** : 284; **5** : 205; **7** : 9; **8** : 104.
Calidris testacea **7** : 317.
Capella gallinago **3** : 123; **5** : 127, 205; **6** : 10; **9** : 36, 45; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
— media **3** : 123; **7** : 317; **8** : 371; **10** : 470; **17** : 243.
Caprimulgus europaeus **2** : 59; **5** : 127; **7** : 283; **8** : 192; **11** : 62; **17** : 243.
Carduelis cannabina **2** : 106; **5** : 126; **6** : 10; **10** : 102, 216; **11** : 61; **12** : 78; **14** : 73; **15** : 143.
— carduelis **4** : 283; **8** : 371; **10** : 469; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143.
— flammea exilipes **11** : 264.
— flavirostris **5** : 203; **8** : 371.
— hornemanni exilipes **9** : 233; **10** : 102; **13** : 55; **14** : 73.
— linaria holboellii **8** : 103; **10** : 102; **11** : 61; **17** : 242.
— — linaria **2** : 106; **4** : 283; **5** : 126, 203; **6** : 10; **8** : 103; **9** : 35, 39; **10** : 102; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143; **16** : 24; **17** : 230, 242.
— spinus **1** : 142; **3** : 122; **4** : 47; **5** : 126, 203; **6** : 10; **8** : 103; **10** : 102, 105; **11** : 61; **12** : 78; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
Carpodacus erythrinus **5** : 203; **6** : 10; **7** : 8, 316; **8** : 103, 317; **9** : 35; **10** : 102; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143.
Cepphus grylle **8** : 189.
Cerchneis tinnunculus **7** : 283.
Certhia familiaris **1** : 142; **2** : 106; **4** : 282; **5** : 126, 204; **7** : 8, 282; **8** : 104; **9** : 15, 39; **10** : 102, 355, 356; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242, 247.
Chaetura caudacuta **10** : 470.
Charadrius apricarius **2** : 59, 107; **3** : 122; **4** : 284; **5** : 205; [**16** : 24].
— — altifrons **7** : 317.
— dubius **5** : 127; **9** : 36.
— — curonicus **2** : 107; **3** : 123; **4** : 284; **5** : 205; **6** : 10; **7** : 9; **13** : 56; **14** : 74, 86; **15** : 144; **17** : 243.
— hiaticula **1** : 143; **2** : 107; **3** : 122; **4** : 284; **5** : 205; **6** : 10; **7** : 9; **8** : 104, 115; **10** : 102, 218; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144, 148; **17** : 243.
— — tundrae **3** : 122; **4** : 284; **5** : 205; **7** : 9.
— morinellus **2** : 107; **5** : 205; **7** : 317; **12** : 79; [**16** : 24].
Chelidonaria urbica **7** : 282.
Chloris chloris **2** : 106; **3** : 122; **4** : 47; **5** : 126; **6** : 10; **7** : 8, 11, 52, 282; **8** : 103; **11** : 61; **12** : 78, 82; **13** : 55; **14** : 73, 78; **15** : 143; **17** : 242.
Ciconia ciconia **3** : 17—18, 131; **3** : 123.
Cinclus cinclus **2** : 106; **3** : 131; **7** : 281; **17** : 231.
Circaëtus gallicus **9** : 233.
Circus aeruginosus **1** : 143; **2** : 33, 112; **5** :

204; **6** : 225; **7** : 52; **9** : 233; **11** : 264; **17** : 336.
Circus cyaneus **1** : 143; **3** : 122; **4** : 283; **5** : 111, 204; **7** : 283; **8** : 371; **12** : 78; **14** : 165; **15** : 144.
— macrourus **2** : 107; **8** : 371; **13** : 165.
Clangula glaucion **7** : 52.
— hyemalis **1** : 143; **2** : 107; **4** : 285; **5** : 205; **12** : 79; [**16** : 43].
Coccothraustes coccothraustes **4** : 177.
Colaeus monedula **2** : 106; **5** : 126, 203; **7** : 52, 53, 282; **8** : 103, 106; **9** : 35, 38; **10** : 102, 104, 355, 356; **11** : 61, 64; **12** : 78; **14** : 73, 77; **17** : 242.
Columba livia domestica **2** : 107; **3** : 122; **6** : 10; **7** : 53; **10** : 102, 357; **11** : 62; **12** : 79, 89; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243, 256.
— oenas **1** : 143; **3** : 122; **5** : 127; **7** : 9, 283; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 102, 356, 357; **11** : 62; **13** : 56; **14** : 74, 86; **15** : 144, 158; **17** : 243, 256.
— palumbus **5** : 127; **6** : 10; **7** : 9, 14, 283; **8** : 104; **9** : 36, 44; **10** : 102, 115; **11** : 62; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74, 85; **15** : 144, 157; **17** : 243.
— sp. **4** : [43], 47; **15** : 144.
Colymbus adamsii **9** : 234; **12** : 248; **13** : 165; **17** : 336.
— arcticus **4** : 285; **5** : 127, 205; **6** : 10; **7** : 9, 51; **8** : 104; **9** : 36; **11** : 62; **13** : 56; **17** : 243.
— stellatus **1** : 143; **2** : 107; **4** : 285; **5** : 127, 205; **15** : 144.
Coracias garrulus **3** : 122; **6** : 4, 225; **8** : 193—194; **12** : 247; **19** : 299.
Corvus corax **1** : 142; **2** : 106; **3** : 122; **4** : 283; **11** : 61; **13** : 55; **14** : 73, 75; **15** : 143; **16** : 24, [27]; **17** : 230, 242, 244.
— cornix **1** : 68, 69, 152; **3** : 122; **4** : 46, 47, 283; **5** : 126, 203; **7** : 8, 9, 236, 282; **8** : 100, 103, 105; **9** : 33, 35, 37; **10** : 102, 103, 216, 355, 356, 358, 359; **11** : [50], 59, 61, 63; **12** : 75, 78, 79; **13** : 53, 55, 57; **14** : 73, 75; **15** : 141, 143, 145—147; **17** : 230, 242, 244.
— — var. color **2** : 106.
— frugilegus **7** : 282; **9** : 35.
Coturnix coturnix **6** : 36; **15** : 269.
Cractes infaustus **11** : 264; **12** : 247; **17** : 230.
Crex crex **1** : 143; **2** : 107; **3** : 122; **5** : 127; **7** : 283; **10** : 103; **11** : 62.
Crocethia alba **2** : 107; **3** : 123; **4** : 284; **5** : 205; **9** : 234.
Cuculus canorus **1** : 143; **5** : 127, 204; **6** : 10; **7** : 8, 236, 282; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 217; **11** : 62; **12** : 78; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
Cygnus cygnus **3** : 123; **7** : 9, 283; **17** : 231.
— musicus [**2** : 58]; [**5** : 107—108]; [**6** : 114].
— olor **5** : 205.
Cypselus apus **2** : 107.
Delichon urbica **2** : 107; **4** : 283; **5** : 127, 204; **6** : 10, 13; **7** : 8; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 102, 217, 356, 357, 363; **11** : 62; **12** : 78, 85; **13** : 56, 65; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 242.
Dendrocopus major **2** : 107; **7** : 282.
— minor **7** : 283; **13** : 56.
Dryobates leucotos **5** : 204; **13** : 56.
— major **3** : 122; **4** : 283; **5** : 127, 204; **6** : 10; **7** : [4], 4, 8, 13; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 102, 109, 356; **11** : 62; **12** : 78; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
— minor **3** : 122; **4** : 283; **5** : 127, 204; **7** : 8; **8** : 104; **12** : 78; **15** : 144; **17** : 243.
Dryocopus martius **2** : 107; **3** : 122; **4** : 283; **5** : 127, 211; **7** : 53, 283; **8** : 104; **9** : 36, 41; **10** : 102, 356; **11** : 62; **12** : 78; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 230, 243, 251.
Emberiza citrinella **1** : 69, 70, 152; **2** : 106; **3** : 122; **4** : 47, 283; **5** : 126, 203; **6** : 10; **7** : 8, 282; **8** : 103; **9** : 35, 39; **10** : 102, 216; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55, 60; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
— hortulana **3** : 122; **5** : 126, 203; **7** : 282; **10** : 102, 356; **12** : 78; **13** : 55, 61.
— p u s i l l a **1** : 110; **12** : 46.
— rustica **4** : 283; **8** : 104, 317; **2** : 233; **10** : 469; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55.
— schoeniclus **2** : 106; **4** : 283; **5** : 126; **6** : 10; **8** : 104; **9** : 35; **10** : 102, 106; **11** : 61; **12** : 78; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
Eniconetta stelleri **12** : 247; **13** : 165.
Eremophila alpestris flava **2** : 106; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 103; **9** : 35.
Erithacus rubecula **1** : 110, 142; **2** : 106; **3** : 121; **5** : 127, 204; **7** : 8, 281; **8** : 100, 104, 110; **9** : 36, 41; **10** : 99, 102, 108, 355, 356, 357; **11** : 62; **12** : 75, 78; **13** : 56; **14** : [3], 71, 74, 80; **15** : 144, 153; **17** : 242.
Erolia m i n u t i l l a **11** : 188—189.
Erythrina erythrina **17** : 242.
Falco columbarius **5** : 127.
— — aesalon **2** : 107; **3** : 122; **4** : 283; **6** : 10; **7** : 53; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 102, 110; **11** : 62, 70; **13** : 66; **14** : 74; **15** : 144; **16** : 24; **17** : 243, 253.
— lagopus **7** : 52.
— peregrinus **4** : 283; **5** : 204; **6** : 10, 13; **7** : 9; **8** : 104, 111; **9** : 36; **10** : 102, 110, 356, 357, 360; **11** : 62, 70; **12** : 78, 86; **13** : 56, 66; **14** : 74, 81; **15** : 144, 154; **17** : 243, 252.
— rusticolus **2** : 107; **9** : 233; **10** : 470; **17** : 336.
— subbuteo **3** : 122; **4** : 283; **5** : 127, 204; **6** : 10, 78; **10** : 102, 217; **11** : 62, 70; **12** : 78; **13** : 56, 66; **14** : 74, 82; **15** : 144; **17** : 243.
— tinnunculus **5** : 127; **6** : 10, 14; **7** : 9; **8** : 104, 112; **9** : 36; **10** : 102, 111, 217,

356, 358, 359, 360; **11** : 62; **12** : 78, 86; **13** : 56, 67; **14** : 74, 82; **15** : 144, 154; **17** : 243, 253.
Falco vespertinus **2** : 107; **5** : 127; **9** : 233.
— sp. **4** : [43], 47.
Ficedula hippolais **7** : 281.
Fratercula arctica **2** : 108;[1] **5** : 206; **6** : 11; **8** : 105; **11** : 62; **12** : 248; **14** : 74; [**16** : 43]; **17** : 240, 243.
Fringilla coelebs **1** : 70, 152; **2** : 106; **3** : 122; **4** : 47, 283; **5** : 126, 203; **6** : 10; **7** : [4, 5], 8, 52, 236, 282; **8** : 103, 107; **9** : 33, 35; **10** : 99, 102, 105, 216, 355, 356, 357; **11** : 61, 65; **12** : 75, 78, 82; **13** : 53, 55, 60, [101]; **14** : 71, 73, 78; **15** : 141, 143, 148; **17** : 240, 242, 246.
— — var. color. **5** : 203.
— montifringilla **1** : 142; **2** : 106; **3** : 122; **4** : 47, 283; **5** : 126, 203; **7** : 4, [5]; **8** : 103, 317; **10** : 99, 102, 106; **11** : 61, 173; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73, 78; **15** : 143, 148; **16** : 33; **17** : 242.
— sp. **4** : 47.
Fulica atra **2** : 107; **3** : 122; **4** : 284; **5** : 110, 206; **6** : 11, 25; **7** : 9, 283; **8** : 105, 192; **9** : 36; **11** : 265; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243, 275.
Fuligula fuligula **8** : 189, 192.
Gallinago gallinago **7** : 283.
Gallinula chloropus **1** : 141, 143, 148; **5** : 206; **8** : 372; **9** : 234; **11** : 265; **13** : 56.
Gallus (bankiva) domestica **5** : 206; **7** : 53; [**9** : 191—193]; [**10** : 42—46].
Garrulus glandarius **4** : 283; **5** : 126, 203; **6** : 10; **7** : 282; **8** : 103; **9** : 35; **10** : 102; **12** : 78, 81; **13** : 55, 59; **14** : 73; **15** : 143, 147; **17** : 242.
Gavia adamsi **14** : 165.
Glaucidium passerinum **1** : 68, 152; **10** : 102.
Grus grus **1** : 69, 152; **3** : 122; **7** : 53, 236, 283; **12** : 79; **15** : 197.
Gyps fulvus **14** : 165.
Haematopus ostralegus **1** : 143; **2** : 59; **3** : 123; **4** : 284; **5** : 127, 206; **6** : 10, 15; **7** : 9, 51; **8** : 104, 189; **9** : 36, 44; **10** : 102, 218; **11** : 62; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74, 86; **15** : 144; **17** : 243, 257.
Haliaëtus albicilla **3** : 122; **6** : 10; **7** : 9, 13, 317; **8** : 104, 113, 192; **10** : 356, 357, 358, 360; **11** : 62, 71; **12** : 247; **13** : 56; **14** : 74, 83; **15** : 144, 156.
Harelda hiemalis [**2** : 58]; **8** : 189.
Hippolais icterina **2** : 106; **5** : 127; **6** : 10; **7** : 8; **8** : 104; **10** : 217; **11** : 61; **12** : 78; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.
Hirundo rustica **3** : 122; **4** : 46, 47, 283; **5** : 127; **6** : 10, 13; **7** : 8, 52, 282; **8** : 104; **9** : 33, 36, 41; **10** : 102, 109, 217, 355, 356, 357; **11** : 59, 62; **12** : 78; **13** : 53, 56, 65; **14** : 71, 74; **15** : 141, 144, 153; **17** : 239, 242, 251.
Hirundo rustica var. color. **2** : 106.
— sp. **7** : 236.
Hydrochelidon nigra **3** : 123.
Hydroprogne caspia **6** : 10; **7** : 9; **8** : 104, 115; **9** : 36, 65; **10** : 103, 116; **11** : 62, 75; **12** : 79, 89; **13** : 56; **14** : 74, 87; **15** : 144, 159; **17** : 243, 258.
Iynx torquilla **5** : 127; **6** : 10; **7** : 8; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 102, 217; **11** : 62; **12** : 78, 85; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
Lagopus albus **3** : 5; **11** : 50.
— lagopus **1** : 70, 152; **4** : 29—30, 284; **5** : 127, 206; **7** : 9, 53; **9** : 36; **11** : 173; **14** : 74; **16** : 24, [26], 33; **17** : 230, [231].
— — × Lyrurus tetrix **3** : 122.
— mutus **7** : 9; **11** : 173; **14** : 44; **16** : 23, 24, 33; **17** : 230.
Lanius colluris **5** : 126; **6** : 10; **7** : 8, 281; **8** : 104; **9** : 35; **10** : 102, 355, 356, 357; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55, 62; **14** : 73, 79; **15** : 143, 150; **17** : 240, 242, 248.
— excubitor **1** : 70, 142, 152; **2** : 106; **3** : 122; **4** : 283; **5** : 204; **6** : 225; **7** : 281, 317; **8** : 104; **10** : 102; **12** : 78.
— serrator **14** : 165.
Larus argentatus **1** : 70; **3** : 123; **4** : 285; **5** : 206; **6** : 11, 16; **7** : 9, 15, 52; **8** : 105, 132; **9** : 33, 36, 60, 197, 214; **10** : 103, 132; **11** : 62, 90, 93; **12** : 79, 103, 105; **13** : 53, 56, 84; **14** : 71, 74, 103, 106; **15** : 141, 144, 171—172; **17** : 240, 243, 270—272.
— canus **1** : 70, 149, 152; **2** : 59, 107; **3** : 123; **4** : 285; **5** : 127, 206; **6** : 11, 17—20; **7** : 9, 16, 52, 284; **8** : 100, 105, 128—132; **9** : 33, 36, 57—60; **10** : 103, 129—132, 219; **11** : 59, 62, 89; **12** : 75, 79, 102; **13** : 53, 56, 82; **14** : 71, 74, 100—103 (mp.), 105; **15** : 141, 144, 169—171, 226; **17** : 239, 243, 268—270.
— fuscus **2** : 59, 107; **3** : 123; **5** : 127, 206; **6** : 11, 17, 20; **7** : 9, 15, 52, 284; **8** : 100, 105, 133; **9** : 33, 36, 62; **10** : 99, 103, 132, 356; **11** : 59, 62, 92; **12** : 75, 79, 104; **13** : 53, 56, 85; **14** : 71, 74, 104, 105; **15** : 141, 144, 173, 226; **17** : 239, 243, 273.
— glaucus **7** : 52; **9** : 197, 214.
— hyperboreus **1** : 143; **2** : 107.
— leucopterus **7** : 317.
— marinus **1** : 143; **2** : 59; **5** : 206; **6** : 11, 16; **7** : 9, 15, 52; **8** : 105, 132, 134; **9** : 36, 63, 197, 214; **10** : 103, 134; **11** : 62, 91, 92, 93; **12** : 79, 105; **13** : 56, 86; **14** : 74, 105, 106; **15** : 144, 173; **17** : 243, 274.
— minutus **2** : 59; **3** : 40—43 (mp.), 130, 131; **5** : 110; **9** : 36; **10** : 103; **11** : 62; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74, 90; **15** : 144; **17** : 243, 336.
— ridibundus **2** : 59; **3** : 40, 41, 43, 123;

[1] Recte Alca torda; vide **4** : 338.

5 : 206; **6** : 11, 21—24; **7** : 9, 17—26, 284; **8** : 100, 105, 117—128, 318; **9** : 33, 36, 45—57; **10** : 99, 103, 117—129; **11** : 59, 62, 63, 76—89 (mp.); **12** : 75, 79, 90—102 (mp.); **13** : 53, 56, 73—82 (mp.); **14** : 71, 74, 90—100 (mp.); **15** : 140, 144, 160—169 (mp.); **17** : [191], 239, 243, 259—268 (mp.); **20** : 6.

Larus sp. **5** : 206; **6** : 11; **8** : 105, 189; **9** : 36; **10** : 103; **11** : 62; **12** : 79, 176.

Lestris parasitica **2** : 59.

Limicola falcinellus **2** : 32; **3** : 123; **5** : 205.

Limosa lapponica **3** : 123; **4** : 284; **5** : 205; **7** : 317; **8** : 104; **11** : 265.

Locustella naevia **5** : 127.

Loxia bifasciata **8** : 192.

— curvirostra **1** : 142; **2** : 106; **4** : 283; **5** : 126, 203; **8** : 103; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143.

— leucoptera bifasciata **7** : 317; **8** : 103, 371.

— pityopsittacus **1** : 70, 152; **3** : 122; **4** : 283; **5** : 203; **7** : 282.

— sp. **4** : 47; **7** : 8.

Lullula arborea **2** : 106; **3** : 121; **10** : 102; **12** : 78, 83; **14** : 73.

Luscinia luscinia **4** : 282; **5** : 127, 204; **10** : 217.

— philomela [**9** : 28].

— suecica **2** : 106; **4** : 282; **8** : 104; **10** : 102; **16** : 24; **17** : 242.

Lymnocryptes minimus **1** : 143; **2** : 107; **3** : 123; **7** : 317.

Lyrurus tetrix **1** : 143; **3** : 122; **5** : 127, 206; **6** : 11; **7** : 283; **8** : 105; **9** : 36; **10** : 103, 137, 219; **11** : 62; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **16** : 23; **17** : [231], 243.

— — aberr. **4** : 284; **5** : 206.

— — var. color. **4** : 284.

— — × Tetrao urogallus **2** : 107; **5** : 206; **17** : 336.

Machetes pugnax **1** : 6, 152; **7** : 53.

Megalornis grus grus **4** : 43; **5** : 127; **7** : 9.

Meleagris gallopavo [**10** : 43].

Mergus albellus **1** : 143; **2** : 33, 112; **3** : 123; **4** : 285; **5** : 205; **7** : 317; **10** : 470; **12** : 247; **13** : 165.

— merganser **1** : 68, 152; **2** : 59; **4** : 285; **6** : 10, 15; **7** : 9, 14, 52, 53; **8** : 189; **10** : 102, 218, 356; **12** : 79, 176; **14** : 74; **15** : 197; **17** : 243.

— serrator **2** : 107; **3** : 123; **4** : 285; **5** : 205; **6** : 10; **7** : 9, 53; **8** : 189; **10** : 102, 218; **11** : 62; **12** : 79, 88, 176; **13** : 56; **14** : 74; **17** : 243.

— sp. **6** : 10; **7** : 9; **9** : 36; **11** : 62.

Micropus apus **17** : 243, 251.

Milvus migrans **12** : 247; **13** : 165.

Morus bassanus **15** : 269.

Motacilla alba **2** : 106; **3** : 121; **4** : 46, 47, 282; **5** : 126, 203; **6** : 10; **7** : 8, 11, 52, 236, 282; **8** : 104; **9** : 35, 39; **10** : 102, 216, 355, 356, 357; **11** : 59, 61, 66; **12** : 75, 78; **13** : 53, 55; **14** : 71, 73, 78; **15** : 141, 143, 149; **17** : 240, 242.

Motacilla flava **4** : 282; **5** : 126; **6** : 10; **7** : 8, 282; **8** : 104; **9** : 35; **10** : 102, 216; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 55; **14** : 73; **15** : 143; **17** : 242.

— — borealis **4** : 282.

— — thunbergi **5** : 203.

Muscicapa atricapilla **5** : 126; **7** : 281; **10** : 355, 356.

— colchica **1** : 109.

— ficedula **7** : 281.

— hypoleuca **4** : 283; **5** : 204; **6** : 10; **7** : 8; **8** : 104; **9** : 35; **10** : 102; **11** : 61, 67; **12** : 75, 78; **13** : 55; **14** : 71, 73; **15** : 141, 143, 150; **17** : 239, 242; **20** : 10.

— parva albicilla **1** : 109.

— — hyperythra **1** : 109.

— — parva **1** : 109—110, 142, 148; **5** : 73—75; **6** : 4, 225; **8** : 104, 371; **9** : 233; **10** : 102, 469; **11** : 61; **12** : 78; **13** : 165; **15** : 143.

— striata **3** : 122; **5** : 126, 204; **6** : 10; **7** : 8, 12; **8** : 104, 108; **9** : 33, 35; **10** : 99, 102, 217, 355, 356, 357; **11** : 59, 61, 67; **12** : 75, 78, 247; **13** : 53, 55; **14** : 71, 73, 79; **15** : 140, 143, 150; **17** : 240, 242, 248.

Nucifraga caryocatactes **1** : 70, 142, 152; [**2** : 59]; **5** : 203; **6** : 14; **8** : 192; **10** : 469; **15** : 269; [**17** : 206].

— — macrorhynchus **6** : 225; **8** : 371; **10** : 469; **12** : 247; **13** : 55.

Numenius arquatus (arcuatus) **1** : 143; **2** : 107; **4** : 284; **5** : 127; **6** : 10; **7** : 9, 52, 236, 283; **8** : 104, 115; **9** : 36; **10** : 103, 116, 218; **11** : 62; **12** : 79, 89; **13** : 56; **14** : 74, 87; **15** : 144, 158; **17** : 243, 257.

— phoeopus **1** : 143; **4** : 284; **5** : 205; **6** : 225; **8** : 104; **16** : 24.

Nyctea nyctea **3** : 122; **4** : 284; **5** : 127, 204; **7** : 52; **8** : 104; **9** : 42; **11** : 62, 69, 264; **12** : 247.

— scandiaca **3** : [19—20], 131.

Nyctala sp. **10** : 358, 361.

Nyroca ferina **4** : 285; **5** : 127; **6** : 10; **8** : 318; **11** : 62, 73; **14** : 74?

— fuligula **1** : 143; [**2** : 59]; **3** : 123; **4** : 285; **5** : 127; **6** : 10; **7** : 9; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 102, 217, 470; **11** : 62, 73; **12** : 78, 88; **13** : 56, 68; **14** : 74, 85; **15** : 144, 157; **17** : 243.

— marila **4** : 285; **5** : 205; **6** : 10, 225; **11** : 62; **12** : 78; **13** : 56.

— sp. **11** : 62.

Oenanthe oenanthe **4** : 282; **6** : 10; **7** : 8; **8** : 104; **9** : 36, 41; **10** : 102, 108, 217, 355, 356; **11** : 62; **12** : 78, 84; **13** : 56, 65; **14** : 73; **15** : 144, 152; **16** : 24; **17** : 242.

Oidemia fusca **1** : 68; **2** : 59; **4** : 285; **6** : 10; **8** : 189; **10** : 217, 218; **11** : 62; **12** : 79, 88; **13** : 56; **14** : 74, 85; **15** : 144; **17** : 243.

Oidemia nigra [2 : 59]; 4 : 285; 9 : 36; 13 : 56.
— sp. 7 : 9.
Oriolus oriolus 5 : 126; 6 : 10; 7 : 316; 14 : 73.
Ortygometra porzana 2 : 59.
Otis tarda 19 : 299.
Pandion haliaëtus 1 : 68, 152; 3 : 122; 4 : 284; 5 : 205; 8 : 104, 318; 9 : 36; 10 : 102, 112, 217; 11 : 62; 12 : 78; 14 : 74; 15 : 144.
Parus ater 2 : 106; 5 : 126, 204; 6 : 10; 7 : 8, 282; 8 : 104; 9 : 35; 10 : 102, 355, 356; 11 : 61; 12 : 78, 83; 13 : 55, 62; 14 : 73, 79; 15 : 143; 17 : 242, 248.
— atricapillus 5 : 126.
— — borealis 2 : 106; 3 : 121; 4 : 282; 6 : 10, 12; 7 : 8; 8 : 104; 9 : 35; 10 : 102; 11 : 61; 12 : 78, 83; 13 : 55; 14 : 73; 15 : 143; 17 : 242, 248.
— borealis 7 : 282; 10 : 355, 356,
— cinctus 4 : 282; 5 : 204; 6 : 225; 9 : 35; 10 : 102; 16 : 23, [24]; 17 : 230.
— coeruleus 5 : 204; 6 : 10, 12; 7 : 8; 8 : 104, 318; 9 : 35; 10 : 102, 107; 11 : 61, 264; 12 : 78, 83, 247; 13 : 55; 14 : 73; 15 : 143, 269; 17 : 242.
— cristatus 2 : 106; 3 : 44; 5 : 126, 204; 6 : 10; 7 : 8, 282; 8 : 104; 10 : 102; 11 : 61; 12 : 78; 13 : 55; 14 : 73; 15 : 143; 17 : 242, 248.
— major 2 : 106; 3 : 121; 4 : 282; 5 : 126; 6 : 10, 12; 7 : 8, 11, 282; 8 : 100, 104, 108; 9 : 33, 35, 39; 10 : 99, 102, 107, 355, 356; 11 : 59, 61, 66; 12 : 75, 78, 83; 13 : 53, 55, 61; 14 : 73, 78; 15 : 140, 143, 149; 17 : 139, 242, 247.
— sp. 7 : 8; 10 : 355, 356; 15 : 143.
Passer domesticus 1 : 142; 2 : 106; 5 : 126; 6 : 10; 7 : 8, 11, 52, 282; 8 : 103, 107; 9 : 35; 10 : 102, 216, 355, 356, 357; 11 : 61, 66; 12 : 78, 82; 13 : 55; 14 : 73; 15 : 143, 149; 17 : 242, 247.
— — aberr. 5 : 203.
— — f. flavescens 4 : 283.
— — var. color. 11 : 264.
— montanus 11 : 61.
Passerina nivalis 7 : 282.
Pelecanus onocrotalus 4 : 285.
Perdix perdix 1 : 143; 2 : 107; 4 : 284; 5 : 127; 7 : 283; 8 : 105, 136; [9 : 205, 223]; 11 : 62, 96; 12 : 79; 13 : 56; 14 : 74; 15 : 144.
— — robusta 7 : 9.
Perisoreus infaustus 3 : 122; 5 : 203.
Pernis apivorus 4 : 46, 284; 6 : 10; 7 : 13, 283; 8 : 104, 113; 9 : 36; 10 : 112; 11 : 62, 71; 12 : 78; 13 : 56; 14 : 74; 15 : 144, 156; 17 : 243.
Phalacrocorax carbo 1 : 143; 2 : 59, 107; 4 : 285; 5 : 127, 205; 7 : 9, 51, 317; 8 : 104, 193; 9 : 36, 44, 233; 10 : 470; 12 : 248.
— perspicillatus 11 : 191.
Phalaropus lobatus 1 : 143; 2 : 32, 107; 4 : 284; 5 : 205; 6 : 225; 10 : 218; 11 : 265; 12 : 79; 14 : 74.
Phasianus colchicus 8 : 105.
— — × Ph. c. torquatus 5 : 206; 12 : 79.
— sp. 2 : 107; [9 : 205, 223].
Philomachus pugnax 1 : 143; 2 : 107; 3 : 123; 4 : 284; 5 : 205; 14 : 74; 15 : 144.
Phoenicurus ochrurus gibraltarensis 6 : 225.
— phoenicurus 1 : 142; 5 : 127; 6 : 10; 7 : 8, 12, 281; 8 : 100, 104, 110; 9 : 36; 10 : 99, 102, 106, 108, 355, 356; 11 : 62, 69; 12 : 75, 78; 13 : 53, 56; 14 : 71, 74; 15 : 144, 153; 17 : 240, 242, 251.
Phyllopseustes collybita abietinus 7 : 281.
— sibilatrix 7 : 281.
— trochilus 7 : 281.
Phylloscopus abietinus 10 : 355, 356, 357.
— borealis 4 : [153], 282.
— collybita 5 : 126.
— — abietinus 2 : 107; 3 : 121; 4 : 282; 5 : 204; 8 : 104; 10 : 102; 11 : 61; 12 : 78; 13 : 55; 14 : 73; 15 : 143; 17 : 242.
— nitidus viridanus 12 : 247.
— proregulus 11 : 264.
— sibilatrix 5 : 126; 8 : 104; 9 : 35; 11 : 61; 12 : 78; 13 : 56; 14 : 74; 15 : 143; 17 : 242.
— superciliosus 1 : 110.
— trochilus 1 : 142; 2 : 106; 4 : 282; 5 : 126; 6 : 10; 7 : 8; 8 : 100, 104; 9 : 33, 35; 10 : 99, 102, 217, 355, 356, 357; 11 : 59, 61; 12 : 75, 78; 13 : 53, 55, 63; 14 : 71, 73, 79.
— — acredula 15 : 140, 143; 17 : 177, 240, 242, 248.
— viridanus? 9 : 35.
— sp. 13 : 56; 15 : 143.
Pica pica 3 : 122; 4 : 283; 5 : 126, 203; 7 : 8, 10, 282; 8 : 103, 106; 9 . 35, 38; 10 : 102, 104, 355, 356, 357; 11 : 61, 65; 12 : 78, 81; 13 : 55, 59; 14 : 73, 77; 15 : 143, 147; 17 : 230, 242, 245.
— — fennorum 7 : 8, 10; 8 : 103, 106; 9 : 35, 38; 10 : 102, 104; 11 : 61, 65; 12 : 78, 81; 15 : 147; 17 : 242, 245.
Picoides tridactylus 2 : 107; 3 : 122; 4 : 283; 5 : 204; 6 : 10, 225; 7 : 282; 14 : 74; 15 : 144; 17 : 230, 243.
Picus canus 1 : 143; 2 : 107; 4 : 283; 5 : 127; 7 : 283, 284; 8 : 104, 111, 194, 318; 12 : 247; 15 : 144; 16 : 77.
— — guerini 7 : 285.
— major 7 : [3], 4.
— viridis 7 : 284—285 (fig.); 8 : 371; 10 : 470.
Pinicola enucleator 4 : 283; 5 : 126, 203; 7 : 8; 9 : 35; 12 : 78; 15 : 143; 17 : 242.
Plectrophanes (-phenax) nivalis 1 : 70, 142; 152; 2 : 106; 3 : 121; 4 : 282; 5 : 203, 7 : 236; 13 : 55, 61; 16 : 24; 17 : 230.
Plotus alle 5 : 206.

Podiceps auritus **1**: 143; **3**: 43; **4**: 285; **5**: 127; **8**: 104; **9**: 36; **10**: 218; **12**: 79; **13**: 56;[1] **14**: 74; **15**: 144.
— cristatus **2**: [59], 107; **3**: 123; **4**: 285; **5**: 127, 205; **7**: 9, 14, 284; **8**: 104; **9**: 36; **12**: 79; **13**: 56;[2] **14**: 74; **15**: 144; **17**: 243.
— griseigena **3**: 123; **8**: 318; **9**: 36, 44, 233; **17**: 243.
— rubricollis **2**: 59.
— sp. **6**: 10; **7**: 9; **9**: 36.
Porzana porzana **7**: 317; **14**: 74.
Pratincola rubetra **7**: 281.
Prunella modularis **3**: 121; **4**: 282; **6**: 225; **8**: 104; **10**: 102; **11**: 62; **12**: 78; **13**: 56, 165; **15**: 144.
Pyrrhula pyrrhula **1**: 142; **2**: 106; **3**: 122; **4**: 47, 283; **5**: 126; **6**: 10; **7**: 282; **8**: 103; **9**: 35; **10**: 102, 355, 356, 357; **11**: 61; **12**: 75, 78, 81; **13**: 55, 60; **14**: 73; **15**: 143, 148; **17**: 230, 242.
Rallus aquaticus **6**: 225; **8**: 371; **9**: 234.
Regulus cristatus **3**: 4, 131.
— regulus **1**: 142; **2**: 106; **3**: 121; **4**: 47; **5**: 126, 204; **7**: 281; **8**: 104; **10**: 99, 102, 355, 356; **11**: 61; **12**: 78; **13**: 55; **14**: 73; **15**: 143; **17**: 242.
Riparia riparia **5**: 127; **6**: 10; **7**: 8; **8**: 100, 104; **9**: 36; **10**: 102, 357, 358, 359, 365, 367; **11**: 62; **12**: 78; **13**: 56, 65; **14**: 74; **15**: 144; **17**: 243.
Rissa tridactyla **2**: 33; **3**: 123; **4**: 285; **5**: 206; **7**: 9; **9**: 234.
Saxicola oenanthe **5**: 127; **7**: 281.
— rubetra **3**: 121; **5**: 127, 204; **6**: 10; **7**: 8; **8**: 104, 110; **9**: 36; **10**: 102, 355, 356; **11**: 62; **12**: 78; **13**: 56; **14**: 73; **15**: 144; **17**: 242.
Scolopax rusticola **3**: 44; **4**: 284; **5**: 127; **7**: 283; **8**: 104; **9**: 36; **10**: 103; **11**: 62, 75; **12**: 79; **13**: 56, 70; **14**: 74, 87; **15**: 144, 159; **17**: 243, 257.
Sitta europaea **2**: 30—31, 106.
— — europaea **2**: 31.
— — homeyeri **2**: 31.
— — uralensis **2**: 31; **6**: 225.
Somateria mollissima **1**: 143; **5**: 205; **6**: 15; **7**: 9; **8**: 104, 114, [188], 189, [190]; **9**: 36; **10**: 102, 218, 356; **11**: 62, 74; **12**: 79, 176; **13**: 56, 69; **14**: 74; **15**: 144; **17**: 256.
Spatula clypeata **1**: 143; **2**: 107; **7**: 9; **8**: 104; **10**: 470; **11**: 265; **12**: 78, 247; **14**: 74; **17**: 243.
Squatarola squatarola **1**: 143; **2**: 32, 107; **3**: 122; **5**: 205; **7**: 317.
Stercorarius longicaudus **7**: 9; **9**: 234; **11**: 172; **16**: 24, [43]; **17**: 243.
Stercorarius parasiticus **1**: 70, 143, 152; **3**: 123; **4**: 285; **5**: 206; **6**: 11; **7**: 9; **8**: 105; **9**: 36; **10**: 103; **12**: 79; **14**: 74; **15**: 144; **17**: 243.
— pomarinus **2**: 33, 107; **3**: 123; **5**: 206.
Sterna albifrons **10**: 219.
— caspia **4**: 285; **8**: 193; **15**: 226.
— hirundo **2**: 107; **3**: 123; **4**: 285; **5**: 127; **6**: 10; **7**: 9, 14, 52, 284; **8**: 100, 104, 116; **9**: 33, 36, 64, 65; **10**: 99, 103, 116, 117, 218; **11**: 59, 62, 76; **12**: 75, 79, 89, 90; **13**: 53, 56, 70, 72; **14**: 71, 74, 88, 89; **15**: 140, 144, 160; **17**: 240, 243, 258.
— macrura **5**: 206; **6**: 10; **7**: 52; **8**: 104; **9**: 36, 65; **10**: 103, 117; **11**: 62, 76; **12**: 79, 90; **13**: 56, 72; **14**: 74, 89; **15**: 141, 144, 160; **17**: 243.
— paradisea **1**: 143; **3**: 123; **4**: 285; **10**: 218.
— sp. **6**: 10; **7**: 9; **8**: 104, 189; **10**: 99, 103; **12**: 79; **13**: 56.
Streptopelia turtur **1**: 143; **2**: 107; **8**: 371.
Strix aluco **2**: 32; **5**: 204; **6**: 10, 13, 225; **7**: 9, 13, 52; **9**: 233; **10**: 102, 110; **11**: 62, 69; **12**: 78, 86, **13**: 56, 66, 165; **14**: 74, 81; **15**: 144, 154; **17**: 243, 252.
— nebulosa lapponica **3**: 122; **4**: 284; **7**: 52; **13**: 165.
— uralensis **3**: 122; **4**: 284; **5**: 204; **6**: 225; **7**: 52; **10**: 470.
Sturnus vulgaris **1**: 70, 142, 152; **2**: [39—40], 106; **3**: 122; **4**: [44], 283; **5**: 126; **6**: 10, 12; **7**: 8, 11, 53, 236, 282; **8**: 100, 103, 107, 190—191; **9**: 33, 35, 38; **10**: 99, 102, 105, 216, 355, 356; **11**: 59, 61, 65; **12**: 75, 78, 81; **13**: 53, 55, 59; **14**: 71, 73, 77; **15**: 140, 143, 147; **17**: 240, 242, 246; [**19**: 88].
Sula bassana **2**: 59.
Surnia nyctea **1**: 69, 152.
— ulula **1**: 69, 143, 152; **4**: 284; **5**: 204; **7**: 52, 283; **8**: 104; **9**: 36; **10**: 102; **11**: 172.
Sylvia atricapilla **2**: 106; **5**: 126; **8**: 104; **10**: 102; **11**: 62, 264; **12**: 78; **14**: 73; **15**: 144.
— borin **2**: 106; **3**: 121; **4**: 282; **5**: 127; **6**: 10; **7**: 8, 12, 281; **8**: 104, 108; **9**: 35; **10**: 102, 217, 355, 356, 357; **11**: 62, 68; **12**: 78; **13**: 56; **14**: 73; **15**: 144; **17**: 242, 248.
— communis **3**: 121; **5**: 127, 204; **6**: 10; **7**: 8, 281; **8**: 104, 108; **9**: 35; **10**: 102, 217, 355, 356; **11**: 62; **12**: 78; **13**: 56; **14**: 73; **15**: 144; **17**: 242.
— curruca **1**: 142; **5**: 127, 204; **6**: 10; **7**: 8; **8**: 104; **9**: 35; **10**: 102; **11**: 62; **12**: 78; **13**: 56, 63; **14**: 73, 80; **15**: 144; **17**: 242;
— nisoria **7**: 317.
— salicaria **7**: 281.
— sylvia **7**: 281.

[1] Per errorem Mergus a.
[2] Per errorem Mergus cr.

Sylvia sp. **7** : 8; **9** : 35.
Syrnium uralense **1** : 69, 152.
Terekia cinerea **12** : 248.
Tetrao tetrix **1** : 70; **3** : 6; **11** : 173; **16** : 33.
— urogallus **3** : 5, 6, 133; **3** : 122; **5** : 127, 206; **7** : 52, 53, 283; **9** : 36; **10** : 103, 137; **11** : 62, 173; **13** : 56; **15** : 144; **16** : 26, 33; **17** : [231], 243.
— — var. color. **1** : 143; **3** : 122.
— — × Lagopus lagopus **10** : 470.
Tetrastes bonasia **5** : 127; **8** : 105; **9** : 36; **11** : 62; **12** : 79; **13** : 56; **15** : 144; **17** : [231], 243.
Totanus littoreus **1** : 70, 152; **7** : 52.
— totanus **7** : 52.
Tringa erythropus **3** : 123; **4** : 284; **5** : 127, 205; **6** : 225.
— glareola **1** : 143; **2** : 107; **3** : 123; **4** : 284; **5** : 127, 205; **6** : 10; **10** : 103; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
— hypoleucos **4** : 284; **5** : 127; **6** : 10; **7** : 9; **8** : 104, 115; **9** : 36; **10** : 103; **11** : 62; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
— minuta (**11** : 188).
— nebularia **1** : 143; **2** : 107; **3** : 123; **4** : 284; **5** : 127; **9** : 36; **10** : 103; **11** : 62; **14** : 74; **17** : 243.
— ochropus **1** : 143; **5** : 127, 205; **6** : 225; **11** : 265; **12** : 79; **17** : 243.
— totanus **1** : 143; **4** : 284; **5** : 205; **6** : 10; **7** : 9; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 103, 218; **11** : 62; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243.
— sp. **17** : 243.
Troglodytes troglodytes **1** : 142; **3** : 121; **5** : 127, 204; **7** : 8; **8** : 104; **10** : 102; **11** : 62; **12** : 78; **15** : 144; **17** : 242.
Turdus iliacus auct. **3** : 121; **4** : 282; **5** : 204; **6** : 10, 13; **7** : 8, 12, 281.
— ericetorum philomelos **17** : 242, 250.
— merula **2** : 106; **3** : 121; **5** : 204; **6** : 10; **7** : 8, 12, 281; **8** : 104, 191, 318; **9** : 36, 40; **10** : 102, 355, 356, 357, 469; **11** : 62, 68; **12** : 78; **13** : 56, 65; **14** : 73, 165; **15** : 144, 152; **17** : 242.
— musicus **1** : 142; **2** : 106; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 127, 204; **6** : 10, 13; **7** : 8, 12, 281; **8** : 104, 109; **9** : 36, 40; **10** : 102, 108, 355, 356, 357; **11** : 62; **12** : 75, 78, 84; **13** : 56, 64; **14** : 71, 73, 80; **15** : 140, 144, 152; **17** : 239, 242, 250.
— philomelos (-lus) **1** : 142; **2** : 106; **4** : 282; **5** : 127, 204; **6** : 10; **7** : 8; **8** : 104, 109; **9** : 36, 40; **10** : 102, 355, 356, 357; **11** : 62; **12** : 75, 78, 84; **13** : 56; **14** : 73; **15** : 144, 152.
— pilaris **1** : 142; **4** : 282; **5** : 127, 204; **6** : 10, 12; **7** : [4], 8, 51, 52, 281; **8** : 100, 104, 109; **9** : 33, 35, 40; **10** : 102, 107, 355, 356, 357; **11** : 59, 62, 68; **12** : 75, 78, 83; **13** : 53, 56, 63; **14** : 71, 73, 80; **15** : 140, 144, 150—152; **17** : 239, 242, 249.
Turdus torquatus **10** : 102; **11** : 62; **15** : 144.
— viscivorus **3** : 121; **4** : 282; **5** : 127, 204; **6** : 10; **7** : 8; **11** : 62; **12** : 78; **13** : 56; **14** : 73; **15** : 144; **17** : 242.
— sp. **4** : [44], 47; **7** : 8; **8** : 104; **9** : 36; **10** : 355, 356; **11** : 50; **12** : 78.
Tyto alba guttata **12** : 74, 247.
Upupa epops **2** : 58, 112; **12** : 247; **15** : 269; **19** : 299.
Uria aalge **13** : 165.
— grylle **4** : 285; **5** : 206; **6** : 11, 24; **7** : 9, 26; **8** : 105, 134; **9** : 36, 66; **10** : 99, 103, 135; **11** : 59, 62, 63, 94; **12** : 75, 79, 106; **13** : 56, 87; **14** : 74, 106; **15** : 144, 174; **17** : 243, 274, 336.
Vanellus vanellus **5** : 127; **6** : 10; **7** : 9, 53, 283; **8** : 104, 192; **9** : 36; **10** : 218; **11** : 62, 74; **12** : 79; **13** : 56; **14** : 74; **15** : 144; **17** : 243, 256.

MAMMALIA.

Agricola agrestis **2** : 105; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 203.
— — var. color **3** : 121.
Alces alces **10** : [252], 254, 469; **11** : 264; **14** : 165; **15** : 269; [**17** : 231].
— machlis **7** : 284.
Alopex lagopus [**17** : 231].
Arvicola agrestis **11** : [170], 172.
— amphibia **12** : 13.
— arvalis **3** : 121; **12** : 247; **14** : 165.
— terrestris [**14** : 123].
— sp. **20** : 105.
Bos taurus **3** : 282.
Canis domesticus **10** : 361.
— familiaris **1** : 69, 152; **3** : 121; **5** : 202.
— lagopus [**9** : 25].
— lupus **12** : 247; [**14** : 123]; [**17** : 206, 207, 229, 231].
— vulpes **7** : 284; [**16** : 26, 32, 40]; [**17** : 205, 206, 229, 231].
Capra hircus × Ovis aries **8** : 371.
Capreolus capreolus **9** : 233; [**14** : 123].
Castor fiber **8** : 371; **10** : 469; **14** : 165; [**17** : 231].
Cervus capreolus **10** : 252, 254.
— dama **10** : 252.
— elaphus **10** : 252.
Crossopus fodiens **2** : 105; **3** : 121; **4** : 281; [**14** : 123].
Dicronatyx groenlandicus **16** : 34.
Elephas primigenius **19** : 299.
Eliomys quercinus **6** : 68—79 (mp.), 225; **11** : 264; **12** : 247; **14** : 165.
Epimys norvegicus **6** : 78.
Equus caballus **1** : 142; **4** : 282.
Erinaceus europaeus [**3** : 20, 21, 131]; **4** : 281; **5** : 202.
— — var. color. **8** : 371.

Evotomys glareolus **4** : 282; **11** : 173; **16** : 33.
— rufocanus **11** : 173; **15** : 54; **16** : 26, 33.
— sp. [**17** : 229].
Felis domestica **10** : 361.
— lynx **4** : 281.
Fiber zibethicus **2** : 106; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 203; [**9** : 234]; [**12** : 130].
— — var. color. **6** : [164—166] (fig.), 225; **8** : 374; **14** : 165.
Foetorius putorius **2** : 105; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 202; **6** : 225; **7** : 284; **10** : 358, 469.
Gulo gulo **14** : 165; [**17** : 229, 231].
Homo [**4** : 160]; **10** : 361.
Hypudaeus glareolus **2** : 105; **3** : 121; **10** : 358, 359, 360, 361.
Lagenorhynchus albirostris **12** : 74, 247; **13** : 165.
Lemmus lemmus **8** : 258; **11** : 170—174; **15** : 51, 52—55; **16** : 23—28, 28—44; **17** : [204—205], 229, [231, 232].
— obensis **16** : 34, 42.
— schisticolor **11** : 173.
— sp. **20** : 105.
Lepus cuniculus **4** : 282.
— europaeus **1** : 43; **2** : 106; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 203.
— timidus **1** : 142; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 203; [**6** : 77]; **7** : 284; **11** : 173; **16** : [23], 33; [**17** : 231].
— — var. color. **4** : 282.
Lutra lutra **2** : 105; **5** : 202; [**6** : 77]; [**17**: 229, 231].
— vulgaris **3** : 121.
Lynx lynx **7** : 316; **10** : 469; **11** : 264; **14** : [123], 165; **15** : 269; [**17** : 231].
Martes martes **14** : [123], 165; [**17** : 231].
Meles meles **10** : 359; [**14** : 123].
— taxus **1** : 142; **7** : 284; **10** : 361.
Microtus [**11** : 173].
— agrestis **10** : 358, 360, 361, 366; **11** : 173; **15** : 54; **16** : 23, [24, 27], 32, [33].
— amphibius **11** : 173; **16** : 32.
— arvalis **8** : 259.
— californicus **8** : 259.
— ratticeps **11** : 173; **16** : 33.
— terrestris **3** : 21, 121; **4** : 282; **5** : 203; **10** : 358, 359, 360; **16** : 33.
— sp. **10** : 360.
Mus agrarius **5** : 203; **10** : 469; **17** : 336.
— decumanus **3** : 121; **6** : 78; **10** : 358, 360, 361.
— — aberr. **1** : 142.
— — var. color. **3** : 121.
— minutus **2** : 105; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 203; **6** : 225; **7** : 316; **8** : 198; **9** : 233; **11** : 264; **14** : 165.
— musculus **1** : 142; **2** : 105; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 203; [**6** : 77]; **10** : 359, 360.
Mus musculus var. color. **1** : 142; **4** : 282.
— rattus **1** : 62.
— silvaticus **2** : 105; **4** : 282; **5** : 203; **10** : 358, 359, 360, 361; **11** : 173; **16** : 33.
— sp. [**17** : 229].
Mustela erminea **1** : 142; **5** : 202; **11** : 174; **15** : 55; **16** : 24; [**17** : 206, 229, 231].
— nivalis **1** : 142; **2** : 105; **3** : 121; **5** : 202; **11** : 174; [**14** : 123].
Myodes schisticolor **16** : 30, 32.
— torquatus **16** : 34.
Oryctolagus cuniculus **10** : 361.
Phoca foetica **2** : 105; **5** : 202.
— — ladogensis **2** : 105; **4** : 282; **6** : 225.
— — saïmensis **2** : 105; **3** : 121, [125].
— groenlandica **5** : 203.
— sp. **5** : 202.
Phocaena communis **7** : 316.
— phocaena **1** : 141, 142; **6** : 225; **17** : 336.
Pitymus savii **8** : 259.
Plecotus auritus **12** : 247.
Pteromys volans **1** : 142; **3** : 121; **5** : 203; **6** : 225; **10** : 358, 359, 365.
Putorius putorius **1** : 142.
Rangifer tarandus **3** : 121; **9** : [25], 233; **10** : 248—255 (fig.); [**16** : 27]; [**17** : 231].
— — fennicus **8** : 371.
Rattus **17** : 171.
Sciurus vulgaris **1** : 142; **5** : 203; **7** : [4], 284; **10** : 355, 358, 359; **11** : 264; [**16** : 23, 26]; [**17** : 229, 231].
— — var. color. **6** : 225.
Sicista betulina **17** : 336.
— subtilis **12** : 247.
Sminthus subtilis **4** : 142, 143; **6** : 225; **7** : 316.
Sorex araneus **5** : 202; **11** : 173; **15** : 55; **16** : 26, 33.
— minutus **7** : 316.
— pygmaeus **3** : 121; **10** : 359, 360.
— vulgaris **3** : 121; **10** : 358, 359, 360, 361, 368.
— sp. [**11** : 173]; [**16** : 23].
Sus scropha domestica **4** : 282; **5** : 203.
Talpa europaea **1** : 142; **3** : 121; **4** : 281; **5** : 202; **10** : 359, 360; (**14** : 123).
Ursus arctos **4** : 282; **5** : 202; **10** : 469; [**17** : 231].
Vespertilio borealis **10** : 361.
— daubentonii **2** : 105; **8** : 199.
— mystacinus **5** : 202; **9** : 233; **10** : 361.
Vesperugo borealis **3** : 121; **5** : 202.
— noctula **8** : 199.
Vison lutreola **1** : 142; **3** : 121; **5** : 202; **8** : 371; **14** : 165.
Vulpes vulpes **2** : 105; **3** : 121; **4** : 282; **5** : 202; [**6** : 77]; **10** : 361.
— — v. nigroargenteus **5** : 202.

CORRIGENDA. — BERICHTIGUNGEN.

Pag. 71 rechts, Zeile 3—1 von unten sind gegen
Zeile 1—2 Pag. 72 links zu vertauschen.